

247^c 250
A xxix Alt

60:
 56:
 38:
 24:10
 30:-
 28:10
 27:-
234:15

40:5
 21:-
 20:-
 120:-
 30:-
 25:-
 35:-
 20:10

 30 L:15
 45

 346:15:-
 346:-
 234:-


 2 L:12:-

AL TOMARI. MED PRAC.









55358(1)

DONATI ANTONII ab Altomari,

MEDICI, AC PHILOSOPHI
NEAPOLITANI,

DE MEDENDIS HUMANI
CORPORIS MALIS,

A R S M E D I C A .

*A Iacobo Rubeo Furciensi sub Ioannis ab Altomari censura quàm dili-
gentissimè recognita, simul cum locis, & Galeni numeris
integris denuo in margine ad studiosorum
emolumentum repositis.*

Q V A R T A E D I T I O .

Cum priuilegijs Summi Pontificis, Regis Neapolis, Regis
Franciæ, ac Illustris, Senatus Veneti.

De lib.

*Phisici 75
Cavari*



*Joseph Antonii
An. 2. 11. g. Lat.*

Ant. 2. 11. g. Lat.

V E N E T I I S
Apud Ioan. Anto. de Maria.
M D LXX.

PAULO III. PONT.

Maximo, atque Sanctiss.

DONATVS ANTONIVS.


AB ALTOMARI.



Vm maximam, præcipuamq; meæ etatis partem in Medicinæ studijs consumpsissem P.M. atq; Sanctiss. uidererque omnia meæ professionis spatia decurrisse, ad ea demum me contuli, (quæ paucis demptis) totam penè Medicinam absolvere uiderentur. in quibus non succissimis (ut aiunt) horis, sed diu multumque uersatus perfeci, ut singularem humani corporis partium morbos cognoscendi primum breuem mo-

dum, deinde in eis prædicendi, curandique omnibus indicarem, uia quadam, ac methodo usque à Galeno intacta, à nulloque absoluta Quæ dum mecum commentarer, non defuere, qui in me turpiter essent maleuoli, meoque de nomine & fama detrudere arbitrantur, uarijs calumnijs, non religione, sed maleuolentia, ut nigro notarer carbone, à patria non tantum eijcere, sed etiam arcere conati sunt: perfeceruntque, ut & solum uerterem, Romæque adirem. Quamobrem meas lucubrations omnes detraxi, & meridiationes, nec addere potui, quibus uti solebam. Vnde effectum est, ut opus istud, quod in manibus tunc habebam, iamdiu esset imperfectum, atque inelaboratum. Qua calamitate cum te unum præter cæteros, tua, qua es in omnes singulari humanitate, acerrimum mei defensorem præstitisse, meque pro uirili tueri non destitisses, non modò domum, & ad patriam, uerum etiam ad præstinam dignitatem, quam semper te fauore seruauit, sum restitutus, datique sunt mea ad studia reditus: & quæ in illa calamitate prope oblanguerant opera oculos susstulerunt. Cumque in illis noctes & dies urgere, quæ prius fuerant imperfecta, perfeci. Quod cum ita sit, quicquid est hoc Medicæ artis tibi uni acceptum referre debeo. Tuo igitur patrocinio, cui me totum tradidi, fretus, illud in apertum proferre constitui. Per te enim absolutum, per te etiam inuidorum calumnijs uindicandum æquum esse duxi. Suscipe igitur munusculum hoc tranquillo animo, serenaque fronte, tanquam signum quoddam meæ erga tuam sanctitatem iustæ, ac debitæ seruitutis: uelut etiam me illius authorem in re

bus aduersis semper suscepisti, in quo animum, non rem in spectes, oro,
nec alienū à tua dignitate ducas. Est enim sapientis, et prudentis literas
earumque cultores utcunque amplecti. Nec me præterit, te arte Medi-
ca potius, quàm medicis ipsis oblectari. Huc accedit, quòd cui magis in
hac re sit tribuendum, uideo neminem. Nam ut omittam, quæ te omni-
bus numeris absolutum à pueritia reddiderunt, quid dicam de animi
fortitudine? quam in maximis robur gerendis, dubiisque sustinendis
& semper declarasti, & nuper præcipuè, cùm tota Italia intestino bel-
lo ardere cœpisset (cùm & bella uitari interdum nequeant, ubi res ur-
geat, pax autem semper seruanda, si fieri potest) sicut initia illius obi-
ter admisisti ita extrema libenter honorificentissimè et fortiter es per-
secutus, paceque, ex omnium sententia desperata, tua uigilantia, maxi-
maque auctoritate effecisti, ut omnia pacem essent habitura, & Phil-
ipum, Regem nostrum Sereniss. ea beneuolentia tibi reconciliasti, ut te
unum, præter omnes (quot fuere unquam) Pontifices Maximos, & ipse
admiretur, & nostra etiam memoria: adeò, ut quæcunque tuo motu cõ-
silioque gesta sunt, præclarè sanctèque gesta omnia arbitretur. Itaque
omnes Pontificem talem habuisse letamur, nec iniuria. Quis enim un-
quam in Deum ea religione fuit? Sanctæque Romanæ Ecclesiæ defen-
sor adeò assiduus, & ueluti sui patrimonij uehemens fortisque propu-
gnator? Quid dicam de uitæ integritate? summaq; in omnes charitate?
Quid de domesticarum rerum ordine, & publicarum administratione?
Quæ omnia, ut in terris ad hunc magnum dignitatis gradum, atque am-
plissimum te extulerunt: sic apud Deum æternam sedem tibi parasse
omnibus est exploratum. Ad quam ne quamprimum, sed multis post an-
nis proficiscaris, omnes, pro Reip. Christianæ commodis, maximaque
pro illius, fidei seruandæ necessitate, cupiunt & optant. Vale Ponti-
fex Sanctiss. & meæ (quamuis indignæ tanto Pontifice) seruitutis, eius-
que semper augendæ uoluntatis, ex animo tuo nunquam discedat me-
moriam, meam enim tuorum erga me meritorum nulla unquam delebit
obliuio, Neap. V. Kal. Februarij. M. D. LX.



IACOBVS RVBEVS,

FVRCIENSIS,

IOANNI AB ALTOMARI

SVO EXIMIO PRAECEPTORI.

S.

D.



ANTI est apud te, offeruan-
de præceptor, Donati Anto-
nij ab Altomari tui parentis
(uiri nunquam satis laudati)
auctoritas, ut quiduis in suis
operibus mendi, & si leuif-
simum sit, id minime pa-
ti ualeas. Cum itaque librum
de medendis humani corporis malis (opus sane per
utile, ac necessarium) Typographorum incuria mul-
tis mendis esse refertum cognosceres, cuiusque tum
tui patris nomine, tum etiam doctissimorum uiro-
rum, ac artis medicæ officiosorum auiditate, uiola-
tos locos, atque numeros in ipsis locis cum Galeni
numeris componens integros reponere mihi, & alijs
amicis, efflagitantibus sæpe, sæpius promississes, idque
quidem fecisses, si per summas occupationes, qui-
bus quotidie detineris, licuisset. Quare cum promif-
sum hoc non modo propediem te facere posse spe-
rares, uerum etiam te nullo pacto agere posse con-
cerneres

cerneres, me uocasti, negotium dedisti. Ego etsi gra-
uius onus, quàm ferre possem humeris meis imposi-
tum esse intelligerem, nolui tamen tergiuersari, ne
tuæ qui tantum apud me auctoritate, & beneficijs
ualeas dicerer uoluntati, uel libētissime non obtēpe-
rare. Curaui itaque mandatum diligenter, eòque dili-
gentius, quo uideo librum hunc ad communem ho-
minum utilitatem & ad conualescendum uires, &
corpus recuperandum, non parum adiumenti homi-
nibus allaturum. habes ergo officiose præceptor la-
boris mei ueluti primitias, quas spero tibi non im-
probatum iri. futurum est enim fortasse, ut ex hac se-
cunda excusione liber auctore ab ipso recognitus ef-
se uideatur. illud uero mihi dubium non est, quin
meum in hac re officium tibi futurum sit iucundum
ama igitur tui discipuli uoluntatem.
& uale. Neapoli.

INDEX EORVM QVAE IN ARTE

MEDICA DESCRIBVNTVR,

PER SERIEM DIGESTVS:

annotatis & capitum, & pagellarum
numeris.



E Methodo artis	De nyctalope.c.31.	f.142.
Medicæ, deque	De ægillope.c.32.	f.144.
aliis ad eam rem	De aurium dolore.c.33.	f.145.
aut necessariis,	De aurium sonitu.c.34.	f.149.
aut scitu dignis	De difficili, seu graui auditu, & surdita	f.151.
in Præf. Pag. 1.	te.c.35.	f.154.
De memoria de-	De parotidibus.c.36.	f.156.
perdita. Cap. 1.	De lēſione olfactus, & narium uitis.c.	f.158.
fol.	18.	f.160.
De lethargo. Cap. 2.	37.	fo.161.
De caro Cap.3.	fol.24.	f.165.
De catoche, uel de catalepsi.c.4.	fol.28.	f.171.
De co.mate, seu de cataphora.c.5.	fo.29.	f.174.
De phrenitide. Cap.6.	f.31.	cap.44.
De melancholia. Cap.7.	f.34.	fol.
De furore, seu infamia.c.8.	f.42.	De glandularum iuxta linguam inflā-
De lupina infania.c.9.	f.51.	matione.c.45.
De capitis dolore.c.10.	f.56.	f.183.
De coephalea.c.11.	f.56.	De anguina.c.46.
De hemicrania.c.12.	f.75.	f.185.
De conuulsione.c.13.	f.77.	f.193.
De resolutione.c.14.	f.79.	f.199.
De conuulsione canina.c.15.	f.85.	f.206.
De incubo.c.16.	f.91.	De laterali dolore, seu morbo.cap.50.
De uertigine, & tenebricosa uertigi-	f.92.	fol.
ne.c.17.	f.94.	218.
De epilepsia, seu morbo comitiali	fol.	f.240.
Cap.18,	f.99.	De pneumonia.c.51.
De Apoplexia.c.19.	f.109.	De empyemate, seu suppuratione. ca.
De lippitudine.c.20.	f.116.	52.
De ungue oculi.c.21.	f.123.	f.244.
De sugillatione.c.22	f.125.	f.257.
De oculorum ulceribus.c.23.	f.126.	f.259.
De cicatricibus, & albuginibus. c.24.	[f.126.	266.
fol.	c.24.	276.
De pustulis.c.25.	128.	288.
De procidentia oculi.c.26.	f.129.	De lactis redundantia.c.57.
De mydriasi, seu pupillæ dilatione.	f.131.	282.
Cap.27.	f.132.	De lacte in casei spetiem, seu grumos
De tabe pupillæ.c.28.	f.134.	conuerso.c.58.
De suffusione.c.29.	f.136.	283.
De oscuritate, seu offuscatione oculo-	fol.	De mammaram inflammatione.c.59.
rum.c.30.	f.140.	284.
		De cardiaco morbo, & cardialgia, seu
		Cordis dolore.c.60.
		292.
		De canina appetentia.c.61.
		294.
		De citta, siue pica.c.62.

De bulimo, seu ingēti esuritione. c. 63	452.
fol. 2.96	
De cibi fastidio, seu inappetentia. c. 64.	457.
fol. 298.	
De immoderata siti. c. 65.	303.
De singultu. c. 66.	306.
De supinitate, stomachi subuersione, nausea, & vomitu. c. 67.	310.
De inflammatione stomachi, vel ventriculi, c. 68.	318.
De cruditate. c. 69.	320.
De inflatione ventriculi. c. 70.	325.
De leuitate intestinorum, & cœliaca, seu ventrali affectione. ca. 71.	329.
De cholera. c. 72.	335.
De alui profluuiio, seu ventris fluxu. c. 73.	339.
De dysenteria, seu torminibus. ca. 74.	349.
fol. 349.	
De tenesmo, seu tinesmo. ca. 75.	361.
De hæmorrhoidibus. c. 76.	364.
De ragadiis. c. 77.	371.
De procidente ano, vel de procidentia ani. c. 78.	374.
De colico affectu, seu coli dolore. c. 79.	376.
De ileo, seu voluulo. c. 80.	384.
De lumbricis. c. 81.	389.
De hepaticis, vel ijs, qui iocinoris imbecillitate laborant. c. 82.	399.
De hepatis obstructione. c. 83.	408.
De inflammatione hepatis. c. 84.	413.
De scirrho, seu tumore scirrroso hepatis. c. 85.	419.
De ictero, seu morbo regio. c. 86.	423.
De nigro ictero. c. 87.	429.
De inflammatione lienis. c. 88.	418.
De scirrho lienis. c. 89.	436.
De malo corporis habitu. c. 90.	439.
De aqua intercutem, seu hydropico morbo. c. 91.	442.
De diabete. c. 92.	452.
De sanguinis renum profluuiio. ca. 93.	457.
fol. 457.	
De lapide renum. c. 94.	461.
De inflammatione renum. c. 95.	470.
De exulceratione renum. ca. 96.	474.
De stillicidio vrinę. c. 97.	477.
De diffiultate vrinę. c. 98.	481.
De suppressione vrinę. c. 99.	483.
De his, qui in seipsis mingunt, vel de his qui vrinam continere non possunt. c. 100.	488.
De lapide vesicę, seu calculo. ca. 101.	491.
fol. 491.	
De inflammatione vesicę. c. 102.	494.
De exulceratione vesicę. c. 103.	496.
De feminis profluuiio. ca. 104.	499.
De priapismo, & satyriasi. c. 105.	503.
De ignavis partibus genitalibus. ca. 106.	502.
De vteri affectibus, & primo de mensium suppressione. ca. 107.	509.
De immodica purgatione vteri, & sanguinis profluuiio. c. 108.	517.
De mulierie bri profluuiio. c. 109.	520.
De veteri stragulatione, seu suffocatione. c. 110.	524.
De vteri prolapsu, seu procidentia. c. 111.	530.
De mola. c. 112.	531.
De non concipientibus, siue sterilibus. Cap. 113.	535.
De difficultate partus. ca. 114.	541.
De secunda derelicta. ca. 115.	547.
De vteri inflammatione. c. 116.	548.
De exulceratione vteri. c. 117.	552.
De Ischiade, seu coxendicum dolore. c. 118.	554.
De podagra, & arthritide, seu morbo articulari. c. 119.	561.

F I N I S.

DONATI ANTONII

ab Altomari,

MEDICI AC, PHILOSOPHI
NEAPOLITANI,

DE MEDENDIS HUMANI
CORPORIS MALIS,

A R S M E D I C A .

M E T H O D V S .



V M de singulis humani corporis locis male affectis dignotionem, prognosticū, ac curationem rationabili uia, & Galeni methodo post eum hucusque intacta, à nulloq; in lucē edita conscribere proposuerim: efflagitantibus quibusdam amicis studiosis, artisq; medicæ cādidatis, quo facillimè in singulis malis quouis eorum uiam hanc assequi ualeat, uniuersalem methodum uno capite contentā prius describēdam fore putauī, sub qua demum promptius in particularibus se exerceāt. Fit namq; exercitatio omnis cū particularia sub eandem uiam, ac rationem ducuntur. Viæ siquidem, & rationes ubi solæ sine

multifaria secundum ipsas exercitatione cognoscuntur, haudquaquam possunt perfectos efficere discipulos, uelut secundo de locis affectis Gal. scriptum reliquit. Quapropter nono methodi medendi non ab re decretum est ab eo, non licere ullius artis scientiam nancisci, nisi & methodum quandam habueris per uniuersalia uocata theoremata, & in particularibus te exemplis exercueris; namque in uniuersalibus methodus, in particularibus exercitatio consistit. Et lib. 9. de Hippo. & Plato. decretis dicebat. Vniuersalis methodus sine exercitatione multa in singularibus artificem bonum efficere non potest. Qua ergo uia, ac ratione ualeat quispiam affectam sedem omnem, ac quemuis præter naturam affectum, eiusque causam dignoscere, & eis cognitis quid deinde futurum sit præsentire, & prædicere, ac demum si affectus is curari ualeat, curare, iuxta Hippocratis, & Gal. monumenta potissimum hoc loco scribere aggrediar. In his namque tribus continetur omnia quæ ad artem medicā spectant nā cōmoda ea sunt uel ad dignotionē, uel curationē, uel prognosticū. Curatio aut per se a medicis exercetur, prænotio uero, & dignotio propter curationē, ut Gal. inquit primo de rōne uictus in morbis acutis. & proinde inter primarias partes artē medicā diuidi asserere melius erit, quā in quinque,

2. de loc. aff.

cap. 9.

9. meth. cap. 6.

Intentio & li.

9. de Hip. & Pl

decre. & c. 2.

Ccm. 3.

A ut

ut quibusdā uisum fuit ex eisdē Galeni sententia. Sub eandē deinceps uia, & rationem particulares omnes affectas partes ipsosq; affectus, & eorū causas proprias docere conabor, prout in singulis his patebit; cum nō satis sit, ut diximus, methodū nouisse, sed multifaria insuper exercitatione in his quæ particulatim occurrunt opus est, ut liquet primo de causis symptomatum; propterea quod pro locorum differentia, ac affectuum præter naturam curationem quoque uariari contingit. Quamuis oportet, ut Erasistrato placuit, hominem exercitissimæ considerationis esse, qui uoluerit non solum ipsius affectus qualitatem, sed affectum quoque locum probe dignoscere, præsertim si in imo corporis lateant. Nam quæ in superficie sunt constitutæ partes unā cum affectuum suorum specie faciliē sensibus deprehenduntur. Sunt uerō morbi non in manifesto loco hærentes multi, atque hi qui ad interna uertuntur, ut Hippocr. inquit, libro de arte; quorum nullus est, quem oculis conspicienti uidere, ac cognoscere contingit, & ab arte quoque obscuri esse iudicati sunt, & proinde obscuri morbi appellati sunt; qui cum oculorum conspectum effugiant, mentis tamen oculis obtinentur, & superantur, ut ipse refert. Primum denique quod in ægris medicum inspicere oportet, ut Gal. uisum est primo, & tertio de locis affectis, est quæ nam corporis pars sit affecta, & nunquid ea per se afficiatur, uel alteri consentiat. Qua propter semper incipere oportet à læsæ actionis instrumento, eiusdem Gal. præcepto, eodem primo de locis affectis. Quo inuento, ipsam deinceps dispositionē quærere opus est; ut ex utriusque simul totius curatiui generis indicatio sumatur, ut apud eundem Gal. liquet tertio de locis affectis. Verum quæ nam pars afficiatur, priusquam eius natura, seu essentia sit cognita, actio, seu usus eius, & compositio cum qua, & societas, quam cum alijs habet, comprehenditur, ratione quadam, ac uia rite inuestigabit nemo, ut primo de loc. affect. & li. de const. artis medicæ patet. Nihil autem interest si positionem, aut compositionem, uel cum proximis societatem dixeris. Hæc autem per artem secandi corpora accurate cognoscere oportet, præsertim qualis sit cuiuslibet partis essentia, ac compositio; ut exinde earum cuiuslibet, cum actiones, tum usus manifestentur; non siquidem solis anatomicorum libris fidem adhibendo, qui magna ex parte infinitis erroribus pleni comprehenduntur, sed propriis oculis diligenter inspiciendo. Cognita nanque hoc modo cuiusuis partis substantia, ac compositione, actionē cuiusque earum, quinetiam earundem utilitates nullo negotio inuenies, ab ipsa partium natura doctus; cum uidelicet exactè, ut diximus partium essentiā, ac totam earum constructionem noueris, iuxta Gal. sententiam ij. de usu partium. Hæc nanque corporum dissectio, ut ipse refert, se ipsum Gale. docuit, ut patet primo de loc. affect. cum alia permulta, tum cuiuslibet partis essentiæ proprietatem. Hanc igitur anatomen propriis oculis, ac sæpius recte inspicere ab his, qui eam callent, conemini, ut quæ dicturi sumus prompte intelligere ualeatis. Nam iis, qui eam ignorant, forte quæ dicemus, & si ratione dicta sint, ueluti insomnia quædam uidebuntur. Nos uero his qui corporum dissectionem haud ignorant, sed propriis oculis mecum, uel ab aliis administratam probè, ac sæpius inspexerunt, has lucubrationes scribere paramus. Hi nanque, partium essentia, ac compositione cognita, earum cuiuslibet, cum actionem, tum usum haud ignorabunt. Cum singulæ nostri corporis partes aut peculiarem habeant actionem, aut aliquem præstent usum; pro comperto etiam habeant actiones partiū duplices esse pro duplici earū natura, alteras simplicium, & simularium, reliquas compositarum, seu instrumentalium. Quæ siquidem partium actio motus est earundem factiuus. Insuper non præteribit eos quælibet partiū usū aut gratia conseruationis, & tutelæ fuisse, uel ut causam sine qua non pōt actio perfici, aut, ut melius eadem perficiatur, quorū omniū Gale. pro teste habent

Cap. 3.
Vide. 1. de loc.
aff. c. 2.

Paulo post me
dium,

Quid primo in-
uestigandum sit
in ægris.
1. de loc. affect.
cap. 2. & 3.
3. de loc. aff. c. 1
& 3.

Cap. 2.
Cap. 3.

1. de loc. aff. c. 2
Lib. de const.
art. med. c. 16
Ars secandi cor-
pora non igno-
randa.

2. de usu part.
cap. 3. & 7.

Cap. 1.

Quibus fuerit
hoc opus con-
scriptum.

habent tum libro de constitutione artis medicæ, tum primo de usu partium, & ut uno perstringam verbo, medico usum præstant confectiones anatomicæ, non modo ad affectus noscendos, sed ad eos curandos, ac ad illorum præfagia; ut secundo de anatomicis administrationibus ab eodem Gal. dictum est. Qui igitur cuncta quæ diximus exacte nouerit, nõ nihil utilitatis ex his, quæ dicemus, exportabit. Vt autem & hi mentem exerceant in affectorum locorum notitia, tres exercitationis modos, Erasistrati autoritate, Gal. secundo de locis affectis proposuit. Quorum unus est circa singulas corporis partes, quas locos uocant. Alter circa causas, & dispositiones. Tertius circa symptomatum differentias. His nanque rite cognitis, ac inter se distinctis, facile propositæ rei ueritas percipi potest, singulorum per eam facta contemplatione. Veruntamen nos, ut quæ facilius sit, & ne eadem bis repetamus, ea exercitationis uia præcipue utemur ad affectorum locorum notitiam, quæ quidem ex symptomatibus, ac eorum differentia procedit, cum hoc tamen, & reliqua quæ diximus, non negligentes. Ex hoc nanque genere eorum quæ præter naturam sunt, sperandum est comparari posse exacte dignoscendarum partium affectarum iudicium, uelut Gal. scriptum reliquit lib. de constitutione artis medicæ. Quantum autem præstet usum affectorum locorum notitia in curandis singulis corporis uitijs, Gal. passim in cunctis fere suis commentarijs meminit, præsertim lib. primo de locis affectis. Nam quod quilibet præter naturam affectus suo auferatur contrario, communis. Hippoc. decreto, affectus ipse indicat; ut si calidus, frigidus, & si frigidus calidus. At quo usque, quo modo, aut qua materia id exequi liceat, affectus ipse non indicat duntaxat, sed ipsa pars affecta commonstrat: quemadmodum de phlegmone in diuersis partibus orta, pro ipsarum partium diuersitate libro 13. methodi Gale. docuit terminum, modum ac diuersam medicamentorum materiam eligere. Quare ad usum dextrum adiumentorum necessarium esse exacte scire partis curandæ substantiam, formationem, ac situm lib. de constitutione artis medicæ decretum reliquit. Quantam insuper uim habeat hæc notitia in ea artis parte, quæ prognostica dicitur, & si sexcentis in locis confiteatur Gal. quarto, tamen ne præfagatione ex pulsibus per hæc uerba palam ostendit, cum dixit. Proinde cui status facultatis perspectus ad unguem sit, locusque affectus & eius affectus, hic ad futura præsentienda est peritissimus: & tertio methodi medendi disseruit, primum artis opus esse ut intelligas sperare ne id, quo tendis, debeas, an secus. Cuius rei cum duplex possit haberi cognitio, altera per experientiam, cui longo usu est opus, altera per ipsius rei naturam; hæc si quidem cuiusque particulæ substantiam existimabit, tum actionem, & usum ac situm ipsum, à quibus procedens non solum quod sanari non potest, præuidebit, sed etiam quod recipere sanitatem potest, de inueniendis, ei remediis deliberabit. Habes igitur ex his quantum conferat, cum ad curationem tum ad prognosticum partium affectarum notitiā, ex Galeni monumentis. Præter id quod non nihil etiam afferat utilitatis ad affectus dignotionem ipsius loci naturæ, cum ea fuerit cognita, ueluti primo de locis affectis liquet. Reliquum denique erit postquam ea primo uenit inuestiganda, docere quo modo, ac qua uia partem quampiam affectam dignoscere ualeamus. Cum uero ex nonnullis notis ipsa deprehendi possit, ut testatur Galenus primo de locis affectis, à læsa tamen actione prius eius dignotio auspicianda est; ex qua sola, cum nulla alia pateret uia, idemmet Gal. confessus est inuenisse partem affectam tertio de locis affectis. Est nanque cuiuslibet partis affectæ proprium symptoma, propriæ actionis eiusdem noxa, siue simularium, siue instrumentalium partium actio fuerit; singularum & enim animalis corporis actionum unam esse propriam particulam, per quam fiunt,

lib. de cõf. ar.
med. c. 4. & 5.
1. de usu part.
cap. 8
Anatomes
usus.
Cap. 1
Cap. 1.

Cap. 15. & 16.
Notitia affecto-
rum locorum
quos præstet
usus.
Cap. 1.

Cap. 6. & sequē-
tibus.
Cap. 17.

Cap. 11.

Cap. 1

Cap. 1. & 5.
Affectæ partis
cognitio ex qui-
bus.

Cap. 5.
Ex læsa actiōe.
Cap. 3.

- omnibus medicis in confesso est. Reliquæ uerò quæ instrumentali parte continentur, eidem præstant usum, ut liquet secundo methodi medendi. Quare actionem lædi necesse est, instrumento ipsam efficiente quomodolibet affecto, ut decretum reliquit Gal. eodem primo, & secundo de locis affectis. Quæ uerò actiones similium duntaxat partium sunt, oblatso earum proprio temperamento, & ipsas offendi necesse est. Non ab re igitur ex actione læsa diximus primò inuestigari debere ipsam partem affectam, quomodolibet ipsa afficiatur. Nam uelut naturalis actio necessario comitatur corporis statum naturaliter se habentem: sic contra, si à natura recesserit actio, statim præter naturam se habet, ut patet primo methodi medendi; quæ aut non fit, aut male fit, diminutè uidelicet, aut deprauatè. Nam si uentriculus affectus sit, & eius propria actio, quæ est chylicatio, seu assumptorum ciborum confectio, ac propriæ eius qualitati assimilatio, uitata erit, si iecur, hæmatosis, hoc est, sanguinis generatio necessario erit oblatso. Quòd si pars, quæ afficitur, peculiari careat actione, uerum aliquem præstet usum, is non ignorandus erit; cum & ipse magnificè conducat ad affectorum locorum inuentionem. Hic enim omnibus partibus, uel nihil agentibus inest, Gale. teste primo de locis affectis. At ubi tunica duntaxat actio læsa est, & sedes affectæ plures, tum nostri instituti est, ut reliquorum uarietate symptomatum eas discernendo, inueniamus uelut liquet quarto de locis affectis. Indicant secundò partem affectam ipsæ excrementorum species, quorum excrementorum, quædam ad exquisitâ perducunt partis affectæ notitiâ, ut quæ affectæ partis essentiæ proprietatem declarant: quædam uerò artificiosam coniecturam producant. quæ nobis per quàm utilis est, ut pote media existens quodammodo inter exactam notitiâ, & omnifariam ignorantiam, teste Gal. primo de locis affectis. Licet ea aliquâdo aberret, ut patet commento aphorismi secundi quarti lib. Sumitur autem artificiosa hæc coniectura ex ea excrementorum natura, quæ in ipsa parte affecta continentur, siue natura, siue præter naturam. Declarant uerò partis affectæ essentiæ proprietatem, si ea excernantur, quæ sunt de propria eiusdem partis substantia seu essentia. Ut si tussiendo aliquando aliquod expuatur bronchion, ulcus maximum in pulmone esse existimamus ab erosionem, uel putredine ortum, cum pars esse non possit arteriæ asperæ, quæ inter fauces, & pulmonem existit, ut pote tam grandi ulceratione haud quaquâ potente in ea fieri, quin prius mors animal præoccupet. At in ipso pulmone talis fieri potest, propter causas primo de locis affectis à Gal. traditas, pariter excrementis cum alui deiectione per dysenteriam excretis, intestina affecta esse dignoscimus. Haud aliter si cum urina carunculis similia excrementa excernantur, renes affectos esse dignoscimus. At si lamarum speciem referant, in uelica ulcus esse ostendunt, prout Hipp. aphorismis 76. & 77. & 81. quarti libri scriptum reliquit. Quod si magnitudinem quoque eorum interdum considerabis, haud obscure, & affectam quoque sedem indicabunt. Nā frustum uasis tussiendo reiectum, si magnum fuerit, pulmonem affectum esse ulcere indicat. Et enī quæ ad asperam arteriam in collo existentem proueniunt uasa capillorum ferè speciem referunt. Sic si tunica intestinorum per dysenteriam eiecta magna conspiciatur, sitque latitudine, & crassitudine his, quæ tenuia constituunt intestina, multo maior, non ab re coniiciendum est, ulcerationem in crassis intestinis consistere. Interdum etiam ea, quæ ad nascuntur, affectam sedem ostendunt. Nāque res adhærentes, essentiæ proprietatem obtinent, quemadmodum fungi capite fracto, membranam esse affectam indicant. Cuius præterea generis est crustula quædam, quæ ephelcis græcè dicitur. Namque eius particula, à qua excernitur, ulcerationem portendit, ut urinæ meatum, si cum urina; spiritualium instrumentorum, si tussiendo; gulæ,

gulæ, & ventriculi si uomitione; aliquod intestinorum affectum esse ostēdit, si per alui deiectionem excernatur. Ex alia excrementorum specie, quæ in affecta parte quouis modo continentur, ipsa quoque deprehenditur, licet non exacta notitia, vt ex prædictis, sed arrificiosa quadam cōiectura. Vt si per vulnus aliquod vrina excernatur, vrinarios meatus, vel vesicā; si stercus, intestinorum aliquod; si cibus, ventriculum vulneratum esse ostendit. Sanguis quoque per vulnus saliendo reiectus vulneratam indicat arteriam. Efflatus spiritus inter respirandum per thoracem, membranam costas succingentem vulneratam esse indicat. Est præterea alius notitiæ modus ex his excrementis, quæ in affecta parte præter naturam continentur, velut in renibus, aut vesica lapidis, aut pus in thorace: vel sanguinis grumus, qui græcè thrombos dicitur, vbicunque contineatur: aut alius quidam humor molestus, in animalis corpore genitus, vel extrinsecus ei adueniens. Conferunt igitur modo quo diximus ad affectæ sedis notitiā excrementa, cuiusvis generis sint. At ipse positus affectam ipsam partem nimirum sufficienter commonstrare potest. Quippe durus in dextra hypochondriorum parte tumor, non lienis, sed iocinoris affecti nota est. Quemadmodum si in sinistra fuerit, non hepatis, sed splenis affectum portendit. Positus insuper, vbi similiter se habeant excrementa, interdum affectam partem commonstrat. Nam si membranosa tunica frustulum excernatur, vlcus alicubi esse ostendit: verum in qua sit particula, ex positu discere licebit. Nam si vomendo fuerit reiectum, gulæ, aut ventriculi, si tussiendo gutturis, seu asperæ arteriæ, si screando, faucium, si per sedem, alicuius intestinorum, si per mulieres pudenda vteri affectum portendit. Intelligere nec minus opus est ipsius partis societatem, quam cum proximis habet, quæ etiam in positionis uocabulo comprehenditur. Conducit nanque & hæc non nihil ad affectorum locorum inuentionem: constat insuper, quod singuli dolores propositus uarietate, affectum locum ostendere possunt. Quippe apparentibus per vomitum vlcis notis, vt diximus, animaduertendum erit, utrum anteriores partes circa hypochondria, aut posteriores circa dorsum, dolor infestet. Etenim, qui in anterioribus percipitur, ventriculum. qui vero in posterioribus, gulam affectum occupare censendum est. Sic si in dextra hypochondriorum parte dolor adsit, iecur, si in sinistra, lienem affectum esse indicat. At qui ex diuersa doloris specie, licebit quoque affectam partem comprehendere, prout Gal. placuit secundo de locis affectis. Nam pulsatorius dolor non nisi affectis arterijs per inflammatorios affectus prouenire potest: modo pars ipsa, in qua arteriæ consistunt sentire nata sit. Quo fit, vt neque in peripneumonia, neque in laterali morbo pulsatorius dolor prouenire possit, pulmo namque sensum non habet, quoniam nullus per totum corpus eius dispersus est nervus: similiter neque in hepate, aut renibus, propter similem causam, talis apparet pulsatio. Membrana vero costas succingens, cuius affectus lateralis morbus est, arterijs minime participat, vtpote quæ per intercostalia vocata spacia extendantur & ad eam haud quaquam attingant. Qua de re nec ipsa taliter affecta, pulsatorius, sentitur dolor. Punctorius tamen dolor membranas affectas esse indicat. Nam ad eas propriè pertinet hæc doloris species, vt patet secundo de loc. affec. & libro de constitutione artis medicæ. At grauis dolor in renum, & iocinoris inflammatione non ab re sentitur. Nam vtrorumque horum viscerum, velut etiam pulmonis adiacens membrana sensu potitur, per quam nervus dispergitur, & propterea cum a tumore, qui in aliquo prædictorum viscerum continetur, membrana ipsa distenditur, talis speciei dolor sentitur, qui grauis dicitur. Proinde Hippoc. primus omnium sexto de morbis vulgatis scripsit. In renem dolor grauis. & post eum optimorum medicorum non pauci. Neque ipsorum dolorum vehementia,

Ex positu.

Ex specie doloris.
Cap. 2. & sequētibz.

2. de loc. af. c. 5

Lib. de const. att. med. c. 15

Commentario 1. tex. 6.

Ex symptoma
tū proprietate.

Ex his quę præ
cesserunt ac cõ-
comitantur,

Nunquid pro-
ptie, & p imo,
aut per consen-
sum, & secunda-
rio pars afficia-
tur.

Cap. 3.

Dignoscendi
modus.

In fine,

Affectus digno-
scio ex quibus.

Cap. 5.

seu magnitudo, remissio, seu mediocritas spernenda erit, pro affectarum par-
tium notitia. Sæpenumero enim affectum locum coindicant, si Gal. creden-
dum sit, commento aphorismi quinti, sexti libri. Quo loco Hippo. scriptum
reliquit. Dolores, qui fiunt in lateribus & pectoribus, atque aliis partibus, si
multum differant, perdiscendum. Innotescit insuper affectus locus ex propriis
quibusdam symptomatibus ipsarum partium affectarum. Nam ore uentricu-
li affecto, fastidium infestat, propter hepatis imbecillitatem. Excrementa,
quæ per aluum deiciuntur, aquæ, in qua carnes nuper mactatæ ablutæ, si-
milantur. Maxillæ item rubræ apparent in peripneumoniacis. Ex his igitur
omnibus, uel si cuncta ea haberi non possunt, ex ipsorum nonnullis, uel qui-
busdam, pars ipsa affecta comprehenditur. Quamuis nec totius corporis di-
spositio, natura, ætas, seu consuetudo despicienda sit, ueluti nec ea, quæ præces-
sit uictus ratio, omittenda erit, ut cuius affectus locus faciliè patefiat. Qua
habita notitia, num ipsa propriè, seu primo, aut per consensum afficiatur per-
quirendum erit. Quod quidem non ex his quæ diximus, sed ex aliis depre-
henditur. Voco autem partem propriè affectam, cum in ea permanens sit di-
spositio: Quem affectum græci Idiopathian nominant. A nulla enim parte
tunc afficitur, sed in se ipsa continet permanentem dispositionem. Veluti
ex aduerso dicimus per consensum aliquam partem affici, cum ab alia, uel cū
alia afficitur, adhuc permanentem dispositionem non continens, licet ea ab
affectu non sit penitus libera. Hanc partis affectionem Sympathian græci
appellant. Primarium autem partis affectum, qui secundo, seu posteriori
opponitur, græci Protopathian dicunt. Sæpenumero autem contingit, ut
pars aliqua per consensum afficiatur, & propria affectione laboret, cum in ip-
sa permanens fiat dispositio: quam non primariò affectam, sed secundario,
& propriè ipsam tunc affici dicemus, Galeni auctoritate primo de locis affe-
ctis: At quicquid sit, propria seu primaria pars affecta dignoscenda erit, ac
exactè distinguenda ab ea, quæ per consensum, & secundariò afficitur. Nam
huiusmodi speculatio, ut Gal. testatur secundo de locis affectis in fine, non
parum ad curationem conducit, cum ad curandi rationem non sine manife-
stæ utilitate imprimis pertineat, cui nam parti sint remedia adaptanda, cogno-
uisse: quæ non, nisi ei, quæ proprio, seu primario affectu laborat, propinanda
sunt. Nanque ea curata, nullus relinquitur in ea, quæ per consensum, & secun-
dariò afficitur præter naturam affectus, quoad in ea aliqua permanens fiat di-
spositio. Cum ergo permanere in quapiam parte aliquis affectus conspicitur,
tunc dicimus ipsam propriè esse affectam, uelut primario, seu primogenio af-
fectu laborare affirmamus, cum à nulla alia prius affecta parte, affectione par-
ticipet, sed ipsa primò affecta sit. Secundariò autem affici partem dicimus,
cum alia ante eam prius afficiatur, à qua demum, seu cum qua afficiatur, & ip-
sa, uelut per consensum quoque asserimus partem affici, quando cum alia, uel
ab alia, sic afficitur, ut una irritata, altera uehementius molestetur. remis-
sa uerò irritatione quiescat. Hæc siquidem coniectura communis est in om-
nibus affectis partibus, prout Gal. secundo de locis affect. decretum relinquit.
Quamquam in quibusdam propria sumantur inditia, uelut de cerebro ipsemet
eodem loco dicebat. Num uerò eadem pars, ut similis, aut ut instrumenta-
lis afficiatur, ex cognitione affectus, ac qualitatis eius dependet. Quare tem-
pus erit, ut ad ipsius affectus notitiam accedamus; ac qua uia, quibus ue indi-
tiis dignosci debeat, ostendamus; cum non solum an aliqua afficiatur pars,
ut uenter, uel iecur, aut alia huiusmodi, à medico considerandum sit, ue-
rum etiam quis affectus urgeat, atque distinguere, quæ nam notæ affectibus
propriæ sint, & quæ nam partibus effectis, iuxta Gale. sententiam primo de
locis affectis, quamuis paucæ admodum sint ipsorum affectuum notæ, quæ non
similiter

similiter affectum locum ostendant. Vt vero hunc pariter via quadam, ac ratione inuestigemus, primum sane definiendum esse censeo; cum tria sint in vniuersum rerum præter naturā genera, ex quo nam eorum separari possit, vt comparetur iudicium dignoscendi prædictos præter naturam affectus, seu morbos. At quoniam omnium symptomatum causa est ea corporis dispositio, quæ morbus, vel affectus nominatur, nihil enim refert, siue morborum, siue affectum pro nūc eam quis nomet, iure ex symptomatibus ipsis morbi cognoscuntur, vt quæ ipsorum sint effectus, ac ipsi morbi, seu affectus, ad ea symptomata causæ rationem habeant, vt patet lib. de differentiis symptomatum & lib. de constitutione artis medicæ. Ex his denique symptomatis affectum, siue morborum notitia inuestigabitur primo haud aliter, quā de partis affectu inuentione differuimus. Nam quod species morbi ex propriis symptomatibus dignoscatur, tertio de crisibus Galen. testatur. Cum vero eorum symptomatum genus in tres dirimatur differentias, actionum videlicet offensam, affectus corporis & excernendorum immoderationes; ex his omnibus sumi notæ possunt pro affectus, seu morbi notitia comparanda. Licet nonnulla eorum ex necessitate eos consequantur, quæ symptomata pathognomonica, hoc est passionis significatiua appellantur: siquidem certa sunt morborum indicia, & vna cum morbo inuadunt: eiusque, vt ita dixerim, essentiam constituunt, vt patet libro de constitutione artis medicæ, & tertio de morbis vulgaribus. Quædam vero symptomata, non ex necessitate, sed vel sæpissime, vel raro, vel ancipiti opinione morbum consequuntur: quæ morbi aut differentiam, aut morem, aut magnitudinem indicant: & hæc quandoque simul inuadunt, aliquando superueniunt, nonnunquam vero nullo pacto veniunt. Neque enim sunt a morbo inseparabilia, velut pathognomonica appellata: nec eius veluti substantiam constituunt: appellantur autem assidentia. Quapropter siue hanc præter naturam dispositionem, morbum appellaueris, cum videlicet ea permanens sit, siue affectum, cum videlicet motus alterationis sit permanens, ipsam dignoscere, præsertim si abditis partibus consistat, ex dicendis tentandum est. Neque enim cuiusuis est morbosam singularum, tum simplicium, tum instrumentalium partium dispositionem reperire; cum in profundo sint abditæ Gal. teste, libro de constitutione artis medicæ. Quare de re speculationem quandam inuenire oportet, qua dispositiones dignoscamus vniuersas, præsertim eas, quæ circa partes intimas conditæ fuerint. Proinde Gal. primo de locis affectis, ratione quadam, ac via docuit eas dignoscere. Primo quidem ex excrementis: vt si vlcus sit, ex ramentis, ex fabulosa quoque vrina lapidem deprehendimus. Excrementa vero seminibus cucurbitæ similia, latorum vermium indicia sunt. Denique ex diuersa excrementorum specie interni affectus deprehenduntur: nec minus ex doloris proprietate: quamuis singulorum dolorum species nemo conscribere possit, nisi ipsemet passus fuerit, sitq; medicus, qui interpretandi facultatem habeat, & qui prudenter, & sine mollicie comprehendere suos affectus possit, dum laborat, vt Gal. testatur secundo de loc. aff. Potest tamen affectus aliquis ex ipsa doloris proprietate dignosci. Inflammatorij nanque affectus ex pullatorio dolore deprehenduntur. Quamuis non singulis hæc doloris species eueniat, est tamen eorum propria. Ab accidentium quoque proprietate affectum, siue morborum indicia oriuntur. Nam quibusdam, vt Gal. placuit, per tabificos morbos, vngues adunci euadunt. Intempestius horror cum febre inflammationis ad suppurationē transeuntis, indicium est. Lingua nigricans ardentem febrem portendit. Ab ipsorum quoque locorum affectorum natura, morborum indicia sumuntur, eo quod quibusdam solis partibus quidam morbus accadat, quibusdam vero solis nunquam eueniat. Nanque soli oculi suffusione laborant. Lapis in renibus, & in vesica dūta

De dif. sympt.
cap. 4. & s. de
const. art. medi.
cap. 15.

cap. 4

De const. art.
med. cap. 15. 3.
de morb. vulg.
com. 3. con. 34.

Cap. 15.

Cap. 5.
Ex excrementis

Ex proprietate
doloris.

cap. 7

Ex accidentiū
proprietate.
1. de loc. af. c. 5.
Ex loci natura,

xat nascitur, atque etiam, vt non nullis placet, in colo. Lumbrici in intestinis
 gignuntur. Rursus impossibile est, vt abscessum cor sustineat, quemadmodum
 nec pulmo, neque syndesmi dolorem. Caterum paucae admodum sunt, vt dixi
 mus, ipsorum affectuum notae, quae non simul locum affectum ostendant. Et
 enim vt actionum noxae affectam duntaxat particulam, ita earum differentie
 ipsius affectum declarant; quae solae ipsorum affectuum sunt propria signa: per
 accidens tamen ipsos sequuntur. Variantur nanque nozarum differentiae pro
 affectus tum specie, tum magnitudine, vt patet secundo de locis affectis. Cum
 his autem & quae praecesserunt, perpendenda sunt. Nam & ea non parum
 conferunt pro partis cum affectu, tum ipsius affectus cognitione, vt liquet
 primo de locis affectis. Qualis ergo praecesserit victus ratio, quae consuetu-
 do, aetas, anni tempus, regio, aeris constitutio, seu celi status, ac reliqua con-
 sideranda sunt, totius corporis dispositione non neglecta, vt valeamus quoad
 artificiosa coniectura permiserit, distinguere, quis affectus urgeat, cum ali-
 qua pars non abdita affecta fuerit; quamuis quidam eorum scientifica notitia
 deprehendi possint, vt patet tertio de locis affectis. Separandique ac discernen-
 di sunt, vt diximus, qui nam affectus fiant in partium propria essentia, & qui
 ipsis veluti instrumentis accidant, ac qui facti iam sint affectus, seu morbi, &
 qui adhuc fiant, seu nondum pertinaciter inhæreant, quorum singula ex qua-
 litatis affectus notitia prompte elucescunt. Interim ipsius morbi vis, seu ma-
 gnitudo, ac mos ignorari non debent. Nam cum triplici genere morbus qui
 libet grandis, seu magnus sit, aut propter praecellentiam partis, aut propter
 affectus magnitudinem, vel propter ipsius malignitatem, Gal. teste quarto
 metho. quorum omnium primam indicationem inuenit Hippocr. propterea
 medicus nec ea spernere debet; verum cognito affectu, haec singula de eo
 perpendat; ipsam siquidem affectus magnitudinem ex dispositionis magnitu-
 dine, ac ipsam sequentium priorum symptomatum: quod si magnus pro-
 pter praecellentiam partis fuerit morbus, ex praestantia, partisque affectu na-
 tura dignoscet. Morem uero, seu cacoethiam, cum ex eorundem morborum
 differentia, tum ex symptomatibus, quae ipsam consequuntur, seu superue-
 niunt, iis denique cognitis distinguere oportet eos, qui per consensum fiunt,
 à proprijs affectibus. Nam cum aliqua vitia proprijs accidentibus exacte
 discernuntur, ac eadem fuerint perpetua, neque alijs praecedentibus superue-
 niunt, tunc ea propria, ac primogenia appellamus. At cum proprijs acciden-
 tibus discerni nequeunt, nec perpetuo permanent, & ad alias affectiones
 consequuntur, per consensum ipsa oriri dicimus: quod tribus modis fieri
 contingit, vt testatur Gal. j. & iij. de locis affectis. Nam aut ex primo affe-
 ctu humor quidam, vel vapor eleuatur ad aliam quampiam partem deueniens,
 in qua demum quispiam generatur praeter naturam affectus, vt similia suffu-
 sioni, symptomata vel capitis dolor humoribus in ventriculo contentis, ad
 oculos, vel caput ex eis vaporibus delatis. Aut propter defectum materiae,
 quam ab alijs partibus praeparatam suscipere aliqua pars consuevit. Per con-
 sensum quoque affectus gignitur, si ea priuetur, vt vox vitata, cum flatus, seu
 efflatio, materia vocis existens, deperditur. Vel prohibita facultate aliqua:
 quae ad quasdam partes descendit, cum naturaliter operantur, propter aliquem
 affectum primarium illius partis, a qua facultas transmittitur: velut accidit cru-
 ra resolui propter spinalis medullae inflammationem; & manus digitos sensum
 amittere, ea parte spinæ prius affecta, quae est circa dorsi initium. Læditur nan-
 que vocalium instrumentorum, crurum, ac digitorum officium, quauis ad ea
 quicquam praeter naturam non perueniat; sed quoniam carent eo, quod secun-
 dum naturam ad ipsa peruenire debet. Guttur nanque efflatum spiritum non
 recipit: nec vis sentiendi digitis, aut mouendi cruribus impartitur, atque in-
 fluit

Cap. 7.

Cap. 1.
Ex his quae praecesserunt.

Cap. 3.

Trifariam affectus redduntur magni.

Cap. 6.

Modus dignoscendi eos.

Quibus distinguantur affectus per essentiam ab his, qui per consensum fiunt.

1. de loc. af. c. 6.
3. de loc. af. c. 1.
Affectus per consensum quot modis fiant.

fuit & propterea eas partes affectas esse dicimus per consensum ramen. Nam quoties alicui deest illud, sine quo secundum naturam munere suo fungi nō ualeat, ipsum iure affectum esse putandum est Gal. teste tertio de locis affectis. Tot igitur modis per consensum pars aliqua affici potest. Fieri autem hæc consortia tribus modis; aut propter uiciniam, aut propter familiaritatem uel generis, uel operis; liquet. 3. de morbis vulgaribus commentario primo. ac confirmatur, 2. de ratione uictus, & 1. de caus. sympt. ab eodem Galeno. His prædictis inditijs, qui proprii affectus dicuntur, ab his, qui per consensum, excitantur, separandi, ac discernendi sunt. Vbi uero connexi duo, tresue aut plures fuerint morbi, haud aliter dignoscendi erunt, quàm ex excrementis, locorum natura, proprietate doloris, ac proprijs symptomatis, diuersis siquidem existentibus pro complicatorum morborum numero, ac natura.

Cap. 1.

2. de rat. uict.
comm. 44.
2. de caus. sym.
cap. 7.

Causæ cognitio

Quibus rite perceptis ad ipsius affectus ac affectarum partium causæ cognitio nem deueniendum erit. Eo indemonstrabili axiomate ductus, quod nihil uide licet absque causa fiat, præsertim si is quoque nunc fiat. Deinde inuestigandum erit, num causa, quæ affectum efficit, in ipsa affecta parte contineatur, uel per ipsam transeat. Est nanque causa unum genus eorum, quæ præter naturam sunt; quæ dispositio quidem est præter naturam, uelut morbus actiones lædens, licet non primo, sed secundo. Neque enim ipsam per se sed morbo interueniente actionem lædit; ut patet lib. de differentiis symptomatum quo solo à morbo distat. Dixi autem causam inuestigandam esse, præsertim si affectus nunc quoque fiat, non ab re. Nam hanc ptoprie causā in confesso est apud omnes medicos appellari. Id enim quo tangente afficimur, & quo separato quiescit affectus, causam esse apud omnes homines in confesso est, dicebat. Gal. primo de locis affectis. Sic enim ignem ustulationes, & gladium sectionis causam esse credimus. Quanquam consueuerunt græci causam etiā quodammodo appellare, si non dum quicquam agat: sed eo solum, quod possit agere, uelut incoctio auctor, & causa morborum dicitur, quamuis morbum nondum afferat, quemadmodum lib. de constitu. artis medicæ Gale. scriptum reliquit; nec minus, & id quod egit, desit uero agere causam nominant, ut idem testatur lib. de differentiis symptomatum. Quicunque igitur affectus præternaturam morbos præcedunt. causæ rationem obtinent, ac morbificæ causæ nominantur, ex Gale. sententia eodem libro de differentiis symptomatum & secundo methodi. Quas morbificas causas in duplici esse differentia, primo methodi medendi his verbis ostendit. Quartum uero ab is genus statuit, quod sit morbificarum, seu insalubrium causarum. Atque harum, quæ in ipso animalis corpore consistunt, internas nominant. Quæ extrinsecus, externas; nisi maius, ut nunc vulgus medicorum consueuit, illas antecedentes, has primitiuas uocare. Illud idem confirmauit lib. de morborum causis, dum dixit, Redeamus igitur ad id, quod propositum nobis erat, nēpe ut singulorum simplicium morborum causas explicemus, tum præcedentes tum primitiuas. Neque enim fuerit absurdum dilucidioris doctrinæ gratia, eas huiusmodi nominibus distinguere, eas siquidem quæ in animali ipso consistunt, siue affectus sint, siue motiones præter naturam, causas nominant morbos præcedentes. Quæ uero extrinsecus adueniunt si uehementer alterant, immutantque corpus, eas primitiuas appellāt. Ex quibus Gal. verbis luce clarius liquet, eum non nisi duplex statuisse insalubrium, seu morbificarum causarum genus, nec præter eas dinumerasse, quas Arabes, & medicorum vulgus coniunctas, seu continentes appellant. Et si interdum de eis meminerit non ex propria sententia, sed stoicorum more loquutus fuit, ut idemmet in libro aduersus Iulianum fatetur quanquam nec easdem inter causas posuerit: nisi reponantur in numero eorum, quæ essentiam habent in fieri, quemadmodū alię

Cap. 1.

Cap. 2.

Cap. 15.
Cap. 1.

De disse. symp.
cap. 1
2. meth. cap. 7.
1. met. cap. 8.
Morbificæ cau
sæ quot, quæ ne
sint.
Cap. 2.

Cap. 6

medendi, cap. 3.

Cap. 8.

4. meth. cap. 3.
2. de loc. af. c. 2.
& 9.

Cap. 11.

Cap. 4.

aliæ causæ. Neque enim ex ijs sunt, quæ absolute esse dicantur: quanquam earundem affectus, seu habitus ex permanentium, constantiumq; numero sunt; vt liquet. 2. metho. med. vbi internæ fuerint præsertim. Nam tunc vere aliquam esse causam alicuius dicimus, cum agit, vt prædictum est. Qua ratione si in numero eorum, quæ in generatione essentiam habent, numeretur cōtinēs causa, ab antecedente non discrepabit. At si aliquo quodammodo ea sumatur, vt pote quod habeat esse permanens, & absolute, penitus a Galeni sententia secludenda erit: Qui morbi dispositionem esse præter naturam retulit: qui per se primo functionem lædit: Quare coincidet cum morbo. Siue ergo externa, siue interna causa aliqua cuiusuis morbi fuerit, via quadam, ac methodo ea inuestiganda erit, parte affecta, ipsoque affectu, seu morbo prius cognitis, tam si adhuc agat, quæ vere causa appellatur, quam si egit, desit vero agere, velut externa: quanquam hæc tantum pro affectus cognitione, qui actionem vitiat, cum videlicet rationem, & sensum lateat, inquirenda sit, vt quarto methodi medendi liquet. non enim solum affectum locum, verum etiam causam illi noxam inferentem considerata esse decreuit Gal. secundo de lo. affe. Quæ si adhuc agat, ab ipsius affectus, seu morbi specie, ac symptomatibus, eorumque diuersitate dignoscitur, non modo quæ causa sit, verum et vtrum ea, quæ affectum efficit in parte, contineatur tanquam in propria essentia, vel tanquam in instrumento, aut per ipsam pertranseat; ex symptomatum inquam differentia, vt ex diuersa noxa diuersarum functionum, excrementorum varietate, ac corporis diuersis affectibus, colore præsertim seu sapore, ex morbi specie. Nam hæc præcipue causam indicat, vt si tertiana fuerit, bilem; si quotidiana, pituitam; si quartana, atram bilem causam esse indicat; aut si erysipelas, bilem; si oedema, pituitam; si scirrhum, melancholiam. Quod si morbus similis fuerit, & ipsa causa tanquam in propria essentia partis continebitur; si vero in compositione morbus erit, permanebit potissimum & causa in parte affecta, tanquam in instrumento. At si permanens non fuerit affectus; nec ipsa causa in parte continebitur, sed per ipsam veluti transibit partem, velut nec ipse affectus permanens, seu constans erit. Hunc affectum Archigenes umbram affectus appellare consuevit. Totius quoque corporis dispositio, temperamentum, seu ægrotantis natura, ætas, regio, tempus anni, victus ratio, consuetudo, & vt vno verbo perstringam, cuncta, quæ percellerunt, causam interim morborum opificem ostendunt. Nam præteritorum cognitio nihil aliud est vt Gal. inquit quarto de prælag. ex plus. quam inuentio causarum, quæ affectus inducunt. At cum his addenda erit, cum ciborum potionumque, tum medicamentorum quotidiana experientia, vt exquisite, cum morbos, tum eorum opifices causas inuenire valeas. Qua experientia vsus Gal. in quibusdam coli dolore laborantibus, eos sanauit, vt testatur primo de locis affect. Haud dissimili ratione ea morbi causa inuestiganda erit, quæ, licet egit, desit tamen agere. Nanque ex ipsa affectus specie, natura ægrotantis, ætate, tempore anni, regione, aeris constitutione, præcedenti victus ratione, & alijs prædictis inuestiganda erit. Sed præsertim inquirere oportet, qui præcesserunt in animantis corpore affectus, vt dignoscas euidentiores causas extrinsecus aduenientes, quas procatarticas appellant. Quare, vt summam dicam, intueri oportet cuncta, tam præsentia, quam præterita symptomata; præsentia quidem ex se ipso medicus inspicere debet; præterita vero non a laborante solum, sed ab ipsius familiaribus interrogando, perdiscere; quo promptius, non modo locus affectus, ac morbus ipse, sed morifica quoque causa, quæcunque ea sit, comprehendatur. Quamuis præteritorum cognitio magis necessaria fuerit pro causarum, quæ affectus inducunt inuentione: velut præsentium, pro affectuum, & partium affectarum inuentione.

ne, ut patet eodem quarto de præfagatione ex pulsibus. Quibus iam cognitissimum finem imponet medicus ei artis medicæ parti, quam dignoscitiuam appellant, quæ reliquas duas prognosticam scilicet, & correctiuam meritò præcedere debet. Namq; ex ea, & hæc oriuntur; ut nec præcedi quicquam, aut corrigi ualeat, nisi prius singula, quæ diximus, medicus optimè distinguat, ac primo cognoscat. Mox ad prognostica accedere debet, cum uenientium præfagia, seu futurorum prognostica ex præsentibus sumantur, inuento scilicet affecta, ac parte affecta, qui præsentis sunt, cognitissimæque eorum causis; ex eisdem nanque ijs, quo nam terminaturus morbus sit, præcognoscimus, & usus dexter suppetit nobis adiumentorum Gal. autoritate lib. de constitutione artis medicæ. Medicus nanque futura præsentiendo, ac prædicendo, triplicem comparat usum, Hipp. ac Gal. testibus primo prognosticorum. Nam cum fieri non possit, ut omnes ad sanitatem ægri perducantur, mortis culpa eum uacare ostendetur, si futura prædixerit; obtemperantesque egrotos reddit, cum propensius ipsi pareant; & de longinquo ipsi morbo obuiam it, multò antè remediorum tempus oportunitate edocens. Quapropter hæc pars artis spernenda non erit. quæ in dignoscendis euentis, quæ in morbis expectantur, consistit. Quorum unum ac primum quidem est, quo erumpet morbus ad exitum ne, an ad salutem præcognoscere. Alterum ab hoc, quo potissimum tempore illud accidat. Tertium autem, qui nam erit modus mortis, aut salutis: quæ omnia ex affectibus præfagiuntur, ex quibus morbi genus, & facultatis imbecillitas, uel robur dignoscitur. Hæc nanque si inter se conferantur, futura præfagiuntur, ut quarto de præfagatione ex pulsibus, tertio de crisib. primo de arte curatiua ad Glauconem, & libro de constitutione artis medicæ testatur Galenus. At cum non omnia, quæ sunt circa egrotantem oritura, necessariam generationem obtineant; eorum, quæ non habent necessariam generationem: neque erit firma prædictio, cum de eis certam non possit medicus habere præcognitionem; ut si propter uicinorum tumultum, canes latrantes, aut in iucundos quosdam nuncios insomnis reddatur æger, nullo horum morbi ratione effecto, quinimò nec eorum omnium, quæ morbi ratione efficiuntur certam præcognitionem habere poterit. Nam si superflui intra corpus humor aliquis in partem quampiam principem repente influat, aut ab ea in uiliorem transeat, quò fit, ut eum, qui in princeps membrum illatus est, summum periculum; eum uerò, qui non in primariam, sed in uiliorem partem transmigravit, subita, ac inexpectata salus laborantis necessariò sequatur; in his statibus, quò terminaturus sit morbus, non exactè comperit medicus; sed tantum prænoscere in his licebit incertantiam, ac lubricitatem. At si permanentiam habuerit morbus, in quo non amplius diffuunt excrementa, sed in locum unum quendam grassata, illum occuparunt, præfagiri in his futurum potest, si uidelicet rectè omnia circa ægrotum gerantur. Nam quæ perperam à quopiam aguntur, ex causæ existunt, ut aut morbi solutio prorogetur, aut mors anteuerat. Propterea meminisse semper oportet, ut Galenus tradit libro de constitutione artis medicæ sola optimi medici præfagia, curante quidem ipso, euenire, ægroto autem nihil delinquente. In hoc igitur morbi genere, cum uirtutis imbecillitate, uel robore collato, futura præsentiri possunt; cum summa totius præfagationis in morituris, conualiturisq; sit quoties uis egrotationis cum ægri facultate conferatur, Galeno teste secundo prognosticorum. Cognita nanque morbi specie ex proprijs symptomatibus, ut ostendimus, ac eius magnitudine ex quantitate eorundem symptomatum, aut partis affectæ præstantia, cognitaque benignitate, uel malitia, seu, ut ita dixerim, more, quem dignoscet ex ipsius morbi differentia, ac superuenientibus symptomatis, quod quidem maximè

Cap. 11.

Prognosticorū.

Cap. 16.

Tres artis.
Prognosticæ usus.
In principio.Quæ in morbis
prognosticari
debent.4. de præfag. ex
pudi. cap. 11. 3.
de cris. c. 5. 1. ad
glauconem, c. 8.
Lib. de const.
art. med. c. 18
Quæ medicus
prædicere non
ualet.In quibus mor
bis præfagiri fu
turum possit.

Cap. 18.

Quæ requirantur
ut præfagia eue
niant.

com. 6.

Cap. 4.

Vires ex quib.
diagnoscantur.De const. art.
med. cap. 18.De cur. rat. per
sang. mis. c. 14.
com. 37.ad glauc. c. 8.
De const. art.
med. cap. 18Primum quod
in morbis præ
sagiri debet.

Cap. 5.

Tex. 39.
Secundum.

maxime inspiciendum esse iussit Gal. tertio de crisis, adiuncta consideratione, temporis anni, naturæ, regionis, & similium, nunquid æger seruabitur, aut morietur, inuenies; potissimum tamen si hæc tria respicias, speciem uidelicet, morem ac morbi magnitudinem; partis affectus notitia non posthabita, si qua est, quæ precipue afficiatur: post quæ uirium robur, uel imbecillitatem, cum ex earum propriis actionibus, tum ex commodo temperamento, uel intemperie partium, ex quibus uires proueniunt, dignoscere oportet, tam eius, quæ ex corde prodit, quam quæ ex hepate oritur, quam etiam quæ ex cerebro originem ducit. Quâuis naturæ robur præcipue ex pulsuum actionibus agnoscat, ut patet lib. de constitutione artis medicæ, & lib. de curand. rat. per uenæ sectionem. Tamen per quam potissimum facultatem ægro periculum immineat, medicus pendere debet ipsius facultatis indicia bona, uel mala inspiciens; uelut Gal. placuit tertio prognosticorum. Nanque ueluti oblectatoribus quibusdam, semper duobus his medicus attentus esse debet, nempe morbo, & naturæ, seu uiribus. & proinde sanitatem, uel mortem non ex aliis meditationibus præsentiet, quam ex morbi, & naturæ robore exactè cognito: ad hæc inquam duo capita cuncta rediguntur, eodemmet Gale. autore lib. primo de arte curatiua ad Glauconem, & lib. de constitutione artis medicæ. Quibus ignoratis minimè poterit exactè prænoscere, ac prædicere. Deinde, futuri status præ cognitionem perdiscere studendum est; potissimum si crisi terminaturus morbus sit. Neque hoc difficillimum fuerit, cognita morbi specie, ac magnitudine. Horum denique cognitione habita, exactè quicquid de ægrotante futurum sit, inuestigari contingit, nunquid seruabitur, uel peribit. Nam utrum aliquis portando oneri sufficiat, sciri minimè poterit, hominis robore, oneris magnitudine, & itineris longitudine antea non perspectis. Aegri nanque uires portanti onus, morbus uero oneri, tempus autem, quod usque ad statum extenditur, itineris longitudini respondet, prout Gale. tertio de crisis asseruit. Euadendum ergo, uel pereundum homini esse ex horum duorum altero robustiore cognito, morbo uidelicet, uel natura, seu uiribus prædictio facienda erit. Nam si uires adeo ualide fuerint, ut possint morbum superare, necesse est ægrotum euadere. Si uero contra, omnino morietur. Vires tamen nec omnium iudiciorum exacte interstinguere oportet, inter se comparando, non probè dignoscere & indicia certa, ac alia signa. Sunt nanque ea certa indicia, quæ indicant uires corpus gubernantes, quo pacto, robore ualeant, uel deficient. Hæc nanque perpetuò si mala sunt, malum; bona uero, bonum denuntiant, ut patet tertio prognosticorum. Ex eisdem quoque & terminum utriusque inueniet medicus. Quod tanquam secundum euentum is morbis expectandum prædignoscendum esse dicebamus, morbi uidelicet, ac naturæ robore exactè cognito. Nam eo tempore ægri euadent, cum morbum semel superatura est natura. Morientur uero tunc temporis, cum facultatem, morbus adeo prosterneat, ut functio aliqua ad uitam necessaria, pereat. In propinquo autem morbi solutio erit, cum bene ualuerit facultas, ac morbo fuerit ualentior, is uero imbecillis; quod si ea fuerit imbecilla, morbus uero ualidior, mors maturabit. Præscriptionis autem tempus indicat magnitudo excessus. At quantum alter alterum superet coctionibus, ac incoctionibus, hoc uero ex propriis excrementis percipies. Quæ quidem in uasis continentur, per urinas; quæ in toto corpore, per sudores; quæ in thorace, & pulmone per ea, quæ extulsiuntur; quæ in uentriculo, & intestinis per alui excrementa, quæ in uesica, & renibus, per ea, quæ in urinis deferuntur; quæ in superiori uentre, ac stomacho, per ea quæ uomuntur; quæ uero per palatum, nares, uel aures excernuntur. quomodo cerebrum robore affectum sit, declarabunt. Ita & de reliquis indicandum excrementis.

Nam

Nam commune in omnibus est, non prius dissolui morbum posse, quàm aliquod in exeuntibus excrementis coctionis indicium apparuerit. Coctiones namque omnes crifium celeritatem, securitatemque salubrem portendunt. Cruda autem, & incocta & quæ in malos conuertuntur abscessus, infectas iudicationes, vel labores, vel tempora, uel eorundem recidiuas, aut mortem significant auctore Hipp. primo de morbis uulgaribus. Præfinitum ergo tempus, quo uel pereundum, uel euadendum sit homini, ex eo intelligas, quanto uidelicet alter altero ualentior sit. Id uero coctionibus, & incoctionibus priorum excrementorum percipitur. Namque, ut dicebat Gal. primo. de crisib. summopere necessarium est, exquisitè scire dignoscere, quantum inuicem superant, & superantur, & coctionis, & cruditatis signa. Habent enim utraque non paruam inter se differentiam. Nam possunt & integræ cruditatis signa, & debilis, mediocriter, aut parua satis apparere: uelut & coctio debilis seu obscura, aut manifesta, uel perfecta & integra. Hæc igitur uniuersa in primis etiam morbi diebus, quos primus præfinit quaternarius, præsertim si acutus sit, exactè dignoscenda sunt pro noticia temporis, quo potissimum salus, aut ægri exitium expectetur. Namque usus prædictionis est agnoscere diem, quo morbus iudicandus est Gal. auctore tertio prognosticorum. Verum cum nec scribi, neque sermone edoceri omnino singulorum quantitas possit, ut patet primo de arte curatiua ad Glauconem; ex nulla tamen re possumus adeo ad exquisitâ eius peruenire noticiam. quantû ex cerebra excitatione circa quantitatis coniecturam. Neque enim bene prænoscere ualebimus, nisi horum singulorum magnitudinem diligenter pensitemus, eiusdè morbi motu, nunquid uidelicet acute, aut tarde moueatur, non neglecto. Modus autem salutis, aut mortis ex eisdem fere patebit. Nam cognita morbi specie, ac motu, naturæque inclinatione (cum necessario, ut animal pareat, aliquam facultatem, pro uita necessariam aboleri oporteat) cum ea aboletur, uel ipsam suffocans morbus, uel prosternens, uel partim proportionè suffocans, & prosternens, eandem auferet. Id uero ex morbi natura, seu specie, ac loco affecto perdisces. Sunt namque morborum quidam, quorum natura est suffocare, ut thoracis, pulmonis, aut gutturis affectus, seu asperæ, arteriæ, qui uitaleni suffocant facultatem, & nonnulli etiam qui statim ipsum cor occupant, quemadmodum longi, seu uehementes dolores, stomachici affectus quidam, aut iocinoris affectus diuturni ipsum prosternunt, ac hecticæ febres omnes, & ipsius corporis cordis (quoquo modo fuerit genita) ingens intemperies. Ex ingenti quoque cerebri intemperie animalis facultatis imbecillitates excitantur ex impletionibus uentriculorum eius, & obstructionibus meatuum, qui in eos penetrant, suffocationes oriuntur eiusdem animalis facultatis. Pari ratione de altrice, seu naturali facultate sentiendum erit; & si perire omnino animal non possit, nisi cor afficiatur. & propterea semper mors sequitur ad immodicas cordis intemperantias, ut quinto de locis affectis patet. Similiter si euasurus sit eger, quis nam erit salutis modus, ex eisdemmet intelliges, potissimum naturæ inclinationes, seu motu exactè perspecto, uiribus ipsis bene ualentibus, ac morbo ualentioribus existentibus. Proinde merito cum Galeno iterum concludamus quarto de præfagatione ex pulsibus; quod cui status facultatis perspectus ad unguem sit, locusque affectus, & eius affectus, hic ad futura præsentienda est peritissimus. At si libuerit præcognoscere, nunquid crisi, uel non crisi terminandus sit morbus, ac ex quibus id prænoscere liceat, librum tertium de crisibus consulas, ubi Galenus illud scriptum reliquit; nos uero hic breuitati indulgentes prætermisimus. Inuentis denique affecta parte, ipso affectu, & causa, ex eorum que noti-

com. 2. tex. 44
& 45.

cap. 19.

com. 10.

cap. 8.

Tertium.

cap. 1.

cap. 11.

Præcipue ca. 3.
& 4.
curatio,

tionis

- circa principis. tionis modum accedere. Et enim medicinam esse, inquit Hipp. lib. de arte, morbos ab ægris in totum tollere, & morborum vehementes impetus obtundere, & eorum quia morbis victi sunt, curationem non aggredi. Quorum itaque curationem aggredieris, communissimum eiusdem Hipp. axioma, lib. de flatibus præsertim, ac nonnullis alijs in locis conscriptum, perpetuo præ oculis habeto: Quod omnia videlicet, quæ præter naturam sunt, ab ijs, quæ ipsis sunt contraria, curentur. Verum cum eorum duplex sit prima differentia, vt ex Gal. patet vndecimo methodi, alijs per se subsistentibus, alijs vero in ipso fieri, vt ita dicam, suam essentiam habentibus, non omnibus tamen ipsis ex usu est semper mederi, sed ijs quæ uere per se subsistunt: ex his nanque curationis indicatio præstatur. Nam id, quod curationem desiderat, aliud plane non est, quam affectus, qui vitiat actionem vt Gal. placuit primo methodi medendi; & secundo eiusdem dicebant, non functionis vitio, sed morbo ipsi, id est affectui præter naturam, qui actioni incommodat, applicamus remedia: & proinde necesse est remediorum inueniendorum initium ex morborum ipsorum natura sumi, vt eidem Gal. visum est tertio methodi medendi. Siquidem absurdum sit, vt ipse fatetur, aliud esse, quod curandi rationem præscribat, aliud quod curetur: indicare enim de se quicquam magis potest, quam de alio. Semper igitur comparandum est remedium, quod affectui sit contrarium; ab ipsoque affectu prima indicatio sumenda; ac illi demum remediorum indicatio, quæ a laborantis natura sumitur, adijcenda ex Gal. sententia septimo methodi medendi. Nanque minima est ea, quæ ob ipso sumitur affectu, tantum initium, & ut sic dicam, carcer, vnde medendi ratio promouetur; cum is merito morborum curator sit, cui facultas adest illa inueniendi: ex quibus perfici possit quod a prima indicatione suggeritur ratione quadam, & methodo, si rationalis, & methodicus sit medicus. Nam si per experientiam inuenerit, obseruator, & empiricus est nominandus. Vñ itaque est in omnibus curationibus principium, tum & via, quæ ob eo principio ad finem vsque ducit, in omnibus particularibus morbis similis est. Quare & si in singulis morbis priuata quædam methodus sanandi videatur, commune tamen in omnibus genus vnū est: auspicari etenim perpetuo oportet ab indicatione, quæ ab affectu, cui mederi paramus, accipitur, quemadmodum quarto method. Gal. scriptum reliquit: & demum examinare, ac discernere, an causa, qua effectum excitauit, iam desierit, an ipsum quoque nunc tum augeat, tum faciat. Methodos propterea de medicamentis discas oportet, si consummare morbos si sanaturus, ac, vt quæ particularim sunt agenda, prompte inuenias, doctus tum ab eo, quod prima indicatio dicat, tum verò ab ægræ partis natura, tum ambientis temperie, ac alijs his cognatis, vt eodem quarto methodi medendi liquet. Quanti vero momenti sit ea, quæ ab affectis partibus præstatur indicatio, pro ipsorum morborum curatione, sexcentis in locis Gal. testatus est: vt in decimotertio methodi scriptum reliquerit, nihil ob stare quo minus medicinam non sex mensibus tantum, sed sex diebus totam addiscas, si quis eam, quæ a partibus ipsis præstatur, indicationem adimat. Atqui ex ipsa affecta parte pro morborum curatione non vna tantum indicatio sumitur, etenim ab ipsius temperamento prima sumenda erit. Ipsa nanque mensuram præscribit adhibendorum medicamentorum pro morborum abolitione, quando videlicet vberius, & diutius, & quando minus, ac breui tempore, calida, vel frigida, humida, vel sicca medicamenta adhiberi debeant; cum eatenus redeat ad naturam eorum quodque necesse est, quatenus a natura recesserit: ac veluti quadam via retroferatur, quæ in diuersum agat ei, quæ facta est in ipso, transmutationi: quamuis & ipsa etiam partium substantia simul cum affectu, medicamenti genus componat. quæ,

In principio.

Cap. 12.

1. Meth. c. 9.

2. meth. cap. 3.

In principio.

Cap. 13.

Cap. 4.
A quo sumenda
sit prima indica-
tio pro curatio-
ne.

Cap. 3.

Cap. 20.

Ab ipsa parte
affecta non vna
sunt indicatio-
nes sumitur.
Prima indica-
tio.

que, ut patet quinto methodi medendi: uelut modus utendi ab ipsius forma, ac si tu desumitur. Secunda indicatio ab eius actione sumitur: Nunquid uidelicet cunctis animalis partibus utilis sit, aut paucis quibusdam, aut sibi uni. Verum hæc in ijs intemperiei generibus deseruit, quæ ex humoribus sunt orta. Nam audacter euacuare licebit, si pars sibi soli inseruiat, prout affectus suadebit, uirtuti tamen eius attendo. At si opus partis necessarium sit omnibus animalis particulis; uelut uentriculi, & iocinoris, non leuis adhibenda diligentia de robore uirtutis est, ne hanc, magna semel usus euacuatione, dissoluas; quare cum cautione euacuandum, ut ne quid uirtuti officias. At cum non par sit actionum dignitas, ad portionem actionum dignitatis etiã cuiusq; partis prospiciendum est robori: & propterea intelligendæ sunt omniũ particularum tum functiones, tum usus, ut supra retulimus: ex quorum intelligentia haud difficulter inuenies quatenus cuiusque robur custodiri oporteat. A figura etiam affectæ partis indicatio ipsius modi euacuandi excrementi suggeritur. Nam uenter uomitu, deiectioneque inanitur. Intestina deiectione tantum, sicut iocinoris caua. Renes uero. & iocinoris gibba, uesica, si multo uitioso succo sint referta, per deiectiones, & pharmaca. deiectoria expurgantur; sin modico sint referta, per urinarios meatus. Cerebrum uerò per palatum, nares, & aures. Pectus, & pulmo, per asperam arteriam, & fauces. A situ quoque affectæ partis indicatio dabitur sane non leuis, cum ad solidarum partium intemperiem, tum ad succorum uitium. Nam qui per summa corporis intemperie laborant, ijs medicamenta, quæ intemperies requirit, applicabimus. Quibus autem in profundo corpore intemperies est; in his rationem interualli habebimus uehementioribus utentes medicamentis, quam intemperies requirat. Nam si eis utaris, quæ intemperies requirit, multo imbecilliora quam usus postulet ad locum peruenient. Ad euacuationes quoque situs non nihil indicat, societatem cum alijs particulis laborantis partis docens & propterea per quæ, ac quomodo euacuare oporteat, ipsa partis positio præcipue demonstrat, ut liquet secundo de arte curatiua ad Glauconẽ, & quinto, ac decimo tertio methodi. Nec spernenda erit indicatio, quam sensus partium acuitas, hebetudoque suppeditant, quãdo omne medicamen contēnunt quæ tardia sunt sensus, etiam si non leuiter rodāt. At quæ acuti sunt sensus, eorum uires dolore resoluunt. Expedit igitur has non confertim, nec semel ualentioribus auxilijs mederi, sed tuto potius in tempore. At ubi tardus est sensus, in his etiam celeriter obire, quod iustum est, licet, semel utendo remedio, quod sit idoneum. Sumpta igitur ab ipso morbo prima indicatione, ac prædictis omnibus de affecta parte optime perspectis, seu ipsarum nonnullis, quæ contraria sunt morbo, una, vel duabus qualitatibus, aut tota substantia pro eius abolitione, propinanda sunt, uictus ratione primum instituta: quæ iterũ ex ipsius morbi, simulq; affectæ partis noticia, præstat. Etenim uniuersa morbo pugnare debet, quoad eius qualitatem spectat. Similis uero ætati, consuetudini, ac naturali temperamento instituatur, & si uere alimonix scopus unus tantum sit, cõmunis prorsus cum sanis, tum languentibus, facultatis scilicet uitalis custodia. ut patet apud Gale. primo de ratione uictus in morbis acutis. Nanque morbus, suæ affectionis indicat auxilia, uenæ sectionem uidelicet clyfma cataplasma, oxymeli, aquam mulsam, atque aliorũ unumquodq;. Virtutis uero custodia solam indicat alimoniam: Quanquam morbi affectionẽ in cibis ægris non tanquam cibi indicatricem, sed tanquam prohibitrice contemplamur. Vbi igitur non prohibuerit morbus, facultasque perceperit, tũc nutrimus. Neque. n. cibis morbi affectionẽ sua ratione iuuabit, nisi uim et medicamenti obtineat, quæ cõtraria uelut ipsa medicamẽta, morbo esse debet ut diximus. Ipsi uero quãtitas metiẽda erit, ut magis, uel minus uires indigẽt, ac morbus

Cap. 11.
Secunda Indica-
tio,

Tertia Indica-
tio,

Quarta Indica-
tio,

2. ad glauc. c. 2.
5. meth. c. 15.
Quinta Indica-
tio,

Victus ratio,

Com. 44

Complicatorū
affectuum curā
di ratio.

Primus modus
complicationis.
3. meth. cap. 9.
7. meth. cap. 12.

Cap. 6.
Secundus mod.

Tertius modus
Cap. 9.

Cap. 1

Cap. 12.

morbis ipse a cibo maiorem, uel minorem noxam suscipere paratus est, quod idem est, ac si dixeris promptius, aut ægrius alimoniam prohibeat. Similis quoque ratio habenda erit in singulis aliis morbis, non ex intemperie tantum, sed ex quauis alia causa ortis, cum non alia ratione curentur, quam per contrariam uictus rationem, ac medicamenta contraria, parte ipsa affecta, ac eius indicationibus non neglectis, ut supra decretum est. At si non unus tantum fuerit præter naturam affectus, sed duo uel plures, primum existimare licebit, a quo maxime discrimen ægro impendere uideatur, ut ab eo non leue periculum immineat. Nam affectus, a quo primum, maximeque impendet homini periculum, hic primus curari debebit, ut patet tertio, & septimo meth. medendi. Quamquam interdum non primus modò, uerum etiam solus. Ad id uerò quod magis urget, dirigi primum curantis consilium debet, non tamen alterius cura omnino posthabita, cum etiam aliquando omnibus pari studio auxiliemur, si æqualiter urgeant. Urgebit autem maxime affectus, ubi ipse magnus fuerit, aut ex eius propria essentia, seu magnitudine, uel quia cacoethes: aut propter affectæ partis præstantiam, quam occupat, ut diximus Gal. auctoritate quarto methodi medendi. Hac igitur uia curari debent complicati affectus, ubi alter magis urgeat. At si ita se habeant, ut unus sanari nequeat, nisi prius alter curetur, ad id, quod ordo dicat, est respiciendum, eo scilicet primo curato, quo non curato, reliquus affectus curari non ualet. Veluti si ulcus una cum phlegmone consistat, quamuis phlegmone ad ulcus consequatur, curari tamen non ualet ulcus, nisi prius phlegmone curetur, prout scriptum reliquit Gal. tertio methodi medendi. At si unus affectus causæ rationem obtineat, alter uero effectus, animaduertendum erit quis nam eorum augere, aut gignere reliquum possit: qui uel rursus uel gignetur, uel incrementum ab eo suscipiat, illud pro comperto habens non posse ad perfectionem ullum affectum sanari, manente adhuc ipsa, unde natus est, causa. Quamquam fieri aliquando potest, ut tanta sit morbi, qui se habet ut effectus, magnitudo, ut præsentem perniciem, nisi occurras, afferat: quo casu oportebit huic primò occurrere, deinde ad causam redire: ut a Gale. decimo methodi medendi decretum est, licet non amplius complicati tunc affectus à medico, ut causa, & effectus considerentur, sed ut unus magis urgeat, quam alter. Qua de re idem erit curationis modus, uelut in prima affectuum complicatione diximus, qua ratione interim fit, ut quamuis symptoma nullum seorsum curationem exigat, utpote cum affectu, unde nascitur, una cessans, & proinde nullum symptoma, qua symptoma est, curationis rationem indicat, nec primam immutat: ex accidenti tamen symptomata quædam interdum curationem immutant, causæ scilicet locum eo tempore habentia, quando adeò aucta sint, ut lædant, aut uirtutem, aut affectionem; quò fit ut curandi ratione mutata, symptomata primum summopere cogamur. Quod iterum non ut symptoma, sed tamquam magis ugens affectus a medico consideratur. Complicatur namque non modo morbus cum morbo, & symptoma cum symptomate, sed morbus cum symptomate, seu symptoma cum morbo interdum. Cum uidelicet grauiora adeò sint symptomata, ut eis prospici maiore medentis sollicitudine debeat. Nam ea, quæ necessariò morbis succedunt, tanquam effectus eorum, ceu prorsus non sint, relinquimus. Sunt etenim & morborum signa, & una cum affectu, unde oriuntur, cessant, ipsum umbræ ritu comitantia, ut patet undecimo methodi medendi. Cum igitur eò complicantur affectus, ut unus causæ rationem obtineat, reliquus uerò effectus, qui uel gignatur, uel incrementum ab eo accipiat (nam si genitus ab eo fuisset, nec amplius generaretur, aut incrementum susciperet, nulla sumeretur ab ipso curatiua indicatio, tanquam alterius causa utpote eo non amplius lædente) ab eo affectu prima sumenda erit indicatio, ac is primò

primo curādus, à quo alter gignitur, aut incrementū suscipit, non alio inquam modo, quā, vt superius demonstrauimus, si morbus ille fuerit, ac ex se ipso functiones quasdā primo offēdat (subinde nāque morbus ex morbo nascitur, vt testis est Gal. lib. de differentijs morborum) demum ad reliquum accedere, qui vt effectus se habet; cuiq; nanq; eorum sua erit contrarietas, & si plura sint morborum genera, vt liquet i. i. meth. Ita vt omnis excessus per contrariū excessum sanetur, vt ipsemet Gal. testatur octauo eiusdē. Vbi vero qui generat, vel auget affectum, non morbus, sed morbi causa fuerit, ipsa causa spectanda erit, Gal. præcepto 7. meth. med. Nanq; hæc dum lædunt, curandi rationem immutant, ac interpellant, vt liquet duodecimo eiusdem, cum ex eis prouidentia indicatio, & non curationis veræ, & proprie præstetur. quò fit vt in ijs nec affectus simplex, nec sanatio sit, tamen prima indicatio ab ipsa sumitur causa, ac proculdubio hæc primò sananda erit. Interim tamen nec eius affectus, qui per eā genitus est, ratio non habenda erit. Quinimò si in idem consentiant, & quæ morbum curant, & quæ causam oppugnant, sine cunctatione id peragendū erit. Animaduertendum tamen in huiusmodi implexibus, q̃ nonnūquā à causa quapiam oritur affectus, sed ita oritur vt separata causa, haud quaquam affectus ipse permanentem habeat dispositionem. Interdum aurem partim iā factus est, partim etiam dum fit, sæpenumero, quanquam fieri desinat ablata causa, perseverans tamē manet dispositio, vt primo de locis affectis, & octauo method. med. testatur Gal. proinde si talis naturæ erit, qui à quapiam causa affectus oritur, vt ea sublata permanere non valeat propter eius exiguitatem, propter quam interdum non apparet esse, summouenda tunc tantū causa erit, nulla demum ipsius affectus habita ratione, cum propter eorum exiguitatē, separata causa faciente illico tales affectus finiantur, natura videlicet ipsos sanante, nullo adhibito medicamēto. At si nō adeo exiguus affectus sit, sed pars eius iam genita sit, pars in gignendo, & etiam dum fiat, vtrique consulendum erit. Primum quidem summouendo, quæ ipsum efficit, causam; deinde quod factū iam est ipsius auferendo, utpote natura propter eius magnitudinem absq; medicamento externo ipsum vincere non potente. Quòd si idē contentiant, & quæ causam rescindunt auxilia, & quæ affectum oppugnant, cū vnū sit in quod vtraq; conspirant, sine cunctatione, vt diximus, id peragendū erit. Quanquam prima indicatio perpetuo ab ipsa sumitur causa, eaq; nimirum prima sananda erit. Etenim dum ipsa lædit, curandi morbi rationē interpellat, vt ostendimus. Interim tamē nec ipsius affectus, seu morbi ratio nō habenda erit, vt diximus, quinimò semper quo ad fieri possit, medicamentorū materia eligenda est quæ cum hoc, q̃ causam rescindat, affectum saltem non augeant: Si ex eisdem amborum sublatio prouenire non porerit, cōmune præceptū Gal. perpetuo obseruantes lib. artis medicæ, vt vnāquanq; prius, quæ efficit causam rescindamus, deinde ita ad illam, quæ ab eadem causa facta est, egritudinē, accedamus, salubrium casarum inuentionem facientes: quod quidem medici opus mixtum iā est ex præseueratione, & curatione. Nā per causæ morbum efficientis abolitionem, illud quod factura erat causa illa, prohibitū est fieri: & hoc pertinet ad artem præseruatiuā. Quod vero iam factum est ex morbo, propriam exigit curationē. Quare non immerito cū talia mixta sint ex præseueratione, ac curatione, interdum alias alia vtimur appellatione, cū proprio hoc opus nomine careat. Semper. n. curatio prophylactica sibi quoq; permixtam habet. Nec secus exequendum esse censerem, cum perseverans permaneat dispositio, quanquā ablata causa fieri desinat. Quinimo ipsa causa prius sublata, vniuersa medici intentio (quamuis affectus fieri desinat, quoniam perseverans manet dispositio) pro ea dispositione auferenda suis contrarijs occupari debet, modo quo supra retulimus, neglecta eo tempore causæ indicatione, utpote non amplius lædente,

B ipsa

Cap. 7.

11. meth. c. 2
8. meth. 2. 1Cap. 12.
Cap. 1.Affectuum qui
sunt differentiæ
tres.1. de loc. af. c. 2.
& 3.
8. meth. cap. 1.

Cap. 49.

- Causæ abscissio** ipsa iam sublata. Ut uero ipsius efficientis causæ congrua fiat abscissio, ea animaduertenda erunt, quæ in nostra methodo breuiter conscripsimus, utpote si opus fuerit, ipsam prius concoquendo, ac præparando, & demum euacuando. In rerum autem statim circa initia ipsam euacuabis, prout usus urgebit ut pote si materia turgeat, aut ea quæ ex turgētia imminēat pericula, etiam si nō turgeat. Quantitas uero quæ auferri debet, tum ex eiusdem quantitate mensuratur, tum ex uirium robore, uel imbecillitate maiori uel minori: quod quidem summo-
Cap. 10. pere perpendendum iussit Gal. 9. meth. med. Semper. n. ad uires collatio facienda erit, ut quantum ipsæ permiserint, aut prohibuerint, tantum ipsius causæ morbi auferamus, & non auferamus. Pro magnitudine etenim imbecillitatis impeditur uacuantium auxiliorum usus, ut patet decimo eiusdem meth. med.
Cap. 2. Quod si cum uiribus imbecillibus corruptela humorū incidat, oportet & paulatim, quod uitiosum est, euacuare, & paulatim inuicē quod salubre est pro eo reponere. ut 9. med. scriptum est: uocant autem medici eiusmodi uitiosi succi curationem græce epicrasin. Naturæ autem robur, prout superius diximus iuxta Gal. sententiam lib. de cur. ratione per uenæ sectionem, & lib. de cōstitut. artis medicæ, ex ipso præsertim pulsu dignoscimus. Si uero adeo imbecilliores interdum uires fuerint, ut omnino causæ abscissionem prohibeant, ipsæ prius roborandæ, sunt tanquam magnopere urgētes, causæ eò tempore ac morbi indicatione posthabita; ac demum ad causam, ipsumque morbum redeundū erit, ut patet 10. meth. med. Nam uirtus omnium prima custodienda hominibus est, ac omnium ea prima indicatio est, quæ à uirtute sumitur, licet non sic prima, ut quæ curationem doceat, cum ex numero curatricium indicationum non sit, quamuis ex accidenti aliquando uirtutis roboratio ad affectus curationem conducat. Verū prima est earum, quæ ad uitæ custodiam pertinet. Nā neque ut ualeamus. nec ut à morbis liberemur, ab ea quicquā proprium desumimus, sed ut uiuamus, ex eiusdē Gal. decreto 9. meth. med. Quod si affectus, seu morbi causa non amplius ledat, ac ipsum efficiat morbum, licet prius fecisset, cum non amplius causa sit, nec in corpore persistat, aut actiones lædat, nulla ab ea sumenda indicatio erit, pro eius sublatione, aut eiusdem affectus curatione sed tantum pro ipsius affectus notitia, ut diximus ex Gal. sententia 4. method. med. Si uero ea nondum efficit, aut lædit, poterit tamen olim lædere, aut actu morbum efficere hæc ad eam attinet artis partem, quæ uere prophylactice dicitur: de qua hoc loco sermonem facere non intendimus. Nam quō sanitas, quæ iam deperdita est, uendicanda sit, & non quo pacto ea in corporibus seruanda aut eadem corpora à morbis præcaueri debeant, pertractare aggredimur.


EXERCITATIO.

περὶ μνήμης ἀποδείξεις IDEST.

DE MEMORIA

DE PERDITA

CAPVT. I.



2. de lo. c. af. c. 9. colligas.

3. de loc. af. c. 5. 6. & 7.

4. de Placitis.

Cap. 3.

VM caput, seu cerebrum, quod in capite continetur, aut uelut arx, sedes, & domicilium sit anime rationatricis, uel ipsa anima forma sit, aut temperamentum eiusdem cerebri, ut Gal. uisum est: tanquam in hac re ancipiti, in secundo, & tertio de loco. aff. ac 7. de Hippoc. & Platonis decretis, & sexcētis fere aliis in locis non ab re eiusdem affectionibus exordiemur. Verum de eis, non uelut ceteri, qui indistincte scripserunt, tractare intendimus. Quicquid enim sit ad Galen. mentem

mentem, anima ipsa, cum semper de eius substantia anceps fuerit, & proinde confessus fuerit ipsius essentiam non nouisse, illud tamen, non modo eiusdem auctoritate, sed Hippocratis, Platonis, ac Aristotelis, pro comperto habetur, eam ob suscipientis ipsam corporis alterationem immutari posse, & proinde interdum lædi uelut etiam experientia in dies comprobari uidemus, animæ scilicet functiones à diuersis præter naturam affectibus oblædi, quamuis eam incorruptibilem ac immortalem, ut Christi assecla, firmiter teneam. Propterea ratione diuersarum læsionum animæ functionum, quæ ex diuersis causantur præter naturam affectibus, eorumdem ordinem quendam statuemus. Nam cum quedam per se ac propriæ actiones sint, quas ex se ipsa operatur, uelut imaginari, cogitare, ac memorari; quædam uera munera per aliud exequatur, tanquam instrumentis quibusdam, ut sentire, mediis instrumentis sensus, & moueri, instrumentis motoriiis, principium, ac originem, & sentiendi, & mouendi eis præstans, ut liquet in Gale. doctrina; propterea enim duxi ordinem seruandum, ut primo de iis affectibus sermo habeatur, ex quibus principes animæ functiones læduntur. Secundo loco, de iis, qui sensibiles operationes, offendunt. Tertio uero, de iis uitiiis, quæ quomodocunque uoluntarios motus impediunt. Ultimo, si qui sint præter naturam affectus in capite orti, in quibus aut cunctæ prædictæ animæ functiones, aut plures offendantur, de iis etiam tractare non grauabor. quibus tandem enarratis, absolutus erit sermo de capitis affectibus. Et licet omnes fere difficilis sint cognitionis, cum nullum habeant loci affecti signum, quod sensibus dignoscatur, nam neque tumor præter naturam, neque dolor, neque excretio, aut aliud quippiam apparet, quo ualeamus partem affectam in eis dignoscere; in memoria quidem deperdita id potissimum conspicitur. Qua propter cum non admodum facilis sit in ea affectione partis affectæ dignotio; cumque sit ex numero earum affectionum, quæ raro euenire solent, ut testatur Gal. tertio de locis affectis, in quibus remediorum inuentio ex uera demonstratione procedens, quæ hic sectari potissimum intendimus, experientia longe præstat, non ab re cum Gal. tertio de locis affectis, ab hac exordiendum esse censui. cuius dignotionem, prognosticum, ac curationem, uia quadam, ac ratione, iuxta eiusdem Galen. monumenta præcipue, & Hippocratis, ac aliorum græcorum, ueterumque latinorum, Arabibus omnino posthabitis, uelut & aliorum quoque affectuum præter naturam, conscribere paramus, illum quem in præcedenti uniuersali capite proposuimus ordinem perpetuo seruantes. Proposito nanque quolibet uitio de quo differendum erit quis locus afficiatur primo inuestigabimus, deinceps quis affectus præter naturam sit & quibus indiciis cum ipse tum eius causa dignoscantur dilucidabimus. Quibus exacte cognitis ad eiusdem uitii prognostica primum & deinde curationem rationabili quadam methodo deueniemus. Cum itaque quispiam omnium eorum quæ prius nouerat oblitus fuerit, huic memoriam deperditam esse fatemur, adeo, ut interdum eueniat, ut quidam eorum, & literarum, & artium in tantum obliti fuerint, ut ne nominum quidem suorum meminissent, prout Gal. testatur libro de differentiis, & secundo de causis symptomatum, Thucididem pro teste inducens. Huius affectionis, quæ pars in ea affecta sit, cum omnes affectarum partium notatione indigeant, primo inuestigabimus. Quæ quidem quod ea sit, qua princeps animæ uis continetur, nulli dubio est, quam sola actionis læsio satis conducit ad dignoscendum. Hæc nanque, cum nulla alia pateret uia Galeno satis erat, pro affectarum partium inuentione, uelut scriptum reliquit tertio de locis affectis, potissimum in hac affectione, in qua nullum affecti loci signum, quod præcipue eiusdem sit, haberi potest, uidelicet neque tumor præter naturam, neque dolor, neque excretio, neque aliud quippiam tale, nec ea affectio, si caluaria

Ordo seruandus
in capitis affe-
ctibus.

Cur prius de
memoria deper-
dita.
Cap. 4. colligi-
tur.

Cap. 3. in fine.

Auctores quos
sectabimur.

Quis ordo ser-
uetur in singu-
lis affectibus.

Memoria dep-
dita quid.

De diff. sympt.
Cap. 3. in fine.
2 de caus. sym.
cap. ult.
Quæ pars in ea
affecta sit.
Cap. 3.

prope finem.

Cap. 4.

Cap. ultimo.

Quis affectus
præter naturam,

Cap. 5.

Symptoma cū
sit quem morbū
señetur.

3. de loc. aff. c. 5.
2. de symptom.
cap. 7.

2. de loc. aff. c.
ult.
3. de loc. aff. c. 5.
de morbo sacro
circa finem.

Via distinguen-
di diuersitas cere-
bri intemperies,
ad quas sequi-
tur.

Nunquid per
consensum, aut
per consensum
ratio cerebro,
nat.

Cap. 7

3. de loc. aff. c. 5.
2. de symp. c. 7.

Quot quæne
sint eius causæ.
Diuersarum cā-
sum indicia.

tantum affecta sit, fieri posset, ut patet eodem tertio de locis affectis uelut quod nec cerebrum ipsum secundum eius uentriculos afficiatur, idem Gale. secundo de causis sympto. decretum reliquit. Nam nec eius generatio, nec solutio subitaria est. relinquitur ergo iuxta eius doctrinam, quod cerebrum ipsum secundum proprium eius corpus, in quo principes exercentur functiones in obliuione, seu deperdita memoria, affectum sit. Ipsa uero affectio symptoma est in genere noxæ functionum animalium principium: in qua memorandi facultas non deprauata est, nec imbecilla reddita, sed omnino abolita. quod propter ex modo læsionis ipsius facultatis, nec ab ipsius notione patere poterit. Verum cum cuiusuis symptomatis causa morbus sit, ut liquet lib. de dif. sym. eūque præcedere necesse sit; ad quem cerebri morbum consequatur, inuestigandum erit: hunc uero omnino intemperiem, eamque frigidam ipsius cerebri, quæ animales actiones torpidas efficit, Gal. tertio de loc. aff. ac secundo de causis symp. asseruit esse, medicamentorum exemplo, quæ hoc sympt. facere possunt, quibus refrigerandi facultas inest, illud comprobans, siquidem calida causa motum excitat, frigidum autem ociosum, & ad motiones pigrū reddit animal; id quod animalia quoque quæ per frigora latere coguntur, haud obscure declarant: perinde. n. ac si mortua essent, hyeme ob frigoris uim latitate, solent, ut ipsemet Gal. asserit secundo, & tertio de loc. aff. illud idem confirmauit Hippocr. tum lib. de morbo sacro, tum in epistola de insania, cum dixit. Obliuolos fieri dum cerebrum perfrigeratur: hoc uero à pituita perpetiuntur, cum præter solitum morē compingitur. Verum nunquid ea sola frigida cerebri intemperies sit, uel cū humiditate, seu siccitate copulata, ex aliis quibusdam signis deprehenditur, somnos siquidem obseruando, utrum uidelicet uehementer an modice somnolenti sint, aut omnino nō somnolenti, sed quantum ad somnū pertinet scdm naturam se habeant nam si uehementer somnolenti sint, frigidam ac humidam cerebri intemperiem, si omnino non somnolenti, frigidā, ac siccam, si uero modice somnolenti sint, frigidam tantum intemperiem esse significabit. Præterea considerandum est, nō quippiam excernant, uel ex naribus uel ab ore, quod quidē à capite defluat, aut siccae appareant partes hæ: nam si multa excernantur, pariter humidam cum frigida copulatam intemperiem: at si aridiores huiusmodi partes sint, siccam, & frigidam. si uero quantum ad hæc pertinet secundū naturam se se habeant, frigida tantum intemperie deperditæ memoriæ causam esse ostendunt. Nūquid autē hæc cerebri dispositio ipsius primaria sit, uel per consensum, nam sic quoque exoriri potest, ut in quibusdam morbis in abscessum declinantibus Gale. testatur secundo de caus. sympt. discerni illud potest, si obseruaueris, num prædicta affectio propriis accidentibus dignosci ualeat, perpetuoque permaneat, ac ad alias affectiones non consequatur: nam tum primario affectu cerebrum laborare constabit. Quod si propriis accidentibus discerni non ualeat, neque perpetuo permaneat, atque ad alias affectiones consequatur, per consensum memoriam offendi dicemus. Sunt qui uelint aliis quoque cerebri partibus affectis. ac ex quibusdam, præter dictas, intemperiebus, eam oriri posse; quos, sine græci, seu arabes, uel Latini fuerint, cum à Gal. doctrina, ac Hipp. magnopere deuiant, Gal. inquam, ut liquet tertio de locis affectis, & secundo de causis sympt. Hippo. uero, ut præcitatis locis patet, præsertim cum eosdem tanquam duces præcipue sectari intendamus, breuitati modo indulgentes, missos faciemus Huius autem affectionis causa cum interna. tum externa esse poterit: quod si interna fuerit, uel redundans pituita, uel succus melancholicus erit. At si pituita, non tantum ex modo dictis somnis, ac cerebri excrementis illud percipies, uerum ex ægri habitu, ætate, ac temperatura, anni tempore, regione, & cœli litatu ac præcedendi uictus ratione; omnibus siquidem, aut saltem pluribus ad frigidum & humidum uergentibus: pariter si redundans melancholicus succus prædictæ affectionis causa

causa fuerit, vt diximus, aderunt somni, tum excrementa, ac cuncta alia; quæ præcesserant ad frigidum, & siccum inclinabunt. Si verò nullum affuerit prædictorum humorum redundantia signum, ex aliqua externa causa ortum ducere coniectandum erit; præsertim si ex extrema senectute obliuio originem non ducat: idq; potissimum percipies ex ægri, vel astantium relatione: vt si quispiam morbus prius præcesserit, solutusq; in totum in obliuionem transierit: vel ex assumptione quorundam medicamentorum, quæ ingentem refrigerandi facultatem habeant, seu capiti quomodocunq; adhibita fuerint. Ex immodicis quoq; laboribus in studijs, atquæ vigilijs, vel in alijs quibusdam, ortum habere poterit; veluti in eo, qui circa disciplinas, & in alio, qui vires colebat, propter labores Gal. nouit: vt patet tertio de locis affectis. ex alijs quoq; infrigiditatibus, quæ extrinsecus accidunt, si immoderatus occurrat, velut sunt tum cibi, tum potiones suapte natura frigidiores, excitari poterit. Quod si modica fuerit ipsius memoriæ offensio, ob minorem eueniet cerebri refrigerationem, & veluti quidam torpor eius erit, ac labes, nec omnino ea abolita erit, sed diminuta, seu imbecilla. Si uerò simul cum memoriæ ratio quoq; perdatur, quæ affectio fatuitas, siue stultitia nominatur, à græcis *μῆμνησις* dicta, licet ab eadem dispositione procedat, vehementius tamen in hac intenditur iuxta eundem Gal. eodem tertio de locis affectis, ac secundo de causis symptomatum. At quoniā totius præfagitionis summa in morituris, conualiturisq; est, quoties vis ægrotationis cum ægri facultate confertur; si. n. morbus vehementior est, æger omnino morietur, si debiliior quàm ægri facultas, haudquam morietur, vbi nihil erroris committatur Gal. teste secundo prognosticorum; propterea considerata hac affectione, quæ suapte natura cerebrum, membrum liquidè princeps, lædit, perpessusq; eius magnitudine, quanta videlicet fuerit, factaq; demum relatione ad vires ipsas, cum ipsius cerebri, tum etiam totius corporis, vitalesq; ac naturales, si affectus eis superior inueniatur, utiq; morietur æger; sin contra, seruabitur: potissimum si alia consenserint, ætas videlicet, tēperamentum, tēpus anni, &c. Tempus autem coniectari poterit ex maiori, vel minori robore virium, & prædicti affectus, ac magnitudine excessus eorundē. Quæ, & si in alijs non dicantur, in cunctis tamen subintelligi affectibus debere volumus Hippoc. vero lib. 1. prædictionum, obliuionem malam esse retulit. Insuper ex Aetij sententia, capite de memoria amissa, valde timendum erit, quibus ea de repēte deficit, alia vero sana esse videntur, ne comitialis morbus eis supueniat, aut sideratio vel resolutio, aut quoddā aliud magnū cerebri malum. Pro cuius curatione illud primo animaduertendum erit, non tantum in hac, sed in singulis sequētib; affectionibus nos earum tantū curationes docere, quæ per essentiam ortum habēt, ac primariæ, & propriæ sunt, & non earum, quæ per consensum; cum ex nullam propriam curationem requirant, sed sublatis primis, ac proprijs affectibus, quos insequuntur, statim & ipsæ auferuntur, vt liquet 1. & 2. de locis affectis. Quēadmodū si obliuio ad lethargum, vel cæteros sopoliferos affectus insequatur, aut ad morbum quempiam in abscessum declinantem. Summa vero huius affectionis medelæ est in calefaciēdo vniuersum ipsorum corpus intrinsecus, & extrinsecus, iuxta mēsuram euariationis habitus naturalis, Aetio auctore. Proinde tā si ab interna, quàm si ab externa causa ortum ducat, aer ad calidum inclinet oportet. Nam cum si ne eo nec sanitas tueri, nec morbus tolli possit, Gal. teste nono met. med. nō immerito is primo alterandus erit; isq; sit luminosus, alienus ab aquilone, ac austro, cū vnus infriget, alter verò caput repleat. Caueat à multo somno, præsertim diurno, ac super repletionē; sed is sit moderatus; velut & vigiliæ moderatæ quoq; esse debent, cum & superflue spiritus dissoluant. Exercitium quoq; moderatum, & pedum, & manū, & interdū capitis cū frictionibus ex asperis

Cap. 5.

Locis citatis.
Prognosticum

Com. 8.

Quæ seruanda
sint in singulo-
rum affectuum
prognostico, &
si non dicantur.
Tex. 18.
Act. lib. 6. c. 23.

Curandi ratio. 7

1. de loc. affica.
6. colligas.
2. de lo. af. c. 9.

Vicius ratio. 3

Cap. 14.

lintheis magnopere confert: uelut quies immodica, ac desidiosa uita ualde offendunt. A lui excrementa singulis diebus, si non à natura ab arte educenda erunt; eorum nanque retentio caput offendit. Cauentur ab immoderatis animi affectibus, præsertim mæsticitia, cura, ac sollicitudine: nam iræ excitatio forte eis non nocebit. Cauenda est multa repletio alimentorum, & potuum, uitandaque sunt edulia in frigidantia, crassifacientia, & inflantia, multusque aquæ, adhuc magis uini potus. Ab oleribus propterea omnibus frigefacientibus abstinentum, fructibus, ac bellarijs, caseoque, ac lacte. Verum, ut Aetius testatur alimentum conuenit friabile, & aliquo modo calefactorium, ac attenuatorium. Acriora autem alimenta, uelut sunt allia, tymbra, origanum, pulegium ex interuallis exhibeantur. Sed & horum etiam copia uitanda erit. Cruditas quoque omnino cauenda, cum omni re magis mentem, uitiet, Vinum his conuenit tenue, album, non ualde uetus. Nam per moderatam caliditatem, ut ait Aetius, tum alia non pauca potest, tum animam mansuefacit, & motum ei præbens concinnum, ac sedatum, ad tripudiū aptam facit. Veneris uero usus sit rarissimus. neque enim ad totius corporis sanitatem conducit neq; ad animæ raciocinationes, si immoderatus fuerit, confert. Verum illud memoria tenendum erit, quod si à frigida. & humida causa obliuio ortum duxerit, non tantum ad calidum, uerum & ad siccum uniuersa victus ratio declinabit. Si uero cum frigiditate siccitas fuerit commixta, non modo ad calidum, uerum etiam ad humidum vergat oportet; cum ex calido, & sicco prorsus læderentur taliter affecti, uelut experientia comprobauit Gal. in eo, qui ob laborem in studijs effectus erat obliuiosus; simulq; in eo, qui uites colebat. Hoc autem cum non magno negotio fieri possit breuitati indulgentes bona fronte omittimus. Medicamentorum uero ratio ea seruanda erit. Nam si ex pituitæ redundantia obliuio ortum duxerit, eam prius concoquendo, ac præparando, demum euacuare oportet: pro cuius concoctione, ac præparatione vtaris rhodomelle, accipiens eius vnc. i. & ss. syrupi de infusione rosarum unc. i. aut tantundem oximellis cum eodem syrupo de infusione rosarum cum aqua betonicæ, sampfuci, vel hyssopi vnc. iii. vel iiii. aut sampfucum, hyssopum, betonicam. serpillum, vel thymum in aqua mulla decoquito: de qua vnc. iiii. vel v. ægro tribuantur. quibus pluries adhibitis secundum totum, vel partem cōcocta, ac præparata materia, eam euacuare licebit ex decocto myrobalanorum chebulorum pondere 3. iiii. agarici trochiscati 3. i. vel scrup. iiii. florum stœcadis. 3. ss. cui adde syrupi. de pluribus infusionibus rosarum rubearum, aut rosarum persicarum vnc. ii. vel iii. diacatholicon vnc. ss. aut confectiois de dactylis 3. ii. uel iii. & si unica uice tota causa auferri nequeat, quod sæpius euenit, tum suapte natura, quia crassus, & lentus humor est, cum ratione partis affectæ, iterum is præparandus, ac concoquendus erit cum eisdem, uel ualentioribus, ut syrupo de stœcade, aut oximelle scylino, eis iterum addendo syrupum de infusione rosarum, permiscendoque decoctum aliquod ex supradictis & miscendo; si uidebitur, in eo pulegium, origanum, vel stœcadem; quo denuo concocto, ac præparato ex catapotis arabicis, aureis, sine quibus, vel aggregatiuis cum agarico permixtis, euacuati poterit 3. i. uel scrup. iiii. excipiens ex dictorum catapotio rum aliquo, addēdo insuper agarici trochiscati scrup. ii. aut 3. i. redactisque in formam catapotis cum aqua sampfuci, vel betonicæ, rhodomelle, seu syrupo de stœcade: post quæ per duas, vel tres horas, exhibeatur potio ex decocto myrobalanorum prædictorum 3. iiii. in quo aut syrupum ex pluribus infusionibus rosarum, aut mel æereum poderis, vnc. ii. vel iiii. dissoluatur. Auxiliatur etiā iis summopere purgatio ex hiera, præsertim Rufi, ut Paulo, & Aetio placuit. Verum quæ de quantitate medicamentorum hic scribimus gratia exēpli habenda erunt; cum nec dici, nec scribi, nec præcipi ea possit, ex Gal. mente tertio meth.

3. de loc. aff. c. 5.
Medicamentorum
ratio.
Rex pituita.

indic. in aff. pit.

De quantitate
medicamentorum
quid sentiendū
tit. 3. meth. c. 3.
prope finem.

meth. med. quare coniectura quadam assequi licet: Nam nihil æque artem me-
dicam in agendo coniecturaleni efficit, uti cuiusque remedij quantitas, eodem
Gal. auctore lib. de curandi ratione per venæ sectionem: & si quid in nobis
est, ex nulla re adeo possumus ad exquisitam eius peruenire notitiam, quantum
ex crebra exercitatione circa eiusdem quantitatis coniecturam, eodem Gale.
teste primo de arte curatiua ad Glauconem. Minui igitur potest vel augeri
singulorum, quæ diximus, ac in singulis affectibus, quam dicemus, quantitas,
pro diuerso, tum virium robore, temperamento, natura, ac ætate laborantis,
& consuetudine, regione, anni tempore, ac cœli statu, & alijs. Nec aliter sen-
tiendum erit de modo eorum usus, ac temporis occasiones, quæ præ omnibus
est cognitu difficillima, ut liquet eodem lib. 1. de arte curat. ad Glauconem. nam ad
recte medendum plurimum conferre uidetur & temporis occasio, & auxiliorum
quantitas quod quidem perpetuo memoria tenendum consulo. Placuit insu-
per Paulo cap. undecimo lib. 3. pro cura huius affectionis uti acribus clysteri-
bus, ueluti si hieram compositam, uel Ruffi apponas, agaricum, hieralogodion,
aut aliquid tale in quantitate oportuna, miscendo unc. ii. uel iij. mellis rosacei
& iij. uel iij. olei uel communis, uel amygdalarum dulcium, chamæmelini aut
anethini, cum decocto maluarum, mercurialis, foliorum betæ, florum chamæ-
meli, fursuris, & salis. At si quid reliqui fuerit in capite prædicti redundantis
succis, ad particulares ipsius cerebri euacuationes te conferas oportet, apo-
phlegmatismis utens iis, qui pituitam à capite attrahunt, compositis, ex chia-
mastiche, & uua passa uinaceis detractis, interim addas zinziber, pyrethrum
aut nigellam, aut cubebas: ex quibus figurari possunt mansiles pastilli. Inter-
dum erhinis utendum erit liquidis, præsertim ex decocto hordei cum cortici-
bus manipuli unius, sampfuci, hyssopi, betonicæ, ana unc. iij. quo secundum ar-
tem confecto, ex eo sumantur libræ duæ, uel tres, & additis succi foliorum, &
radicum betæ unc. iij. aut tantundem succi brassicæ; uel si ualidius quæras succi
cyclamini unc. ii. quibus cōmixtis calidis moderate, aut tepidis, naribus infu-
sis utaris: & si fortiori indigeas, addere decocto poteris castorei, aut nigellæ 3.
i. calaminthæ, origani, seu stœcadis unc. ii. Nec omnino sternuatoria spernenda
erunt, quæ ex pipere, castoreo, seu albo helleboro, diuisim uel cōiunctim fieri
possunt. Placuit etiam Aetio post purgationem, rametum eboris 3. i. pondere
aut cornu cerui tantundem, seu castoreum similiter 3. i. pondere potum cum
aqua mulsa magnopere huic affectioni prodesse, ac opitulari. Simili modo
& ipse laudarem 3. i. aut amei, uel succi rutæ, seu seminis urticæ cum prædi-
cta aqua mulsa, similiter tantundem confectiois anacardinæ, aut aureæ alexan-
drinæ, confectiois diambriæ, diamusci dulcis, mithridati, aut theriacæ cum
aqua mulsa, aut paucio uino albo. Ab extra uero irrigationes, quas græci,
ἐμβρυσμας uocant, ex alto cadentes torrentis ritu capiti prius abrafo ad-
ministrari possunt, præsertim iuxta coronalem commissuram, qua parte cum
ea laxior sit, atque os tenuius, & rarius, prompte non tantum qualitates, sed
etiam substantiæ medicamentorum præsertim si tenues fuerint, intro trans-
mittuntur, Gal. teste, ac in seipso experto decimotertio meth. tum secundo
de compositione medicamentorum secundum locos. Quæ ex aliquibus præ-
dictorum medicamentorum parari possunt, ueluti ex decocto hyssopi, serpilli,
thymi ana pug. ls. betonicæ, sampfuci, florum chamæmeli ana pug. i. florum stœ-
cadis unc. iij. fiat decoctum, cui adde castorei 3. i. aceti unc. i. Nec non tum par-
te eadem, tum posterioris capitis partis in occipitio uidelicet, ac iuxta primam
& secundam uertebra, unctiones ex oleo nardino, nucis muscatæ, ac de ca-
storeo, costino, uel de piperibus fieri poterunt, pariter & faccelli approximandi;
ut Rec. hyssopi, sampfuci, & florum stœcadis ana 3. i. castorei, nucis musca-
tæ, spicæ, macis, ana scrup. i. corticum thuris, mastichæ, & ligni aloes ana 3. i.

Cap. 12.

Cap. 1. in fine.

1. de arte curat.
Glauc. cap.

Clyster cap. 12.

1. meth. ca. ulti-
mo.
2. de cōp. med.
fac. loc. cap. 1.

Ex melancholico succo.

1. de com. med.
sec. loc. cap. 1.
& 8.

3. de loc. aff. c. 3.

& fl. rosarum rubearum siccarum æquali pondere omnibus contendantur, & formentur faccelli. Illius tamen semper meminisse oportebit, etiam si aliquando in sermone relinquuntur; non prius adhibenda esse topica uocata remedia, quam præmissa fuerit uniuersi corporis curatio ex Gal. 1. de comp. med. secun. loc. & 3. de locis affectis. Id enim commune præceptum est, quod in omnibus morbis obseruare oportet. Quod si ijs non cesserit affectio, ultimo loc. sinapismo utendum erit, ut Aetio placuit non modo in occipite, ut ipse refert, uerum potius in syncipite, propter signatas causas, Frigida uero, & sicca cerebri intemperie existente, ex qua obliuio gignitur, si forte cum quapiam succi melancholici redundantia fuerit, is parandus primo erit expulsio ni, id quod cum syrupo ex succo borraginis, uel fumarie, p̄mixto, cum syrupo ex infusione rosarum, aquis betonicæ, luporum, & melissæ perficies; quibus prout uisum fuerit, pluries assumptis, infra scripto medicamentorum purgâte ducendus erit. Rec. mirobalanorum indorum 3. iij. fenæ, epithymi ana 3. ij. florum lupulorum, fumarie, & borraginis ana 3. ij. & fl. fiat decoctum in aqua fontis, in cuius expressionis quantitate dissolue mannæ electæ unc. ij. diacatholicon 3. vij. aut diasenæ unc. ss uel syrupi domini Augustini unc. iiii. fiat potio. Reliqua demum topica remedia ad humidum magis, quam ad siccum uergant, tum unctiões, de quibus mentionem fecimus, eis addendo oleum chamæmelinum, anethinum, ac amygdalarum dulcium. Irrigationibus autem prædictis iterum humectantia addendo exsiccantia demas, pariter & saccellos pares oportet: quod si frigida tantum, & sicca, aut solum frigida intemperies sit, calefaciente, & humectante uictu, ac eiusdem qualitatis medicamentis alterantibus tum intus, tum extra uetendum erit, frigida, & sicca existente. Si uerò frigida, tantum calefacientibus. At si ob extremam senectutem euenerit obliuio, non oportet curiosè aliquid moliri, sed sola conueniente uictus ratione contentus esse. Si ex immodicis laboribus, ac alijs euacuationibus. refectoria dieta uti conuenit. Si ex frigidis medicamentis absorptis, aut capiti adhibitis, & intus, & extra calida medicamenta approximanda erunt, ex ijs, quæ supra diximus. Ex quibus omnibus diligens medicus poterit non modo quamlibet obliuionem rationabili methodo curare, uerum etiã & ipsius labem, seu ut ita dixerim, torporem, in quo non abolita, sed imbecilla redditur memorandi functio: prouenit siquidem ex eisdem fere causis, quã uis non admodum auctis, uelut si ipsa deperdatur. Qua propter cognita causæ diuersitate eisdemmet medicamentis utitor, ea tamen seligendo, quæ mitiora fuerint. At si cum ipsa memoria deperdita, ratio quoque deperdatur, quæ fit ut stultitia, seu fatuitas generetur, pariter obseruando, quæ prius a nobis dicta sunt pro causæ dignotione, absque labore pro eiusdem affectionis ablatione iam dictis medicamentis uti poteris, ex eis tamen, quæ ualentiora sunt eligendo, cum ex uehemētiori cerebri intemperie gignatur, Gal. teste tertio de locis aff. uelut superius dictum est.

Cap. 5.

πρὸς ληθάργον.

De lethargo.

Cap. 2.

Vnde nectus fit
nomen.
Quæ pars affi-
ciatur.

CVM maximam habeat cum deperdita memoria affinitatem is affectus qui a græcis ληθάργος, a latinis interdum lethargus interim uetus a quibusdam appellatur, nō ab re de eo hic uerba faciemus. Nōmē siquidem nactus est ἀπὸ τῆς λήθης, quod interpretatur, & ἀργός, hoc est, iners, proinde ληθάργος, obliuio iners latine dici posset, cum in ipso marcor, & inexpugnabilis pene dormiendi necessitas percipiatur, uelut Paulo, & Celso uisum est cap. nono libri tertii, & cap. uigesimo libri tertii. Quod autem ce-
rebrum

rebrum in prædicto affectu afficiatur, liquet Gal. aucto. decimotertio meth. Paulo præcitato loco, ac Tralliano. libro pri. cap. decimo quarto. Et insuper quoniam nequeunt taliter affecti eorum, quæ dicuntur meminisse, ut eidem Tralliano uisum est, illud potissimum patere potest. Quinimò cum ipsa memoria, ratio quoque perit, auctore Galen. tertio de locis affectis, & libr. de differentiis symptomatum, in lethargo imaginationem lædi idem scriptum reliquit. Iure igitur cerebrum, in quo princeps pars animæ residet, in hoc affectu læditur, uelut ex eius principum functionum læsione ostendimus; & id ipsum non secundum eius uentriculos, sed secundum propriam eius substantiam, ut eodem tertio de locis affectis, liquet. Verum quis affectus præter naturam sit, nec inter græcos, nec inter latinos quempiam determinasse hucusque reperi, quamuis Auicenna uelit eum esse apostema phlegmaticum factum intra cranium. Galenus autem libr. decimotertio meth. interim νόσος, ipsum appellat, interdum ipsum sub nomine πάθος comprehendit, quemadmodum etiam commento aphorismi tertij secundi lib. libro autem de sympt. differentiis, inter ea symptomata, quæ principibus functionibus animæ eueniunt, ipsum connumerat, & propterea decimotertio meth. dicebat, hoc πάθος contrarium quodammodo est secundum ideam phrenitidi. Verum cum & ipse lethargus, ut dicemus, non tantum ex cerebri inflammatione orta à pituitoso succo excitari possit, verum etiam ex ipsa pituita citra inflammationem in cerebro putrefacta, propterea inter symptomata ipsum connumerabimus functionum principum, memoriæ uidelicet, ac rationis obolitæ, imaginationisq; infirmæ, & ueluti deficientis, simul cum Gal. tertio de locis affectis, & libr. de differentiis symp. Quod quidem affirmare uidentur Pauli verba, dum asserit, lethargum esse noxam aliquā ratiocinatricis animæ: & Aetius cap. de memoria amissa dicebat, Pereunt autem ambo hæc, de memoria, & ratione loquens in lethargo. Indicat hanc affectionem obliuio ipsa, ut diximus, cum inertia. Omnium namque ueluti amentes obliuiscuntur; palpebris semper conuiuere volunt, & conquiescere. Vix respondent quocunque modo interpellentur. Oscitant crebro, & hianti ore aliquandiu persistunt, tanquam claudere id oblitum. Cum uiolenter ab assidentibus excitantur rursus in somnum deferuntur; dum ad mictionem urgenter, porrecta ipsis matula, sese in manibus ipsam habere obliuiscuntur. Febris lenta eos committatur, pulsusq; magni, molles, languidi, tardi, ac rari, & turbulenti, intermittentes potius, quam intercurrentes; respiratioq; rara, & imbecillis. Deiciunt per aluum lethargici magna ex parte liquidiora, quibus valde exigua uitæ spes est Hipp. teste lib. tertio de morbis. Nonnullis contra uenter inarescit, urinam reddunt iumentis similem: quidam ex eis tremiscunt, & sudoribus unde quaque madent, auctore Paulo. Comitatur autem is affectus frigiditas, ac humiditas cerebri intemperiem, cum obliuio, segnitia, ac altus somnus ex ipsa proficiunt, Gal. teste eodem decimotertio meth. Hoc idem testatur Paulus, cum dixit, ex nimio frigore, ac cerebri humiditate hunc affectum contrahi. Quod autem ea intemperies ex redundante pituita, eaque putrescente originem ducat, idem Trallianus affirmat, dum asserit lethargum ex pituita superante nasci, quæ cerebrum humectat, ac ualide madefacit; & Paulus hoc idem asseruit, dicens, Ex pituita, quæ frigore nimio, & humiditate cerebrum imbuerit, ipsum oriri. At quod ea putrescat oportet, ut lethargus contrahatur, decretum reliquit Gale. decimotertio meth. & proinde cum febre incidit nec sine ea gigni potest. Propter quod non mirum, cum in capite humor frigidus redundat, si insensibilitas, immobilitasq; hominem opprimat: ex frigore enim segnitia, uelut ex calore immodico motus prouenit, ut patet eodem decimotertio meth. Ex quibus liquet, etiam si alia, quæ non præcesserunt non consideraueris,

13. met. cap. 21.
post principium.

3. de loc. aff. c. 5.
5. prope principium.
de diff. symp. c. 3.
collige.

Quis affectus
præter naturam
sit.

Cap. 21.
Auic. li. b. 3. sen.
1. tract. c. 7.
De diff. symp.
c. 3.
Cap. 21

3. de loc. aff. c. 5.
collige.
De diff. symp.
c. 3. collige
Aet. l. 6. c. 25.
Affectionis signa.

Circa principium
quem cerebri
morbum comi
tetur.
Loco citato.

Quæ sit eius
causa.
Citato loco.

com. 1.

Quibus conue-
nit, & differat
lethargus ab ob-
litione, seu me-
moria, de per di-
ta.
3. de loc. affe.
cap. 4.
2. de caus. sym.
cap. ult.
De diff. sympt.
cap. 3.

Prognosticum,
cap. 3.

Prope finem,

Curatio.

Vicius ratio.

Lib. 6. cap. 3.

consideraueris, ut regionem, ætatem, anni tempus, victus rationem, &c. Lethargi causam pituitam esse in cerebro redundantem, eamque necessario putrescentem, iuxta Gal. monimenta, siue cum inflammatione, siue citra inflammationem ea putrescat. Proinde ipsum non perpetuo subsequi ad cerebri inflammationem ex pituita ortam, sed interdum citra inflammationem ea tamen putrescente ortum ducere cum Gal. audacter asserimus, quicquid uelit Auicēn, ac reliqui simul cum eo sentiētes. Quod quidem clare ostēdunt uerba eiusdē Gal. cōmento aphor. tertii lib. secūdi, dū dixit, quæ refrigeratio quando fortis facta fuerit, cum humiditate quidem mixta facit *τὸ λ. θερμὸν καὶ πύον*, hoc est, lethargicas affectiones, seu passiones, & primo prorrheticorū, cū asseruit lethargum fieri cū locū eundē, in quo princeps animę pars residet, humectarit, dilueritque pituita liquet in super, quod licet lethargus quandā habeat cum obliuione propriē dicta affinitatē, nonnullis tamen inter se dirimuntur. Nā in obliuione memoria duntaxat ablata est, in lethargo nedum memoria, sed etiā ratio aboletur, ut patet tertio de locis affe. & secundo de caus. sympt. præter id quod imaginatio infirma, seu deficiēs redditur, eodē Gal. teste li. de diff. sympt. proinde obliuio cum ineres, seu ociosa lethargus dicatur: nec ambo omnino eandem sectantur cerebri dispositionem. Nam obliuio ad frigidam, tum frigidam, & humidam, ac frigidam, & siccam, indifferenter cerebri dispositionem consequi potest; ac lethargus ad frigidam, & humidam tantum, ut præcitatīs locis liquet. Quapropter non nisi a redundante pituita excitatur lethargus. Obliuio uero ab humore melancholico etiam, ac a sola frigida cerebri intemperie, ut præcedenti cap. ostendimus. adde quod quamuis utraque affectio a pituita excitari possit, in obliuione tamen non oportet quod ipsa putrescat, uelut in lethargo: nec quod febris eam sequatur, ut lethargum consequitur necessario; & si Trallianus, & Aetius non ueri lethargi mentionem faciant, nos tantum de uero ac genuino, qui per essentiam in cerebro gignitur, uerba facimus. Hic affectus, nisi ei succurratur, cum ex genere acutorum sit, Celso auctore, celeriter ingulat. Galenus autem quarto de causis pulsuum inspicieus cum eius causam, tum partem ipsam affectam, asseruit, lethargum longe letaliorem esse peripneumonia. At Hipp. lib. secundo de morbis scriptum, reliquit, quod lethargicus in septem diebus moritur, si uero hos effugerit sanus euadit. Cum autem ex iis, quę diximus de hoc affectu, eius causa, ac parte affecta, maxima quędam similitudo esse reperiatur, eius cū memoria deperdita, licet in quibusdam discrepent, ut cuilibet recte inspicienti, ea quę scripsimus, patere poterit, propterea & eius curatio fere similis erit cum prædicta, paucis quibusdam mutatis. Locandus proinde æger est in domo tepida, ac lucida, & splendida: ita ut aer parum ad calidum, & siccum inclinet. A somno potius excitandi sunt, quam is prouocandus sit. odoramentis ex castoreo, funiculo lucernario extincto, galbano, sagapeno, sulfure, pice liquida, aut bitumine, Aetio auctore: vel ex tymo, pulegio, hyssopo, & origano in aceto decoctis, additoque castoreo, odoramentum fiat. Eluatur alius efficaciore clystere, ex hiera uidelicet, agarico, aut ex eisdem figuratæ glaudes cum mele subdantur. Pedes, & manus fortiter confricentur, ligentur, & interdum pungantur; nonnunquam etiam pili in ipsis uehementius euellantur. Cibi autem extenuantes esse debent, Tralliano teste, ut cremor ptisanę, aut ptisana ipsa, interdum sola, interim cum oximelite permixta; aut in qua hyssopi coma fuerit decocta, uel pulegii, seu thymi, præsertim ualida non existente febre. Salutares etiam sunt panis micę ex apōmelite, uel hydromelite datę. Quod si vires requirant, carnibus quoque uescatur æger oportet, pullis uidelicet gallinaceis, perdicebus, starnis phasianis, turdis, metulis, ac montanis uicinis, quę cinnamomo, uel gariophyllis condiantur. Oleribus uti poterunt

sunt fœniculo, oreoselino, & asparagis, uel in iure prædictarum carniū bul-
liat parum sampſuci, hyssopi, thymi, betonicæ, aut serpilli. Pro potu, utantur
hydromelite, uel uino albo aquoso, tenui, & astringenti. Nam ipsum cum
tempestiuo cibo datum non mediocriter adiuuat, ut Celſo uisum est. A cibo
autem non ab re extremæ partes, præcepto Pauli, uinciri debent per aliquod
spacium, ne uidelicet uapor ad caput ascendat. Statim autem ab initio, si
nihil prohibeat, in tali affectu incidenda uena est. Quod licet præceptum sit
Galenî decimotertio meth. cum eo itidem conueniunt Paulus, Aetius, Tral-
lianus. Vena autem incidenda est media, aut interna: Quantitas sanguinis
pro uiribus euacuetur. At si sanguinis missionem uires prohibeant, ætas, aut
aliud quippiam, acribus clysteriis alius ducenda erit Pauli præcepto Demum
redundans succus hyssopi docto in hydromelite, thymo, uel pulegio, rho-
domelle, aut oxymelite, solis, aut permixtis, cum syrupo borraginis, uel ex
infusione rosarum, & aquis betonicæ, hyssopi, uel sampſuci, & borraginis
præparetur; ac demum purgetur aliquo purgante medicamento eorum, quæ
conscripsimus præcedenti capite pro cura deperditæ memoriæ ex frigidityte
& humiditate cerebri prouenientis. Interim capiti admouendum erit oxy-
rhodinum, idque in principio, cum repellendus à capite humor sit, quisquis is
fuerit, ut eodem decimotertio meth. liquet. At procedente tempore misce-
re, & incoquere poteris oxyrhodium, quæ extenuere simul possint, ut casto-
reum, pulegium, calamintham, thymum, & alia huiusmodi. Fronsque illinien-
da erit, Tralliano auctore, aut castoreo, aut pilis humanis crematis, læuigatisq;
ex aceto. Incoquantur etiam in aceto thymum, pulegium, & organum, aut ali-
qua id genus, ac naribus sic affectorum admoueantur, miscetoque cū eis casto-
reum: habent namque vim huiusmodi medicamenta calfaciendi, attenuandi, ac
dissecandi humoris crassitudinem, ac lentitiem: similiter si cornua capræ leui
flamma torreantur, ac naribus fumus excipiat, grauem somnum depellēt,
ut inquit Q. Serenus, idem labrum ueneris, si teratur prius, & confusum uino
liqueſcat, ac bibatur, commendauit. Asperis frictionibus utendum, ut dixi-
mus, erit, ac extremarum partium vnctionibus, & uinculis: nonnunquam
pilos, etiam in ipsis uehementius euellere oportet. Sternutamenti quoque
interdum utendum ex castoreo, pipere, seu helleboro; & si admiserint, apo-
phlegmatismis quoque iam dictis in præcedenti capite. Mox palatum etiam,
ut Gal. placuit, ualentibus, & acribus medicamentis ungemus, uelut mithri-
dato, theriaca, diamoscho, diambra, aut eclegmate pliris archoticon dicto,
aut sinapi cum melle. Quod si his nec affectus discutiatur, caput radendum
erit, & ex alto, uelut torrentis ritu, medicamentum infraſcriptum innden-
dum erit, præſertim in ſyncipitis loco. Sumito ſerpillum, hyssopum, ac
thymum cum pauco castoreo, & in aceto, ac oleo coquito, & utare: aut casto-
reum cum modico aceto terito, additoque oleo communi, uel irino, & caput
irriga; uel fouendum erit aqua in qua laurus, aut ruta decocta sit, & altero
die imponendum castoreum, aut ruta ex aceto contrita, si Celſo credendum
erit. Satureia quoque cum aceto frequenter infusa capiti adhibita, aut ex
uino pota lethargicos etiam letaliter dormientes excitat, ut Plinius ſecun-
dus refert, libro quarto de re medica cap. decimonono. Excitat item eos ruta
trita ex aceto infusa, & fronti admoda, ut Apuleo Madaurenſi uisum est cap.
90. Occipitio quoque cucurbitæ sunt affigendæ cum multa flamma circa pri-
mam, & ſecundam uertebra: interimque ſanguis ex his detrahendus erit, si
opus fuerit. Quod si neque hæc ſuffecerint, ſinapiſmus adhibendus erit ex
caricis cum ſinapi aceto macerato. Summopere Trallianus extollit aſſum-
ptionem caſtorei, præſertim una hora ante acceſſionem per ſe exhibitum, aut
cum oximelite: ex cuius aſſumptione nouit ipſe multos hoc ſolo remedio eua-
ſſe,

Medicamento-
rum ratio.

Cap. 21.
Veneſectio.

Purgatio.

Topica remedia
Cap. 21.

Verſus finem
libri.

fisse, propterea ipsum præterire nolui: poterit eius quantitas esse 3. i. cum oximellis unc. i. aut tantundem vini albi astringentis, aut hydromellis. Similiter recrementorum copia non existente, coctioneq; morbi apparente, balneum summopere laudauit, illud quod nec Aetius, affectione tamen declinante, negauit, nec Paulus. Verum nullo pacto ægri caput est in ad faciendum. Modus autem vsus eius ab eodem Tralliano prædicto capitu. 14. describitur. Oportebit præterea frequenter eos sollicitare ad naturæ excretionem, vt inquit Paulus, ad alui excrementa cum glandibus, ac clysterijs; ad vrinam verò irrigando pubem cum oleo rutaceo, aut irino, cui adiectum sit castorei paululum. Hæc pro huius vitij curatione sufficiant: quod si quis mauult, non symptomata, sed morbum appellare, a symptomate tamen nomen assumemus, modò in curatione non erret, non reclamabimus.

ἡ πρὸς τὸν καρ. De Caro. Cap. 3.

DE CREVERAM de ea affectione, quæ à græcis, *καρπ* ab Arabibus subeth appellatur, quam etiam & nos vt *cardanopulx* vitemus, carum nominabimus, nondum verba facere: cum in eo, vt patebit, non tantum principes animæ functiones vitientur, verum sensibiles, atque voluntariæ motrices, Galeno teste 2. de articulis, dum dixit, in caro omnes animæ operationes lædi, vt neque sentiat, neque moueatur homo, neque intelligat. sed & rationem, & memoriam, & sensum, & motum, qui per appetitionem fit, oblæsos habeat. At quoniam maximam ipse habet similitudinem cum lethargo, græciq; omnes fere post eum de caro mentionem faciunt, ea de re hoc loco & nos de eo tractabimus. Est namque is veluti resolutio quedam principis facultatis, imaginatricis præsertim, Gal. auctore lib. de diff. sympt. ac priuatio sensuum, vniuersarumq; motionum, spirandi tamen facultate manente illæsa, vt ab eodem scriptum est 4. de loc. aff. In qua affectione quòd cerebrum afficiatur ex operationum eius læsione cuique patere poterit, confirmaturq; à Gal. eodem 4. de loc. affec. quo loco non modo in eo cerebrum affici asseruit, verum ipsum magis affici secundum ventres, quàm secundum corpus, ac magis secundum totam anteriorem partem eius, quàm posteriorem, scriptum reliquit. Symptoma hoc affectus est in genere noxæ, functionum animalium principium, præsertim imaginatricis abolitæ, sensibilibus, ac motricibus, spirandi tamen facultate excepta, quo ab apoplexia discrepat, quamuis interdum & ipsa quoque lædatur quodammodo, vt patet 5. de locis affectis, vt in minori appellexia, cum videlicet carus magnus fuerit, intellige, alias Gal. sibi ipsi pugnaret; & si Aetius velit in cunctis soporiferis affectionibus memoriam: ac rationem perdi Cap. de memoria amissa, indicant ipsum non modò prædictarum functionum læsio, verum quòd taliter affectorum oculi semper sunt clausi, ac somno profundissimo detinentur, vt dum punguntur, sentiant quidem, non tamen loquantur, neque oculi os aperiant, Aetio teste. Propter quòd a lethargo differt quoniam lethargici interrogati respondent, & non omnino sine voce decumbunt. Præterea earum febris præcedit, vt Paulus testatur, eaq; vehementior, lethargum verò subsequitur ignauior. Itæ carus ad nonnullos superuenit affectus, ut dicemus, lethargus autem peculiaris causam obtinet, ut dictum est. Namque ad cerebri frigidam intemperiem, præsertim secundum eius ventres, a frigido, crasso, aut omnino viscido humore ortam, insequitur carus, Gal. auctore 4. de locis affectis: qua ratione à lethargo non discrepat; verum hic ut pituitosus humor putrescat, non requirit; lethargus verò nisi putrescat fieri nequit, ut 13. meth. liquet: quòd fit ut propterea a lethargo differat etiam, hac de causa genitus carus. Superuenit

Com. 18

Caros quid sit.
De diff. sympt.
cap. 3.
4. de loc. aff. c. 2
Quæ pars in eo
afficiatur.
Loco citato.

Quis præter
naturæ affectus
sit.
Cap. 1.

Ipsius affectio-
nis signa.
Lib. 6. c. 11.
Lib. 6. cap. 5.

Lib. 3. c. 9.

Cap. 2

Cap. 21.

nit etiam aliis cerebri affectibus, aliisque causis, à quibus nec lethargus gigni potest, ut musculis temporum affectis, ac quibusdam acutis morbis, ut Hipp. testatur 2. de articulis. Item cum ossē quopiam terebra perforato, medius uentriculus fuerit attritus, carus hominem occupat, teste Gal. eodem. 4. de locis affectis, quemadmodum etiam si quis inter perforandam membranā negligentē, ac ultra quā res ex postulat, *μηνιγεφύλακι*, præmendo uiolauerit, carus accidere solet: sic ubi os caluarię uehementer attritum ipsius uentriculos comprimat, maximeque medium, carus superuenire potest: ueluti etiam ad uehementē dolores hic affectus sequitur, confidente uidelicet robore spiritus animalis. Superuenire insuper cōsueuit febrium accessionibus, ac comitialibus. Ex quibus omnibus causis liquet cerebrum ipsum non uno modo semper affici, sed diuersimodē pro diuersitate causarum, tūm hic, affectus gignitur. Verū quoniam uerus carus à frigida, ac humida cerebri intemperie à pituita orta, ut diximus, originem ducit, isque præsertim curari solet, quem etiam facile dignoscēs, tum ex iis, quæ diximus, tum quod nullam habeat aliarum, quas retulimus manifestam causam; ideo alii postpositis de hoc sermonem facimus: & si quilibet morbosus carus, de quo modō loquimur, malus semper sit, Gal. auctore 2. prorrheticorum. Et ut breues simus, Aetii auctoritate curandi sunt taliter affecti, similiter ut lethargici, ualentioribus tamen attenuantibus, ac incidentibus utendum erit; Stomachi quoque cataplasmata unā cum hoc, quod calfaciant, ēt corroborandi uim habere oportet; si is quoque pituita refertus, aut immodicē frigidus sit. Aliorum uerō curationem nunc scribere tēpestiuū non est; peculiare ēt curationes requirūt: quæ suis locis fortasse olim dicētur.

TEX. 7. 18. & 19

Cap. 2.

Prognosticum.

curandi ratio.
2. prorrh. cō,
29.*περί κατωχῆς, ἢ καταλήψεως.**De catoche uel de catalepsi. Cap. 4.*

Re refrigerato item primo sensitiuo, hoc est, cerebro, alius quidam affectus fieri consuevit, uerū non tantum eo refrigerato (ut dicemus) sed arefacto simul, Gale. teste commento tertii aphorismi lib. 2. Affectus hic à græcis interim *κατωχῆ*, interdum *κατάληψις*, dicitur, uelut qui eo affectu laborant *κατόχους, καὶ κατεχομένους* ueteres græci appellabant; latine uerō ea affectio, Deprehensio, Detentio, seu Occupatio dici potest, à quibusdam congelatio dicitur. Qui uerō taliter affecti sunt deprensi, detenti, seu occupati, ac congelati possent nuncupari. Est nanque affectus hic, subita quędam detentio, seu occupatio tum animæ tum corporis; qua qui corripitur repentinē in illo permanet habitu, quo correptus est, Paulo auctore cap. 10. tertii lib. Ex cuius uerbis liquet cerebrum affectum esse, cum is affectus gignitur, nec illud alia uia indagari opus est, quā ex eiusdem operationum læsione: quanquam Gale. 4. de loc. affe. uelit posteriores cerebri partes magis in hac affectione molestari, ueluti in caro anterior pars magis afficitur, symptomaque existit (ut Galeno placuit lib. de diff. symp. (in genere noxæ functionum animalium principium, & propriæ imaginationis resolutæ; seu abolitæ; quanquam & reliquæ quodammodo animę functiones in eo uitiantur, uelut ex eiusdem indiciis comprehendi potest; seruata tamen secundum naturam spiratione, uelut in caro ex sententia eiusdem Gale. 4. de locis affectis. Adeo enim hi mente detenti, seu occupati sunt, ut ueluti fixos oculos, ac palpebras habeant penitus immobiles; aliquando & easdem apertas habentes, aut nictant, aut intente uident, adeo ut neque si quis manus, oculis ipsorum obtendat, eos claudant, ut testis est Aetius. Voce insuper, ac sensu priuantur, neque audientes, neque respondentes. admouent autem manus suas aliquando

Aet. lib. 6. c. 5
catalepsi quid sit.

Quæ pars afficitur.

Cap. 2.

Quis affectus præter naturam sit.

Cap. 3.
Eiusdem affectionis signa,
Cap. 2.

Lib. 6. c. 4

D. puls. ad tyr.
cap. 11.
4. de caus. puls.
cap. 16.

com. 56

Ad quem cere
bri morbum ie-
quantur.

Animaduerten-
da sunt Pauli
uerba de catoch-
cho.

Quæ sit eius
causa.

Cur uniuersum
corpus eisdem
stipetur, ac co-
gatur.
Locis citatis.

Prognosticum.

Curandi ratio.
Ratio uicinis.

do ad caput, & oculos, ac nares, uelut qui uellicentur, atque hoc non sentiunt. Pulsus similis quodammodo lethargicis est, non tamen ita languidus, nec mollis, iuxta Gal. sententiam lib. de puls. ad tyrones, & 4. de causis pulsuum: præterea horum pulsus æqualis est, lethargicorum uero inæqualis. Alius, & urinæ supprimuntur iis propter sensuum stupiditatem. Spiritus eorum aliquando densus, aliquando rarus, & per interualla quædam magnum spiritum ducunt: Quo malo quidam ex Gal. condiscipulis correptus fuit, ut 2. prophetic. liquet. Iacebat enim (ut ipse inquit) ueluti lignum prorsus inflexus, rigidusque atque extensus, videbaturque oculis apertis astates ita intueri, ut ne cōniueret quidem, nihil tamen loquebatur, uerum quæ loquerentur audire se dixit, quanquam non euidenter, clareque; nonnulla item & memoria tenens referebat, præsentēsque omnes sese conspiciere dicebat, ita ut quorūdam actiones recordatus exponeret, sed neque loqui posse, neque membrum ullum mouere fatebatur, cū uidelicet conualuisset. Consequitur autem frigidam, ac siccam cerebri intemperiem, ut diximus, autoritate Gale. com. aphorif. tertii, lib. 2. ex frigidiore, sicciori; materia ortam, ueluti Paulo placuit præallegato loco. Verum ut ononymiam uitent, qui eius uerba perlegunt, animaduertant in primis eiusdem auctoris uerba, ca. 10. tertii lib. non de uera catalepsi, sed de uigilanti comate uerba facere: quod uicium afferebat idem auctor cap. 6. eiusdem lib. antiquiores Galeno medicos κατοχον uocasse; à quibusdam autem græcis κατωχον dicitur, de quo in sequentibus tractabimus. Demum uero alterum, atque diuersum ait fieri κατωχον à uigili comate, simplicem quidem non mixtam habentem causam, nimirum frigidiores, siccioresque materiam. quæ posteriore cerebri uentriculo repleto malum hoc excitat: quo qui corripitur, ut ipse fatetur, repente, in illo permanent habitu, quo correptus est, stans scilicet, uel sedens, clausis oculis, aut respiciens, quibus uerbis de eo catochcho, de quo modo mentionem facimus, meminit, illud quod hucusque pauci animaduertendum, quamuis ad obstructionem potius posterioris uentriculi quam ad intemperiem posteriorum cerebri partium consequi ipsum, uelit, eiusdem met causam attulit Aetius, dum dixit ex atræ bilis humore contingere. Præter autem iam dictos casus, id comprehendere ualebis ex uictus ratione præcedenti consuetudine, ætate, ac laborantis natura, tempore anni, regione, ac ceteris ad frigidum, & siccum uergentibus. At quoniam uniuersum corpus catochis stipatur, & cogitur, non laxatur, atque intumescit, uelut lethargicis, ex Gal. sententia lib. de puls. ad tyrones, & 4. de causis puls. nec id absque ratione contingit; cū catalepsi ex frigidityte, & siccitate, lethargus uero ex humiditate, & frigidityte ortum habeat, Quamuis Aetius interdum ob sanguinis multitudinem confertim caput occupantis, & id ipsum superimplentis fieri hanc affectionem uelit; illudque testatur se uidisse in quodam adolescente multo sanguine referto. Nos uero qui in hoc, uelut in aliis Galenum præcipuè sectamur, ex frigida tantum, & sicca cerebri intemperie ortum habere fatemur, eisque causam esse frigidum, ac siccum humorem. Actio autem dicere poterimus, aut non ueram fuisse catalepsi, quam ipse in adolescente uidit, sed catochor, hoc est, coma uigil; aut à sæculento sanguine, eoque frigido, & sicco existente, propterea quod magnam habet permixtam copiam eius humoris, quem succum melancholicum confuerunt medici nuncupare; ipsam fuisse genitam: proinde à sanguinis eruptione per nares facta, melancholici uidelicet, adolescentem fuisse liberatum. Idemmet Aetius asseruit cathalepsi periculosiorem esse, quam lethargum, licet in febribus lethargo similibus consistat: proinde si ille periculosior erat, hæc erit periculosissima. Propterea confestim aer ad calidum, & humidum uergens eligatur. Cibi sint prius sanæ succus, & similia: potus conueniens est apocyni, aut aqua mulsa diutius

tius cocta, aut uino utatur aquoso, albo, & tenui, ac subastringenti, optimè diluto: nam cum caput nō percutiat tale uinum, magnopere iuuabit: aqua autem ijs aduersatur, cum & fluctuationes faciat, sitim non sedet, splenes exciter. quod si æger multo sanguine refertus sit, uires, ac ætas non perhibeant, citra dilationem, eiusdem auctoris decreto, vena superna in cubito secanda erit, & pro viribus sanguis detrahendus. In alijs autem primū uentrem per clysterem eluere oportet ex furfurum decocto, chamæmeli, borraginis, betæ, mercurialis, ac salis, in quo adicias olei communis, chamæmeli, anethini, aut amygdalarum dulcium unc. iiii. mellis rosacei. unc. ii. casia tractæ. unc. i. diacatholicon unc. ss. uel 3. 7. postea uerò cum prædicto decocto coquantur polypodii, senæ, epythimi an. 3. iiii. insuper adde prædictis diasenæ aut confectionis hamech 3. iiii. At si non tantum clysteriis æger indigeat, sed putgante medicamento, assumpto prius aliquot uicibus, si affectus permiserit, infra scripto syrupo, Recipe syrapi de succo borraginis unc. i. ss. syrapi de epythymo unc. ss. aquæ betonicæ, & lupulorum unc. iiii. hoc medicamento uti poterit. Recipe lupulorum, fumaris, & borraginis ana. 3. iiii. senæ, polypodii, & epythimi ana. 3. ii. fiat decoctum secundum artem, in quo dissolue pulpæ casia unc. i. syrapi domini Augustini unc. iiii. sacchari uiolacei, aut mannæ unc. ii. aut loco syrapi domini Augustini unc. ss. diacatholicon, aut diasenæ. Caput uerò irrigeretur oleo dulci tepido, chamæmelino aut anethino. deinde coquatur in eis serpillum, aut hyssopus, aut thymum. quod si urinæ crassæ fuerint, præcepto Aetii, anethi, & apii decoctum dandum erit. Totum autem eorum corpus anethino oleo inungatur, maximè in hyeme. & in quibus etiam tremor succedit, castorei 3. i. cum aqua mulsâ ori infundatur. Reliqua pro eius curatione requiras partim cap. de melancholia, & quædam in cap. de perdita memoria, ac lethargo.

Vena sectio.

Medicamentorum ratio.

Purgatio.

Topica medica uenta.

περὶ κώματος, ἢ καταφώρας.

De comate, seu de cataphora. Cap. 5.

Licet nonnulli uariè de cataphora, ac comate tractarint, nos tamen Hippocratem, ac Galenum in hoc, uelut in reliquis sectabimur. namq; cōsuetudo est. Hippocrati quamlibet cataphoram κώμα appellare, ut lib. de comate, ac prorrheticorum 1. Gal. testatur. Verum q̄ ab Hippocrate κώμα a Galeno καταφώρα nuncupatur, nihil aliud uolentes significare per cataphoram, seu coma, quam quandam in somnum delationem, seu propensionem, ut liquet cum præcitatis locis, tum 3. de morbis uulgaribus: in qua somni delatione, ut Galenus fatetur, nequeunt qui taliter affecti sunt, uigilantium munia obire, non apertos habentes oculos, sed conuiuentes, ac palpebra claudere cupientes, simulque dormire sperantes. Verum quoniam horum quibusdam contingit interdum, ut licet clausas palpebras habeant, dormire tamen nequeant, sed plurimum uigilent; quibusdam uero euenit, ut mox dormiant, & profunde, & diu: propterea non immerito duas; iuxta Hippocratis sententiam cataphoræ species lib. de comate Galenus statuit. quarum commune est, quod eleuare non possunt oculos laborantes, sed mox grauantur, & dormire uolunt. Propterea uelut commune ambarum, specierum, coma, seu cathaphoram (ut diximus) appellare licet. Quamuis coma somno magis familiare fuerit, ac eius naturæ magis assimiletur. Harum uerò specierum eam, in qua dormiunt mox ægri, & profundè, & diu, Coma, seu cataphoram simpliciter interdum, interim uerò cum hac adiectione somnolentam, mos est ab Hippocrate, & Galeno nominari propter assignatam causam,

Lib. de comate cap. 2.

1. prorrh. com. i. Coma, seu cataphora quid sit 3. de morb. uul. commentario 1. Com. 7.

Cataphoræ due species, cap. 2. In quo communent.

Prima species.

- Alter a species.** causam. Ea verò in qua licet non apertos habent oculos, sed palpebras clausas spe somni conciliandi, tamen dormire nequeunt, sed plurimum vigilant, non amplius simpliciter coma, seu cataphora ab eisdem nuncupatur, neque cum hac additione somnolenta, sed coma vigil, seu cataphora non somnolenta dicitur. Hanc comitis speciem Galeno antiquiores catochon appellabant, Paulo auctore, cap. sexto lib. tertij. de quo affectu cum capite decimo eiusdem libri tractasset in primis verbis eiusdem capituli; de alio quodam diuerso catochon à uigilanti comate in fine meminit. quæ Pauli verba male à quibusdam intellecta nonnullis iunioribus propter omonymiam maximi erroris causa fuere, veluti in præcedenti capitulo notauimus. propterea nos, ne posteris erroris ansam tribuamus, coma vigil, aut cataphoram non somnolenta, relicta catochi appellatione, nominabimus. Cuius insomnis cataphoræ geminæ insuper sunt species, iuxta Hippocratis, & Galeni doctrinam; quarum altera pigra dicitur, reliqua vero nomine generis nuncupatur. Commune autem ambarum est, propter quod & maxime differunt à somnolenta; quoniam loquuntur, & delirant. Nulli hærentia menti, & ad assurrectiones promptissimi sunt, si phreniticis coincidunt præsertim, quorum nullum somnolentis existit cataphoris. at quicquid sit de earum differentis, illud tamen liquet in earundem quauis parte cerebrum esse affectum, ut patet Galeno, tum libro prorrheticorum 1. tum 3. de morbis vulgaribus. Quod insuper coniectari licet ex animalium functionum læsione in prædictis affectibus, præsertim principium, & maximè imaginatiue. Quod autem quoduis prædictorum comatum symptoma sit, ab eodem Galeno in præcitatis locis decretum est verum quod hoc symptoma imaginationi præsertim tribuatur, deficienti videlicet, & infirme existenti, liquet libro de diff. sympt. Cum autem quælibet cataphoræ, seu comatis species ex proprijs, ac diuersis signis dignoscatur distinctè, decreuimus cuiusuis propria indicia conscribere. Dignoscitur nanque quæ somnolenta est cataphora, præter prædicta signa communia non solum ex graui somno, sed quoniam difficilem habet expergefactionem, Galeno auctore commento aphorismi tertii lib. secundi: & proinde libro de comate dicebat, quod hi dormiunt mox, & profundè, & diu; propriamque esse huiusmodi cataphoram lethargicorum, ac semper eis inesse fatetur, & quod immobiles præterea semper, & inuocibiles iacent, eis qui profunde dormiunt, affimiles. At qui insomni comate grauantur, vigiles, & uersuti sunt, & si phreniticis aliquando coincidunt, audientes vocem, & sonum facili ter surgunt; & si tetigeris partem corporis eorum, mox oculos eleuant & ad tangentem aspiciunt; & in ipsa in somnum delatione vel manum mouent, vel crus, vel vniuersum corpus eiiciunt irrationabiliter, & repente, & desipienter exiliunt, instar spasmi: hæcque omnia faciunt, cum eo, quod loquuntur aliqua non congruè. Hunc affectum medio loco statuendum esse inter lethargum, & phrenitiam Galeno visum est libr. de pulsibus ad tyrones, & 3. de morbis vulgaribus, velut medios intercedentes inter planè vigiles, & dormientes, comate vigili affectos asseruit esse. Quod si eo vigili comate capiantur (quod nomine generis appellatur) ita facile, & multum mobiles existunt; ut neque deficient clamantes ualde, & moueant aliquam particulam vehementer; & si excitaueris eos, aut loquaris, aspiciunt inconuenienter, & magis egrediuntur à se, & malum facere tentant, ac omnino in audiendo promptissimi sunt, nihil relinquentes ab ijs, qui summè desipiunt. Si verò insomni, ac pigra cataphora corripantur, surgentes magis intelligunt, & non multum mouentur; & quamuis desipiant, tamen tunc magis, quando comiseris eos comati, secundum quod maximè licet eos discernere à cataphoris letargicis. Ex quibus omnibus liquet rectè à Galeno, de morbis vul.
- decretum**
- Pauli uerba iterum perpenduntur de catochon.**
- Insomnis cataphora duplex.**
- commune utrisque.**
- Quis locus in cunctis afficiatur.**
- Locis allegatis.**
- Qui affectus præter naturam sint.**
- Cap. 3.**
- Somnolentæ cataphoræ signa.**
- Lib. de comate c. 2. & 3.**
- Insomnis signa.**
- De pulsibus ad tyrones cap. 11.**
- 3. de morbis uul. commentario 3 com. 19.**
- Vigilis comatis, quod nomine generis nuncupatur signa.**
- Insomnis, ac pigre cataphoræ signa.**
- Commentario 1.**
- Commentario 7.**

decretum esse comatosos omnes, vel altis somnis, vel tenuibus, uel vigilijs de-
tineri, prout diuersimode cerebrum ipsum fuerit affectum. Nāque eo immo
dice irrigato, coma sequitur, ut nonnullis vsu venit ebrijs repleto in ipsa
ebriatione capite, ac humectato valde; interdum autem ex solis vaporibus
calidis, & humidis à subiectis partibus ad caput in febribus delatis, ut Aetio
visum est, ipsumq; impleantibus, affectio comatosa excitatur. Subinde ob solā
cerebri frigiditatem oritur, est insuper cum ad ambas has intemperantias ce-
rebri somnolentum coma succedit: quo casu profundior, & soporesior som-
nus erit; velut tenuior, si ab aliqua sola frigida, vel humida cerebri intempe-
rantia ortum fuerit: quas varias cerebri intemperies promptissime dignosces,
si ea quę conscripsimus cap. de memoria deperdita, ac de lethargo considera-
ueris. Si vero propter virium infirmitatem talis affectus fiat, adeo iam lan-
guentium, ut aperte genę ægri seruari non valeant, præter id, quod ex ijs, quę
præcesserunt, prompte dignosces, ex ijs quoq; facile deprehendes, quoniam
ita affecti, postquam conuiuerint, aut nihil prorsus, aut parum dormiūt, sed ui-
gilant, nec attolere tamen genas queunt, eorumq; pulsus languidissimi, tar-
di, rari, & parui erunt: quo potissimum distinguuntur ab eo comate, quod
committit humiditas, & algor. Vigil autem coma oritur, cum tam biliosus,
quā pituitosus humor cerebro molestus fuerit: & propterea mixtam ipsi
permanere affectionem est putandum, ut Gal. placuit, i. prorrheticorum. In-
terim verò præ copia sanguinis, cum bilis permissione acris, ac mordentis,
poterit eger reddi tum comatosus, tum vigilans, grauata quidem ob sangui-
nis copiam cerebri facultate, sed a bile vsque adeo irritata, ut somnus inhi-
beatur, ut idem præcitato loco testatur; quemadmodum, & libro de comate
sæpenumero ebrijs euenire dixit, ut vigilēs simul, & comatosi sint, repleto in
ipsa ebriatione capite; deinde præ grauata ad coma tracto, simul autem & à
somno prohibito, multitudine indigesta caput comprehendente. Vnde quem
admodum causam, sic appellationem acquisiuit compositam, vigil siquidem
coma appellatum, Paulo teste, ca. 6. lib. tertii, & vniuersaliter quidem bilioso
humore prædominante, phrenetizant tales vigilantes: pituitoso autem do-
minante comatose, rursus deferuntur, ut ipse testatur; & quoties ad finem usq;
tum desipientia, tum coma persistunt, velut phreneticis euenire solet, tunc af-
fectionem hanc ex phrenitide & lethargo mixtam appellat Gal. eodem lib.
prorrheticorum i. quidam vero Typhomaniam vocauerunt. Contraria verò
hominem prehendent symptomata, ita ut tum vigilet, tum leniter in somnū
deferatur, & prout magis, vel minus desipit, seu vigilat, aut ad somnū defera-
tur, quis nam prædictorum succorum magis prædominetur, ac ex aliis vtriuf-
vis humoris redundantis propriis indiciis prompte dignosces. Pro causarum
autem ipsius comatis diuersitate, diuersæ quoq; eius prædictiones fieri pos-
sunt; exitiosissimum siquidem est, si propter infirmitatē virium talis affectus
oriatur: nec minus exitiosum erit, si cum calidis, & siccis morbis insignem ce-
rebri refrigerationem sequatur ex Gal. sententia, 3. de morbis vulg. si vero
frigidam, ac humidam cerebri intemperie cōmittetur, quę de lethargo prædi-
ximus, de eo prædicenda erunt. minus tamē periculosum erit, si ab vna tantū
cerebri intemperatura ortum ducat: velut si ex contrariis magis. Diuersa in-
super pro causę ratione eiusdem curatio tentanda erit: nam si ex humiditate
tantum somnolentum coma originem ducat; his, quę excitant, capiti admo-
tis, curari debet, ex acerrimo videlicet aceto cum rosas, ac chamæmelo permi-
sto, eo irrigato, ac eiusdem medicamenti euaporatione per nares suscepta. Si
ex frigiditate, anethinum oleum, seu chamæmelinum calefactū adhibeas: ac in-
quantum intenta frigiditas sit, in tantum calefactoria augeātur, ut etiam pu-
legium, & rutam liceat aliquando in oleo coquere, Aetio autore. At si ex fri-

Diuerse coma-
tum causę.

Lib. 6. cap. 7.

Si ex virium in-
firmitate.

Comatis vigi-
lis causę.

Comm. i.

In fine.

Loco citato.
Typhomania.

Pregnoſtica.

Comment. i.
com. 7.

Curandi ratio.

gigitate, & humiditate simul excitetur, simili curatione eget, qua & lethargus. Ex uirium autem imbecillitate ortum cum iis, quæ eas instaurare ualent, curare tentabis. Coma uero uigil, seu phreniticum cum ex permixta, ac contraria causa originem ducat, contrariis quoque medicamentis curare oportet partim lethargi, quæ prius diximus: partim phrenitidis, de qua deinceps dicemus. Vtrum autem eorum superare debeat, ex exuperante humore dignoscitur: nam si pituita bilem superarit, ad lethargi remedia declinandum erit magis: si uero bilis pituitam, ad phrenitidis magis: de cuius tum dignotione, tum curatione, decens est, ut consequenter tractemus.

περί φρενιτιδος.

De phrenitide. Cap. 6.

Com. 4.

Mortales omnes (ut Gal. inquit 1. prorrheticorum) phrenitim appellant eam affectionem, in qua φρένας, id est mentem læsam esse uident, quam tum νόον, tum διάνοαν græci uocant. Proinde ab Hippocrate, eodem Galeno teste præcitato loco, omnes qui mente læsi cōtinue fuerint, phrenitici uocantur, sola febre, ab ijs, qui μαινόμενοι appellantur, discrepantes. quoniam continuam dementia cum febre acuta phrenitidem appellant. Hunc affectum Aetius (Possidonij auctoritate) inflammationē esse membranarum cerebri cum febre acuta, delirium, & mentis percussione inducentem, asseruit. Paulus uero cap. 6. lib. tertij ait, quod phrenitis inflammation membranarum cerebri est, aliquando quidem & ipso cerebro coinflamato, aliquando uero præternaturali caliditate existente in ipso. Trallianus autem ca. 13. libri primi, inflammationem testatur phrenitim esse cerebri, aut membranarum eius. Nos uero Gal. sectantes, cum eo. 2. de causis symp. dicimus phrenitim inflammationem esse secundum cerebrum, & membranas eius: quod quidem ex eiusdem Galeni uerbis colligitur, quæ talia sunt. Phrenitis nanque neque simpliciter in calidis consistit succis, sed cum eo, quod inflammationem efficiat secundum cerebrum, & membranas: & 1. de mor. uul. scriptum reliquit, quod ubi in cerebrum, eiusq; mēbranas flaua bilis fuerit impacta, phrenitides inducit. Qui uero cerebri naturaliter habentis munia nouerit, is ex horum offensa, quod affectum sit primum, deinde qualis nā is morbus sit inuenire ualebit (eodem Galeno teste prorrheticorum 1.) cū exacte definire, utrum cerebrum, an membranæ ipsius primitiue afficiantur, haud magnam utilitatem asserere potest: In utraq; enim dispositione, ut Gal. 2. de locis affectis uisum est, capi succurritur. Quapropter huic rei, non ita uehemens studium adhibere oportet; præsertim cum ipsemet testetur phrenitim ipsam potius ex tenui meningē, quā ex crebro gigni, ut patet 4. de causis pulsuum: quanquam 4. de prælagatione ex pulsibus fateatur tenuem meningem, ut quæ cerebrum amplectatur, nisi una cum eo nullum fere affectum subire posse, nec etiam cerebrū citra meningem, sed statim impartiri unius affectus alteri oportet. & si dura meninx, quoniam longissime a cerebro dissita est, affecta esse sola possit. Quare exquisita phrenitis in loco, in quo princeps animæ pars residet, generatur, ut liquet eodem 1. prorrheticorum: siue autem is qui primo afficitur locus, cerebrum sit, aut membrana tenuis, cū exigui sit momenti quærere, ac nullius usus, iuxta Gal. doctrinam, iure nos inquirere præmittimus, tantum studio sis liqueat cerebrum in eā affectum esse, illudq; constare ex earundem functionū principū lēsiōne, quæ in ipso cerebro perficiuntur. Dixi autem nō ab re exquisitam phrenitim, nam quæ exquisita non est, ex septi transuersi inflammatione oritur; cuius uitio excitatum delirium parum ab eo, quod in uera appareret phrenitide, distat, adeo ut ueteres putarint eodem septo transuerso inflammatione affecto (ut Galen. testis est 5. de loc. aff.) homines phreniticos euadere

1. prorrh. cō. 1.

Aet. li. 6. c. 2.
Phrenitis quid sit.

Cap. ultimo.
Commen. 2.
com. 72.

Quæ pars in phrenitide afficiatur.

Com. 4.

Cap. 9.

4. de caus. puls. cap. 14.
4. de prælag. ex puls. cap. 9.
Exquisita phrenitis locus affectus.

Com. 1.

2. de loc. aff. c. 9.

In non exquisita quæ pars primo afficiatur.

Cap. 4.

dere, atque ob eandem suspicionem *φρένας*, hoc est, mentē eam partem appellauerunt, tanquam sapienti parti conferat quippiam. Verū nos quo pacto hæc non uera phrenitis, ab exquisita, de qua uerba faciemus, distinguenda sit, deinceps ostendemus; cū de utriusque signis pertractabimus. Illud tamen pro cōperto habeatur, quod quæuis functio in exquisita phrenitide lædatur, cum & diuesæ lædi possint, in ea, ut dicemus, pro uaria phrenitidis specie, seu differentia, eius læsio, & perpetua, & prima erit, cum necessario cerebrum læsum esse oporteat primo, aut cum eius meninge. Quisnam autem præter naturam affectus sit phrenitis, ex iam dicta eius notione patere poterit, diximus nanque eā inflammationē esse. At cum in inflammatione duplex particulis affectus oritur, ut lib. de diff. morib. & 3. de temperamentis liquet, unus uidelicet in quantitate, alter uerò in quantitate; erit ergo phrenitis, cum de genere inflammationum sit morbus in compositione, primo, & proprie in magnitudine, uelut quæ libet alia phlegmone est, iuxta Gal. sententiam 13. meth. Poterit secundo dici morbus in intemperie, & ea calida; & 3. in continui solutione. Verum quo modo intelligenda sit inflammatio, cum phrenitidis inflammationē dicimus esse, in explorandis eiusdem causis enucleabimus: nūc uero tempus est de eiusdem indiciis pertractare. Exordiemur autem ex propriis eiusdem signis, quæ quidem cerebri affectionem ostendunt: nā propria morborum signa sunt, cum vel perpetuo, vel solis contingunt: cum autem neque solis insunt, neque perpetuo, propria illorum signa non sunt: ob eam rem phreniticorum signorum ea sunt certissima, quæ perpetuo, & solis insunt phreniticis: deinde ab his, quæ perpetuo, sed nō solis, uelut Gal. 1. porrheticorum fatetur. Qua propter neq; in urinis, ut ipse testatur, neq; in deiectionibus, neque in sudoribus, neque in vomitibus signa phrenitica sunt. Adhuc autem & hæc signa phrenitidis biparita sunt: nam quædam eorum imminentem ipsam, seu iam exordientem, vel futuram dixeris, indicant: quædam uero ipsam factam, seu cōpletam ostendūt, iuxta Tralliani sententiam præcitato loco, & Gal. 5. de loc. aff. Verum quæ exordientis affectionis notæ sunt, iuræ prognostica signa eius, quæ iam cōpleta est, esse dixeris, ut liquet 1. porrheticorū: quamuis & ea quoq; phrenitica indicia uocentur. Interim nanque vigilæ præcedūt, siue etiam somni manifestis imaginibus turbati; ita ut & clamant nonnulli, & exiliant: interdum uero adeo agrestis ac cedit obliuio, ut laborantes aliqui cum matellam petiissent, meiere tamen neglexerint, aut cum lotium emitterent, matellā ipsam prodere haudquaquā meminerint. Interdum maiori cum tumultu, aut temeritate respondent, præsertim ubi antea fuerint mansueti; atq; hi omnes exiguo utuntur potu, propter mētis lētionē; spiratioq; ipsis rara est, & magna; pulsus parui, & neruosiore; nōnunquā occipit dolor infestare. Febris uero semper est continua. At cū ipse affectus increuerit, seu inuale scat, oculi eorū ueremēter euadūt squallidi, aut ex altero ipso acris lachryma effunditur: ac deinde lippitudo innatat, & uenæ ipso sanguine plenæ uidentur: sanguisq; ex naribus stillat, quo tēpore nihil (quod ex arte ad prudentiā pertinet) respondent. Floccos auellūt, & festucas carpunt, aridioresq; febre torquentur, cui nō ita magnæ in alterutrā partē mutationes accedunt: quēadmodum in aliis quibusdam febribus videre est, quæ per vigorem quidem grauissime infestant: inclinationes uero habēt mitiores. Ad hæc lingua salebrosa quoque est: nonnulli interdum audiendo falli uidentur, ac interim mœsti iacent, vix quicquam respondentes; atque dolorifica dispositione affecti, uel acius premēte aliquo, haudquaquam sentiunt. Hoc in quā modo exquisita phrenitis paulatim euenire solet: quiescere uero neq; subito, neque affatim consuevit, prout Gal. uisum est, eodem 5. de loc. aff. Proinde licet perpetuū deliriū. septo trāuerso quoq; inflammato, excitetur, & propterea quodammodo cum eo, quod ad exquisitā requiritur phrenitidis, cōueniat;

Quis affectus præter naturam sit.

lib. de diff. mor. cap. 12.
3. de temper. c. 5. c. 1. & seq.

Signa indicatiua.

Comm. 4.
Quæ sunt phrenitidis certissima signa, & quæ non.

Cap. 4. colligitur.
Hæc quoque bifariam sunt.
Comm. 4.
Imminentis phrenitidis signa.

Factæ iam phrenitidis signa.

Cap. 4.
Quibus inditiis ipsa distinguatur.

ab ea quæ ex
septo transuer-
so oritur.
Loco citato.

Quibus a cete-
ris delirantibus
distinguuntur.

Cap. 9

Quibus a iuro-
re,
Exquisite phre-
nitidis differen-
tiæ tres.

Cap. 2,

de diff. symp. c. 3
4. de loc. affect.

Cap. 2.

De diff. sympt.
cap. 3.

Quomodo di-
stæ tres differen-
tiæ distinguan-
tur.

Loco citato.

Quot modis in
Gal. doctrina di-
catur inflama-
tio, quia qua-
tuor,

2. de loc. affect. c. 9,

Quomodo phre-
nitidis inflama-
tio dicitur,

distinguitur tamen ab ea (iuxta Gal. sententiam) ex oculorum accidentibus, & sanguinis a naribus stillis, ac spirationis specie, quæ in phreniticis magna est, & rara. Vbi vero a septo transuerso delirium ortum fuerit, inæqualis est, ut modo exigua sit, ac frequens, modo magna, & angustiosa. Rursus præcordia intendi proprium indicium est, illico ab initio septi transuersi affecti, id quod affecto cerebro posterius accidit, parato iam eo, non autem incipiente. Calor quoque circa caput, & faciem vehementior est ijs, qui ob cerebri vitium delirant: & (ut summam dicam) eorum signorū, quæ phrenitidē antecedere diximus, aut nullum apparet, aut si apparuerit aliquod, id per exiguum est in his quibus septum transuersum inflammatione laborare incipit. Distinguuntur vero phrenitici a reliquis delirantibus, per consensum reliquarum partium cum febre acuta: quoniam in his non adeo valida fiunt deliria, non perpetua, seu assidua permanent, sed aucta febrim sequuntur, remissa verò ea, quiescunt, ut patet 2. de loc. affectis; quemadmodum & ab ea insaniam quæ græce *μανία* dicitur, sola febre discrepat, ut antea meminimus. Huius autem exquisitæ phrenitidis tres in quā inueniuntur species, seu differentiæ: quarum duæ simplices sunt, ex quibus deinde tertia componitur, ut patet 4. de loc. affect. Quippe sunt quidam phrenitici, qui de ijs, quæ oculis offeruntur, recte quantum ad sensitiuam notitiam pertinet, seu ad imaginatiuam spectat, iudicant: cogitando verò a naturali iudicio aberrant. Alii rursus cogitatione quidē minime falluntur, cum eis veluti errans sit imaginationis motus: plerumque verò in vtriusque simul deliriū cōstitit, sensus videlicet, seu imaginationis, & cogitationis vitio laborantes, parū probe imaginando, ac parum aptè rationando. Attulitque idem Gal. exemplum lanifici pueri tum prædicto loco, tum lib. de diff. sympt. pro declaranda prima differentia. Secundam autem differentiam non solum in alijs, verum in seipso, cum puer adhuc esset, expertū esse testatur. Illud quod Theophrasto medico egrotanti contigit, ut eodem lib. 4. de loc. affect. & de diff. sympt. patet. Quomodo autē quispiā valeat prænominatas differentiæ, seu phrenitidis species sigillatim dignoscere, prolixa oratione opus non est, cum ex deprauato cuiusque functionis motu, aut ex vtriusque si cōposita fuerit, prompte percipiatur si quis prius norit, quid sit vtriusque facultatis munus. Euenit autē interdū, ut illa læsa seruetur memoria, interim vero ut simul cum eis afficiatur: at non propterea sic temere in Gal. doctrina asserendū est has functiones in diuersis cerebri partibus perfici, cum & vna lædi possit, altera illæsa permanēte, quāuis Aetius illud sentiat, cum valde alienum sit ab eius sententia, ut in quodā nostro cōpēdio lōgiori discursu ostēdimus, ac qua rōne illud fieri possit demonstrauimus: quāuis in vno, eodēque loco, hoc est, in cerebri corpore, perficiatur. Illud tamē non omittā, priusquā ad narrandas phrenitidis causas deueniam, cum ea sit inflammatio, ut diximus, sub quo inflammationis significato cōprehēdatur. Nāque Gal. cōmunissimo eius significato utēs secundo de arte curatiua ad Glauconē, dixit aliā esse siccam, aliā esse humidā inflammationē: nec ea sub sicca contineri potest, cum ex quibusdā oriatur succis, ut dicemus. Insuper & hæc, quæ humida est, fieri potest ex cuiusvis humoris superabundantia, potissimum cum sanguine, ut secundo de locis affectis, ac cōmento aphor. 33. sexti libri patet, communi quodā significato ea utēs, quomodo nec ipsa phrenitis inflammatio dici posset, cum ea oriri non valeat ex cuiusvis succi redūdantia, etiā cum sanguine permitti, ut dicemus. Interim vero inflammationis nomine utitur, velut etiam cōmuni quodā non ad omnes inflammationes, sed ad eas tantū, quæ ex calidis succis ortū habent, siue, is sanguis fuerit, siue, bilis flaua, aut ex ambobus simul humoribus genita fuerit: sub quo significato & ipsa phrenitis cōprehenditur nā ex calidis succis, quāuis non omnibus, originem ducit, ut infra patebit. Qua ratione fit, ut quāuis Gal. alio modo inflammationis nomine utatur, & quanto

magis

to magis proprie ipsam fumendo, ut sit tumor quidam ex sanguine optimo, ac mediocrem crassitudinem obtinente, præter naturam excitans, cum uehementi dolore, colore, tensione, ac pulsu; phrenitis tamen ipsa ab hac inflammationis appellatione secludatur; cum nec ipsa a sanguine optimo, ac mediocrem crassitudinem habente excitari possit. Ex quibus liquet phrenitim ipsam exquisitam propterea inflammationem dici, quoniam ex calidis succis ortum habet, non siquidem omnibus, sed ex ipsa bile, cum uidelicet locum, in quo princeps animæ pars residet, prehenderit, eodem Gal. teste primo prorrheticorum. At quoniam ea non unam tantum habet denominationem, & differentiam, cum alia pallida bilis dicatur, alia flaua, seu rufa, quæ iterum immoderatus ex calfacta, afflata flaua bilis nominatur; ex qua istarum exquisita phrenitis excitatur, non iniuria quæret quispiam. cui respondebimus nos cū Gal. tertio de loc. aff. ac Tralliano, præcitato loco, eam oriri posse ex quauis prænominata bile: nam interdum a pallida ortum contrahit: interim flaua eā parit: nonnunquam ab eadem flaua præassata gignitur. Illud vero hoc modo inuestigare licebit, quando ex prædictorum aliqua excitetur: nanque ex pallida bile si generetur, mitior erit, & phrenitis, & delirium, & febris; illudque nō absque ratione: nam cum seroso recremento flauæ bili commixto pallidam constitui contingat, ut Gal. visum est 10. de simplicium medicamentorum facultatibus non mirum, si mitior ea fuerit. Si vero ex flaua bile excitetur, multo vehementior phrenitis erit, febres quoque maiores inducet: cum & ipsa flaua bilis propterea colore flaua sit, quoniam plusculum ex calfacta est, ut præcitato loco Gale. placuit. At ubi flaua bilis immoderatus, ex calfacta, & plus æquo adusta fuerit, seu præassata, phrenitim efficiens, dementia occurrit ferina, & melancholica: & propterea efferata dicitur: cuius ratio cunctis facile patere poterit. Patet deniq; ex his, ex qua bile phrenitis gigni possit, ac quibus indiciis eiusdem causa inuestiganda erit. At si quis dixerit Pauli autoritate fretus cap. 6. lib. 3. ex redundante sanguine phrenitim oriri posse; respondebimus nos, aut Paulum non de exquisita phrenitide intellexisse, quæ ex sanguine, cui admixta fuerit flaua bilis gigni posset, vel de sanguine feruescente, & tenuissimo secundum substantiam intelligere voluisse: qui flauæ quidē bili similis existit, assimilesq; parit affectus, Gal. teste secundo de arte curatiua ad Glauconem, quinimo & ipse flaua bilis dici potest. Quapropter cum Gal. concludamus, exquisitam phrenitim, quæ inflammatio cerebri, & membranarum eius existit, ex pallida bile, aut flaua, seu eadem flaua præassata originem ducere. Quo aut pacto diuersæ eius causæ dignosci ualeant, ex iam dictis liquet: reliquum est igitur ut eius prognostica describamus, deinceps vero curationē.

Quod autē ea acutissimus, periculosissimusq; sit affectus, omnibus in cōfesso est, iuxta Tralliani sententiam: & Gal. 1. progno. vniuersum phrenitidis genus exitiale esse testatur, simul cum Hip. Verū idem Hippocrates aphor. 53. sexti libri asseruit, desipientias, quæ cum risu fiunt, securiores esse: quæ vero cū studio periculosiores: quo loco per securiores intellexit minus periculosas: cum nulla desipiētia secuta sit, velut Gal. eodem loco exponit. Quo fit, ut hæc sententia non aduersetur ei, quæ dicta est, primo progno. Hoc idem Celsus cōfirmavit lib. 3. c. 18. dum dixit, interdum in acceffione ægros desipere, & loqui aliena: quod nō quidem leue est, neq; incidere potest, nisi in febre uehementi; non tamen æque pestiferum est, ut phrenitis. Idemmet Hipp. aphor. 72. quarti lib. urinas albas, & perspicuas malas esse in delirantibus dixit: & Galen. 3. de morbis vulgaribus acutissimam esse phrenitidē testatur, quæ primo statim die una cū febre inuadit: atq; omnes fatetur, qui ita phrenitide perciti essent, infra septimū diē mortuos esse: per paucos autem, hosq; raros, hunc superasse. Grauiſſima quq; phrenitis est, quæ ex præuſta bile gignitur ut Paulus inquit.

Exquisite phrenitis causa.
Com. 1.
Amare bilis differentie.

Cap. 7.

Modus dignoscendi ex qua bile phrenitis fiat.

Cap. de felle.

Dubiū ex Pauli uerbis.
Responsio.

Cap. 1.

Prognostica.
1. progno. co. 13.

1. progno. loco citato.

3. de morb. uul. com. 3. com. 75.

Curatio.

Ratio uisus.

At tempus est ad eius curationē accedere: pro qua, aer primo alterandus, hyeme quidem, ut Aetio uisum est ad tepidum, æstate uero ad frigidum: nā dixit, Aeger igitur decumbat hyeme quidem in domo tepida, æstate uero frigida. At Paulus uoluit, quod æger decumbat in loco tum lumine, tū temperie moderato, & uariis quibusdam picturis libero. Ut uero hi concilientur, prohibendus est, mea quidem sententia, aer extreme frigidus, etiā in æstate: de quo noluit Aetius intelligere: quoniam & inflammationi nocua sunt impenſe frigida eiusque causam densando prohibent digestionem: nec impenſe calidus eligendus erit, etiam in hyeme, cum inflammationem & irriet, & foueat; ac eius causam adaugeat. Quo uero ad lucē, seu tenebras spectat, uoluit Aetius, q̄ hi qui ad lucis splendorem resipiscunt, hi lucida domo degant: at qui ad lucem efferuntur, in tenebricosa domo decumbant. Trallianus autem iussit aerem magis lucidum, quā tenebrosū eligendum esse, ut æger per huius sensum ad consuetorum perceptionem, ac conscientiam perueniat. Quo uero ad aeris qualitates primas eligendas, quod temperatus existat, uoluit, quod animalis spiritus tēperie ipsius refocilletur, ac relaxetur, uitandusque sit admodū crassus, humidus, frigidus, aut calidus, propter assignatas causas. At Celsus quo ad tenebras attinet, aut lumen, hūc utitur uerbis. Fere uero antiqui tales ægros in tenebris habeant, eo quod eis contrarium esset exterreri, & ad quietem animi tenebras ipsas conferre aliquid iudicabant. At Asclepiades tanquā tenebris ipsis terrentibus, in lumine habendos esse dixit. Neutrū tamen perpetuū est: alium enim lux, alium tenebræ magis turbant: reperiunturque, in quibus nullum discrimen deprehendi, uel hoc, uel illo modo possit. Optimū itaque est utrunque experiri, & habere eum, qui tenebras horret, in luce, eum qui lucem in tenebris. At ubi nullū tale discrimen est, eger, si uires habet loco lucido si non habet, obscuro continendus est, quam Celsi sententiam perpetuo seruādam esse censerem, quanquam prædicti omnes ueritatem asserant, si eorundē mens rite percipiatur. Quantū uero ad motum, & quietē spectat, iussit Paulus phreniticos in quiete, quoad eius fieri licet, contineri, si diuites fuerint à famulis; si pauperes, uinculis conuenit; nam inordinata motio uires prostermit ac egrotos macilentos reddit, potissimum delirantes Gal. teste comm. aphor. 28. secundi libri. Alia etiam de causa pedes deligaturis constringi debent. nempe quo humores deorsum reuellantur, ut eidem Paulo placuit: huius quoque sententiæ est & Trallianus: qui propterea inhibendum esse uiolentum motū asseruit, quoniam præter iam dicta, & morbum excitat, & somnū impedit: de uinculis similia proferens, quæ Paulus. De somno autē dicebat Celsus, Omnibus uero sic affectis somnus, & difficilis, & præcipue necessarius est: sub hoc. n. plerique sanescunt: propterea quæ somnum moliuntur, adhiberi debēt intus ac extra, de quibus in sequentibus mentio fiet, ac omi ratione uigiliæ excidēdæ sint Tralliano auctore. Subluenda interim aliis est lenibus clysteriis decocto uidelicet maluarum, uiolarum, hordei, papaueris capitū, ac foliorū betæ, & pauco sale, additis unc. iij. uel iiij. olei uiolacei, uel de papauere, seu amygdalarū dulcī, duabus mellis uiolacei, & i. cassiæ tractæ, seu cassiæ fistulæ licebitq; interdum si hæc non suffecerint 3. iij. uel iiii. diacatholico addere. Ventris uero attritio penitus uitanda erit cum & morbū, & cām adaugeat. Ad locū autem quo æger decūbit, amici, & quidē gratissimi ingrediātur: qui nūc blāde ægrotum alloquātur, nūc acerbius corripiant, ut inquit Paulus. Celsus uero aduersus omnium insanientiū aīos asseruit, necessariū esse gerere se pro cuiusq; natura: nā quorundā uani motus leuādi sūt sicut in hoīe p̄diuite famē timēte accidit, cui subinde falsæ hæreditates enunciabantur: quorundā audacia coercēda est, sicut in iis fit, in quibus continendis plagæ quoq; adhibentur: quorundā ē intempestiuus risus, & obiurgatione, & minis prohibendus est quorundā discutiendē

scutiendæ tristes cogitationes, ad quod symphonix, & cymbala, strepitusque proficiunt. Sæpius tamē assentiendum, quàm repugnandum est, paulatimq; & non euidenter ab his, quæ stultè dicuntur, ad meliora mens eius abducenda est. Interdum etiā elicienda ipsius intentio, vt fit in hominibus studiosis literarū: quibus libet legitur aut rectè, si delectantur, aut perperā, si id ipsum eos offendit; emendando enim conuerrere animū incipiunt: quin etiā recitare, si qua meminerunt, cōgendi sunt. Ad cibū quoq; quosdam non desiderantes reduxerūt hi, qui inter epulātes eos collocauerint. Quare rectè inquit Trallianus, quod amici nonnulli admodum familiares ei assistere debēt, vt etiam increpantes ipsum propter ea, quæ facit, reuereatur: neque verò domesticus, aut cognatus, cuius causa aliquando tristeretur, aut cui irascatur, ingredi debet: quippe hoc irritare ægros, & commouere solet, & vt valdè perturbentur, manifestā præbet occasionē: nec etiam amici frequentes, & copiosi ad eū ingredi debent, propter causas ab eo assignatas. Quoad cibum attinet, moderatio in eo quoque adhibenda: nā neque implendus æger est, ne insaniat: neque ieiunio vtique vexandus est, ne imbecillitate in cardiacum incidat, quemadmodum Celsus testatur. opus est autem, eo auctore, cibo infirmo, maximeque sorbitione: propterea ptisana, velut primū omnium victus ratione phreniticis remedium adhibeatur, optimè prius decocta vt Tralliano visum est. Insuper & ipsius solus cremor utilis est. Quod si ægri prædicta auersentur, panis in aqua calida intinctus iuuabit. Quod si vires consentiant, ipsa aqua hordei tantum vtare. Ex oleribus intybum, & lactuca elixa, ac alia olera frigida cucurbitaq; , in pauca tamen quantitate exhiberi potest. Ex fructibus vti possunt malis, ac acidis pomis, & eiusdem qualitatis cerasis. Pro potu vtantur aqua hordei iam dicta, aut aqua ex decocto seminum coriandrorum præparatorum, vel aqua ipsa decocta cum additione exigui succi acetositate citri, aut succi malorum punicorum acidorum, siue succi pomorum etiam acidorum. In quibus autē multæ urgēt uigiliæ, febris verò nō vehemētissima, ac vires sunt imbecillæ, quædā quoq; concoctio vrinarū in eis apparet, præsertim si cū sani essent vino vtī cōsueuerint, & eo vtī possunt, potissimū si os ventriculi eis imbecillum sit. Commodissima nanque est ijs vini potio, si modicè assumatur, Tralliano teste; nam ferocitate ipsorum mutat, ferinos mores ad hilaritatem transfert, somnūque concilat ac sitim restinguit; eoq; vtendum erit vino, quod Græci *ὀλιγοφορον* appellant dilutū inquā, tenue, & aquosum, ac album, modicèq; astringens. Nā huiusmodi vinum & ventriculum robustum efficit, cū hoc, quod haudquaquam caput tentant, auctore Galeno 5. de locis aff. 12. meth. medendi, & 3. de ratione uictus in morbis acutis. Proinde nulla futura mētis alienatio ex eius exhibitione timeri debet, ut Paulo visum est. Frigidam autem aquam vitare omnino oportet, eò quod tuta non sit. at tutius erit tepida potius vtī, vt placuit Tralliano, & potissimū si septem transuersum coactum sit. Phreniticis vero statim ab initio venam incidendam esse, modò valens virtus sit, vt sine noxa missionem sanguinis toleret, ac nihil eorum prohibeat, quæ de secanda vena perpēdenda sunt, cuncti ferè artis medicæ auctores cum Galeno 13. meth. consentiunt, præter Asclepiadē, qui perinde esse dixit his sanguinē mitti, ac si trucidentur, rationē hanc secutus, quod neque insania esset, nisi febre intenta, neque sanguis in remissione eius rectè mitteretur: quem Celsus & rectè quidem improbauit, tum propter alia, tum quoniam continuata quoque febris habet tempora; quibus & si non remittit, non tamen crescit. Sanguis ergo absque controuersia, alijs consentientibus, statim ijs mitti debet, tanquam primum omnium, & maximum futurum præsidium, prout omnes conueniunt. Verū Aetius mediam cubiti venam secandam esse præcipit. Paulus uerò protinus è cubito sanguinem itti debere iussit, ex qua autē ue-

5. de loc. aff. c. 6.
12. meth. c. 4.
3. de rat. uict.
c. 2.
Venæ sectio.

cap. 21.

Quæ uena secanda sit.

Quantitas san-
guinis auferen-
da.

Oxyrhodinam
Cap. 21.
Commune præ-
ceptum in admo-
uendis topicis
medicamentis.
1. de comp. me.
sec. loc. c. 1. & 8.
3. de loc. af. c. 3.

Nunquid purga-
re eos cōueniat.
Aui. lib. 3. sen.
tract. 3. c. 3.

Cap. 6.

Quibus purga-
ntibus medicamē-
tis utendum sit.

na, non meminit: quanquam illud ratione determinare haud difficile: erit nā si ab initio usque ad quartum diē phrenitis irruat uigenti etati, bonæque corporis habitudini, ac cuncta sanguinis multitudinem indicent, secunda primo erit præcepto Aetii, media uena. At si non adeo fuerit sanguinis cum bile redundantia, & ex transmutatione alterius morbi phrenitis succedat, potissimum si aliæ euacuationes præcesserint, tunc humeralis, seu externa uena incidenda erit. quod si phreniticus manum non porrigat, quod sæpe accidit, ex recta in fronte uena sanguinis missio molienda erit, ex Tralliani, & Pauli sententia Facies autem id recte, si collum artificiose fascia lanea, seu linea constringas, ut uas attollatur. Quantitas autem pro uiribus detrahatur, & minus quā oporteat auferatur, ob plurimam, quæ in ipsis ea uehementi motu contingit, dissipationem, ac exhalationem, & propter laxitudinem, at si uidebitur, iteranda potius erit, ut si prior ex media facta fuerit, secundo loco ex externa, & tertio, si opus fuerit, ex frontis uena sanguis detrahatur. Quod si prior externa uena incisa fuerit, secundo loco eadem frontis uena secetur, & ultimo, si opus fuerit, cucurbitulæ in occipito figendæ, ex quibus sanguis scarificatione trahatur: aut si noluerit æger brachium porrigere, & propterea recta in fronte uena fuerit incisa, secunda uice, si oportebit, ex eadem sanguis mittendus erit, & demum si intererit, cucurbitulæ, in occipitio figendæ. Post sanguinis euacuationem, caput oxyrhodino madefaciendum erit, non tantum ex Galeni præcepto 13. meth. sed ex communi omnium consensu, illudque in principio admouendum: nam repellendus a capite humor est, ipsumque alterādum, ne immodica caliditate liberalius humores attrahat, atque id circo eis repleatur: quanquam nec illud capiti admouere tentandum erit, nec aliud quodpiam medicamentum, nisi uniuerſi corporis curatione præmissa: id quod commune præceptū est in omnibus morbis, ac obseruare oportet in cunctis topicis, hoc est, localibus uocatis remediis, Galeni decreto, cum primo de compositione medicamentorum secundum locos, tum tertio de locis aff. ut supra retulimus, quō etiam tempore odoriferum parari potest eundem præstans usum, excipiens aquæ rosarum, & myrtillorū ana unc. iiii. sandalorum rubeorum, citrinorum, & corallorum rubeorum ana 3. i. aceti rosacei unc. i. & si misceantur simul. Interim nonnulli alterātes syrupi competunt, ut rosaceus, uiolaceus, ex nymphæa, ex cychorio, seu endiuia, ac de papauere. Verum nunquid purgatione, ubi opus fuerit, utendum sit, non admodum liquet, cum neminem græcorum inuenerim ipsam præcipere: quamuis Celsus uideatur ipsam olfecisse, dum dixit, Nec minus deliberari potest an alius ducenda sit. Inter arabes, Auicenna proprio capite de cura phrenitidis, redundante flaua bile, magis quā sanguine, purgationem laudauerit. Verum uos (icet græci auctores de ea mentionem non fecerint, forte, quod purgantia medicamenta sint natura calida, humoresque commoueant, & propterea inflammationem augeant, tum etiam quod cum ea febris sit uehemens) ipsā tamen non negabimus, ubi usu fuerit, nec propterea tantis pugnabimus uiris tum nec ea medicamenta purgantia, quæ talis sint naturæ, ac eorum temporibus reperiabantur, admittimus, sed tantum ea, quæ cum hoc, quod feliciter purgant, ac fluentes succos ad infernas partes reuellunt, nec inflammationem nec febrem ad augent, imo & utrasque mitigant, ac curant, quæ si nouissent, approbassent utique, quanquam nec eam, quæ ipsi nouerunt purgantia medicamenta damnant, licet non præcipiant. Nam & ipse Galenus 4. meth. medendi, auctoritate Hippocratis, interdum in morbis magnis, non modo uenæ sectione, uerum & purgatione reuulsionis tantum gratia utendum esse præcipit, etiam nulla humorum plenitudine existente, aut redundantia uitio si succi. Qua de re utendum esse purgantibus medicamentis, quæ aut calida

non

non sint, aut parum caliditate participant, cum ipsis tamen frigida miscenda
 medicamenta censerem: ea sunt manna, casia fistula, saccharum violaceum,
 seu syrupus ex pluribus infusionibus violarum, aut rosarum, tamarindi, & in
 terdum diacatholicon, aut triphera persica, seu rhabarbarum, modò cum ali-
 quo prædictorum permixta sint. poterit autem sic cõponi. Rec. tamarindorũ
 unc. i. fiat decoctum cum florum, violarum borraginis, buglosi, & hordei mun-
 di ana 3. iiii. in aqua: in cuius decocti iure dissolvas mannæ electæ unc. ii. s. vel
 iii. aut cassiæ fistulæ unc. i. & s. vel sacchari violacei unc. ii. seu syrupi ex pluri-
 bus infusionibus violarũ, aut rosarum unc. iiii. adde demum rhabarbari uigo-
 rati infusi 3. i. vel scrup. iiii. diacatholicon, seu triphera persicæ 3. iiii. vel iiii. &
 fiat potio. Verũ si quis rhabarbarum auerfetur propter corporis temperatu-
 ram, ætatẽ, aut habitum, seu anni tempus, regionem, ac coeli statum calidum,
 poterit reliquis benè uti, eorum quantitatem accommodando, prout ritè vi-
 debitur. Iterim quoque frictionibus utendum leuibus pro reuulsione, eo po-
 tissimum tempore, quo & delirium & febris non valde auctæ fuerint, sed po-
 tius remiserint; & præsertim inferiores fricentur partes. Caput autẽ rosaceo
 cum modico aceto irrigetur, estate quidem tepido, hyeme verò moderate ca-
 lido, quòd in cunctis alijs medicamentis seruandum erit topicis: & si ambiens
 frigidior fuerit, commodũ est & chamæmelinum ex æquo ipsi admixtũ, ue-
 lut ipse illustrem Indicum Picolhominem, Ducis Amalfiæ filium hoc medi-
 camento à phrenitide, cum à cunctis medicis esset destitutus, liberaui, facta ex
 eo irrigatione supra coronalem commissuram, capillis prius tonsis. Poterit in
 super parari decoctum ex rosis, violis, hyoscyamo, lactucis, nymphæa, ac cor-
 ticibus papaueris, cui miscendo rosacei, & chamæmelini quantitatem mode-
 ratam, aut rosacei solum in aeris constitutione calida, seu estate, & albi aceti
 parum, irrigatio similiter fieri potest: odorem quoque naribus obicijmus: ac na-
 res ipsas intus, vel frontem ex similibus medicamentis illiniemus, etiam cum
 in summo incremento phrenitici fuerint, teste Galeno 13. meth. Quippe sopi-
 re, ut ipse asserit, ac stupefacere principem facultatem oportet, cerebrum sci-
 licet, quod supra modum incaluit, refrigerando: ex quibus etiam assiduè facies
 proluatur, ut Aerio visum est. Vbi verò diu hoc vitium moram traxerit, Ga-
 leno, & Aerio testibus, ea adhibenda medicamenta sunt, quæ discutiant, ac cras-
 sos vapores transpirare faciant, velut si serpillum, thymum, aut spondylium,
 melilotum, & althæa oleo coquantur rosaceo, vel chamæmelino, quo demum
 caput irrigandum, aut madefaciendum erit, atque vapor per nares suscipien-
 dus. Verũ in hoc magnopere animaduertant medici rogo, ne sic temerè præ-
 dicta, seu alia, quæ discutiant medicamẽta calida phreniticis admoueant, nisi
 transacto eius incremento, inclinanteq; vigore summo: nam si prius approxi-
 mentur, maximũ parabunt discrimen, & fortè egrotantis perniciem, inflama-
 tionem siquidem augendo. nec minus animaduertant quæso in approximãdis
 uelut uulgus medicorũ hodierno tẽpore vitur, catellis, seu gallis, cũ si in prin-
 cipio, ac summo incremẽto eis vtaris, inflammationem irritabunt, & febrẽ. in fi-
 ne verò summi vigoris, ac inclinatione rectè fortè eis vtaris: quo etiam tem-
 pore aquę potabilis balneo temperatè calido, præsertim ubi siccitas, & vigi-
 lię plurimę vrgeant, lauare eos non nocebit, & si febricitent: cũ ad bonam
 temperiem ex eo reuertantur, & in posterum delirio, & febris liberantur.
 Tralliani decreto: post quod & liberaliter vngere conuenit. Illud præterea
 menti tenendum, quòd in quacunque phretitidis differentia, seu quanuis prin-
 cipe functione affecta, perpetuo medicamenta iuxta capitis commissuram co-
 ronalem approximanda sunt; tum propterea, quòd non in diuersis cerebri
 partibus prædictę functiones exerceantur, sed in eadẽmet sede, iuxta Gale-
 ni sententiam, ut alibi fusiùs declarauimus; tum etiam quòd per eam partem
 promptius

Frictiones.

Quæ iterũ ser-
uanda sint, in
adhibendis to-
piciis.

Cap. 21.

Quæ præsertim
parte applican-
da sint topica
internis capitis
affectibus.

In proprio que
fito.

Quæ somnum
conciliant medi-
camenta.

Quæ obseruan-
da sint in exhi-
bendis anody-
nis medicamen-
tis torporem in-
ferentibus.

promptius non modo facultas, sed etiam substantia medicamentorum pene-
trare valet velut prius in Capite de lethargo ad mentem Galeni dictum est.
At cum dixerimus somnum solum, & maximum esse delirantium remedium
propterea non immerito commemoranda hic duxi, quæ ipsum moliuntur,
tam intus, quam extra adhibita: nam pro oxyrhodino, ac iam dicta irrigatio-
ne, posset caput irrigari cum oleo de nymphæa, violaceo, seu ex papauere,
paucis aceto addito; aut decoctum fieri ex lactucæ folijs violarumque tum
floribus, tum folijs, hyosciamo, rosis, solano, capitibus pauperis albi, & ni-
gri, ac mandragoræ pomis, seu radicibus, semper acetiparum miscendo, ex
eoq; vel caput irrigando, vel ipsum olfaciendo. Naribus insuper, ac tempori-
bus cum paucis aceto populeone vnguento. vti poteris, ac fronti. Sub cerui-
cal papaueris capita, aut mandragoræ mala subdantur, vt præcipit Aetius.
Confert etiam aliquid ad somnum silanus iuxta cadens, hoc est, aquæ riuus,
vt inquit Celsus, faciemq; assidue prolui præcipito ex aqua, in qua papaueris
cum albi, tum nigri capita sint cocta; in potu insuper danda est aqua, in qua
papauer, aut hyoscyamus decocta sint, vt idem Celsus refert pondere vnc. iij.
aut 3. i. alicuius somniferi antidoti, vt triphæræ magnæ, aut eius, quæ requies
dicitur, seu philonij romani, vel perfici tribuas: in quorum assumptione il-
lud obseruandum, ne in uigore, sed in exacerbationis declaratione dentur.
Cæterum assiduum usum stupefacientium pharmacorum, potionum, irriga-
tionum, ac illitionum vitare oportet; facile enim in his, ut Aetius refert, qui
immodice perfrigerantur, transitus fit a phrenitide in lethargum: quo fit, ut
quem obdormire volumus, excitare. postea non possimus. Si etiam vires im-
becillæ fuerint, tunc maximè vitabis nequid torpori, somnoq; inducendo ac-
commodum exhibeas: nam in his, qui infirmas vires habent. Tralliano teste,
non vulgaris noxa, immo interdum mors talium potionem comitatur. Liqueat
igitur, ex his non modo phrenitidis curandi ratio, verum & immodice uigi-
liæ, nec non delirij quouis modo in febribus geniti, cum uidelicet adeo ur-
geat, ut & ipsi quoq; quamuis per consensum excitetur, ac febrium sympto-
ma sit, non absq; ratione succurrere oporteat, ne uidelicet ex eo cerebrum ip-
sum per se facile afficiatur.

περί μελαγχολίας.

De melancholia. Cap. 7.

2. de caus. sym.
cap. 7.

1. meth. ca. 2.
3. de loc. aff. c. 7
Melancholia
quid sit.

Quæ pars in ea
afficiatur.
Cap. 7.

SVb delirii nomine, quod Græci παράφρεσιν appellant, non modò phreni-
tis, ac quod in acutis febribus excitari consuevit, continentur, Galeno te-
ste secundo de causis sympt. verum etiam duæ aliæ species, seu differen-
tiæ, quæ quidem citra febrem oriri solent: quarum una melancholica
tum a Græcis, tum a Latinis dicitur, reliqua uero *μανία* græcè latine in-
fania, seu furor nuncupatur. de his propterea non immerito pertracta-
bimus, de melancholia prius uerba facientes: quæ quoniam inter eos con-
numeratur affectus, ut Galeno uisum est secundo meth. med. & tertio de
loc. aff. qui a causa nomen sumpserunt, propterea melancholiæ nomen im-
positum ei est. quò fit, a Paulo lib. tertio cap. 14. sic describatur. Melancholia
delirium quoddam est sine febre, ex melancholico humore maxime nascens
qui mentis sedem occupauerit: nam quamuis non unus sit eius generationis
modus, ut dicemus, cunctis tamen melancholicis commune est, quod cere-
brum eis afficiatur, siue per essentiam, siue per consensum: quod inspiciens
Paulus in eius descriptione innuit cerebrum in ea affici. Hoc idem Galenus
ante ipsum tertio de locis affectis decretum reliquerat. Patere insuper pote-
rit ex principis functionis læsione aliqua, cum dictum sit eam quandam esse
delirij speciem: & propterea in ea necessarium esse aliquam lædi functionem
principem

principem, quæ non nisi in cerebro perficitur: quæ de re & ipsum affectum erit; nam quod in cerebro consistant omnes principalium animæ virium affectus, in confesso habent omnes medici, ut tertio de locis aff. liquet. Nunquid autem ut instrumentalis, vel ut similis pars, cerebrum ipsum in melancholia afficitur, idemmet Galenus eodem tertio de loc. aff. testatur, cum dixit. Vbi verò in ipso cerebri corpore melancholicus succus abundat, eam infantiæ speciem quam græci *μελαγχολία* vocant, efficit: quo fit, ut neque subito eueniat, neque affatim solvatur: nam totius substantiæ cerebri temperies mutata est. ex quibus liquet cerebrum, ut similem partem, & non ut instrumentalem in melancholia læsum esse: quod quidem ante Gal. Hippocrates sexto de morb. vulg. confessus est, cum dixit. Melancholici magna ex parte comitiali morbo afficiuntur: & contra, morbo comitiali laborantes efficiuntur melancholici; atque horum vtrumlibet magis accidit, prout vel in hanc, vel in illam partem infirmitas repit: si enim in corpus, epileptici, si vero in mentem, melancholici redduntur. Cum vero in hoc affectu cerebrum per essentiam læditur, propria ipsius melancholiæ symptomata quæ infra narrabimus, auctiora videbuntur, nec alia symptomata in aliqua aliarum partium prius apparebunt. At si prima symptomata in aliqua corporis parte, ut puta circa ventriculum inceperint, & demum ipsis auctis melancholica sequatur affectio, haud ab re existimandum erit, primitiuam affectionem non in cerebro consistere, sed ipsum per consensum affici: quo casu, nec propria melancholiæ symptomata grauiora apparebunt, ut fusius infra dicemus. Sufficiet autem modo non ignorare cerebrum necessario esse affectum in ipsa melancholia, quomodocumque ea exciteretur. At nunquid morbus sit hic affectus, vel symptoma, non omnes consentiunt: quidam namque, quod in morborum numero reponatur, existimarunt, qui licet magnæ auctoritatis viri sint, pareant mihi, si aliter sentiam cum Galeno, dicamque symptoma, & non morbum esse in genere noxæ functionum principum, cum earum quædam deprauata sit functio, velut tertio de loc. affe. ac secundo de causis sympt. liquet; ubi ipsam *πείρα*, hoc est, dementiam appellat: nec minus veniam dabunt ab eorum opinione recedere, qui tum imaginationem, tum cogitandi functionem in melancholia lædi asseruerunt: nam licet dixerimus symptoma esse principum functionum, non tamen cogitandi, nec memorandi functio in melancholica dementia, noxam suscipiunt, prout Galeni verba 2. de causis sympt. liquido ostendunt, dum dixit. Melancholicæ autem dementiæ variæ sunt species, prout in ipsis particulatim dolosæ imaginationes apparent. Patet ex ijs verbis, imaginandi functionem, non cogitandi, nec memorandi læsam esse. hoc idem confirmavit Aetius proprio capite de melancholia, dicens. Melancholica deliria multiformia quidem sunt, ob particulares corruptas imaginationes. & Trallianus cap. 17. lib. 1. asserbat, quod non omnes melancholici eadem symptomata sustinent, neque similiter eisdem imaginationibus agitur. Quod igitur imaginatio tantum melancholicis lædatur, eaque deprauata sit ac veluti errans, ex iam dictis patet, cogitandi functione, ac memorandi manentibus illæsis, cum circa visa decipiantur, & propterea cuiusvis melancholiæ propria indicia sunt, metus, & mœstitia, absque manifesta causa: quemadmodum si propter causam manifestam hæc incipiant, longoque tempore perseuerent, adhuc melancholiam significant, prout Hippocrates, & Galenus decretum reliquerunt aphorismo 13. sexti lib. Metuunt enim, & tristantur omnes, odioque habent homines, ut inquit Paulus, nec si roges eos, quamobrem mœreant, reddere causam possunt: nam sine causa omnes mœsti sunt, ut Galenus inquit, ac frequenter coguntur in lacrimas, & desertas loca potius appetunt, hominumque incipiunt vitare consortia. aliquando rur-

sus

Nunquid ut si.
milaris, uel ut
instrumentalis
pars cerebrum
i ipsa afficiatur.
Cap. 5
Cap. 7

Sec. 7. in fine.

Quomodo di-
stinguatur, si p
essentiam, aut p
consensum ipsi
fuerit affectum.

Quis affectus
præter naturam
sit.

3. de loc. aff. c. 7
2. de caus. sym.
c. 7.

Quæ animalis
functio per ip-
sam offendatur.

Cap. 7.

Lib. 6. cap. 9

Propria melan-
choliæ indicia
quæ.

Cap. 7.
cur melancholici
eis timor, ac me-
mor accidat sem-
per.
cap. ultimo,

loco citato,

Cap. 7.

Ad quem cere-
bri morbum cō-
sequatur.

2. de caus. sym.
cap. 7.
3. de loc. aff. c. 7.
14. meth. cap. 9.
lib. de atra bile,
cap. 3.
Ex qua nigra
bile generetur,
cum duplex sit,

3. de loc. aff. c. 7.

sus suam sententiam redamnantem uitæ solatio delectantur. Theodoro Pri-
sciano teste lib. 2. cap. 5. ad Timotheum. timent insuper cuncti melancholi-
ci, nec aliquo tempore timor eos deserit, licet non cuncti idem sit timoris mo-
dus: quoniam præter naturam eis uisa non semper eodem genere continen-
tur, ut Galeno uisum est 3. de loc. aff. Cæterum, nihil mirum si eis timor, mœ-
rorque accidat, siquidem eorum, quæ extra corpus sunt, nihil uidemus, quod
nos perinde terreat, ac tenebræ. Ergo cum tenebræ rationalis animæ parti
sint circumfuse, necesse est hominem timere, ut qui semper una cum corpore
suo timoris causam circumferat. Quod enim nobis extrinsecus sit, ut inquit
Galenus secundo de causis symp. altissimis tenebris circumdatum nobis aerem
ad tempus aliquod occupantibus, id melancholiæ uitio laborantibus ab inter-
no, & ipso corpore contingit, uel nigra bile cerebrum occupante rationalis
animæ sedem, uel aliqua melancholici halitus exhalatione. qua ratione fit,
ut nonnulli ipsorum mortem, atque alia quædam haudquaquam timenda, ti-
mere uideantur; si quidem alius, ut Gal. 3. de loc. aff. testatur, testam se fa-
ctum putauit. atque iccirco obuiantibus cedebat, ne collederetur. Alter gal-
los cantare audiens, ut hi alarum, sic ille brachiorum plausu latera quatens,
animantium sonum imitatus est. Fuit item alter timens ne Atlas, qui mun-
dum sustinere dicitur, grauatus sub tanto onere, ipsum à se excuteret, atque
ipse cum illo collideretur, ac nos quoque cum ipso periremus. Sunt autem
alia huiusmodi infinita eorum uisa, seu phantasmata, ut propterea Trallianus
dixerit, Nouimus autem eiusmodi humorem etiam alias infinitas peregrinas
& multiplices imaginationes inducere posse. Differunt autē inter se melan-
cholici; nam licet omnes timeant, mœreant, uitam damnent, odio habeant ho-
mines, non tamen omnes mori cupiunt: nam nonnulli mortē pertimescunt
quidam etiam adeo alieno, atque extraneo animo sunt, ut qui simul & mor-
tem metuant, & tamen mortem sibi consciscant: cum præter naturam eis ui-
sa, ut Gal. inquit eodē tertio de loc. aff. non semper eodem genere cōtineantur.
Excitatur autem melancholica dementia, quæuis ea fuerit, ratiocinatricis ani-
mæ sede, hoc est, cerebro intemperato, ac tenebris simili reddito; porro
nigrescit aliquando hic humor supercalefactus, aliquando superfrigefactus.
Actio teste: quæ intemperies rationabiliter frigida, & sicca erit: quoniam
melancholicus succus hanc efficiens, talis est naturæ, quod fit, ut non modò,
quod tenebris simile à melancholico succo reddatur cerebrum, propterea
melancholia gignatur, ut quidam falsò ausi sunt Galeno imponere; uerum
etiam quia frigidum ipsum, & siccum ab eo redditum est, ut patet eodem 2.
de causis symp. Nam quamuis nigra bilis in duplici sit differentia, ut liquet
tertio de loc. aff. 14. meth. lib. de atra bile, & sexcentis alijs in locis; alia nan-
que est ueluti fex sanguinis, quæ admodum spissa est, fæcibus uini haud absimi-
lis: quam nigram bilem, melancholicum succum, seu melancholicum sangui-
nem nominare consuevit Galenus: & hæc non rectè atra biles appellari po-
test. nominibus uerò abutentes aliquando atram bilem uocamus; quoniam si
non prius euacuetur, paulò post atra futura est, Gal. auctore commento apho-
rism. 53. sexti lib. Alia uerò multò est essentię tenuioris quàm prædicta:
uomentibusque eam, & olfacentibus accida uidetur etiam terram radio, attol-
lit, & fermentat, atque ampullas, quales feruentibus iusculis supernatare ui-
demus, excitat: quæ ex præassata flaua bile, seu sanguine, uel prædicto melan-
cholico succo oriri consuevit: & hæc propriè atra bilis nominantur: ex qua
melancholica iam dicta affectio non excitatur: nam hic humor ubi in cere-
bro contineretur ferina deliramenta induceret, ut dicemus, cum de mania per-
tractabimus. Verum ex altera nigra bile, quæ rectius melancholicus succus
nuncupatur, melancholici fiunt, ut patet tertio de loc. aff. & cōmento apho-
rismi

risimi 11. sextilibris; quamuis quidam licet temere ex hac quoque atra bile melancholiam oriri ad Galeni sententiam fateri ausi sint; sed quoniam iam dictus melancholicus succus nonnunquam in toto corpore redundat, uniuerso uidelicet in uenis sanguine melancholico effecto; & propterea ipsum quoque cerebrum leditur. nonnunquam uero reliqui corporis sanguine prorsus innocuo solus is, qui in cerebro contentus est, alteratur, siue in ipsum aliunde deriuetur, aut in ipsum et genitus sit. Interim contentus in uentriculi uasis sanguis crassior, ac melancholicus, sublataque ex eo ad cerebrum euaporatione, melancholica prius dicta symptomata excitat. Propterea earundem specierum, quæ tres sunt ut liquet seiunctim propria indicia cōscribemus, ut earum exacta habita notitia, prōptius, ac rationabilius quicquid eas curare ualeat, præcognoscens quando cerebrum solū ipsum per essentiā afficiatur, seu simul cum toto corpore, uel ab ipso uētriculo coafficiatur. Nā si & uniuersū corpus melancholicus sanguis occupauerit, cerebrum simul cum toto corpore affectū erit. Euenit autem hoc ut patet 2. de art. cur. ad Glauconē: cum iecur ad generandū hanc superfluitatē sit aptum, & rō uictus per tales fuerit adhibita cibos qui crassum, & feculentum humorē procreare natura apti sint: ac ipse splen sit natura imbecillior, ut quicquid de eo generetur, ad se minime trahere potens sit. Quo fit ut eorundem corpora sint macra, nigra, & hirsuta: ac uenas latas habeant, qui ex tota melancholici sunt natura: qui uero ex acquisititia, per sollicitudines, aut uigilias, hæmorrhoidum, aut menstruorum suppressiones, seu prauorum ciborum esus, tales facti sunt: qui autem cibi suapte natura melancholicum sanguinem pariunt, quique potus, 3. de loc. aff. fusissimè à Galeno enumerantur: qua uictus ratione si quis fuerit educatus, maximam quendam licet coniecturam facere, succum melancholicum in totum redundare. Si uero boni succi cibis usus fuerit, reliqua considerare oportet; ut ipsius exercitationes, mœstitiā, uigilias, sollicitudines: & ad efficaciorē noticiā non parum confert anni tempus, præterita, ac præsens aeris constitutio, regio, ac laborantis ætas: & ut certiorē habeas cognitionem, cubiti uenam seca, præcipue mediam, quæ communis est humerali, & axillari: & si fluens sanguis melancholicus uideatur, in uniuersi corporis uenis melancholicum sanguinem contineri iudicabis: ac proinde ea utaris, ut dicemus. At si fluens sanguis non uideatur melancholicus, iudica melancholicum succum non in toto redundare corpore, ac statim eum supprimas, ut iterum paulo post docebimus. Qua de re inquirendum erit, nunquid circa uentriculum prima incœperint symptomata, ipsiusque auctis melancholica sequatur affectio: nam tunc licebit coniecturam facere in ipso uentriculo sanguinem ipsum melancholicum, tamquam in parte quadam inflammata contineri: ex quo facta ad cerebrum euaporatione, eoq; intemperato, atque tenebroso reddito melancholia ipsa excitatur, cerebro ipso per consensum affecto. Hunc affectum hypochondriacum, ac flatuosum, lib. 3. de loc. aff. Galen. nominauit. Testantur autem eum hæc symptomata: nam præter metum, & mœstitiā cruditates, acidique ructus accidunt, æstus in præcordiis, flatus, interdum uentriculi uehementēs dolores: sumptoque cibo, maxime coctū difficili, sputum humidum, idemque multum sequitur: præcordia ei sursum conuelluntur deinde alui deiectione, uomitu, proba concoctione, ructibus eleuatur is, qui ita laborat. At si neque circa uentriculū aliquod apparuerit prædictorū indicium, aut si apparuerit, paruum admodum sit, neque signa affuerint redūdantis in toto corpore sanguini melancholici, propria autem melancholiæ symptomata extiterint, metus uidelicet, & mœstitiā quæ ueluti caractere quodam ipsam designant Gale. 3. de loc. aff. auctore, cerebrū ipsum primario affici, ac tertiam melancholiæ speciem ortam esse, existimandum erit ob melancholicum

Tres melancholice species,

cap. 10.

Signa melancholice ex toto,

Loco citato,

Loco citato.
Signa melancholice hypochondriacæ.

citato loco,

Virus, quæ solo
affecto cerebro
accidit signa.
Melancholiæ
prognostica.
Loco citato.

Modus curandi.

Ratio uictus co-
munis cuiusli-
bet melancholiæ.

Lib. 6. cap. 10.

melancholicum succum in ipso cerebro congestum, siue in ipso genito sit, siue aliunde in ipsum deriuatus. His quippe sic declaratis ad prognosticum deuenientes dicimus, periculosas esse permutationes ipsis melancholicis, cum uel apoplexiam, uel conuulsionem, uel furorem, uel cœcitatem significant, ut Hippo. inquit 56. aphor. lib. sexti. Interim uero, eodem teste, in morbum comitiales permutationes, ut patet 6. de mor. vulg. propterea non negligenda erit eius curatio circa initia, ne diutius, protrahatur, ac in prædictos uergat affectus. circa initia nanque facilis est eius curatio: inueteratus enim & ueluti in naturam conuersus affectus, ut Alexander inquit, incurabilis propemodum euadit: Vtcrius cum ex melancholico succo exciretur, qui si non prius euacuetur, paulopost superaffatus in atram bilem uertitur, ut Gale: uisum est commen. aphor. 53. 6. lib. & maniam, hoc est, furorem efficit: hoc quoque ratione confestim curanda melancholia erit. Cauendi insuper sunt timor atque mœstitia immodici ex externa quauis causa orti: nam si longo tempore perseuerent, melancholiam significabunt, ut liquet apud eundem Hipp. aph. 23. sexti lib. Verum si ipsis melancholicis hæmorrhoides superuenerint, bonum erit; & si uarices, uel hæmorrhoides superuenerint, eiusdem melancholiæ fit solutio, ut idem Hippo. inquit aph. 11: & 21. sexti libri. Frequentant autem in masculis magis, & medijs ætatibus hæc affectiones, difficile uero in fœminis, uel alijs ætatibus, Cælio Aurel. teste cap. 6. libri primi. Vt uero singule iam dictæ melancholiæ species, seu differentiæ, ritè curari ualeant, uictus rationem cunctis communè instituemus; deinceps earum cuiuslibet propriam curationem præcipimus. Sit itaque aer ad calidum, & humidum uergens, non tenebrosus, aut grauiter olens, sed lucidus, ac suaue olens. Interdicenda est uigilia immodica, quinimò somnus consueto paulo longior conciliandus: omni que conatu, ut dormiant melancholici tentandum erit: nam magnopere confert eorum curatione. Debent etiam mediocriter per loca uiridia, & amœna exerceri conuenienti tempore, excretis prius natura, uel arte alui excrementis: quæ dia detineri nullo pacto est permittendum. Prodest insuper coram eis non quæ metum & mœstitiam afferre possunt, loqui; uerum quæ his contraria sunt, gaudia, hilaritates, bonam spem, ac animi constantiam & securitatem, ut egri gaudeant, & latentur, in hocque cantu, aut alijs musicis instrumentis utendum: & ut inquit, Cels. quærenda delectatio ex fabulis, ludisque, quibus maxime capi sanus afflueuerat; laudanda si qua sunt ipsius opera, & ante oculos eius ponenda: leuiterque obiurganda uana tristitia. Eorum cibi sint probe succi, mediocriter humidi, concoctu faciles, ac flatu exortes: attendendaque est in iis, ægri dispositio; cū non omnes ad omnes cibos similiter dispositi sint. Plerumque tamē conueniunt panes clibano cocti probe præparati. Carnes non uirosæ, nec pingues; gallinarum uidelicet, pullorum, caponum, perdicum, phasianorum, & starnarum, præsertim iuuenum, oua gallinarum mollia, piscet petrosi, & moles carne Erinacei uero marini plurimum præstant ad iucunditatem, & utilitatem. Aetio teste Conueniunt iterum hœdinæ carnes. Ex oleribus cōferunt ad communem uictum dulcia cum prædictis carnibus decocta, ut borrago seu buglossum: interim lactuca, intybi, & malue comedendæ sunt, ex Plinii secundi auctoritate lib. 5. cap. 8. Acriora uero loco pharmaci aliquando danda sunt. Præparata quoque potissimū utendum: quæ cū aliquo prædictarū carniū iure paranda erit. Ex fructib. interim uti poterunt uuis, ac malis dulcibus, & uua passa. Vino utantur tenui, albo non ualde ueteri, pro potu, optime diluto, non tamen acernatim eo utantur; & ut summam dicam, uictu humido bonique succi, ita affecti utantur: quo simul cum frequentibus balneis (ubi nō diuturnus factus fuerit affectus) Galenus se curasse 3. de log. affe. testatur. Videntur autem cuncta, quæ melancholicum succum gene-
rare

rare possunt, quorum sylua locupletissima habetur à Galeno eodem tertio li. de loc. affe. nos uerò breuitati indulgentes iure hoc prætermittimus: unum tamen non omitam, quod ualde ab Aetio, & Paulo extollitur, aceti uidelicet sorbitio quàm acerrimi possit omnem cibum, ubi iam dormire uelit æger, idq; modicum esse debet, ut uoluit Paulus; aut cochlearii mensura, ut placuit Aetio, fortè quoniam attenuat, ac melancholicum succum discutiat, uel quòd assumptorum ciborum uapores humidos confestim ad caput deferat somnumq; propterea conciliet, illud probarunt. Qua de re siue iam dictis rationibus promoti, siue alijs fuerint, absolum non erit eorum, cum & tanti viri ipsum approbarint. Prædicta communi victus ratione instituta, decens est singularum curationis proprium modum describere, incipientes ab ea, in qua melancholicus sanguis uniuersum corpus occupauit, ac ipsum cerebrum. In hac principiū curationis a venæ sectione exordiendū erit, viribus ægri, ac alijs consentientibus (iuxta Galeni sententiam 3. de loc. aff. & aliorū græcorum omnium, ac Celsi) præcipueq; media, seu cōmunis appellata incidenda erit, tātūq; sanguinis extrahendum, quātum pro laborātis corporis habitus satis esse conieceris; sin autem vires multā prima vice euacuationem nō tolerāt, necesse est tunc nō modo semel, sed etiā bis, & sæpius quātum licet paulatim auferre, præcepto Tralliani: & si a brachio vacuatio fieri nequit, tentandum est a poplite, vel tali partibus moliri, idq; potissimum in muliebribus corporibus, aut in uiris, quibus menstruæ purgationes, vel hæmorrhoides detentæ fuerint: nam pro prædicti affectus curatio ne sanguinis euacuatio est necessaria. Quare cū cubiti venas non manifestas inueneris, nihil minus iuuabis, si ex prædictis uenis, vel quacunq; alia parte sāguinem detraxeris. Est nāque ut Hipp. li. de alimento afferit, confluxus vnus, conspiratio vna, omnia cōsentientia. Interposito deinde a venæ sectione tempore, vitibusq; relictis per inferna purgare conuenit, Paulo auctore, ac Possidonio. Verum prius concoctioni, ac præparationi redundantis succi vacandum erit: pro quibus syrupi adhibēdi sunt, ut de pomis, de corticibus citri, de succo borraginis, seu buglosi de succo fumarie, aut lupulorum, vel violaceus cum aquis melissophylli, lupulorum, ut buglosi, ut Rec. syrupi de pomis, & violacei, vel de corticibus citri ana vnc. i. de succo fumarie, & violacei, vel de succo lupulorū, & fumarie, & violacei, aut vel de succo lupulorum, & fumarie tantundem, & additis aquæ melissophylli, & buglosi, aut lupulorum vnc. iij. p. uribus vicibus exhibeantur. Per interpositos autem dies alius per clysteres euacuari poterit, parato prius decocto ex folijs maluarum, violarum, betæ, mercurialis, borraginis, fumarie, & lupulorum, farsure, ac pauco sale adiectis, atq; interdum addita, senæ, polypodij, vel epithymi vnc. 5. in eo dissoluas vnc. iij. vel iij. olei violacei communis vel amygdalarum dulciū. mellis rosacei vnc. ii. pulpæ casie fistulæ vnc. i. diacatholicon 3. vi. vel 7. interim loco eius 3. iij. vel iij. diasenæ, vel compositionis hamech. Facta autem humoris coctione, ac præparatione, purgetur corpus hoc purgante medicamento. Quod recipit florum violarum, borraginis, fumarie, & lupulorum ana 3. ii. hordei mundi 3. iij. senæ, epithymi ana 3. ii. & s. myrobalanorum indorum 3. i. & s. vuarum passarum vinaceis detractis vnc. s. pruna numero iij. ex quibus parato decocto, ac per colum transfuso, in eo dissoluas vnc. ii. vel iii. manne Calabrie, vel unc. i. & s. casie fistulæ uel iii. succhari uiolacei, aut syrupi ex pluribus infusionibus uiolarum tantundē diacatholicon 3. vii. seu diasenæ, uel confectionis hamech 3. iij. uel iij. & fiat portio. Quod si nec huic purgationi cedat affectus, iterum parandus humor erit ex prædictorum syruporum aliquo, adita unc. i. syrupi de epithymo, aut parum senæ aquis syruporum decoquere; quibus sæpius (prout uidebitur) assumptis, iterum æger purgari poterit, aut prædicto medicamen-

Loco citato.

Curandi ratio
eius melanco-
licæ, quæ ex toto
genita est.
Venæ sectio.
loco citato.

Paulo post principium.

Paulo loco cita-
to.
Aet. lib. 7. c. 10.
concoctio, & præ-
paratio.

Clysteres.

Purgatio.

Coctio, & præ-
paratio iterum.
Purgatio altero

to purgante, uel ualentiori, si opus fuerit; ut picra, quæ epithimum accipit, uelut Themison iubet, & Aetius eius auctoritate describit. Exhibet autem ipse ex ea cochlearium magnum cū aqua mulsa: & ex modicis interuallis iterū atque iterū dari præcipit. Confert insuper epithymo, ac sena, in aqua lactis maceratis purgare, uel 3. i. è catapociis de lapide lazuli, seu de lapide armenio quem summopere Trallianus extollit, prius præparatū, uidelicet exhibeas: q̄ si ea assumere uoluerit, aut inuitus capiat, cū uino, aut ouis mollissimis excipiat ita ut uitelli mēbrana leuiter aperta in medio illa coniiciantur, præcepto Tralliani, pariter scrup. iiii. pilularum arabicarum exhibens. post quæ sorbeat manna dissoluta in aqua lupulorum, uel borraginis, aut hordei unc. ii. uel tantundem uiolacei sacchari. Conducit et & lactis sero aluum subducere, ut Aetio placuit: quod quidē per cocturā a lacte separetur. Sit aut equinum, aut bubulū ac præparatū eo modo, quo ipse iubet, ex eo non infra 5. heminarū mensurā æger accipiat. Ab omni uerò euacuatione idē Aetius iussit utendū esse maluæ semine leuissimè trito duarū drachmarū pondere, cū aquæ ciathis iiii. Interim uerò, ut agris lætitia paretur, sæpius pauca quantitas infra scripti medicamenti danda erit, ut quæ animi tenebras abigere ualeat, ac uires quodammodo recreare. Recipit autem sacchari è buglossio, & fumaria, & lupulo, & uiolacei ana unc. i. sacchari rosacei unc. ii. syrupi de pumis, & de infusione rosarū, ac de corticibus citri ana unc. i. & s. dianthus. 3. iiii. confectionis diambra 3. 2. uel dia margariton frigidi 3. iiii. cum iiii. uel v. auri foliis conditum paretur. Post purgationem, dulcis aquæ balneis utendum erit; cū non modo aliquam melancholici succi partē discutiant, uerū & totum corpus contemperent, & propterea melancholicis magnopere opitulantur. At eorum caput tepida potius, quàm calida dulci aqua superfundendum erit: luteisq; ouorum abstergere, ut Trallianus præcipit. Quod si maius eorum caput torrentis ritu irrigare, poterit hoc modo parari. R. foliorum maluarum, uiolarum, altheæ, borraginis, & lupulorum, singulorum pug. i. florum chamæmeli manip. 3. s. florum stēchadis iiii. fiat secundum artem decoctum, & utere capite prius abrafo. post quam irrigationem caput oleo amygdalarum dulciū, uiolaceo, chamæmelino, seu anethino ungendum erit. Odoramenta similiter parari possunt: aquæ rosacæ, & florum citrangularum unc. iiii. assumens, in quibus florū nymphææ, uiolarum, melissopssylli, maluarum, & altheæ ana 3. ii. decoquito, parumque aceti adici to, & per nares ex eo uaporem suscipiat æger. At si hæmorrhoidibus, aut mensibus suppressis, malum hoc fuerit concitatum, horum quoque purgationem moliemur, inquit Paulus. Si uerò exprimario cerebri affectu melancholici fiāt, assiduis balneis, uictuq; boni succi, humido, ac flatus experte citra aliud efficacius auxilium curare oportet: cū uidelicet humor, qui molestat, nondum ob temporis longitudinem, ægrè euacuetur, iuxta Pauli, & Aetij sententiam; quā ex Gal. 3. de locis affectis sumpserunt, dum dixit. Interim mouendi sunt mihi amici, qui me curantem uiderunt, frequentibus balneis, uictuq; humido boniq; succi, nullo alio adhibito præsidio huiusmodi me affectum curasse, ubi nondum oblongum temporis tractum nocuus humor multum euacuationi resisteret. Cum enim diuturnus iam factus fuerit, fortiora prædictis oportet adhibere remedia. Verū ipsemet eodem loco asserit, quod ubi solum cerebrum affectum sit, quo ad hanc dispositionem attinet, sanguinis detractio- ne non indiget, quamuis ob aliam quampiam causam, sanguis mitti possit: ut pote si æger (ut Aetius inquit) multo sanguine redundarit, & præseruationis gratia sanguinis detractio- nem faciamus. Quo casu præciperem & ipse uenam secari) quamquam solum cerebrum melancholicum habuerit sanguinem) diuturno etiam existente affectu, qui nec balneis, nec uictu humido curari potuerit, nondum in *μῆλας*, hoc est, furorem uerso. Deinceps præparato,

ac

Medicamenta
post purgatio-
nem sumenda.

Balneæ.

Vnguentæ.

Odoramentum.

Melancholiæ,
quæ solo affe-
cto cerebro ori-
tur, curatio,
cap. 7.

Quando iis ue-
na secanda sit,

ac concocto redundante succo purgans medicamentum exhibendū erit, idq; si opus fuerit, iterandum, ac aliis paulo ante dictis medicamentis utendum erit. At si multo sanguine æger non redundarit, uenę sectione opus non habet: uerum omiſſa ea, ad reliqua quę diximus medicamenta confugiendum erit: quibus omnibus probe, uti poterunt. Pro uiribus autem nitendum erit omni modo, omniq; artificio uti (cum in prædictis, tum in ijs, quibus malum à manifesta quadam, & veluti primaria causa occasionem habuerit, quę tristitiam, metum, aut sollicitudinem quandam efficere potuerit, diu perdurantes, pro diuersa deprauatę imaginationis specie) ut ab eadem reuocentur: aut ratione persuadendo, aut aliud quidam agendo eorum, quę subitam, & affatim mutationem efficere possunt. Plurimi nanque (ut Trallianus asserit) curati sunt quodammodo, vel cum uidissent, audiissentq; ea, quę consequi desiderabant. Ita nanque Philodotus medicus quendam, qui sibi caput amputatum esse putabat, quod tyrānus factus fuisset, curauit, imposito repente capiti ipsius plumbeo pileo, ut grauitatem sentiens, caput se recepisse rursus putaret: quo plurimum gauisus, vana imaginatione liberatus est. Pari ratione idem Trallianus fatetur duas mulieres curatas fuisse; quarum vna imaginans serpentem se deuorasse, citauit ei medicamento vomitum, ac anguem extinctum in vas, quod vomitionem excipiebat, immisit: quem videns mulier, putans se uomitu reiecisse, nimirum gaudens, à vana illa imaginatione liberata fuit. Reliqua vero ex longa viri peregrinatione melancholia correpta est, & iracunde omnibus respondens, eodem modo sanata est: nam eius vir peregre reuerſus, nulli prædicens, sed subito ingressus se ipsum illi ostendit. Præter spem igitur ipsum mulier conspiciens, atque ita amplexa multoq; gaudio affecta, subito omni metu liberata est, ac ad statum naturalem reddijt, ut nulla alia indigeret curatione. Hypochondriaca verò, ac flatuosa melancholia cum ea quę primario affecto cerebro oboritur, communia habet auxilia ventrem subducentia, ut Aetius Rufi auctoritate testatur. Propterea primum bonę coctionis curam habere oportet, postea vero purgare: & velut in hoc conueniunt, ita in venę sectione (mea quidem sententia) sentiendum erit: cum non nisi multo sanguine si redundarit æger, seu præseruationis gratia facienda erit, aut si melancholicus sanguis, qui in ventriculo, seu vasis eius continetur, ex aliquo viscerum, liene videlicet (ut placuit Galeno §. de loc. aff. & sexto eiusdem circa principium) aut iecore ad ipsum fuerit deriuatus; tunc nanque reuulsionis gratia seruans rectitudinem, præseruationis item interna uena vnus, vel alterius brachij secunda erit. Deinceps aliquem prædictorum syruporum pluribus vicibus (prout opus fuerit) exhibere, cum quo adijcere poterimus syrupum è corticibus citri, de infusione rosarum, aut de absinthio. Ut Recip. syrup. de succo fumarie, borra. vel de pomis vnc. i. & s. ex infusione rosarum, corticibus citri, vel absinthio unc. s. aque melisophylli, & lupulorum unc. iij. post quę talis exhibetur purgatio. Pulueris hię simplicis Galeni excipe 3. i. pulueris sene, epithymi ana 3. s. aut diacatholicon 3. vj. vel 7. cum 3. i. casie fistule formetur, bolus; vel loco casie fistule (formantis ex prædictis catapotijs) unc. ii. manę vel iij. syrupi domini Augustini cum aqua lupulorum exhibeantur: huius clasſis medicamentis, vbi vrgeat necessitas; iterum, atque iterum iteratis, utaris, à valentioribus, atque à vehementioribus protinus abstinendo: ne eorum, tum calore immodico, tum à remotis partibus attractione augeatur affectio. Prodest insuper ijs moderate, & paulatim velut etiam cunctis alijs melancholicis, aluum subducere. Verum in hac affectione hypocondriorum quoque sollicitudo habenda erit; præsertim ne flatus in ipsis generetur. Propterea optimum est (Aetio auctore) pulegij decoctum sepe bibere, aut mi-

Purgatio.

Hypocondria-
cę, & flatose
melancholię cu-
ratio.

Venę sectio.

§. de loc. aff. r.
cap. 6.

Syrupi.

Purgatio.

Topica.

Cucurbitulæ.

Cap. ultimo.
Vomitus a ci-
bis.Syrupi nostri
descriptio ad
hypocondria-
cam,

noris centaurij, & ante purgatoria, & post ipsa. Absinthii autem decoctum assidue præbendum erit, uerum postquam purgatus fuerit æger, Aetii, & Pauli decreto; adeo. n. huic medicamento confusus est Aetius ipse, ut ex solius usu nouerit quosdam ab hoc affectu liberatos. Danda insuper eis sunt, quæ urinam mouent, anisum, daucus uidelicet, petroselinum, nardus, fœniculi syluestris semen, & radix: nec prætermittendum est chamæpithyos, & chamædryos decoctum; aut ipsemet herbæ aride trite potioni inspergantur. Exterius autem fouebuntur & ipsa hypocondria ex oleo, in quo decocta fuerint ruta, anethum, absinthium, pulegium, serpillum, agni semen, bacce lauri, aut folia eiusdem tenera: hæc nanque dolores mitigant, & flatus discutiunt. Interdum in stomachi inflationibus, cuminum, & pulegium, vel anisum in aceto coquere oportet, & per spongas stomachum fouere, ex Aetii sententia; vel ex prædictis saccellos parabis, excipiens foliorum, & baccarum lauari, rutæ, absinthij, serpilli, & pulegij ana unc. ii. vel iii. florum chamæmeli, fœni græci, anethi. ana unc. iiii. cumini, anisi, seminis fœniculi ana 3. i. rosarum rubearum manip. i. contundantur, & fiât saccelli: qui irrorati pauco acceto, uel uino albo calidi approximentur, sæpius eos mutando, supra ventriculum. Ceterum præter hæc cataplasma adhibeas, in oleo de quoquens anisum, cuminum, apium, absinthij, & artemisiz folia: quibus demum addatur cyperus, & rosmarinus leuissime triti, admoueasque ipsum diutiusque permittas & ante, & post cibum adhærere: quo ablato, locus contegatur operimento quodam accommodato, ut lana, uel stupa leuissima præillito loco ex nardino. Ad flatum quoque digerendos cucurbitulis uti poteris: nam ueluti incantamentum quoddam, ex flatuoso spiritu dolorem ortum confestim leuant, Gal. teste 12. meth. medendi. Quibus etiam uitium hoc diutius perdurauerit, præsentissimum remedium est ex longioribus interuallis, etiam à cibis vomitus, non tamen fortioribus vomitionis utendum: sunt enim talia nociua, in his ærumnam ventri, ac stomacho addentia, ut Aetius inquit. Utaris autem aceto, aut syrupo acetoso seu oxymelite cum aqua tepida pro vomitu ciendo: prætermittendus quoque erit vomitus ei cuius ventriculus seu stomachus debilis existit. Interim nec melancholicorum caput, etiam si ea hypocondriaca, & flatuosa sit, omnino ommittendum erit, quin ei opituleris cum his, quæ ipsum roborare, ac humectare valeant, irrigationibus uidelicet, inunctionibus, ac odoramentis superius decriptis, quamuis à ventriculo ortum habuerit. Postremo visum est syrupum nostrum, quo in prædicta affectione uti consueuimus, non prætermittere; præsertim cum nonnullos, Deum testor, ex eius usu melancholicos tales curauerimus, potissimum facta prius purgatione quadam. Is autem excipit hyssopi, samplici, serpilli, melystopholi, & betonicæ, singulorum manip. s. borraginis, lupulorum, scolopendrij, fumariz, capillorum veneris ana pugil. s. radicem cichorij, borraginis, fœniculi, & capparorum ana unc. iiii. absinthij, corticum citri ana manip. i. senæ, epithymi ana 3. iiii. pulegij, florum chamæmeli, & minoris centaurij ana 3. ii. chamædryos, chamæpytios ana unc. ii. & si iunci odorati, spicæ, anisi, dauci, seminis fœniculi, asari ana 3. i. passularum uinaceis detractis unc. i. paretur ex his secundum artem decoctum: cuius excipe lib. iiii. adijcito succi pomorum dulcium, & acidorum, succi rosarum, & malorum puniceorum acidorum ana lib. s. succi borraginis, & fumariz, depurati ana lib. i. addito saccharum quantum salis sit, & fiat syrupus: de quo sumat æger unc. iiii. vice qualibet, desuper bibens parum aquæ lupulorum uel borraginis. Poterit insuper, si videbitur, dictus syrupus cum pauco ligni aloes, vel cinamomi odoratus reddi. Detur etiam melancholicis, præsertim hypocondriacis, ex quibusdam interuallis, potissimum hyeme, & inchoante uere 3. i. antidoti theiacæ post purgationes.

περί μανίας.

De furore seu insania. Cap. 8.

Affectus is, qui *μανία* Græce, latine insania, seu furor nuncupatur, non minus sub eius delirij specie continetur, quod quidem sine febre est, quam ipsa melancholia, ut 3. de loc. aff. & 2. de caus. sym. liquet: quinimo tantum inter se cognationem ex affectiones habet ut interim furor pro melancholia, & melancholia pro furore sumatur apud artis medicæ auctores, præsertim Galenum, qui aphorismo 21. 6. lib. per *μανίαν*, hoc est, furorem, de quo Hipp. in aphorismo mentionem fecerat, non vere furorem, seu insaniam, sed melancholiam proprie dictā voluit Hippocratem intellexisse. & idemet 3. de loc. aff. de melancholia verba faciens, dicebat, quod cum ea diuturna facta esset, fortiora exigebat remedia: fiebat autem affecto prius calidis dispositionibus cerebro. Quod quidem de melancholia proprie dicta veritatem habere haudquaquam potest; cum ea ex frigida cerebri intemperie, ac frigidiori succo ortum habeat, ut in præcedenti capite declaratum est. Verum eiusdem verba de furore intelligenda sunt, qui & à mordacibus succis, & interim à calidiori cerebri intemperatura nascitur, eodemmet Gal. teste 2. de caus. symp. Proinde non ab re nil aliud esse insaniam, seu furorem Trallianus cap. 7. tertij lib. dicebat, quam intensiorem melancholiæ ad maiorem feritatem. Intensiorem nanque melancholia est non symptomatum modò verum ipsius cerebri affectus, ac causæ ratione, ut infra patebit: etsi quodammodo secundum omnia hæc assimilares esse videantur. Propter quod nonnulli haud recte auctorum verba, ac sententias Hipp. præsertim, & Gal. intelligentes, in hac re non immerito allucinati sunt, putantes quod perpetuo per *μανίαν* furorem proprie dictum, intelligendum sit, & per *μελαγχολίαν*, melancholiam proprie dictam, iuxta eorum doctrinam, quod quidem falsum esse ostendimus. Nos igitur *ὁρανομιζον* vitantes, cum de mania, seu furore loquimur, de eo proprie dicto, ac à propria melancholia seiuncto intelligemus. Hunc quoque licet Plato in Phædro duplicem dixerit esse, quorum vnū mentis intentione ex corporis causa, vel origine fieri, alterum diuinum, siue immisum, eiusque Apollinem inspirationem esse asseruit, vocatur autem nunc diuination. de primo tamen scripturi modo sumus: qui, ut inquit Cælius Aurel. alienatio mentis est sine febribus. lib. 1. chronicarum passionum cap. 5. siue alienatio tardans in febribus, quo à phreniticis discernitur: Afficiatur autem in hac affectione cerebrum, & ut pars similis existens, velut & ipsa melancholia, ac contentis alijs delirijs, etiam cum febre existentibus, patet tum 3. de loc. aff. tum commento aphor. 53. 6. lib. Laborat autem cerebrum in hoc affectu, modo per consensum, modò primaria affectione, quò iterum cum melancholia conuenit, ac à phrenitide distat: in qua non nisi primaria affectione cerebrum læditur, ut eodem 3. de loc. affec. liquet. Quamquam & ipse furor tum à phrenitide, tum ab alijs in ardentibus febribus ortis distet. Quoniam in his perpetuò febris adest, ipse verò furor omni tempore sine febre reperitur. Præter hæc percipi potest cerebrum in furore læsum esse quoniam principales animæ vires oblæse sunt. Nunquid aut ipsū cerebrū p essentiā, aut per consensū afficiat, ex iā dictis indicijs, & in Methodo, ac cap. de memoria deperdita relatis dignoscere studendum erit. Quòd uerò furor symptoma sit principium facultatū, discere licebit ex 2. de caus. symp. uelut etiā quòd non diminute nec ablata, sed deprauate lædantur. Verum hucusq; Gal. doctrina non reperi, quæ functio princeps in furore oblæsa sit: quanquam Aet. ca. proprio de insania illud fateatur: ait nanque læsam esse insanientibus imaginationē, & rationē seruari autē in ipsis memoriam; uelut coniecture licet ex cætilenis, quas familia

3. de loc. aff. c. 7.
3. de caus. sym.
cap. ultimo.

Cap. 7.

Quibus conueniat, & deliderat furor a melancholia.

Cap. 7.

Quid sit furor Alexandri auctoritate.

Versus finē dialogi.

Ex cælio Aureliano quid sit furor.

Quæ pars in eo afficiatur.
3. de loc. aff. c. citato.

loco citato,

Quis affectus præter naturam sit.

Cap. ult.
Aet. li. 6. c. 8.

- res habent, præsertim si ex feruenti sanguine originem ducat insania. Cum ergo in insania tum imaginatio, tum ratio, seu cogitatio lædatur, hac quoque ratione ab ipsa melancholia discrepat: in qua non nisi imaginatio, vt diximus, oblata est. Quod fit, vt in hac affectione præter deprauatas imaginationes, errent quoque ægri incogitandi functione. Ex quarum functionum læsio
- Eiusdem signa,** nis modo, cum febris non adfit, & ipse furor dignosci poterit. Nam nunc iracundia, nunc hilaritate, nunc mœstitudine, siue vanitate occupat mentem, nunc timore comminante inaniam rerum: horum plurimis accessionis tempore oculi sanguinolenti fiunt, atque attentis: accidunt etiam vigiliæ iuges, venarum extensio, genarum rubor, corporis durities, atque aliena fortitudo, ex Cælij Aureliani testimonio præcitato loco. Præsertim si prius cerebrum ipsum calidis dispositionibus fuerit affectum, aut sollicitudo, mœsticia, ac vigiliæ immodicę præcesserunt, seu horum similia: quibus quoque optime perpen-
- Cap. 7.**
Ad quem cere-
bri affectum cõ-
sequatur. sis, ad quem cerebri affectum furor consequatur, percipere poteris: Nanque nõ nisi ad calidam ipsius intemperiem, vt testis est Gal. eodem 2. de caus. sym. siue sola ea sit, siue ex calidioribus succis orta, vt ipse testatur. Propter quod insuper a melancholia distat, quę a frigidiori cerebri intemperie ortum habet, vt diximus, ac cum phrenitide, alijsque deliriis cum febre ortis communicat. Percipies autem si hæc cerebri calida intemperies præter calidos, ac vitiosos succos redundantes fuerit: quoniam nullum eorum vitiosorum succorum redundantia signum aderit, ac forte quia ex aliqua externa causa cerebrum calfaciente insania orta sit. At si calidiorum, ac vitiosorum humorum occasione cerebrum calfacientium furor genitus sit, ex propriis inditiis illud, percipere poteris. Verum cum hic affectus ex melancholico succo fieri nequeat, ex eo nanque melancholia propria dicta gignetur, Galeno teste 3. de loc. affe. neque ex sanguinis, seu bilis redundantia, nisi prius præassentur, ac in ueræ atræ bilis naturam uertantur, ex qua atra bile mania ipsa excitatur, inuestigandum erit prius, nunquid ex atra bile ex sanguine orta, seu ex flaua bile, aut succo melâcholico, præassatis ipsa generetur. (Nanque pituita nunquam ad tantam deuenire potest assationem, ut ex ea atra bilis fiat, iuxta Gal. doctrinam, quicquid Arabes, & eorum sectatores sentiant) deinceps si ab omnibus, uel quibusdam, quibus indiciis illud percipere poterimus. Quoad primum at-
- Loco citato,** tinet, Aetius cap. de insania facetur eam oriri posse aliquando a multo sanguine non putrefacto ad cerebrum confluente, qui purus sit, & multitudine solû affligat, uelut in ebriis, interdum flaua bile ei admista. Paulus uero cap. 14. lib. tertii furorem excitari asserit, cum flauæ bilis supra modum exustę in atram sit mutatio. At nos Galenum sectantes asserimus interdum maniam ipsam ex feruenti sanguine delato per totum corpus, ac caput præcipue petente excitari pone: quoniam sanguis talis caput occupat, ut patet commento, aphor. 46. 5. lib. Interim uero ex melancholico humore fit, licet ex eo non semper, sed cum supra modum exustus fuerit, aut putrefactus malignam induerit acritudinem, ut liquet apud eundem commento apho. 56. 6. li. Quod aut ex præassata flaua bile furor ipse excitari possit, idem auctor testatur 3. de loc. affe. dum dixit. Quemadmodum alter atræ bilis succus, qui præassata flaua bile nascitur, ferina deliramenta inducit, modo sine febre, innuens maniam, modo cum febre, phrenitim indicans, in cerebri corpore abundans. & demum post pauca dicebat. Atque insuper alia nonnunquam dementia occurrit ferina, & melancholia, flaua bile præassata, quinimo ex hac flaua bile præcipue furor gignitur, ut patet secundo de caus. symp. & comm. aphor. 22. tertii li. Ex iis liquido
- Furoris causa q̃ ex Gal,** constat cuius ex Gal. monumentis quod ex feruenti sanguine, & flaua bile præassata, supraq; modû exusto melâcholico succo, mania ipsa seu furor generari pot. Restat modo ut ad id, quod secundo loco inuestigandû erat, satisfaciamus, ac
- Cap. citato,** distinctua
- 2. de caus. sym.**
Cap. ultimo.

distinctiua indicia cuiusvis redundantis succi conscribamus. Namq; si ex feruenti sanguine originem ducat infania, erit cum immodico risu, uidentibus ægris sepe ob oculos imagunculas quasdam risu dignas, & hilaris est ipsis facies ac assidue canunt. Aliquando enim ex contingentibus euaporationibus sonitus circa aures adsunt, ut putent se tibicines, quosdam audire: & ipsis præsertim memoria seruetur, quauis imaginatio, & ratio oblæse sint; ac similes erunt desipientiæ ipsis quodammodo cum eis, quæ ex ebrietate contingunt, siue ortis ex sola caliditate, siue humore uitioso: cum his quoque indicis totius corporis temperamentum, ætas, ac laborantis habitus, tempus anni, regio, aeris constitutio, ac præcedens uictus ratio considerata erunt, si simul, cum prædictis signis feruentis sanguis redundantiam attestentur. Quod si ex flauæ bilis præassatæ redundantia oriatur ferarum modo redduntur effrenes; ut etiam eos, qui imprudentius ipsis occurrunt, manu uiolenter tractent, ut inquit Paulus: ferina erit dementia, & melancholica, ut Gal. inquit tertio de locis affectis, & quanto magis exulta fuerit, eo magis insanie satis furiosæ erunt, uelut ipsemet commento aphorif. 53. sexti lib. scriptum reliquit, ut iracundi sint egri, temerarij, percussores, & iniuriosi fiant, sicut Aetio uisum est; ita ut eorum quidem iam propriam carnem gustarunt, & domesticos uelut insidiatores tractarunt, occiderunt percusserunt, & vulnerarunt. Temperamentum quoq; eorum, ætas, habitus, & præcedens uictus ratio aeris constitutio, tempus anni, & regio redundantem bilem coindicabunt. Ex ipso autem melancholico succo immodice exusto si fiat, furor, deliramenta cum immodicis metu, ac mœstitia erunt. diutius interdum taciturni fiunt, ac loqui auersantur. Interim cum loqui incipiunt, & si diu locuti fuerint, silere tamen nequeunt. Pariter eorum cum temperamentum, tum ætas, ac habitus ad melancholicum uergunt. tempusque anni, regio, aeris constitutio, ac præcedens uictus ratio, melancholici succi redundantiam commostrabunt. Cum singulis autem prædictis tribus maniae causis præcedere solent ea, ut paulo ante dictum est, quæ cerebrum duntaxat, aut totum corpus simul cum eo, ac redundantes humores ualeant calfacere, ac in tantum exurere, ut possit furor ipse generari. Sunt autem ea, sollicitudines, mœstitiæ, ac uigiliæ immodicæ, præcedens phrenitis, aut alia inflammatio, seu æstuatio, ac quæuis alia ipsius cerebri calida dispositio. Nā plures nisi sunt, ut Gal. uisum est commento apho. 23. 6 lib. furore correpti, qui ab excandescencia, vel ira, vel mœstitia principium habuere, prompte se habente corpore eo tempore ad incidendum in tales affectiones. Si autem uelis delapsuros in hanc affectionem dignoscere, quæ præcedunt, signa attendere oportet. Præcedit namque capitis debilitas, risus præter rationem non assuetis id facere: ex facili occasione irascuntur, aurium sonitus adest; & splendores oculis obuersantur: præceduntque uigiliæ immodicæ, & curæ per uices repetentes, ac peregrinæ; grauitas, item, & uibratio capitis. Progressu uero temporis omnia hæc intenduntur; & appetentiæ ipsis putidiores fiunt, sed ad uenerem prompti sunt, & ideo assidue seminis in somnis effusiones ipsis fiunt, oculi cauantur, simulque intenti, ac fixi consistunt: propter quod doctus medicus his apparentibus, aut quibusdam ex ipsis, poterit eis adhibere, quæ oportet: priusquam ad perfectam desipientiam ægri perueniant. Namque nulla desipientia, ut testatur Gal. commento apho. 53. sexti lib. secuta est: licet minus periculo se sint, quæ cum risu fiunt quoniam ex sola fiunt caliditate sine humore uitioso: periculosissime uero omnium temerariæ. In medio autem amborum sunt, quæ cum studio fiunt ex flaua bile ortum ducentes: quæ cum multum exusta fuerit, ut iam magis ad atræ bilis naturam accedat, insanie ex ea fiunt temerariæ, & satis furiosæ, & propterea omnium sunt periculosissimæ. Ea autem infania, quæ ex superassato atro humore contingit, licet periculosa sit, non

Signa furoris a
feruenti sangui
orni.

Eiusdē si a præ
assata flaua bile
fiat, signa.

cap. 7.

Ex exusto hu
more melancholico
si fiat, signa.

Parati ad furorē
quibus digno
scentur.

Prognostica.

tamen adeo pernicioſa eſt, uelut quæ a flaua bile præaſſata gignitur. Nam tanto pernicioſior eſt hæc attra bilis cenſenda ea, quæ generatur ab exuſto humore atro, quanto nimirum & humor humore efficacior ac ſtrenuior eſt. Gale.

Cap. 3.

Curatio.

Ratio uictus.

Si ex feruenti
ſanguine fiat, cu-
randi ratio.

Generatur autem furor frequentius in iuuenibus, ac mediis ætatibus, difficile in ſenibus, atque difficilius in pueris, uel mulieribus, Cælio Aurel. auctore eodem lib. 1. cap. 5. Hippoc. uero apho. 5. 7. lib. ſcriptum reliquit. A furore difficultas inteſtinorum, uel aqua intercuſ; uel mentis alienatio, bonum: quorum cauſam Gal. tradidit in commento. Pro quorum curatione, aer ad humidum uergat oportet, caliditate temperatus, aut ad frigidum parum uergens: mutare item regiones debent, ut inquit Cælius, nec oportet eos eſſe uel ſolos, uel inter ignotos, uel inter eos, quos aut contemnant, aut negligant. erunt præterea, ut idem Cælius inquit, multorum ingreſſus prohibendi, & maxime ignotorum. Somnus eis procuretur per quacunque uiam, ſiue exterius, ſiue interius adhibitis iis, quæ ipſum promouent. Quorum ſyluam in præcedenti cap. reperiſ. Ante omnia uero, ut ait Paulus, in lecto, uinciendi ſunt, ne uel ſibi, uel alteri noceant; aut geſtandi lectulo penſili intra cubile quoddam inſanientibus dictum. Communia nanque ſunt, ut reſtat Cælius, inſanientibus uehementer exerceri debere, & multa frictione uti. Aluum quoque humidam habere eos oportet: quod ſi non ſponte fiat, clyſteribus ſubducatur lenibus, iam dictis in præcedenti cap. quo loco etiam requiras, quomodo circa animi accidentia ſe habere debeant. Victum autem tenuem exhibere conuenit, Aetii decreto, præſertim circa initia, ſorbilem, liquidum, non multum, uentri commodum, & qui parum ſanguinis generare poteſt. A uino penitus abſtinendum eſt, niſi ex metu inſania orta fuerit: nam in hoc inſaniæ genere ſolo, recte uinum datur, Celſo auctore. Vniuerſa ergo diæta ſtatuatur tenuis, concoctu facilis, uentri commoda, ſtatus exors, habensque uim contemperandi, hoc eſt, humectandi, magis quam inſrigidandi, Propter quod ptifana utendum, intybo, borragine, malua, cucurbita, & interdum lactuca. Procedente tempore, poſtulantibus uiribus, carnibus uti poteris, potiſſimum contuſis gallinarum, pullorum, perdicum, phaſianorum, & caſtratorum; in quarum carnum iure ptifana optime parari poſſet. Pro potu ſumant aquam ordeï, aut decoctum, cum qua permiſceatur ſuccus malorum punicorum dulcium, aut parum acidorum. Quod ſi prædictos potus auerſentur, vires indicent, ac aſſueti fuerint ægri uini potioni, illud quoque non omnino denegandum erit, præſertim ſi ex ſucco melancholico exuſto mania fuerit genita; ſit autem album, tenue, aquoſum, ac ſubattringens, optimeque dilutum, potiſſimum inclinante malo: Admonendi inſuper ſunt, ut ab omnibus edulijs, & potibus bilem gignentibus abſtineant, Aetio teſte. prædicta uero uictus ratio cunctis inſanientibus communis exiſtit, paucis quibuſdam mutatis pro diuerſa cauſæ ratione: propriam autem curationem vnaquæque expoſtulat, licet conſimile melancholicis curationem recipiant, Paulo teſte. Nanque ſi ex feruenti ſanguine furor excitatur, ante omnem aliam curationem ſanguinis miſſio adhibenda eſt, ſecundaque erit cubiti uena media, ſeu externa; aut ſi hæc non appareant, tali uena incidenda erit, præſertim in mulieribus: quod ſi neque hæc appareat, ad eas, quæ in ſummis manibus, ac pedibus, tranſeundum, Aetio auctore: & ſi vires robuſtæ ſint, quantum ſatis eſſe putaueris, ſtatim detrahit, prout Trallia. cum Aetio conuenit. Sin autem vires multam prima uice euacuationem non tolerant, neceſſe eſt non modo ſemel, ſed etiam bis, & ſæpius, quantum licet paulatim auferre. Poſt hæc caput irrigare oportet roſaceo, cum paulo aceto, aut polygoni ſucco, vel oleo anethino, ſeu melino, imbuta uidelicet pecia lanea, ſeu linea oleo ſyncipiti imponat & frequenter renouetur: aut accipe roſarum, violarum, ſolani, foliorum lactucæ ana p. 5. corticū papaueris albi 3. ii. florum

florum chamemeli 3.iiij.florum stœchadis 3.i. & cum prius bullierint in debita aquæ quantitate, additoq; pauco aceto iuxta coronalem commissuram, loco prius abrado, caput irrigato, cuncta vero non frigida actu, sed tepida capiti applicentur. Hoc interim tempore post venę sectionem, omni modo somnus procurandus erit cum his quæ cap. de phrenitide retulimus. Confidit autem Aetius valde pharmaco ex papaueris capitibus cum ptisanæ succo, aut aqua exhibito pondere cochlearis vnus, interdum non vna vice, sed intermissa die vna, rursus exhibendo. Afferit enim quod vel solum hoc medicamentum solet post venę sectionem perfecte liberare ab affectione, vna cum conuenienti diætâ. At si res postulauerit, vena quoque in fronte secanda erit, eodem Aetio teste, præsertim si infractus, impactusq; sanguinis in cerebro fuerit. Orta autem insania ex præssata flaua bile, ad ea, quæ huiusmodi humorem vacant, statim veniendum est Tralliani præcepto, prius tamen eo concocto, ac præparato; tunc namq; purgatio commode tibi succedet. Perficies autem id, si syrupum violaceum, aut rosaceum exhibeas, aut è succo fumarie, intybi, seu borraginis confectum, cum aquis appropriatis præcedenti capite, & cap. de phrenitide prædictis: purgabit siquidem eos, aut aliquo eorum medicamentorum, quæ in curatione melancholiæ approbauimus, vel infra scripto, quod excipit florum violarum, fumarie, lupulorum borraginis, & hordei decorticati, nymphæ, singulorum 3.ii. passularum, vinaceis detractis, & tamarindorum ana vnc.i. ex quibus facto decocto extra hatur cum eo amygdalarum dulcium succus, in quo p. decē, vel duodecim horas macerentur, 3.ii. myrobalanorum citrinarum, & 3.ii. indarum, & facta per colum transfusione, dissoluas in ea mannæ vnc.iii. diacatholicon, aut diasenæ 3.iiij. aut loco mannæ vnc.i. & s. casie fistulæ. Ceterum si tali, vel alio dato medicamento corpus non abunde satis euacuatum esse deprehendas, utpote quia ei non cedat affectus, post aliquot dies præcedente tamē prius corporis preparatione, ac humoris concoctione, rursus aut prædictum medicamentum, uel aliud ex his, quæ in cura melancholiæ diximus, propinandum erit. Et si illud assumere recusarint, aut mollissimis ouis, vt Tralliano placuit, aut aliis cibis, vel ficibus pinguibus, vel palmulis, interdum etiam potionibus excipiant, ut Paulo uisum est. Balneis aquæ dulcis post hæc utendum, inclinante præsertim morbo, aliisq; irrigationibus. & medicamentis topicis prædictis, addendo tamen quæ magis infrigidant, ac humectant. Nec minus somnus in his conciliandus erit, immo magis quam in reliquis maniacis, ac melancholicis: prodest autem eis fœniculi magni syluestris radix, & semen ex aqua quotidie pota post purgationem, præcepto Pauli, & Actii. Ex exusto autem atro humore si furor incidat, non alio modo curandus erit quam melancholia. Propterea si in toto corpore talis succus redundarit, simili curatione utendum erit, quam præcipimus pro curatione melancholiæ cum redundantia sanguinis melancholici in uniuerso corpore. At si furor excitetur ex atra bile prædicta, non tamen in toto redundante, sed in cerebro tantum, similiter curanda erit uelut melancholia excitata ex redundante succo melancholico tantum in cerebro. quanquam perpetuo medicamentis humectantibus, ac infrigidantibus plus, pro duratione furoris, quam melancholiæ uti poteris. Quod si orta fuerit mania ex calida tantum cerebri intemperie, seu extrema causa ipsum calfaciente, præter uenę sectionem, ac purgationem eiusdemmet medicamentis curare oportet caput, ac totum corpus alterantibus. Per consensum uero furor si fuerit genitus, nulla alia peculiari indiget curatione: uerum primogenio affectu curato, & ipse quoque cessabit, Quod si uelis, ne per essentiam fiat, cerebrum præseruare, iam dictis poteris topicis medicamentis recte uti. Attendendæ item species alienationis,

D 4 cuius

Si ex flaua bile præssata generetur curandi ratio.

Ratio curandi furorem, si fiat ex exusto humore melancholico.

cuius accidentia, ut testatur Cælius Aurelianus præcitato loco, contrariorum coniectura erunt mitiganda; ut furiosum hilaritate relaxent, nunciantes quicquam quod animum resoluat: Sic nanque oportet contrarietate quadam alienationis corrigere qualitatem, quo animi quoque habitus sanitatis mediocritatem agnoscat.

περί λυκανθρωπίας

De lupina insania.

Cap. 9.

Aet. lib. 6, c. 11.

Pau. lib. 3, c. 16.

Sedes affecta.

Quis præter naturam affectus sit.

Historia.

Affectiois signa.

Causa.
Curandi ratio.

Malum id, quod à Græcis λυκανθρωπία dicitur, Latine lupina insania, species quedam melancholiæ est, Aetio, & Paulo testibus: qui nanque hoc affectu detinentur in februario mense noctu domo egressi lupos in cunctis imitantur, & donec dies illucescat, circa defunctorum monumēta plerumque vagantur, eaque maximè aperiunt: quo fit, ut promptè quæ pars in eis afficiatur dignosci possit: quoniam cerebrum pariter quis affectus præter naturam sit, quæ ue sit eius causa, quoniam symptoma in genere noxæ functionum principium, præsertim imaginationis, & cogitationis deprauatæ: nam memoria fortasse his oblata non est; velut percepi in quodam qui hoc affectu laborabat, & si hucusque duos viderim tali affectione correptos. Ille nanque cum prius me nouisset, quadam die cum detentus hoc malo esset per iter obuiam mihi factus, ipse vero timens secessi, at ille modicum me aspiciens abiit; erat autem cum eo multitudo quedam hominum, ipse quidem ferebat humeris crus integrum, ac tibiam defuncti cuiusdam: hic demum curatus liber euasit. Qui cum iterum mihi occurreret, nunquid timuissem interrogauit, cum in tali loco, dum insanus erat, eum offendissem: ex quibus constat memoriam in eo non fuisse oblata. Dignoscitur autem hic affectus ex his signis, quoniam facies eorum pallida est, oculi sicci ad videndum imbecilli, & non lachrymantur, ipsorumque oculos cauos videbis: linguam siccam, & saliuam omnino non profundunt: Sitis ipsis adest immodica; & tibias habent exulceratas immedicabiliter propter assiduos casus, & canum morsus, qui frequenti per noctem eius partis offensione accidunt: ex quibus quoque indicijs liquet quæ sit eius causa, quoniam atra bills. Curantur autem hi accessionis tempore venam secando, & sanguinem ferè usque ad animi deliquium euacuando, eosque boni succicibis nutriendo, ac balneis aquæ dulcis, si eis utantur. deinde serum lactis per triduum præbendum erit, & non semel tantum, sed bis, ter ve. Purgabitur autem æger hiera ex colocynthide, ut placuit Paulo, Aetio; aut si videatur aliquod prædictorum medicamentorum in cura melancholiæ præbeto: uelut & post purgationes alia adhibenda sunt eis, antea iam relata in cap. de melancholia, ac præsertim theriaca utendum. Ad vesperam uerò inualecente affectu irrigationibus capiti, ac odoramentis iam dictis somnum inducere tentandū est. Nares item & tempora populeone dicto vnguēdo illinantur: quandoque etiam somnifica medicamenta in potu exhibeantur, Aetij præcepto.

περί κεφαλαλγίας.

De capitis dolore.

Cap.

10.

PRIVS QVAM ad eius affectus, qui à Græcis κεφαλαλγία, à Latinis capitis dolor dicitur, tractationem accedamus, tanquam valde necessarium, ac utile in quauis doloris generatione, tria inuestigare proposuimus, Primum quid sit dolor, Secundum ex quibus, & quot causis gignatur, Reliquum & tertio, in quo præter naturam affectuum genere reponendus sit. Quo ad primum id quod nos dolorem dicimus, varijs nomenclaturis consueuerit à græcis appellari: nam interim ὀδύνη, sæpe ἀλγῆμα, interdum

πόνορ.

πόνος quandoque ἀλγος ab Hippocrates, & Galeno nuncupati assoluer; quan-
 uis aliis etiam nominibus apud quosdā græcos auctores nominari reperies.
 Hunc verò tristis, atque grauis mutationis sensum esse in Galeni doctrina lu-
 ce clarius patet, præsertim duodecimo meth. primo de symp. causis, ac secun-
 do de ratione victus in morbis acutis, At cum diximus sensum, neque omnes
 partes sensiles sint, manifestum est quæ prorsus sunt insensiles, eas non do-
 lituras; quo fit vt sensibilibus duntaxat partibus dolor accidat. Verum cum
 non perpetuò sint dolitura corpora quæ sensibilia sunt, sed multū esse videat-
 ur temporis quo non doleant; relinquatur certo aliquo tempore, quo scili-
 cet excitatur in eis crucians affectus, necesse esse ea dolore: nam citra altera-
 tionem non fit dolor, cum citra eam sensus non fiat: neque in iis, quæ ad per-
 fectionem sunt alterata, vt in hiecticis febribus, dolor adest, Galeno teste libr.
 de inæquali intemperie. Non enim cum mutata particularum temperies iam
 est, siue, vt sic loquar, in ipso mutatum esse, dolent, sed dum mutantur, siue in
 ipsa mutatione, quemadmodum mirus dixit Hippocrates. Verum cum ex al-
 teratione, ac alterationis dignotione sensus fiat, vt liquet septimo de Hippo.
 & Platonis decretis, & primo de elementis, non tamen alteratio ipsa, vt qui-
 dam putant, sensus est, sed ipsa alterationis dignotio: nanque sensus instru-
 menta alterari etiam sine sensu potuissent, vt puta si nervos nō haberent, ac
 per eos alterationis dignotionem. Et propterea non satis est ad voluptatis,
 dolorisque creationem, vt vel leuis, vel grauis, seu aspera in corpore motio ef-
 ficiatur, sed vtriusque his agitationibus earundem dignotio quoque accedat
 necesse est, quæ proprie sensus dicitur. quinimo interdum hæc duntaxat alte-
 rationis dignotio dolor appellatur, vt patet aph. sexto libri secundi, dum di-
 xit, dolorem non sentiunt. Hunc ergo sensum dolorem nos dicimus esse, qui
 penes alterationis dignotionem potissimum attenditur, & non penes altera-
 tionem ipsam: quanuis in eius generatione ea quoque necessaria sit, cum ne-
 que sensus hic sine patiētis corporis immutatione vllō modo esse possit. Im-
 proprie verò interdum appellauit Hippocrates ipsas dispositiones, seu affe-
 ctus, qui cum dolore apti sunt natura fieri, dolores, vt in principio iam di-
 cti aph. 6. libr. 2. liquet, cum inquit. Quicunque dolentes partes aliqua corpo-
 ris; 6. de morb. vulg. quod in cranone antiqui dolores frigidi, non autem ca-
 lidi dicebat. Ceterum nec ex quauis immutatione, seu sensibilibus corporum
 alteratione progigni dolor consuevit: quoniam si leuis, & exigua fuerit cor-
 porum immutatio sensum quidem efficit; qui facultatem, & vim agentis di-
 gnoscat, ac percipit: & proprie naturalis sensus dicitur, non tamen dolorem
 inducit: nam prompte vnumquodque sensorium leuem hanc ex cognatis pati-
 tur mutationem, seu alterationem. Insuper quod nec alteratio ipsa sensum,
 paulatimque facta dolorem afferre animanti possit, primo de caus. sym. & 12.
 meth. a Galen. decretum est. Et propterea non cuiuslibet immutationis sen-
 sus dolor esse dicitur, sed eius, quæ grauis, vehemens, ac tristis est vt diximus,
 tum confertim, tum etiam violenter facta. Huius nanque immutationis sen-
 sus existere nullo modo potest sine patientis corporis immutatione præter-
 naturali, ut eodem 7. de Hippo. & Platonis decr. liquet. Hoc itaque intellige-
 re volumus per tristem, ac grauem mutationem; quæ quidem omnium do-
 lorum communis causa existit, prout Galen. eodem 1. de caus. sym. testatus
 est; illudque tum Platonis auctoritate in Timæo, cum etiam & ipsius Hippo.
 cōfirmavit. Platonis inquam, dum dicebat, quod pathos præter naturam uio-
 lenter, & affatim incidens dolorem excitat, cum uerò ad naturalem habitum
 redit, idque rursus affatim delectationem inducit: at in delectatione, licet af-
 fatim ad naturalem habitum mutatio fiat, non tamen ea uiolenta est: nam si
 uiolenta quoque foret, similiter dolorem excitaret, ut idem Gal. testis est 12.
 meth.

Quid sit dolor,
 12. meth. c. 7
 1. de caus. sym.
 Cap. 6.
 2. de ratio, uict.
 comm. 1.

Cap. 5.

Hip. 2. apho. 47
 7. decr.
 cap. 6
 1. de elem. c. 2.
 Nunquid dolor
 proprie dicatur
 alteratio, uel al-
 terationis digno-
 tio,

Commentario
 1. tex. 7.
 An ex quauis
 immutatione
 dolor fiat,

1. de caus. sym.
 cap. 6.
 12. meth. c. 7.

Cap. 6.

Plato in Timæo
 post medium,

locis citatis.
Hipp. 2. aph. 47

Cap. 7.
Quot, quæ ue-
sint doloris cau-
sæ.

Rationes eorū,
qui solutionem
duntaxat conti-
nuū, causam esse
doloris, ex sen-
tentia Gal. con-
tendunt.

Cap. 1.
Comm. 34.

Opinio nostra
de causis dolo-
ris cum Galen.
2. art. med. c. 80.
2. de loc. affect.
cap. 5.
4. de loc. affect.
cap. 7.
6. de loc. affect. c. 1
12. met. c. 7
2. de rat. uict.
com. 1.
De ineq. intem.
cap. 3.

meth. med. Qua ratione conciliantur eius dicta prædicto loco cum his, quæ afferuerit 1. de causa symp. de doloris, ac delectationis generatione, Hippocraticis uero auctoritate, qui fatetur, quod ab his, quæ naturam mutant, ac corrumpunt, dolores excitantur, hac quidem uoce corrumpunt & celeritatem, & uehementiam transmutationis indicant, quemadmodum Galenus ipse exponit. Quod uero dolor præcipue in sensu consistat mutationis tristis, hoc est, affatim, & uiolenter factæ, & non in ipsa mutatione, palam ostendunt medicamenta, quæ à medicis excogitata sunt pro eiusdem curatione, quando intendimus contra ipsum, uelut symptoma pugnare, & non eius causam adimere: sunt namque ea torporem inferentia, ac sensum auferentia à Græcis *ἀνόδυνα* quasi indolorosa dicta. nam si causam eius auferendo, ipsum curabis, ita utique, ut Galenus inquit 12. meth. contra symptoma non pugnabis. His quippe sic declaratis, reliquum est, ut ad id, quod secundo loco proposuimus, accedamus: uidelicet quot, quæue sint tristis huius, seu grauis mutationis, ac demum doloris causæ, declarare, cum iam ostensum sit unam esse communissimam, ac immediatam omnium dolorum causam, immutationem uidelicet conferti in, ac uiolenter factam corporibus sensibilibus. Hæc uero immutatio fit, ut quidam Galeno ascribunt, à duabus causis, solutione uidelicet continuitatis, aut alienatione aliqua: quidam alii afferunt unam tantum meminisse causam ipsum Galenum; continuitatis uidelicet diuisionem. Siqui uero sunt, qui uelint eum alterationem aliquam duntaxat dolorem excitare, hi uelut apertum mendacium asserentes, ac Galeno, id quod nullibi somniauerit, attribuentes, seponendi sunt, nulla alia confutatione egentes, sed tanquam mendaces condemnandi: quanuis Auerrois tercio colligeret, illud sentiat, ac nonnullis rationibus idem tueri conetur aduersus Galenum, & Auicennam cap. 3. 1. at illi, qui continuitatis solutionem duntaxat doloris causam esse ex Galeni sententia contendunt, illud tueri conantur ex eiusdem Galeni verbis quarto de simplicium medicamentorum facultatibus. Quo loco frigidum, ac calidum propterea mordacitatem inducere assererat, quoniam unum diuellendo, reliquum uero erodendo continuitatem soluebat, ac continuum corpus distrahebat; qua de re nec frigidum, nec calidum præter continuitatis solutionem, auctor doloris erit, ut isti asserunt. Confirmant illud eiusdem Galeni auctoritate tercio de fractur. quo loco uolens non prorsus a probabilitate esse alienum, omnes morbos appellare, ulcera, quemadmodum Hipp. ibidem assererat, repentinam dicebat quoque mutationem in intemperatura solutionem ipsam continui efficere. Non erit ergo intemperies aliqua (ut isti uolunt) doloris causa ad Galeni sententiam, nisi & continuum soluat: & proinde concludunt cum eo unam tantum esse doloris causam, solutionem uidelicet continui. Verumtamen nos, qui Galenum ubique locorum inspeximus quæ euidencia sunt sectari tanquam uerum, ac summum medicum, cum eo asserimus non unam duntaxat, sed duas esse primas omnium, dolorum causas. Quemadmodum & ipse sexcentis in locis lucidissime confessus est, præsertim lib. secundo art. medicin. 2. 4. & 6. de loco affect. 1. 1. met. & secundo de ratione uitus in morbis acutis, ac lib. de inæquali intemperie. Immodica namque intemperies, quæ inæqualis sit, confertim sensibiles partes alterans, seu immutans, & uiolenter easdem partes dolore, afficit afficere ualet circa unitatis dissolutionem: quemadmodum ipsis nullo modo præter naturam immutatis, ac a naturali statu delapsis omnino dolorem non sentimus, tanquam propria temperie fruuntibus eisdem partibus; & eodem modo si & ipse sensim alterentur aut equaliter alteratæ sint, indolorosæ permanent. Si igitur propriam temperiem sensibiles partes possidentes, aut leuiter, seu æqualiter alteratæ indolorosæ, sunt consonum erit easdem præter naturaliter, inæqualiter, ac uiolenter

ter intemperatas redditas, dolorem sentire: quod confirmavit Gal. 1. de caus. symp. cum de dolore loquens dixit. Porro uehementes eueniunt in tactu a naturali habitu transmutationes ob violentum calidi, frigidique occursum. Similiter libro de inæquali intemperie de calida fluxione in musculis loquens, dicebat arterias, & venas ipsorum præter cæteras partes eorum, vario dolore affici; cum interius a fluxione tum excalfiunt, tum extenduntur, ac diuelluntur: exterius non modo excalfiunt, sed etiam premuntur, ac degrauantur: reliquæ particulæ aliæ comprimendo solum, vel incalescendo, aliæ utroque genere laborant. Quid clarius quod Galenus in his verbis asserit quasdam muscoli partes, quod incalescunt duntaxat, dolorem sentire? quasdam vero quod distendantur, seu diuellatur; nonnullæ, propterea quod utroque modo afficiantur, doleant: amplius secundo de loc. aff. dicebat. Verum in erysipelate, & inflammatione, atque in totum in affectibus inflammatorij non solum, quia intentæ sunt partes, laborant, seu dolent, verum etiam quia intemperantia affectæ sunt: ac ne hac quidem exiguum ad dolorem inducendum vim habente, & sexto de locis affectis de coli dolore verba faciens dicebat, frigidum, crassum, aut viscosum humorem, seu flatuosum spiritum in corpore crasso, densoque genitum, sed egridi nequeuntem, dolorem excitari: uehementem quidem geminam ob causam, intemperantiam uidelicet, & corporum, quibus continetur, tensionem. His quippe locis cuius patere poterit Galenum intemperantiam, eamque inæqualem confertim, ac uiolenter factam, præter continui solutionem dolorem excitare, absque dubio uoluisse, & solutionem continui citra intemperantiam, ac ambas simul. Reliquum est eorum opinionem, qui cum Galeno putant solutionem duntaxat continui doloris causam esse, eorundem rationes soluentes diluamus. Ad primam eorum rationem, quam afferunt auctoritate utentes Galeni quarto de simpl. med. facult. dicimus primò, quod quamuis ibidem Galenus doceat modum, quo calidum, & frigidum media solutionem continui mordacitatem efficiant, nequaquam tamen negauit posse dolorem eadem excitare confertim, ac uiolenter sensibiles partes alterando, prout sæpius in eius doctrina compertum est. Qua de re licet unum docuit; non propterea alterum, quod in plerisque locis scriptum reliquerat, negasse uidetur, ut cuilibet patere poterit eius dicta sanè intelligenti. Ad hæc non quodlibet calidum, aut frigidum media solutione continui mordacitatem inducit, ut eodem loco patet: sed illud tantum, quod immoderatus actum est, calidum uidelicet adeo auctum, ut nostram, substantiam diuidat, distrahat, atque secet; frigidum uerò quod supra quàm quod contrahat, ac condensat, etiam diuellendo partes mordicatione infestet, ac continuum soluat. Qua de re quis negabit, quod quamuis uehemens, repentina, ac violenta alteratio esse debeat, ut dolorem excitet, quod priusquam ad tantam deueniret immoderantiam, quam exigit continui solutio ex ea orta, ualeat confertim duntaxat, semel totas sensibiles partes alterans, citra continui diuisionem dolorem efficere? datur inquam immoderato immoderatus; ut proinde fiat, quod ex inæquali intemperie, calida potissimum, uel frigida immoderata non extreme tamen, dolor excitetur, præter continui solutionem dolentis partis. Immoderatus autem aucta, de qua Gal. quarto de simul. med. fac. loquutus est, dolorem gignit interueniente continui solutione: cum immodici calor, ac frigoris hic terminis statui potest, ut libr. de inæquali intemperie patet. quò fit, ut unus minor, alter uerò maior dolor existat. Ad secundam eorum rationem, pro qua Galenum pro teste inducebat libro tertio de fracturis, facilis est responsio: nam querens ibi Galenus tanquam probabile, ac uerisimile Hippocratis dictum seruare, qui assererat posse quempiam omnes morbos ulcera appellare, licet non tanquam

Cap. 6.

cap. 3.

Cap. 5.

Cap. 1.

Solutio rationis
opinionis con-
trarie.
Cap. 1.
Responsio ad
primum ratio-
nem.

Loco citato,
Cap. 6.
Ad secundam rō-
nem eorū respō-
sio.
Com. 34.

quam verum, quanquam non prorsus à probabilitate alienum, ut ipse asserit pro sustinenda hac probabiliter subiunxit, omnem intemperaturam aliquam omnino continui dissolutionem, si non sensui euentem, ratione tamen contemplabilem, efficere; allegans se in præallegato loco 4. de simp. med. facul. demonstrasse repentinam item mutationem in intemperatura solutionem quoque continui efficere: tanquam probabile. ergo ac veresimile illud affirmat, non tamen omniquaque verum; & cum dicit repentinam mutationem in temperatura solutionem continui efficere: concedimus nos modo, quo supradiximus: dum verò subdit, eam omnino continui solutionem, si non sensui euentem, ratione certè contemplabilem progignere, asserimus nos illud fateri, non quòd re uera sit, sed ut à calumnijs Hippocratis dicta liberet: propterea ait illud posse ratione contemplari tanquam probabile, & non penitus absurdum. Nanque in hoc ea, quæ sensui euentia sunt, præter eius morem, ut liquet, transgreditur. & ut cunctis pateat me non infomnia, sed uera fateri Gal. ipsum legat libr. de inæquali intemperie, dum huius Hippocratis dicti etiam meminit: ait nanque, Quippe vlcus unitatis est diuisio, immodicus verò calor, ac frigus proximè accedunt, ut unitatem soluant: & non dixit, quòd re uera soluant unitatem: licet ea quoque euidens sensui non sit, uelut fatetur prædicto libr. de fracturis. quanuis etiam de immodica loquatur in temperatura, & non de omni; cum de his quæ immodicæ ualde non sunt, fortè nec illud ueritatem habeat, quòd proximè accedant, ut unitatē soluant. Quare licet proximè accedant, ut continuitatem soluant immodicæ intemperantiæ, potissimum calidæ, uel frigide, iuxta Galeni sententiam dolorem tamen efficere possunt citra continui solutionem: quanuis probabiliter loquendo à ueritate prorsus alienum nō sit, cum proximè accedant, ut continuum soluant, eas asserere continui dissolutionem efficere: quemadmodum philosophi mobile quoddam quiescere asserunt, etiam si non uerè quiescat, sed quieti proximum sit, ac eundem motum, qui quieti proximus est, quietem appellare consuerunt, licet improprie. Ex quibus liquidò constat in Galeni doctrina non modo continui solutionem (ut quibusdam visum est) dolorem excitare, uerū etiam ipsam intemperiem inæqualem, ac interdum ambo concurrere pro doloris generatione: & propterea rei euentiam consecutus in omnibus ferè locis tum præallegatis, tum alijs sexcentis illud testatus est. Hanc etiam sententiam cōfirmavit 2. lib. de compos. medic. secundum loc. dum dixit. Vehementissimi igitur capitis dolores fiunt iuxta caliditatem, & frigiditatem, maximè cum inæquales existant. Moderati verò iuxta siccitatem: at ad humiditates nullus consequitur dolor. Non enim propterea duntaxat, quòd efficacissimæ qualitates sint caliditas, & frigiditas, ea de re cum inæquales sint, uehementissimos excitant dolores similiarum partium affectiones proritantes simplices ac inæquales, uerum etiam, quòd cum immodicæ ualde fuerint, faciunt etiam quodammodo continui solutionem, ut ab eodem Galeno decretum est. Excitant igitur dolores uehementissimos, & quia intemperatas inæqualiter reddunt partes sensibiles, & quoniam erodendo, eu diuellendo continuitatem earum soluunt, cum immodicæ ualde fuerint, ut diximus. Siccitas uerò moderatos infert dolores, quoniam nec efficacissima qualitas est, uelut prædictè: & propterea suo occurso non ualeat adeo uiolenter corpus contingere, ut media intemperie dolorem proritet, sed tantum media solutione unitatis, tendendo uidelicet partes, quæ continuæ sunt; & si neque tensionem ualde repentinam, & uiolenter moliatur. At humiditas nec uno, nec alio modo dolorem inferre potest ex ipsa, cum nec mutationem repentinam, ac uiolentam partis alicuius ut similiaris efficere ualeat, neque continuatē soluere possit, uelut siccitas ipsa, aut alio modo, contundendo scilicet, secando

aut

aut erodendo. Namque ex hisce causis solui continuitas consuevit, ut patet tum 5. tum 12. method. meden. & 2. de causis sympt. quo loco etiam decretum reliquit, humidum, & siccum nisi calori, aut frigori coniungantur, citra uolentiam corpus contingere: quia nec affatim, nec uolenter ipsum immutare possunt, inefficaciores cum sint qualitates. Hanc diuersam exuariis qualitatibus doloris generationem cum Galeno fatentur Aetius capi. de dolore capitis, Trallianus cap. 10. lib. 1. & Paulus cap. 4. lib. 3. Ad tertium autem deuenientes dicimus cum Galeno 1. de causis sympt. quod delectatio, & dolor omnibus sensibus contingunt, non tamen pari euidencia, sed in oculis minus euidenter, quam in cæteris: in tactu autem, & gustu maxime luculenter, ab his deinceps in odoratu, & post hunc in auditu. At relicta delectatione, quæ nihil aliud est nisi reditus ad naturam, simul, & celeriter factus hic nanque est, qui uoluptatem affert, dicimus, ex maximis splendoribus uisum ipsum propter nimiam secretionem non modo laborare, sed etiam corrumpi quandoque. afficitur quoque gustus instrumentum dolore ab acutis, amaris, acerbis, ac actibus succis. Contristant uero olfactum qui ex iam dictis succis exhalant halitus. Auditum autem infestat uox aspera, & maxima, & celerrima. Verum tactu accedunt magnæ mutationes naturæ à frigidi, calidique uolento tactu. præterea ab his, quæ contundendi, uel secandi, uel distendendi, uel exedendi uim habent. Quapropter cum quærimus nos quis affectus præter naturam sit dolor, non de omni dolore loquimur, qui singulis sensibus contingit, sed de eo, qui omnium euidentior est: hic uero erit qui sensui tactus accidit ex una, aut pluribus prædictarum causarum ortus, molestus quidam sensus existens, ut uolebat Plato, compositus ex uolento simul, & quod confertim sit pathemate sensitiuis corporibus accedente: nihil autem refert dicere vel molestum, vel dolorosum, vel dolorificum, vel laboriosum sensum: quemadmodum neque ipsum pathos, si tristitiam, vel molestiam; vel dolorem, vel laborem, dolentiam uel appellaueris. Nam Plato, ut Galenus refert, pro eadem re in Timæo, & in Philebo dictis nominibus omnibus promiscue usus fuit, ac in aliis libris: similiter & Hippocrates tum de nominibus, tum de rebus prædictis in eadem fuit sententia. quanquā & hoc etiam pathos in aliis quoque sensibus deprehendi possit, ut prius diximus, in hoc uero uidelicet tactu euidentius est. Verum cum tactus in dolore afficiatur ex præternaturali quadam patientis corporis immutatione, is nec morbus, nec causa morbi erit, sed symptoma. Offensa nanque est ipsius tactus actio ex his, quæ ipsum contristant: uerum non a deo offensa est, ut ea penitus ablata sit. nam sentit utique non naturaliter tamen, sed cum tristitia. neque adeo imbecilla, ac difficilis est tactus actio, uelut in torpore, seu stupore est uidere. Relinquitur ergo, quod cum non ablata, nec imbecilla, seu difficilis sit sensus tactus actio in dolore, quod necessario ea deprauata sit propter uiolenta, uehementia, ac repentinam immutationem eius instrumento occurrente m: & propterea molestum, ac malum hunc sensum, seu laboriosum, qui ex prædicta immutatione perficitur, sensitiuis corporibus accedere necessarium est, iam dictam immutationem sentientibus: omnem nanque prauam, seu malam sensationem bifariam dici à Galeno lib. de diff. sympt. patet nam uel idem quod debilitat, uel idem quod deprauate significat. At cum in dolore non debilitat tactus sentiat reliquum est, ut tum mala sit eius sensio, quod ea deprauata sit: Habet enim tactus ipse insigne hoc symptoma, & proprium præter reliquos sensus nempe dolorem; ut eodem lib. de diff. sympt. liquet. His quippe sic declaratis reuersi iterum ad id, à quo nostra oratio diuerticulum sumpsit, de capitis uidelicet dolore dicimus, quod licet de eo uariæ reperiantur apud medicorum vulgus, differentiæ, apud græcos tamen omnes

8. met. cap. 1.
12. met. c. 7
1. de caus. sym.
cap. 6
Aet. li. 6. c. 40
Quis affectus
præter naturam
sit dolor.
1. de caus. symp.
loco citato.

Gale. 1. de caus.
symp. cap. 6.
Pla. in Timæo.
post medium.

Cap. 3.

loco citato.

De capitis dolore sermo iterum.

Quæ sunt eius
species, seu dif-
ferentiæ.

2. med. cap. 2.

4. de loc. aff. c. 9.

Cephalagia
quid sit.

Cap. 9.
Quid per caput
intelligendum
sit.

Quæ pars affi-
ciatur.

cap. 1.
Nunquid intra
caluariam, uel
extra caput af-
fectum sit.

Cap. 9.

2. de cõp. med.

cap. 1.

Lib. de mult.

cap. 1.

3. de loc. aff. c. 9.

Universales cau-
sæ doloris.

capitis.

Particulares
causæ eiusdem.
Cap. 1.

omnes quos vidi, præsertim Galenum, tres duntaxat de dolore capitis specie, seu differentias reperi: quarum una a græcis κεφαλαλγία, a latinis non aliter quàm capitis dolor nuncupatur, nomen siquidem sumens simul ab affectu, & parte affecta, teste Galeno 2. method. Altera ημικρανία. Reliqua, & tertia κεφαλαία dicitur, ut patet 3. de loc. affe. De his igitur tribus differentiis nos separatim verba faciemus ab ipsa cephalalgia exordientis: quæ nihil aliud est, quàm recens laboriosus sensus totius capitis, propter grauem eius mutationem, seu tristem. Adhibitum autem est illud verbum recens, ut differat a cephalæa, quæ, ut dicemus, capitis dolor diuturnus est, difficulterque solubilis, teste Gal. eodem 3. de loc. affec. totius autem dictum est, quo ab hemikrania discrepet. At cum diximus capitis, eam nunc significamus partem, quæ capillo tegitur: hoc inquam intellexit Celsus sub nomine capitis, libr. 4. capitu. 2. illud quoque per iam dictam descriptionem constat, quæ afficitur in hac affectione, partem, caput esse; quod coniectare licet ex ipso dolore cum positu. At quoniam interdum extra caluariam affectio est, aliquando intra, & quandoque quidem omnino exteriorum, aut interiorum, interim non omnium, sed unius tantum corporum generis, arteriarum videlicet, aut uenarum, aut neruorum, aut membranarum, aut cutis, vel ipsius denique cerebri; propterea difficillimum est, Gal. auctore 2. de compositione medicamentorum secundum locos, affectum locum dignoscere, siue unus, siue plures uno existant; aut qui tandem hi ipsi extent. Illud tamen non ignorandum erit, nunquid intra caluariam affectio sit, vel extra. Dignoscet vero ex ipso dolore, si usque ad oculorum fundamenta, seu radices extendatur nec ne: nam si non extendatur illuc usque dolor, extra caluariam erit affectio, ut Gal. 3. de loc. aff. visum est. Si vero ad oculorum fundamenta is extendatur, intra caluariam erit dispositio. nam ab ipso cerebro, & ab utraque membrana, atque a uasis, quæ in ipsis continentur ueluti germina quædam ad oculos deducuntur, ut facile possit propterea usque ad eos dolor extendi; etiam si ipsummer cerebrum in eius propria substantia affectum sit: nam id quoque grauem, ac tristem immutationem sentit: & propterea dolore afficitur, ut testis est Galenus eodem secundo de compositione medic. secundum locos, libr. de multitudine, & 3. de loc. aff. Excitatur autem hic dolor, uelut & reliqui omnes, ut diximus, aut ab inæquali intemperie confertim facta calida potissimum, seu frigida, aut a continuitatis solutione, seu ab utrisque. Verum non satis erit, hoc scire, sed si uelimus cuilibet capitis dolori auxilia rationabiliter adhibere & non indiscriminatim, & citra distinctionem, opus est, cunctas affectiones, ex quibus capitis dolor excitari consuevit, prænoscere. Neque enim omnes ob unam affectionem caput dolent, sed tum ipsæ affectiones plures sunt, tum curatio ipsarum singularum propria existit, ex Galeni sententia, eodem 2. de compositione ne med. secundum locos. Una etenim effectio est, ut ibidem ipse asserit iuxta intemperiem simplicem citra humorum complexum. Alia secundum humorum qualitatem, quædam iuxta multitudinem duntaxat ipsorum humorum contingit: quibus etiam accedit ea, quæ fit, cum humores transitus liquorum, ac uaporum obturarunt. Et ad hæc alia est cum ob imbecillitatem in quibusdam capitis partibus flatu scilicet spiritus innascitur: quandoque etiam ob aliquam externam causam προκαταρκτην græci appellant, capitis dolor contingit, uelut est externus ardor, frigiditas, ebrietas, plaga, & alia huiusmodi. Et hisce ergo sex diuersis causis, ut Galeno uisum est, capitis dolores excitari possunt: ex quibus ipsum propter imbecillitatem suam facillime affici consuevit: interim ob sensus exuperantiam, si u totius corporis plenitudinem: quamuis diffusi, & ueluti efferuescentes humores interdum ac uapores à magnis febribus ad caput ascendant, & capitis dolorem efficiant, ut dicemus. Proinde

de docebimus nos quo pacto singulæ ex propriis earum indiciis dignosci ualeant, ut demum eis cognitis, ratione, ac methodo curari possint, initium fumentes ab eo, qui ex simplici duntaxat intemperie citra humorum complexum ortum habet: quamuis nec illud inuenire promptum sit, sed & exercitato homine indigeat, qui tum per rationis exercitium, tum per multam, & assiduam affectionis ægrorum inspectionem eam cognoscat. Nanque proprietates aliquæ quidem omnino dici non possunt; quædam uero egre circa ægrotantium corpora ostendi ualent, ut pote quæ tantum iis, qui eas sæpe uiderunt, cognitæ sint: & propterea quod coniecturale artis est, id maxime in affectionum cognitione consistit, ut patet eodem 2. lib. de comp. medic. secundum locos. Si autem simplici intemperie capitis, dolor proritetur calida vel frigida, dolor ipse uehementissimus erit, ut dictum est: nanque ex his duntaxat qualitatibus uehementissimi fiunt capitis dolores. Verum si calida fuerit intemperies, præter uehementissimum dolorem, capitis aderit calor, quamprimum ei manum admoueris, ac oculorum rubor: frigidis asperginibus oblectantur ægri, ex quibus maximum precipiunt adiuuementum; præcessitque aliqua extranea calfaciens causa. At si ex frigida excitetur intemperie, licet uehementissimus dolor quoque sit, tamen caput tactu calidum non deprehenditur, neque facies & oculi rubescunt, nec arida, & collapsa apparet, sed è contrario plena, & pallida, Tralliano teste eodem cap. 10. primi libri; præcessitque externa quædam infrigidans causa, & frigidis neque iuuantur ægri, neque gaudent, ut Galeno uisum est. Quod si ex siccitate ortum habuerint, moderati erunt capitis dolores, aridior deprehendetur capitis cutis citra alia indicia, quæ de calida intemperie diximus: aliquaque præcessit exiccans causa, & à siccis medicamentis non modo non iuuantur ægri, sed noxam suscipiunt. Ad humidam uero intemperiem, quod nullus consequatur dolor, iam ostendimus. Quod si non ex simplici tantum intemperie capitis dolor excitetur, sed cum humorum complexu, si biliosus is fuerit, dolor præter uehementiam mordax quoque erit: similiter cum totius capitis calore immodico, ac faciei pallore. Interim etiam os amarescit, quemadmodum Paulus testatur eodem cap. quarto lib. tertii, instructus à Galeno secundo de compositione medicamentorum secundum locos, & quæ præcessit uictus ratio flauam bilem coaceruauit, pariter temperatura calidior, ætas uigens, immodicæque sollicitudines præcesserunt. At si pituita redundante is fiat, præter iam dicta frigida intemperiei signa, tum uictus ratio præcedens tum reliqua concurrentia firmabunt; cuncta nanque pituitam ipsam coaceruarunt. Nec minus si ab atra bile ortum ducat, cuncta aderunt indicia redundantis atræ bilis; quæ requiras cap. de melancholia. At si ex plenitudine quatuor humorum ex æquo, seu ex sanguine dolor capitis proritetur, aderit grauitatis sensus, aut tensionis: faciei color rubeus, temperamentum, ætas, uictus ratio, & reliqua concomitantia sanguinis incrementum, seu humorum omnium ex æquo indicabunt. Quod si eadem humorum multitudo cum obstructione quapiam seu obturatione caput dolore infestat, si quidem ea moderata fuerit cum grauitate prædicta, moderatus erit dolor; sin fortis, fortiter dolebunt, & si mordacem qualitatem humorum multitudo completatur, etiam iuxta hanc dolorem augebit, prout Galenus testatur præcitato lib. 2. de comp. medic. secundum locos. Verum si cum grauitate, aut tensione pulsus quoque aderit, inflammationem indicabit. Quemadmodum si tensio aderit sine grauitate, ac pulsus, spiritus flatuosi multitudinem ostendit, ut liquet 1. de arte curatiua ad Glauconem ederitque aurium sonitus; & quæ præcessit uictus ratio corporis natura, ac reliqua, ad spiritum flatuosum generandum fuerunt idonea. Qui demum ob causam quampiam externam proritantur capi-

Loco citato.
Signa doloris
capitis ex cali-
da in temperie
geniti.
Ex frigida in
temperie,

Ex sicca intem-
perie,

Si ex bilioso
succo,

loco citato,

Ex pituita,

Ex nigra bile,
Ex plethora,

ex multitudine
mordacium hu-
morum.

Cap. 1.

Ex inflamma-
tione.

Ex flatuoso spi-
ritu.

Cap. 15.

Ex externis
causis,

3. de loc. affect.
cap. 9
Doloris capitis
prognostica.

3. prognosti.
tex. 11.

3. progn. tex. 11
Cap. 15

Loco citato,
cap. 1.

Cap. 22.

Cura doloris
capitis ex siccita-
te.

Cap. 6.

tis dolores, ut externo ardore, frigiditate, ebrietate, plaga, odoratis item calidis, ac reliquis huiusmodi, promptè ex ægri, seu astantium relatione percipi possunt. Quare ut diu in his dignoscendis immoremur non oportet: quæ admodum si ob sensus exuperantiam dolor capitis infestet, uelut in ore stomachi accidit quibusdam, qui ipsum exactè sensilem habent, facillimè à quauis causa in eum incidere parati sunt, præsertim ab ipsis odoratis. adeò ut nonnulli ne thuris quidem odorem ferre possint, Galeno auctore 3. de loc. affect. At tempus est doloris capitis prognostica enunciare: cuius primum ab Hipp. aph. 70 lib. 4. scriptum est, dum dixit. Quibus febricitantibus urinae sunt perturbatae, quales sunt iumentorum, ijs dolor capitis vel adest, vel aderit. Quoniam, ut inquit Galenus in comento, spiritus flatuosus una cum calore promte fertur ad caput. Secundum prognosticum eiusdem Hipp. aph. 516. lib. scriptum est, cum inquit. Quicumque sani dolore capitis repentinè capiuntur, & statim muti fiunt, & stertunt, in septem diebus pereunt, nisi febris apprehenderit. Nam cum sanis (ut Galenus asserit eodem comento) dolor in capite repentinè aduenerit, causam referre oportet non modò ad spiritum flatuosum, sed etiam ad materiae uniuersim fluentis multitudinem: quam ad cerebrum fuisse delatam indicant symptomata, quæ post dolorem superuenerunt ab Hippocrate in apho. annotata: per quæ etiam symptomata, quòd sit quædam materia pituitosa, commostratur: atque iccirco febris superueniens dispositionem soluit. Aphor. autem 10. eiusdem sexti lib. idem Hipp. dicebat. Caput dolenti, & circumdolenti, seu vehementer laboranti, pus, vel aqua, vel sanguis effluens per nares, aut os, aut aures, morbum soluit: quando uidelicet propter inflammationem, Galeno teste, vel crudorum humorum multitudinem in capite aceruatorum fieri dolorem contingerit: tunc nanque inflammatione suppurata, aut humore excreto solutio fit. 3. verò prognost. Capitis dolor vehemens inquit Hippocrates, & continuus cum febre, si quod ex indicijis extiterit exitiosis, letalis admodum est: & lib. 3. prædictorum dixit. Vtrum gerentibus capitis dolores soprosi cum grauitate fientes mali sunt. Galenus autem primo de arte curatiua ad Glauconem scriptum reliquit, dolorem capitis inseparabile esse indicium futuræ crisis, si à principio non inuaserit, sed ubi corpus perturbatur, ac agitur natura tentante ipsam per vomitum, aut per fluxum sanguinis ex naribus. Reliquum est cuiusuis doloris capitis curationem conscribere, unam tamen in omnibus communem intentionem habentes, causas uidelicet, à quibus fiunt singuli, considerare: hæ si quidem tibi conuenientem curationem ostendent non cuiusuis doloris capitis tantum, sed omnium aliorum symptomatum, ut liquet lib. primo de arte cur. ad Glauconem. Verum nos non immerito initium faciemus ab ijs, qui à nudis duntaxat qualitatibus originem duxerunt, ac à procatacticis causis. Nā cum recentes hi fuerint, facile curantur, cunctiq; optimi medici ab eis initium sumpserunt, ut patet secundo de comp. med. secund. locos.

Insuper visum est, quò breuiiores simus, ab eo capitis dolore qui ex siccitate oritur, coepisse. Nanque ex ea, licet non vehementissimus, moderatus tamen gignitur, non tamen intemperie media: quoniam citra caliditatem, aut frigiditatem hoc pacto illum efficere non valeret, ut Galeno patet primo de caus. sympr. sed media continui solutione, hoc est, tensione. Demum relictà humiditate, ex qua nec uno, nec alio modo sola existente excitari dolor potest, ad eos deueniemus, qui ex frigida, seu calida intemperie cum humorum redundantia, vel citra, ortum ducunt; alios, qui ex alijs iam dictis causis excitantur, non omittentes, quamuis plurimum, vel frigida intemperies caput vitiat, vel humida, quinetiam & ambæ simul, ut 13. meth. med.

arte paretur. Carnibus utantur magna ex parte assis, interdum elixis, saluæ folia adhibendo, aut betonica, serpylli, sampsoci, seu hyssopi. Pro potu tenui uino utantur, & si illud auersentur, aqua, in qua decoctum sit cinnamomum. Omniaque ipsos iuuant, quæ mediocriter extenuare, & calfacere possunt. Reliqua uictus ratio similis seruanda erit ei quam præcepimus in prædicto capitis dolore ex frigiditate orto; illud tamen seruantes, quod ad siccius quoque inclinet præter caliditatem. Pro extenuatione vero, ac incisione prædicti redundantis succi, mellis rosacei excipue unc. i. & s. cum aqua hyssopi, betonica, seu sampsoci unc. iii. aut oxymellis simplicis tantundem, cum uno. s. syrupi de infus. rosarum. similiter cum aliqua prædictarum aquarum. Quibus pluries iteratis, ac propterea prædictis succis præparatis, ea, quæ purgandi pituitam uim obtinent, medicamenta propinanda sunt, uelut, Rec. agarici trochiscati scrup. iiii. diacatholicon 3. vj. vel diaphœnicon 3. iiii. pulpæ casia recentis extractæ unc. i. cum saccharo fiat bolus. Vel sumas agarici trochiscati 3. i. & s. myrobalanorum chebulorum 3. ii. florum stœcadis 3. i. fiat decoctum in aqua fontana, betonica, seu hyssopi, aut sampsoci in quo dissoluas syrupi de pluribus infus. rosarum rubearum unc. iiii. diacatholicon unc. s. aut diafœnicon 3. ii. fiat potio. Verum quoniam hoc malo affectis non semel tantum purgatio conuenit, sed bis, aut plures: cum vni tantum purgationi sua crassitie, ac lenitie redundans succus non cedat; ea de re iterum post unam, vel alteram purgationem extenuandus, ac præparandus erit ex prædicto oxymelite, aut eodem scyllino, seu syrupo ex stœcade: quibus parum syrupi ex infusione rosarum (si videbitur) addere poteris, & in aquis hyssopi, serpilli, aut stœcadis parum dequoquere. Et cum præparatus fuerit humor, ex catapotijs expurgari poterit: quæ recipiant pilularum arabicarum, sine quibus, aut cocchiarum 3. i. agarici trochiscati scrup. ii. cum oxymelite, aut syrupo ex stœcade catapotia formentur. Post quæ per aliquod spacium unc. iiii. syrupi ex pluribus infus. rosarum rubeorum, aut ii. ex tribus infus. rosarum persicarum, uel domini Augustini cum aqua borrag. vel lupulorum exhibere poteris, aut unc. i. pulpæ casia fistule. Conferunt etiam ijs clysteres: tum ut superfluacrementa in intestinis contenta extrahamus, tum etiam propter reuulsionem eorum, quæ ad caput in ijs ferri cōsueuerunt, facto prius decocto ex maluis, borragine, sampsoco, betonica, serpilli, ac stœcade, furore, & sale: in quo dissoluas olei anethini, chamamælini, aut rutacei unc. iiii. mellis rosacei unc. ii. benædictæ 3. iiii. aut diaphenicon tantundem, vel hieræ picræ 3. vij. & agarici 3. i. & s. vel 3. ii. misceantur singula, & fiat clyster. Eiusdem etiam, vel similibus glandes confici poterunt melle addito: ut si agarici 3. ii. assumes, salis gemmæ, & pulueris hieræ 3. i. cum melle quantum satis sit, & figurentur glandes, quibus clysteriorum vice utior. Nec ommittendæ erunt reuulsionis gratia, frictiones brachiorum, ac crurum; necnon cucurbitulæ citra scarificationem in occipito, ac dorso affixæ post purgationem potissimum. A qua item septimo quoque, vel octauo die, si assumant 3. i. theriacæ, aut mithridati, optimum erit, similiter diambæ, vel diamoschi. Nec minus hoc tempore apophlegmatismi conferunt, tralliano teste. qui ex uuæ passæ 3. iiii. hyssopi, & sampsoci singulorum 3. i. mastiches 3. ii. cum pauco melle, & cera pastilli formentur: quorum unus notabili quodam spacio commanducetur. aut ex piperis, & sinapis singulorum 3. i. hyssopi, staphidis agriæ. origani, & pyrethri scrup. i. uuæ passæ 3. iiii. cum melle, & cera iisdem fingantur. Errhina etiam medicamenta per nares approximata, quæ nasalia appellant, præsertim mollia, & liquida ualde conducunt in euacuanda a capite pituita. Componantur autem ex hyssopi, sampsoci, & betonica decocto: de quo lib. ii. assumēs, adde succi foliorum betæ, aut succi radicis eius. unc. iiii. uel

Medicamento.
tum rano.

Purgatio.

Clysteres.

Glandes.

Cucurbitulæ.

Apophlegmatismi.

Errhina.

Sternutatoria.

Orbiculi odora-
ti compositio.

lib. ss. uel si fortioribus indigeas tantundem succi brassicæ, aut cyclamini adij-
cias. Poterit insuper & à capite pituita expurgari cum his, quæ sternutamen-
ta proritant: quare & interdum eis utitor, ut puluere albi ellebori, castorij,
piperis aut nigellæ naribus indito, uel composito ex his. Et denique nari-
bus odoramenta calida adhibere oportet, uelut infra scriptum, quod recipit
sampsuci, corticum, & foliorum citri, hyssopi, & rutæ ana scrup. ii. castorij,
florum stœcadis singulorum scrup. i. styracis calamitæ, laudani, ligni aloes an.
3. ss. mastiches, corticum thuris, spice, & cariophyllorum maceris ana. scrup. s.
sandalorum rubeorum, & corallorum rubeorum singulorum 3. i. cum succo be-
tonicæ, seu sampsuci, & cremore tragacanthi fiat orbiculus odoriferus, mosci
ac ambra grana iij. uel iiij. addendo. His denique peractis, ad topica confugiē-
dum est medicamēta, quæ disijciendi, ac attenuandi, & dissecandi uim habeāt
præsertim ea, quæ in præcedenti capitis doloris curatione ex frigiditate no-
tauimus. At si ex humore melancholico dolor capitis fiat, simili uictus ra-
tione, ac modo curationis utendum erit, prout cap. de melancholia præcepi-
mus. Qua de re ut iterum hic tractemus, superuacaneum puto, sed cuncta quæ
dici possent, eodem loco requiras.

Cura doloris ca-
pitis ex pletho-
ra genti.

Ratio uictus.

Vena sectio.

Cap. 15
Topica reme-
dia.

SI VERO non ex redundatiâ pituitæ, aut utriusque bilis, sed sangui-
nis solius, aut quatuor humorum ex æquo auctorum dolor capitis excite-
tur: quam redundantiam, siue auctorem multitudinē, seu plenitudinem
appellant simpliciter dictam; pro eius curatione aer frigidus, & sic-
cus eligendus erit; mediocriter exercendi ægri, & mediocri somno utantur:
studeas tamen pro uirili, ut alius eis humecta sit, si non sponte, cū clysteriis
arte perficiatur. Fugiant immodicos animi affectus. Virent carnes, oua for-
bilia, & reliqua, quæ copiose nutriunt. Veseantur hordeacea prisana, aut fri-
gidis oleribus, lactuca uidelicet, cichoria, endiuiâ, portulaca, borragine, &
similibus. Auino abstineant, sed aquam hordei, aut in qua decoctum sit pa-
rum cinnamomi, vel seminum coriandrorum præparatorum, bibant. Hunc
autem capitis dolorem totius corporis euacuatione haud difficulter curabis,
potissimum si in toto quidem corpore adsit plenitudo, nec in capite tantum.
Quapropter media in cubito uena audacter statim incidenda erit; & nisi
quid prohibeat, notatu digna copia sanguinis extrahenda. Quod si id ui-
res non ferant, non vnica duntaxat vice, sed duabus, aut pluribus sangui-
nis missio erit facienda. Verum post primam, externa in cubito uena incida-
tur, uelut etiam si non magna fuerit plethora, ab eiusdem incisione auspican-
da curatio erit. Similiter ubi caput propter eius imbecillitatem multitudi-
nem contineat: quo casu, saltem reuulsionis gratia, uena secunda erit exter-
na, seu humeralis; demum si opus fuerit frontis quoque uena incidatur. Ve-
luti etiam clysteribus, & his quidem interdum acribus, nexibus, ac frictio-
nibus in partibus inferioribus, plurimis expedit uti Galeno auctore primo
de arte curatiua ad Glauconem. Ipsi quoque parti affectæ hoc tempore re-
media adhibere conuenit: quæ à capite repellendi vim habeant primò, de-
inde ea, quæ dissoluunt, atque euacuant, postremo uero corroborantibus u-
tendum. Repellit autem (eodem Galeno auctore) oleum immaturum, quod
græci omphacinum nominant, aut rosaceum, seu oxyrhodinum: qua de re
his commodè uti poteris, ac reliquis, quæ in cura doloris capitis ex ardore
orti conscripta sunt. Deinde ex discussorijs medicamentis quippiam ad-
dendum erit, paulatim detractis pharmacis, quæ repellunt, ut chamæme-
linum, & anethinum: aut si in oleo serpyllum, seu spondylium, sampsucum,
aut hyssopum decoxeris. quæ uirium etiam aliquid capitis partibus adij-
ciunt: & quæ debiles sunt, roborant, ut proinde ipsis usque ad integram sani-
tatis

tatis restitutionem utendum sit, eiusdem Galeni præcepto. Demum si oportuerit, per nares, & palatum expurgandi sunt, ac sternutamenta excitanda, & cucurbitule in occipitio cum scarificatione affigendæ. Irrigationibus quoque, ac aliis medicamentis, quæ uim discutiendi habeant paulo ante conscriptis (ubi opus fuerit) commodè uti poteris: nos uero breuitati indulgentes iterum ea non repetimus. Velut nec si ex iam dictis causis cum obturatione quoque capitis dolor fiat, quæuis earum sit, nouam præcipientur curationem, cū ex eisdem ferè curari possit, causam uidelicet auferendo quæ obturauit.

AT si ex flatuoso spiritu redundante quispiam in dolorem capitis incidat, siue in reliquo corpore simul, siue in ipso capite duntaxat, relicta uictus ratione, quæ omnino talis esse debet, ut flatum non gignat: pro eius curatione, si in capite is non tantum genitus sit, sed ex corpore afferatur, in principio repulsoria curatione utendum est. quod ubi moderate factum sit, ex mitigatoriis, ac concoctoriis quippiam admiscere ad repulsoria oportet. Deinde etiam discussoria addenda, ita ut paulatim repulsoria pharmaca detrahamus, donec ad contrariam misturam perueniat medicamentum ei, quam a principio habuit. si quidem influentem uaporem, seu spiritum repellere necessarium sit: infartum autem concoquere, attenuare, eundemque ipsum discutere; ac circa ipsam affectam partem firmitatem inducere, ne uidelicet quod influit suscipiat: attenuatum uerò excernat, impactumque concoquat, & attenuet; prout scriptum reliquit Galenus secundo de compositione medicamentorum secundum locos. Iuat autem eos magnopere euacuatio alui prius per clysterem ualidum: nam ex eo, præter id, quod ea quæ circa uentrem, misaræum, ac circa hepatis sima hærent, euacuantur; adhuc ea, quæ ad caput feruntur, reuelli contingit. Dissoluas autem in eis præter ea, quæ iam dicta sunt, interim benedictæ 3. iiii. aut electuarii indi, seu diaphenicon tantundem, uel diacatholicon, aut hieræ picæ 3. vii. in clysteriorum autem decoctum, quæ flatum etiam discutiunt, adiicienda erunt: ut semen, anis, fœniculi, carei, aut cumini, aridæ quoque ficus, ac furfur. Corroborandumque interim affectum membrum, ut neque ipsum uentosum flatum gignat, quodcunque id fuerit, siue uenterculus, aut aliquod intestinorum, seu iecur, aut lien, aut quoduis aliud. Post quæ si una cum flatu calor in capite prædominatur, rosaceum adhibendum erit. quod uidelicet repulsorium, concoctorium, & mitigatorium, ad hæc & discussorium sit, ut Galeno visum est eodem secundo de compositione medicamentorum secundum locos: pariter & acetum, cum & repulsoriam simul, & attenuatoriam, immò & discussoriam habeat facultatem, eodem Galeno auctore. verum per se solo aceto utendum non erit, ob facultatis ipsius uehementiam; sed cum eo rosacea aqua admiscenda erit, uel etiam ipsum rosaceum, aut portulaca, polygonum, seu solanum. Si uerò cum frigore flatus sit, loco rosacei chamæmelino, aut anethino cum aceto utaris, uel cum rosaceo etiam, & aceto ea permisceas. At si augescat affectio, Archigenis auctoritate, irrigatorio facienda erit ex ruta viridi cum aceto, & oleo trita, aut ex succo radicum iridis cum aceto: polygonum quoque cum ruta, oleo, & aceto dilutum adhibere conuenit; aut serpyllum cum aceto, & oleo tritum, seu succum è baccis lauri expressum cum aceto, & rura. Amygdalæ quoque deliberatæ, & tritæ cum aceto, & oleo, irrigationis modo adhibitæ, aut cerati crassitudine in linteolo fronti impostæ, cum primum affectio incipit augere, magnopere conferunt. Quod si cupias sacculis potius uti, circa initia, ex milio, rosæ, salicis folijs, & polygono, solano, seu portulaca eos parare poteris, & fronti, ac syncipiti adhibere. Postea uerò

Si ex flatuoso
spiritu oritur
dolor capitis.
Curatio.

Cap. 2.
Clysteriorum
usus.

Loco citato.

Topica.

loco citato.

Cura doloris ca-
pitis ex ebrieta-
te orti.

Cap. 10

1. de comp. me.
secund. loc.

Cap. 1.

Quæ ad ebrieta-
te præseruet.

prædictis sampfucum, serpyllum, hyssopum, ac rutam, lauri folia tenera, cy-
perumq; adijcere ualebis. Nec non odoramētis iam dictis, seu castorei, & mu-
sci, aut amaraci utaris: similiter his, quæ sternutamenta proritant. Poterunt
insuper ægri diacumini, aut dianisi 3 ℥. mane assumere, aut tantundem cheria-
cæ, seu mithridati. Si autem flatuosus spiritus, propter earundem imbecillita-
tem, in capitis quibusdam partibus generetur: nam nec illud mirum est, neq;
impossibile, prout Galenus testatur eodem secundo lib. de compositione me-
dicamentorum secundum locos, præter ea medicamenta, quæ repellendi uim
habent, cum eis opus non sit, cunctis iam dictis, aut eisdem similibus medica-
mentis utare; parum etiam & in hac affectione conferunt, & si non noceant ea,
quæ intus assumuntur, præsertim diacominum, & dianisum.

SVnt quibus caput assidue dolet. ubi uel liberalius uinum ingesserint, uel
meracius, idque magis, si suapte natura calidum fuerit, ut testatur Gale-
nus tertio de loc. aff. utpote quod omnino quidem caput uaporibus re-
plet, aliquando uero etiam humoribus calidis, cum & citra uini potum
eiusmodi ad caput promptè deferuntur. Pro eius curatione scopus primus uni-
uersalis, & communis omnibus habendus erit, nempe euacuatio. Iubendum
igitur est, si crudum adhuc in eis uinum in stomacho fluctuet, ut tepida aqua
hausta uomant, per se sola, aut pauco aceto, seu acetoso syrupo permitta.
Quod si etiam post concoctionem caput doleant, refrigerantibus utendum
est, ac repellentibus, ut multitudo quidem euacuetur, caliditas uero fri-
geat: quale est rosaceum per se, & cum aceto, aut hederæ, seu brassicæ suc-
co: quin & ipsa brassicæ folia in aquam calidam macerata, capitiq; circun-
posita, ac alligata, naturaliter ebrietatem arcent, ut quæ vapores resiccent.
Propterea eiusdem decoctæ esus in id efficax est. Similiter ex leguminibus
lens hos adiuuat, præsertim eos, qui humidiores habent ventriculum: rutæ
quoque folia trita cum aceto admista eis rosa capiti tepidè affusa profunt,
Marcello auctore. Alijs quoque boni succi cibis utendum (non tamē calfacien-
tibus) ut ptisanæ succo. Ex oleribus lactuca: pane ex aqua loto: & interdum
ouis sorbilibus. Pro potu omnino aqua utendum, aut uino tenui, albo mo-
dico, potissimum si aquam bibere non possint. Post omnem uero cibum pa-
rum dandum est de malo punico, aut pomo, aut uua passa. Breuiter, uniuer-
sus cibus sit boni succi, stomacho utilis, & qui vapores arceat, Tralliano au-
ctore. Cæterum somni ac quietis cura in primis habenda erit: cum manife-
stum sit, Galeno teste, quod tum hos, tum omnes, qui caput dolet, agnoscent-
te adhuc, & vigente dolore, quiescere melius est: remittente uero, ac decre-
scente, in locis aptis de ambulare; & ante cibum quidem pluribus deambu-
lationibus utendum. Post acceptum uero cibum, breuibus, & lentis. Oportet
aut neque multa comedere, neque statim deambulare, sed post duas, aut tres,
aut etiam plures horas. Si uero post hæc probe dormire non possint, ad bal-
neum quam celerrimè inducantur, calidaq; aqua eis in balneo sæpe affunda-
tur. At si ex vaporibus, & humoribus in caput sublatis reliquæ quædam re-
linquantur tenuibus potis, ac meatibus impactæ; & ob id etiam capitis do-
lor perseueret, à rosaceo quidem abstinere expedit, & chamæmelino mode-
ratè calido, aut anethino primum, postea (si opus fuerit) irino utendum. In
balneo uero caput calida perfundatur, non solum ob id, ut quidpiam circa
ipsum discutiatur, sed & somni conciliandi gratia, ut Galenus præcipit secun-
do de comp. medic. secundum locos. Quapropter etiam secundum, aut ter-
tium quoque ad uesperam balneum apparandum est, acceptis ab eo lactucis
ex aceto, uerum aqua affusa multa, ut acetum planè exæquet, nisi omnino
aquosum sit ipsum acetum. Si quis autem uelit ab ebrietate præseruari præ-
sumens

med. apud Gal. legitur. Pro huius tamen curatione uniuersa uictus, ac medicamentorum ratio ad humidum uergere oportet. Talis ergo naturę aer eligatur somno utatur longiori, uigilias uitet, quietem eligat. Caueat ab immodico exercitio, ac euacuatione immodica, animique affectibus immoderatis præsertim mœrore. Cibi eligantur humectantes, boni succi, multi nutrimenti, ut recentium ouorum lutei, gallorum testes gallinarum, seu pullorum caro: interdum perdicum, ac phasianorum iuuenum, eorundemque animalium iusculis interim uestantur. Vinum bibant cenne, aquosum, optime dilutum: dulciũ aquarum calefactarum lauacris, ut quę humectare possunt, uti conuenit. capitis irrigationes faciendę, præsertim iuxta coronalem commissuram ex oleo amygdalino dulci, aut de cucurbita, vel violaceo, & chamæmelino simul mixtis. Interim vero cum prædictis oleis recentem aliquam pinguedinem misceas, ut anseris, gallinarum vel vitulorum: pariter & recens butyrum, hisque caput inungendum. Humida quoque errhina administrari poterunt ex prædictis tum oleis, tum pinguedinibus pullorum, seu gallinarum iusculis commixtis, ac saccharo albo.

Viſus ratio.

Medicamento-
rũ ratio.

C Apitis autem dolor ex calore genitus, ut solis ardore, flammę uicinitate, seu odoramētis calidis, aliisq; huiusmodi, curabitur, si aer ac domus in qua eger decumbit, natura frigidi deligatur, aut qui nostra industria sic præparati sint ex floribus, ac germinibus frigida facultate præditis per domum sparsis, rosas uidelicet, uiolis nymphę floribus, pampinis, seu capreolis uitiũ, harundinisque foliis, & huius clasſis reliquis. Refrigerabit itẽ si humi aqua frigida proiecta sit, ac de uasis in uasa transfundatur. De somno maxima habenda erit cura, qui sit, consueto longior, uigilę præsertim immodicę penitus uitandę, quies iniungenda, cũ nõ modo his, uerum omnibus, quibus caput dolet, augente adhuc, & uigente dolore quiescere melius sit, ut Apollonii auctoritate Gal. testatur secundo de compositione medicamentorũ, secũdũ locos. Alui excrementa, si natura non excernantur lenibus clysteribus protrahenda sunt: ex eorũ nanque retentione capitis dolor augetur. Animi perturbationes, præsertim ira, ac furor penitus uitentur. Boni succi cibus, non tamen calfacientibus, immo natura frigidis agrũ nutrire oportet, neque eisdẽ multis. Sunt aut tales panis ex aqua frigida lotus, ptisanę succus. Ex oleribus lactuca tybum, portulaca. Ex piscinis, conueniunt petrosi, & teneris carnibus præditi. Ex carnibus, pullorum, gallinarum, ac columbarum pulli cum omphacio præsertim conditi, gallorum testes atque alæ. Ex fructibus, malum punicũ, uuapassę, pyra, ac mala quę apia, dicuntur, interdum cruda, aliquando uero cocta condonari possunt. Abstinedũ uere ab his, quę proprietatem quandam habent capitis dolorem inducendi, ut a palmarũ glandibus, Gal. teste uero, quercinis glandibus, lactis poru, uiticis semine, ac nigris oliuis, ut Aet. uisũ est & ante ipsum eidem Gal. secundo de compositione medicamentorum secundum locos. Pro potu uero, omnino aqua utendum est: quod si ex eius potu ventriculus subuertatur, in ea parũ cinamomi decoquatur, aut seminũ coriãdrorũ præparatorum, vel misceatur cum aqua succus malorũ punicorũ acidorũ seu acidus syrupus, vel oxy saccharũ. Quod si ne his bene habebit, & aquã bibere nõ possit, permittendus ei erit ex aquosis uinis aquosus potus; eiusdem Gal. præcepto Refrigerantibus itẽ, ac modice astringentibus medicamentis, tenuiũq; partium substantia præditis utendũ erit. Quapropter in principio nil melius erit quã rosaceo. pbe apparato caput perfundere: ac æstiuo tempore frigido existẽte: optimumque erit si ex oleo crudo, quod omphacinum appellat, cõfectũ sit nec id ipsũ rosaceũ uetus existat: magis aut adhuc penetrare poterit, Trallia. teste, si cum aceto illinatur: pnuca aut eius quãtitas adiecta sit. Locus aut illitioni

Cura doloris
capitis ex cali-
da intemperie
orta.

Cap. i.

Loco citato.
Aet. li. 6. c. 46.
Gal. loco cita.

Medicamento-
rũ ratio.

E perfusio

loco citato.

Vide Gal. loco
citato.

Cum doloris ca-
pitis ex redun-
dante flaua bile
orti.
Victus ratio.
Medicamento-
rum ratio.

perfusionis, seu irrigationis sit iuxta frontem, vbi pilosa pars capitis desinit, ac iuxta utranque eius latus, vbi pili ipsi ad aures neſtuntur. Verum inter omnes capitis partes: vt ſepius diximus, ea quæ iuxta ſynciput eſt, propter laxitatem coarticulationis iuxta coronalem futuram, & ob oſſium tenuitatem, & raritatem, facile tum caliditatem, tum frigiditatem omnium, quæ adhibentur pharmacorum intro diſtribuit. Quare ſiue refrigerare oporteat ardorem, ſiue caſfacere frigiditatem, aptiſſimus erit capitis iuxta ſynciput locus. Proximũ à roſaceo chamæmelinum locum habet in his corporibus, quibus uehementem frigiditatem inducere veremur, qualia ſunt fœminarum, eunuchorum ac puerorum, & aliorum quicunque molli carne præditi, albumque habentes colorem. Meſuram autem tum roſacei, tum chamæmelinum, quod ad refrigerationem attinet, ex prædictis corporis habitibus, & ex ardoris magnitudine inuenire oportet, conſiderata ſimul ætate ægri, eiusque & ambi-entis nos aeris temperie, ac reliquis huiusmodi: atque ita demum, ſi oporteat, roſa ceo addere ſemperuiui ſuccum, aut portulacæ aut lactucę, & polygoni pampinorum, vitis, ac uuarum immaturarum, & aliquando ſolani paululũ. A papaueris vero, & mandragoræ ſucco abſtinendum: non enim citra damnũ refrigerant, vt Galeno placuit. Nec minus uitanda, quę cum refrigeratione magnopere adſtringunt: quod ſi liberit ex prædictis, aut alijs medicamenta componere, hoc modo parari poſſent. Olei roſacei excipe unc. ii. aquæ roſacæ unc. i. aceti unc. s. aut prædictis ſucci ſemperuiui, portulacæ ſeu lactucæ unc. i. immiſceas aut aliorum prædictorum inſrigidantium medicamentorum tantundem. Poteris inſuper & addere cremorem ſeminis cydoniorum, maluarum, aut althęæ ſeu pſyllij. 3. iii. vel. iiii. & loco roſacei, violaceo, de cucurbita, ac ex nymphææ oleo vti, & cum cera, ac pauco aceto ad vnguenti formam reddito: quod iam dictis locis adhiberi poterit præſertim ſyncipiti, aut mori ſucco per linteolum expreſſo cum pari roſaceo vtitur. Saccelli item parari poterunt ex roſis, violis, hordeo lentibus, ac nymphææ floribus prius contuſis. At ſi velis alijs quoque embrochis vti, excipe foliorum maluarum, violarum, & roſarum ana pug. s. florum nymphæę .3. iii. pampinorum, ſeu capreolorum vitium, portulacę, ſeu ſemperuiui ſingulorum manip. i. chamæmeli, meliloti, & fœnigręci ana 3. ii. coquantur ſecundum artem, & fiat embrocha, addendo aceti parum, præſertim, ſi dolor intra cranium ſit. Qua ratione permiſceri eum præcepimus in ſingulis iam dictis medicamentis, nec minus ægri odorem ſuſcipere poterunt ex aqua roſacea, & myrtillorum, cum exigua aceti portione: proderit quoque ſi hoc tempore per duas, vel tres horas ante cibum in mane æger aſſumat unc. i. & s. ſyrupi de infuſione roſarum, aut ex nymphææ, vel violacei cum duabus, vel tribus vncijs aquæ borraginis, vel cichorij. Apollonij auctoritate mori ſucco per linteolum expreſſo, cum pari roſaceo caput aſſidue irrigatari poterit: aut portulacæ folia tuſa perſe, & cum polentæ flore capiti imponito, aut ſolani, vel cupreſſi folia ſimiliter tuſa per ſe, & cum polentæ flore; vel vitis folia cocta trita cum mulſa aqua pariter imponito.

Quod ſi non modo ex calida intemperie, ſed ex flauæ bilis redundan-
tia dolor capitis genitus fuerit, non aer duntaxat, ſed cuncta, quæ
ſæpius conſcripſimus, ad frigidum, ac humidum declinare opus erit
ita vt uniuerſa victus ratio non tantum frigida, ſed humidior ſit, oportet, &
boni ſucci. Cæterum curandi ratio ſtatim à bilioſi humoris euacuatione au-
ſpicienda erit. Verum vt probe hunc euacuare poſſis, humidior prius victu
opus eſt, balneis que temperatis. vnctionibus, & aquæ potu liberaliore. Ita
enim ut inquit Trallianus, diſſuſa bilis, & veluti imbecilior facta, facilius à
medica-

medicamento ipsam trahente euacuabitur. Quare si biliosus humor copiosus nimium, & calidus fuerit, ita agere oportet. Quibus uerbis Trallianus & alteratione, & concoctione, simulatque præparatione, priusquam purgetur, bilem indigere, potissimum ubi firmata in aliqua parte decumbit, lucidissime ostendit: id quod nos fusius in nostra methodo probauimus. Propterea non modo ex iam dictis illud probe exequi posses, uerum etiam si exhibeas per aliquot dies ante purgationem syrupi de oxysaccharo unc. i. & ex infusione ros. unc. s. uel tantundem syrupi uiolacei, seu ex nymphæa, uel ex succo cichorii confecti cum borraginis, seu intybi aqua unc. iij. Nunquid uero ante purgationem comperat uenæ sectio, non admodum liquet. At dicimus nos, quod si bilis sincera fuerit, aut alteri humori permixta, quam sanguini, uenam secare non oportet. Verum si sanguini commixta fuerit (id quod sepius accidit) alijs consentientibus, uenam secare non esset absurdum: quod cum ratione, cum principis Arabum auctoritate probari posset, nisi nimium prolixus fierem: secandaque uena erit uel media, uel humeralis, prout maior, uel minor fuerit eiusdem bilis redundantia, ac maior, uel minor cum sanguine commixtio, non semel tantum, sed si opus fuerit, ipsam iterare; cum non multa quantitas sanguinis unica uice extrahenda sit. Apparente autem demum concoctione, absque molestia, minorique negatio a purgante medicamento trahetur, promptiusque a natura ipsa excernetur bilis. Infra scripto autem utitor, quod excipit tamarindorum 3. vij. myrob. citrinarum 3. ij. florum borrag. uolarum, & hordei de corticata ana 3. iij. fiat decoctum; in quo unc. ij. uel. iij. mannæ electæ, & unc. s. uel 3. vii. diacatolicon. dissolue, & fiat potio: aut cum prædicto decocto dissolue casia fistulæ unc. i. & s. seu sacchari uiolacei unc. ii. aut syrupi ex pluribus infusionibus uolarum, uel rosarum unc. iij. rhabarbari in prædicto decocto infusi cum spica 3. i. aut scrup. iij. & cum unc. s. diacatholicon, an. 3. ij. diaprunis solutiui, uel tantundem antidoti e succo rosaceo, fiat potio. Temporibus autem inter medijs clysteribus uti non erit absurdum, in hunc, uel similem modum paratis. Maluarum, uolarum, foliorum betæ, & borrag. ana. manip. i. excipe. ex quibus facto decocto permisceantur olei uiolacei unc. iij. uel iiii. mellis rosacei unc. ii. casia tractæ, uel pulpæ casia fistulæ unc. i. salis parum. Et interdum (si uidebitur) addere poteris hieræ picræ simplicis unc. s. At si crassior bilis fuerit, ac prædictis purgationibus non cedat, ex Galeni picra, agarico trochiscato, ac rhabarbaro formatis catapotii purgari poterit æger: sumes agarici. scrup. ii. rhabarbari, cum spica, & pulueris hieræ simplicis ana 3. s. cum syrupo uiolaceo, & aqua betonicæ fiant catapotia: post quæ per duas, uel tres horas. unc. ii. mannæ, uel iij. syrupi ex pluribus infus. rosarum, uel uolarum assumat cum aqua borrag. intybi, aut cichorii, in qua prius 3. i. myrob. citrinarum fuerit decocta. His quippe peractis ad topica medicamenta deuiendum erit: quæ ex iam dictis in cura doloris capitis ex ardore orti confici, ac parari possunt; unum tantum animaduertentes, quod frigidioribus, ac humidioribus pro cura doloris capitis ex bile orti, uti possumus ac debemus. Insuperque & errhinis similis facultatis, humidis præsertim ex aqua hordei paratis: in qua foliorum maluarum, uolarum, ac lactucæ, singulorum pug. i. decoquatur: cui succum foliorum betæ adiacis, ac utitor, lib. ii. prædicti decocti assumendo, & unc. iij. uel iiii. iam dicti succi. Cucurbitulas sine scarificatione, ac crurum, & brachiorum frictione non omnino omittens, sed intercapedine quadam, temporibus congruis, eis utare. Similiter si quando ex prædictis humoribus reliquæ quedam relinquantur, ac iam dictis medicamentis minimè cedant, ut pote tenuibus poris, ac meatibus impactæ, & ob id etiam capitis dolor perseveret, cum rosaceo ipso, aut alijs conscriptis medicamentis refrigerantibus ea primum me-

De uenæ sectione
ne quid sentien-
dum sit.

Asic. lib. 3. sen.
2. trac. 2. c. 11.

Purgatio.

Topica.

dicamenta miscenda sunt, quæ digerendi uim habeant, ac demum solis digerentibus, aut discutientibus uti, si oporteat; Perpetuo tamen ab his, quæ ualidam uim tum digerendi, cum discutiendi habent: abstinendum erit: cum & immodice quoque calida ea esse oporteret: & propterea affectionem ipsam, cuius causa capitis dolor genitus, est, irritarent magis, ac augerent, quàm curarent. Horum autem materiam, prout magis commoda videbitur, ex his, quæ in sequenti dicentur, eligere poteris.

Cura doloris
capitis ex frigi-
da intemperie or-
tus. Vid. 10.
ti.

Medicamento-
rum ratio.

Cap. 1.

Cap. 1.

Lib. 1. cap. 1.

Cura doloris
capitis ex red-
dite pituita or-

EX perfrigerato autem capite si excitetur dolor, aer frigidus vitandus, & omnino calidus eligendus erit. Somnus moderatus, non tamen solito longior. Motu quoque utendum totius corporis equitatione præsertim & pedum ambulatione. Alius ijs humidior sit, quàm sicca ut singulis diebus ventris recrementa excernatur natura, aut arte, cum glande videlicet, aut clystere. Vitent tristitiam, ac graues cogitationes, aliosque immodicos animi affectus fugiant. Deintus couctos cibos, ac potus, qui refrigerare possunt, ac eligant oua recentia, & sorbilia, gallinarum, pullorum, perdicum & phasianorum carnem. Nec non pro potu, vino urantur tenuium partium, quod medio crite extenuare, ac calfacere potest. Qua ratione fit, ut lauacra quoque calida plurimum conferant: & ut simpliciter dixerim, pro eius curatione calefacientibus, uti oportet: verum pro intemperiei magnitudine remedium quoque variandum erit, iuxta Tralliani sententiam. Proinde neque difficulter curatur capitis dolor ex frigidityte ortus, potissimum ambientis, si recens sit, Gal. auctore 2. de compo. medic. secund. locos, ut interdum sufficiat rutaceum oleum calidum syncipiti (ut dictum est) affusum perfecte hominem liberare, ut ipse testatur: loco autem rutacei, anethino, & chamæmelino uti poteris. Si vero vehementiori calfactione opus sit nardino, serpillino, aut amarantino, & irino. Frons quoque talibus iungatur, & narium ac aurium meatus illinantur. Quidam etiam pedum vestigia, ac sedem ex eis illiniunt, ut idem Gal. testatur præcitato loco. Conferunt super excelsis pannis caput calfacere, aut ex saccellis ex milio, & sale confectis, & prius calfactis, ac pauco vino albo, seu aceto irrigatis. Poterunt parari insuper & alij succuli ex rutæ folijs, hyssopi, ac serpylli singulorum pug. i. sampfuci, betonicæ ana 3. iiii. florum stœcadis, spicæ ana 3. i. rosarum rubearum manip. s. similiter & unguentum conficiatur ex olei rutacei, chamæmelini, & nardi ana unc. i. hyssopi, spicæ florum stœcadis ana 3. s. mastiches, thuris ana. i. & ceræ parum: & si videbitur, poteris interdum addere castorij scrup. i. Embrochæ pariter nec omittantur paratæ ex decocto florum chamæmelini, fœnigræci, seminis lini, fertulæ campanæ ana manip. s. spicæ, florum stœcadis ana 2. i. foliorum rutæ, hyssopi, sampfuci ana. 3. iiii. Ex quibus quoque aut similibus per nares vaporem egri suscipiant. Lauri insuper folia tenera cum irino unguento trita, capiti adhiberi poterunt, aut sampfuci similiter folia cum vino trita, seu rosaceo, uel cyperum tusum adipe anserino admisso capiti. il. initio. Cōueniunt & fomenta interim per spongas calida imbutas, & expressas: maxime si in aqua lauri folia tenera fuerint incōcta, aut sampfuci, vel cyperi. Prodest item oleum irinum cum serpyllo, & exiguo aceto infusum ut inquit Marcellus: magis autem si aut iridis. radix, aut peucedani succus prioribus admixtus fuerit: prodest etiam ruta cum oleo irino & exiguo aceto cocta, ut idem testatur. Hederæ insuper folia mollissima, quæque trita cum aceto, & rosaceo aduersum omnem dolorem capiti fronti illiniuntur, Plinio secundo auctore.

GENITVS autē ex pituitosis humoribus capitis dolor, curabitur primò ad calidum, & siccum uergēte: & si natura is haberi non possit: arte

nitudine ortæ satis. Nam reliqua, cum pro eiusdem curatione, tum etiam si ex quavis alia causa exciteretur, in præcedentibus locupletissimè reperies. Quare in his non erit amplius sermo protelandus, sed ad curam hemicranie accedere tempestivum erit.

ἡμικρανίας.

De hemicrania. Cap. 12.

Sed & alia quedam affectio dolorosa iuxta dimidiam capitis partem, aliquando dextram, interdum sinistram contingit, quam hemicraniam appellant: distinguit autem dextram capitis partem a sinistra, futura per longitudinem ipsius protracta sub qua intra capitis ossa linea medium cerebrum diuidens protenditur: ad quam & peruenit anteriorum duorum ventriculorum septem, vt patet tertio de locis affectis & aliquibus contingit, vt extracalariam doloris sensus percipiatur: alij in capitis intimis partibus dolorem sentiunt: aliqui verò temporum musculos vehementer dolent. Cunctis autem vt plurimum per circuitus dolor exacerbat, influxu uidelicet vaporum, aut humorum, siue multorum, siue calidorum, siue frigidorum causam dolori suggerenti. Euenit etiam interdum, vt quidam adeo vehementer doleant, vt neque manuum contractum facile ferant: in quibus palam est, membranam caluam ambientem esse affectam, & neque cutem ipsam immunitem ab affectione omnino existere: quemadmodum si in partibus, quæ intra caluam continentur, hoc est, cerebro, eiusq; membranis dolor sentiatur, isque vsque ad radices oculorum extendatur, liquidò constabit, partes intra caluam affectas esse, vt neque manuum contactu dolor irritetur. Ex his constat quæ pars in hemicrania afficiatur; ac quomodo ea dignoscenda sit, in quo genere affectuum contineatur, cum dolor sit, ac quot, quæve sint eius causæ. Et quoniam diximus ex vaporum, seu humorum influxu per circuitum exacerbari, rationabile est, Galeni decreto secundo de compositione medicamentorum secundum locos, hunc influxum siue per venas, siue per arterias, seu per vtrasque contingere; & interdum cum corpus, aut aliqua eius pars infra caput, vitiatos vapores, aut humores sursum mittat, interim verò cum ea sola, quæ intra caluam continentur, quod in ipsis redundat excrementum, foras protrudant per iam dictas venas, seu arterias, siue per vtrasque. Siquis autem cupiat dignoscere quando ex multitudine humorum, seu vaporum, & quando ex calidis, seu frigidis hemicraneus dolor exciteretur, ex superioribus capitibus notas petat. Pro quarum causarum uarietate curationem quoque ipsam variari contingit. Nam vbi ipsam hemicraniam curare aggredieris, prius quali purgatione, aut venæ sectione ægro opus erit, considerabis. atque ita deinde ad capitis auxilia progrediaris, venam secans, si multitudo causa fuerit, purgationibus vtens vbi ex vitiosis humoribus fiat. Atque si calidi fuerint his, quæ bilem expurgant, vtaris. Si frigidi, his quæ pituitam, aut succum melancholicum. Quorum purgantium medicamentorum copiam præcedentibus capitibus comperies: quare studiosi exinde petant. Ad capitis auxilia deinde deueniens tum per digitos suæ manus, tum per linteum dimidiam frontis partem, & eam maximè, quæ circa temporum musculum est, confricando excalfaciat æger; atque id ante irritationis tempus faciendum est. Post exacerbationem vero medicamenti hemicranicis a medicis appellatis, vtendum; si quidem multa caliditas in doloribus percipiatur, his, quæ refrigerans quippiam habent: citra vero hanc, his, quæ multum calfaciunt, vtendum. Vtrisque uero aliquid ex ijs, quæ firmitatem, ac robur addunt, misceatur; quod astringentem uidelicet habeat facultatem, prout Galenus eodem 2. lib. de compositione medicamentorum decretum reliquit. Et quamquam

Cap. 9. in med.
Nonnullæ
differentiæ
commune om-
nium,

Diversæ capitis
partes quæ in
ea affici possunt

Cap. 3.

Quæ considerā-
da sint pro eius
curatione.

Cap. 3.
Topica

Aet. li. 7. c. 29

quam ea pharmace per quæ inueterato capitis dolori medemur, hemicranicis quoque affectionibus auxiliantur; testatur tamen Aetius quod quadam naturæ proprietate, seu potentia, euphorbium hemicranicis maxime conferat, si cum aceto teratur. Et si dextrum tempus dolet, illinito, sinistrum: si verò sinistrum dolet, illinito. dextrum. Idem quoque asseruit, quod si intestina terræ terantur, & dolens tempus illinatur, mirifice profunt. Similiter si cochlearum carne utaris: aut si cochlearum carnis cinerem excipiens, ster-
cus bubulum, & thus, æqualibus portionibus cum aceto trita, affectam partem illinas. Stœcadem quoque herbam cum aqua, aut mulsâ coctam si exhibeas, in omni capitis dolore, velut solum, & maximum remedium erit, eodemmet autore. Galenus autem in fine ii. lib. de compo. medic. secund. locos, his, qui ob frigidâs causas hemicranico infestâtur dolore commodissimum medicamentum esse asserit, si dimidiam frontis partem unâ cum temporis musculo ex euphorbio, oleo, & cera parato unguento illinas, euphorbii sumens unc. i. olei lib. i. cere quadrantem. Quod si ualidius uidebitur medicamentum, poterit euphorbii. unc. s. assumi, præsertim si euphorbium ualidum existat, corpusque molle, ac exactiori sensu prædictum. Iuuat etiam hos si oleum tepidum in autem instilletur, modico euphorbio ad oleum iniecto, eodem

Animaduersione,

Cap. 2.

Nostrarum pilularum compositio,

Cels. li. 4. c. 3.

auctore, sumito autem euphorbii scrup. i. olei dulcis unc. ii. quibus comistis gutta, una, vel duæ in aure instillentur. Caueas autem hoc pharmacum in his in quibus à calidis uaporibus, aut humoribus hemicrania gignitur. Hircinum finum tritum cum aceto scillitico misce, & fronti, & temporibus illine, hoc ad dolorem hemicranii sedandum etiam in perpetuum prodest ut inquit Marcellus. Subito vero si hemicranii dolor fuerit, thus, & myrrham & ouum teres, simul etiam fronti induces, vel temporibus, eodem auctore. Minutæ item cochleæ tritæ, & fronti illitæ, & ceruini quoque cornu cinis cum aceto rosaceo mixtus, ac fronti impositus hemicranii dolorem emendant, Plinio secundo teste cap. 8. lib. 1. Reliquum est ut quibus uti consueui, tum in diuturnis capitis doloribus, tum in hemicranicis familiaria ea tapotia conscribam, ex quibus 3. i. vel scrup. iiii. decimo vel quintodecimo quoque die omni tempore præterquam in æstate eger assumere poterit, bile redundante. Excipe pulueris hieræ simplicis Galeni 3. ii. pilularum arabicarum 3. iiii. trochiscorum myrobalanorum citrinarum 3. i. & s. rhabarbari cum spica scrup. iiii. cum syrupo uiolaceo simul componantur, serueturque compositio; & cum opus fuerit ex ea fumantur, ut diximus 3. i. uel scrup. iiii. à cæna per quinque vel sex horas. deinde superdormiat æger. Pituita vero redundante, agarici trochiscati excipe 3. iiii. pilularum arabicarum, & pulueris hieræ simplicis Galeni ana 3. i. & s. florû stœchadis, & trochiscorû myrobalanorum chebularum, singularum 3. i. cum syrupo ex stœcade, & oxymelite simul misceantur, & cum opportunum uidebitur, 3. i. uel scrup. iiii. modo quo supradictum est, assumat æger pro qualibet uice. At si ex nigra bile dolor capitis genitus fuerit, prædictarum pilularum arabicarum 3. ii. excipitas, pulueris senæ; & epithymi ana 3. ii. & s. hieræ simplicis Gal. 3. i. & s. trochiscorum myrobalanorum indarum scrup. iiii. cum syrupo è fumaria, ac aqua melyssophylli insimul componantur: & cum usus urgeat, pariter ut prædictis, utitor. Reliquum esset de aliorum sensuum affectionibus pertractare; sed quoniam extra eam partem, quam caput ex Celsi sententia nuucupauimus, quodammodo existere uidentur; propterea non ab re duxi prius dysfunctionis motricis uoluntariæ noxis uerba facere; nec non & de his uitiis, ex quibus omnes actiones animales læduntur & deinde ad aliorum particularium sensuum læsiones pertractandas conuertar.

περί σπασμῶν.

De conuulsione.

Cap. 13.

Quoniam motiuarum actionum prima symptoma ta sunt, Galeni auctoritate lib. de diff. symp. immobilitas, & uitiosa mobilitas; Vitiose autem mobilitatis, alia diminutus, infirmusque motus est; de quo cum de immobilitate pertractabimus verba facemus; Alia vero prauus motus est: qui licet plures etiam habeat differentias, ut liquet apud Gal. eodem loco: duximus tamen de uena earum, hoc est, de conuulsio motu, prius differere: quem quidem græci σπασμὸν, latini uero conuulsionem nuncupant, nomine ipso indicante quid sit, ac quomodo fiat. Nanque passiuo quædam est in uoluntaria, Galeno teste, commento aph. 39. 6. lib. ad similem dispositionem uenientibus partibus neruosis in ea, quam etiam in motibus uoluntariis assumunt. Nam in eum situm neruos, musculosque conuulsio ducit, ut patet 2. de caus. symp. in quem, si pro naturæ lege se haberent, ab animali uirtute ducerentur, tractis uidelicet, seu reuulsis ad propria capita musculis. Ex quibus constat conuulsionem in conuulsis partibus factam hac sola ratione a motu naturali uoluntario scilicet earum differre, quod præter uoluntatem sit, ut Galeno ter. de loc. aff. uisum est. Omnis nanque motus, qui a uoluntate procedit, attractis musculis in eas, quibus innascuntur partes, hoc est, eas ad quas nerui inferuntur, fieri uidetur: neque potest attractio fieri, nisi ad suam originem retrahatur musculus. Itaque quemadmodum in eo, qui secundum naturam habet, uoluntas in cerebro iuxta neruorum originem ordinata, motionis principium primis dat neruis, ac per ipsos musculis; ita si sine huiusmodi principio contingat musculos retrahi, tunc conuulsio gignitur. Tendi igitur musculos, & ad initia propria retrahi corporisque, cui inheferint, partes secum trahere, est sanis, & conuulsis pariter commune, iuxta Galeni sententiam libro de tremore, rigore, palpitatio, & conuulsione. Verum illud inuoluntarie fieri, his quidem inest, qui naturaliter utique non habeant, at præcedente uoluntate, motus quippe naturalis erit his, qui naturaliter habent. Huius autem deprauatæ motionis tres statuuntur species, seu differentia a Galeno lib. de diff. symp. & lib. de tremore, rigore, & palpit. ac commento aphorif. 57. 4. li. & aliis plerisque in locis, tum etiam a Paulo, Aetio, ac Celso quarum una τέτανος. Alia ἐμπροδότηνος, reliqua uero ἐπίδότηνος dicitur. Nam cum corporis particulæ una cum ceruice, ac capite in anteriora tenduntur, affectus hic ἐμπροδότηνος nominatur. cum in posteriora ἐπίδότηνος. Cum uero æqualiter in alterutram partem, & retro uidelicet tenduntur, τέτανος nuncupatur. A latinis uero quibusdam prima distensio ad anteriora. Altera distensio ad posteriora, & reliqua distensio simpliciter. A Celso autem rigor neruorum quælibet istarum appellatur, qui modo caput scapulis, modo meatum pectori annectit, modo rectam, & immobilem ceruicem intendit, ut ipse inquit cap. 3. lib. 4. Harum autem affectionum non perpetuo eadem est sed des primo affecta. Nam interdum cerebrum ipsum noxam suscipit; interim spinalis medullæ initium; quandoque neruus aliquis, aut musculus, qui particulari motioni deputatus est. Id autem prompte dignoscet: nam si una cum toto corpore faciei quoque musculi conuellantur, cerebrum ipsum affectum esse indicat, Galeno teste, 3. de loc. affe. At si faciei partes, seu musculi seruentur, ac illæsi permaneant, spinæ initium affici sciendum est. Vbi uero pars aliqua conuulsa sit, necessum est neruum, aut musculum, qui eius motioni deputatus est, affici. Verum in iam dictis tribus differentiis, cum in toto corpore constiterint, & non in una determinata parte, unum tantum discrimen habendum erit; nunquid uidelicet capitis, & faciei partes læsæ sint, uel illæ-

Cap. 3. collige.

Conuulsio quid sit.

Cap. 2. in princ.

Cap. 6

Motus conuulsus a uoluntario in quo discrepat.

Cap. 8. in prin.

Conuulsionis, tres species, seu differentia, de diff. symp.

Cap. 3. in med. Lib. de tremore c. 8. in fine.

Paul. lib. 3. c. 10.

Aet. li. 6. c. 58

Cels. li. 4. c. 3

Quod diuerse partes in ei primo affici possunt.

Cap. 6. & 10.

Quomodo distinguende sint.

Qui præter naturam affectus sint.

2. de caus. sym.

Cap. 2

Lib. de tremore cap. 5.

Dux ex Hip. de conuulsionis causæ

Cap. 6. in fine.

Quib. signis dignoscenda conuulsio num ex ariditate, vel repletionem fiat.

Si ex inanitione fiat, causæ.

Si ex plenitudine fiat, causæ.

Loco citato.

sa permanferint. Nam primo modo si euenerit, cerebrum ipsum affectum erit. Si secundo modo contingat, non cerebrum, sed principium spinalis medullæ secundum totum, aut secundum partem. Pro cognitione uero particularis conuulsionis determinatæ partis cuiusdam, cum determinatus nervus, seu musculus afficiatur, summopere necessaria erit anatomes notitia, nervorum potissimum, & musculorum. Cunctæ uero conuulsionis species seu differentia symptomata sunt in genere noxæ functionis motricis voluntariæ, eiusque deprauatæ, à causa duntaxat præternaturali ortæ. Qua ratione conuulsio à tremore discrepat: qui non modò à causa præternaturali, uerùm à functione ipsa, licet irritata, ortum ducit; ut patet 2. de caus. symptom. & lib. de tremore, rigore, palpit. conuulsionum autem causas non immeritò duas Hippocrates statuit aphorismo 39. 6. libr. cum dixit. Conuulsio fit uel ex repletionem, uel inanitionem. Nanque ex his duntaxat causis nervosæ partes conuelli possunt præter uoluntatem: ex repletionem inquam madefactis ipsis, ac irrigatis; ita ut in tumorem præter naturam attollantur: & propterea conuellantur dilatis ipsis secundum latitudinem, earumque longitudine decurtata. Ex inanitionem uero, utpote ipsis nervosis corporibus uolentius exsiccatis; ut propterea cogantur in se ipsa duci, contrahi, atque conuelli: quemadmodum etiam in lyre chordis euenire consueuit: ut intentis ipsis vehementer ob ambientis aeris immodicam intemperiem nonnunquam rumpantur, si uel nimis aridus fuerit, uel admodum humidus. Humiditas nanque ipsas madefaciens, siccitas uero contrahens, modo quo lora quoque cum ad ignem exsiccantur, contrahi, tendique videntur: & sol tergora arefaciens contrahit. His quippe ita præcognitis, haud difficile inuentu fuerit, ut Galeno 3. de locis affectis visum est: utrum ab ariditate, quæ est ab humidæ essentia defectu, & euacuationem, an humoris plenitudine, quæ egestati aduersatur, & ab Hippocrate repletio nominata est, affectus ipse prodierit. Nanque cum conuulsio fit uel à labore, uel uigilijs, uel fame, uel sollicitudine, uel arida, æstuanteque febris, qualem in phreniticis uidere est, & alijs huiusmodi, causam eius esse ariditatem, inationemque rectè putabis. At si contingerit aliquem sanum repente conuelli, ut ait Galenus commento 26. aphor. 2. huiusmodi conuulsionem fieri ex repletionem est necessarium. Ita quoque si temulento cuipiam, ac omnino pleno homini, qui uidelicet in ocio degat, id euenire conspexeris. Verum ubi propter defectum, seu euacuationem conuulsio excitatur, uel ex aliqua prædictarum, causarum uel ex aliquo præcedenti largo sudore aut vomitu, salui deiectione, aut sanguinis profluuio, aut quapiam alia causa simili, haud difficile erit ipsam dignoscere ex relatione præsertim ægroti, seu astantium. Si uero ex plenitudine conuulsio excitetur, bifariam illud euenire poterit, iuxta Galeni sententiam lib. de tremore, rigore, conuuls. & palpit. Nanque aut ex inflammatione principij neruorum, id est, cerebri, aut initij spinalis medullæ, seu alterius partis nervosæ, aut ex succorum copia circa iam dictas partes, ex qua ipse tendi cogantur. Id uero promptè discernas ex indicijs inflammationis, si ea fuerit. Quod si præter eam, ex humorum duntaxat copia conuulsio excitata fuerit, nunquid ex multitudine simpliciter dicta, aut ex ea, quæ est unius tantum succi redundantis, inuestigare oportet, quanquam nervosæ partes ex frigidis, & glutinosis humoribus, ex quibus etiam nutriuntur, promptè repleantur, ac proinde sæpius conuulsionem patiantur, teste Galeno commento aphor. 26. secundi lib. Illudque non alia via, quam supra docuimus, cum de dolore capitis uerba fecimus, Ibi nanque reperias signatum propriæ multitudinis, tum eius, quæ non simpliciter plenitudo dicitur: cum uidelicet alius quispiam humor redundarit cum sanguine, non sanguis solus, nec omnes ex æquo aucti fuerint. Hæc igitur sufficiant quo ad cognitionem

sumens ea, quæ ipsam arcent, quinque, aut septem amygdalas amaras, a ieiuno comedat, Aetio teste: aut uinū absinthites, seu myrteum præsumat. Prohibent insuper, & ebrietatē ipsam myrti baccae præsumptæ, & brassicæ cauliculi præcomesti: at quæ ebrietatem extinguunt postea ingesta, sunt centaurei tenuis decoctum, ceruinum cornu, ac uerbenacæ semen cum aqua. Lib. 6, cap. 43.

DOLOR capitis etiam ex iactu, aut casu accidit, inflammatione interrim subsequente. quare eius curatio magno studio tractanda erit, Tralliano teste. Nam periculum inducit dum humores copiosius ad ipsum caput confluunt. Quapropter pro eius curatione, a uino per initia, carnibus, & in totum ab omni uictu ualētiori, seu pleniori, præsertim si febris adest, ægros coercere expedit: pitisanę uero cremorem, maluam decoctā, lactucam, intybum, & cucurbitam pro cibo exhibere conuenit. Pro potu aquam per se solam decoctam, aut cum semine coriandrorum præparatorum uel paucissimo cinnamomo. Acida uero, acria, & salsa omnino uitanda sunt. Ad hæc quies, & corporis tranquillitas præcipiendæ, ac cibi parcitas: fugienda uero sunt, sol, balneum, clamor, & contentio. Quod si plagas, aut casus, uulneris aut contusionis causa existant, plures scopi erunt ad remedium inuentionem, Galeno teste secundo de compositione medicamentorum secun. loc. Vnus quidem in uulnere, ad quod conglutinantibus, & inflammationē arcētibus pharmacis uti oportet; postquam vlceri labia constricterimus fibulis impositis, aut alijs, ut oportuerit. Alter uero scopus erit in cōtusione, & tertius in doloribus: qui quandoque in ipsis solis percussis partibus fiunt. Plerumque uero etiam ad uicinas partes extenduntur propter continuitatem substantię, tum cutis ipsis, tum eius membranæ, quæ caluariam ambit, præsertim si usque ad eam plaga penetret. Quod si per communionem eiusdem membranæ caluariam ambientis, quam ad duram cerebri membranam circa futuras habet, etiam intra caluariam inflammatio ipsa distribuatur. non absque periculo eiusmodi capitis dolor existit. Contingit autem interdum in casu, præsertim ex sublimi facto, ut quædam circa cerebrum, aut membranas partes abrumpantur: quod ubi euenit etiam amplius capitis dolor inualefcit: ipsaq; affectio tota ægrè curabilis redditur, & periculum ingens, ac præceps imminet. Verum si oborta inflammatio solam cutem occupet, & non ulterius adhuc procedat, nihil negotij est, sed dolor etiam, qui circa caput contingit, facillè discutietur. Optimum itaque fuerit in his, Galeno auctore, nisi ætas prohibeat, & nisi uitalis facultas debilis appareat, a uenæ sectione curationis initium facere: ita nanque influxus reuelletur, ut Trallianus refert. Incidenda autem erit media, aut humeralis uena. A uenæ sectione conuenientibus capitis irrigationibus uti oportet, oleo dulci ipsum perfundendo, lanis contegendo, fouendoque omni ex parte, ut ne caput rigeat: conueniunt quoque & fomenta per spongas aqua calida imbutas. Quod si ætas, siue virium imbecillitas, aut etiam ambo simul sanguinis detractionē fieri impediunt, aluum per clysterem euacuabimus reuulsionis simul, ac euacuationis gratia: atque inde auxilijs ad inflammationes commodis utemur. Nanque incipientibus, & adhuc nascentibus ipsis, rosaceum cum aceto; in vigore verò consistentibus rosaceum solum adhibemus. Ipsis verò decre-scentibus, pharmacis laxantibus appellatis utimur: quemadmodum in induratis inflammationibus absinthium, ac pulegium rosaceo admiscemus. At nec circa initia inde finitè acetum rosaceo admiscendum erit. Nanque cutis capitis, aut quæ post eam est membranæ caluariam ambientis inflammatio-nes, citra quidem uehementem dolorem obortæ, perexigui planè aceti ad rosaceum admistionem iuuari possunt. Læduntur autem ubi magnæ fuerint, dolo-

Cura doloris ca-
pitis ex ictu aut
casu orti.

Victus ratio.

Si ad casum seu
ictum sequatur
uulnus, aut con-
tusio, curatio,
Cap. 1.

Loco citato.
Venæ sectio,
Topica.

doloremq; uehementem induxerit. Similiter si crasse cerebri membranæ nudę rosaceum offeratur, quemadmodum in his, quibus capitis ossiculum aliquod excisum est, fieri consuevit, solum ipsum leniter tepefactum adhibemus. At si citra denudationem per capitis iuxta synciput partem, sana, & integra existente caluaria, rosaceum ad cerebri membranam peruenire uelimus, acetum ei (ut eo perducatur) admiscemus. Quod si vigilie urgeant, etiam chamæmelino oleo, & non rosaceo duntaxat, subinde, verò utriusque commistis pfundere caput debemus, plus, & minus à magnitudine inflammationis ægri, temperamento, & ætate considerantes: Proderunt quoque ijs rosæ & irinum oleum aceto decoctum. Item rosæ aridæ folia macerata prius passo, deinde cocta, atque trita, & ita imposita, & fertula campana. similiter facta, vel myrti folia tenera ex uino trita cum myrrha; & pulegium ex uino tritum, & mala cydonia uino cocta, & trita, atque imposita capiti plurimum profunt, Marcello auctore. Si verò membrana cerebri fuerit vulnerata, egregiè ipsam conglutinat, Archigenis decreto calaminthæ succus infusus, & farina milij arida inspersa; deinde butyrum, & rosaceum, ac adeps suillus infusus, uetus, tepefacta, ac mistim infusa. Cæterum in contusionibus citra desperationem, ac fissuram circa caput factis eodem, Archigene auctore polenta imposita commoda est. Amplius verò & æsypum, atque ipsæ adeo lanæ sordibus sudoris succidæ eodem modo: magis autem propriè similaginem ex aqua pro cataplasmate imponens, aut organum cum polenta. Hęc quamuis alterius negotij, atque operis sint, hic tamen adscripta, nihil incommodi afferent. In mediocribus autem capitis vulneribus, aut quibus omnino legitimo medico non opus est, in quibus nuditas per se non adest, pilos rademus, fibulisque impositis constringemus, ac glutinantibus experimento cognitis utemur, ut Archigeni visum est; quanquam nec hoc ad præsens negotium attineat.

Cap. 1.
Vide Gal.
2. de comp. me-
dic. sec. loc. c. 1.
& 2.
comp. sec. loc.
cap. 2.

Si alterius par-
tis primo affe-
ctæ consensu do-
lor capitis fiat,
curandi ratio.
Gale. loco cita-
to.

Aet. li. 6. c. 45.

Cura doloris
capitis geniti in
febris.
1. ad Glauconē,
cap. 5.

L I Q V E T etiam quoniam non perpetuò capite primario affectu labo-
rante, dolor accidit, sed interim etiam condolescit aliqua particula
prius affecta, velut ventriculo iocinore, aut stomacho, aut alia quapiam.
At quia sic vexatos sanare licebit nihil capiti adhibentes, verum his ip-
sis prius affectis partibus auxiliantes, Galeno, & Aetio testibus; propterea bo-
na fronte huius curationem prætermisimus. Patebit namq; cum de harum par-
tium affectionibus verba faciemus.

E V E N I T etiam capitis dolor ijs, qui uehementer febricitant: in qui-
bus diligenter considerandum erit, num crisis ratione, an non oriatur.
Nam si sanguinis fluxum, aut uomitum decretorium significabit, re-
media quærenda non sunt, Galeno teste 1. de arte curatiua ad Glauc. Quo-
niam ea (Tralliano auctore) quæ admouerentur, præter quàm quod nihil
iunatur, etiam naturam subinde impedirent. At quando ex magnitudine
februm humores diffusi, ac veluti efferuescentes ad caput ascenderint, tunc
medicamenta adhibere est necessarium, Galeni præcepto eodem lib. 1. de
arte curat. ad Glauc. ut verò promptè illud distinguas, ac cognoscas, tria (ut
eidem Galeno visum est) consideranda erunt. Primum quidem species ipsa
februm. Secundo loco si sit ad salutem morbus decliuus, Tertio verò ac potis-
simum totius morbi tempus perpendas: num uidelicet in principio sit, vel in
incremento, vel in summo vigore. Febre namque non magnopere calida
existente, ac circa initia, præsertim si capitis dolor irruat, quin etiam febre
valida existente, cum indicationem non portendat, curandus is est. At si ipsa
valde uehemens, fuerit, adtintque salutis signa, superueneri tōq; capitis dolor
cum

cum ipsa propè indicationem venerit, tunc nihil tentare oportet medicamen-
ta adhibendo: & si Galenus iusserit hæc perpendenda esse pro notitia morbi
num per excretionem crism sit habiturus: poterunt quoque ad hanc cogni-
tionem transferri: maxime verò totius morbi tempus considerandum erit.

In his ergo capitis doloribus, qui in principio cum febribus irruunt, vena se-
canda est post primam, aut secundam remissionem, Galeno, & Aetio testi-
bus (nisi quid impediatur) & præsertim in corporibus bonæ habitudinis, &
multo sanguine refertis. Animaduertendum autem, num ob vapores a ventre
sublatos, aut ob alui suppressionem capitis dolor contingat. Quod si serius
post septimum tandem irruat diem talis capitis dolor (qui crism non signifi-
cet) præuacuata aluo per clysterem notabiliter, cucurbitæ occipitio, vel
cervici affigendæ sunt, & capiti rigationes admouendæ erunt; quæ vim repel-
lendi obtineant, frigidasque qualitates, ac vires, ut rosaceo quidem in calidio-
ribus, ac hora æstiva, & cum exiguo aceto, chamæmelino verò, aut anethino
frigidioribus habitudinibus, ac hyeme, quinta aceti parte adiecta. Aliæ in-
super infusiones, quæ ex papauerum capitibus constant, expediunt, ex Gale-
ni sententia, eodem 1. de arte curatiua ad Glauc. quarum materiam ubi de cura
doloris capitis ex calida intemperie, seu bile orti, tractauimus, inquiras. Nec
minus si deficientibus medicamentis indigeant, ea reperies eo loco, quo
de cura doloris capitis ex pituita orti verba fecimus: perseveranti tamen ve-
hementer dolore, hyoscyami folia viridia, aut papaueris cum rosaceo, pauco
aceto, ac micis panis, syncipiti, & fronti approximanda erunt. Reliquæ vero
ad capitis dolores ob febris magnitudinem obortos, medellæ ad tractationem
de febribus pertinet. Restat ultimo loco amuleta, quæ capitis coronæ modo
circumposita, & alligata dolorem eius arcent, conscribere, Archigenis au-
thoritate: quæ quidem nullam medicam rationem habent derelinqentes:
quæ vero ab eo iuxta medicam rationem tradita sunt, referemus. Horum
vnum est, polygoni duos ramulos coronæ modo imposito, præsertim si ex
ardore, seu ebrietate dolor capitis contingat. Aliud, cichorium ægri capiti
imposito, maximè si ex ardore, seu etiam ebrietate doleat. Rosacæ iterum
coronæ eosdem iuuant, Galeni auctoritate. Callitricho quoque coronare
caput conducit, quod adianthum appellatur. Philanthropo etiam herba ap-
pellata coronari caput Archigenes iubet. Liberat item a capitis dolore ver-
benaca herba, tum coronæ modo circumposita, tum illita ex rosaceo, & ace-
to. Testudinis quoque palustris sanguis syncipiti instillatus capitis dolorem iu-
uat, herbæque plantaginis radix in collo suspensa capitis dolorem mirificè tol-
lit, ut cap. de Arnoglossa testatur Apuleius Madaurensis.

Venæ sectio.
Gal. loco citato
Aet. lib. 2. c. 47.

Cucurbitulæ.
Topica.

cap. 15.

Amuleta.
Vide Gal. 2. de
comp. med. sec.
loc. cap. 2.
Gal. loco citato

περί κεφαλῆας.

De cephalæa. Cap. II.

GRAVIS quidem affectus, vehementer dolorificus, diuturnus, ac dif-
ficulter solubilis nonnunquam euenit in capite, a græcis κεφαλῆα,
pariter & a latinis nuncupatur. Qui capitis dolor ex facili occasio-
ne vehementes habet accessiones, Gale. auctore tert. de loc. aff. & 2. de
comp. medic. secund. locos: adeo ut neque strepitus neque vocem uehe-
mentiore, neque lumen splendidum, neque vini potum, neque medicamen-
ta caput repulgentia tolerare possint ægri; neque item motum: sed in quiete,
& tenebris, ob doloris uehemētiam decumbere uoluit: tanquā a malleo enim
se percuri arbitrantur nonnulli: alij caput frangi, distendique sentiunt: non
paucis uero usque ad oculorum radices dolor progreditur. Habet autem hæc
affectio aliquando quidem continuos dolores; aliquando uero exacerbatio-
nes, & interualla, siue ordinata, siue inordinata. Intermittunt enim quando-
que

3. de loc. affect.
c. 9. in princ.
2. de comp. me.
sec. loc. cap. 2. in
prin.
Signa.

Lib.i.c.i.
Cur uehemen-
tius feminas te-
neat.

Quibus cum ce-
phalalgia con-
ueniat, & diffe-
rat,

causæ.

curandi ratio.

Venæ sectio.

Purgatio.

Topica.

2. de comp. me.
sec. loc. c. 2.

Cap. 2.
post prin.

que eiusmodi exacerbationes, velut incomitiali morbo apprehensis, interce-
ditque tempus, quo perfectè liberati uidentur: sed uehementius foeminas te-
net, ut inquit Cœlius Aurelianus, ob diligentiam capillorum. Constat igi-
tur, quod sicuti in cephalalgia, sic etiam in hac affectione consimilem aptitudi-
nem capitis habent ægri: quia uidelicet facillimè ipsum afficitur, aut propter
ipsius imbecillitatem, vel propter sensus exuperantiam. atque hoc est ipsis
commune. Verùm differunt, quod per cephalæam affectæ capitis partes mul-
to redduntur, quàm in cephalalgia debiliores: & ueluti cephalalgiam patien-
tibus quibusdam capitis inuolucra dolore afficiebantur, aliis pericranium, id
est, exterior caluariæ membrana: ita quoque in cephalæa contingit, prout
quidam quibusdam promptius has, uel illas capitis partes aptas habent, ut af-
ficientur. Discrimen autem num interne uidelicet capitis partes, aut exter-
næ afficiantur, ab oculorum radicibus similiter sumitur, ut de cephalalgia di-
ximus: considerando scilicet, utrum ueniat ad eas malum, nec ne. Totidem
insuper causæ eius esse possunt, quot de cephalalgia narrauimus, externis post
habitis, ex quibus rarò contingit hunc affectum generari, similiq; via, ac ra-
tione inuestigandæ ipsæ sunt: diligenterque animaduertendum est, atque at-
tendendum ex qua causa originem trahat, Sic nanque affectus ipse arte fa-
cilis solui poterit. Quapropter nec uictus ratio diuersa præcipienda erit
ab ea, quam in prædictis capitis doloribus præcepimus: imò eadem pro cau-
sarum similitudine. Similiter & curandi ratio. Nam si humorum, aut uapo-
rum multitudinem causam esse reperiēs, siquidem propter totius corporis re-
pletionem facta est, uniuerso corpore euacuato, capitis dolorem sanabis. Qua
de re venam secare oportet, si vires ferant: incidendaque est aut media, aut ue-
na cubiti eterna: & acrioribus uti clysteribus conuenit. Et si adhuc sanguis
videatur redundare etiam ex naribus aperta vena, quantum sanguini satis
esse uideatur, detrahes. Si verò uelut debile existens caput ad se sublato hu-
mores, ac vapores excipiat, materiam reuellere oportet in totum corpus, at-
que ita particule mederi. Fiat itaque reuulsio per clysteres, & ligaturas ex-
tremorum, ac plures infernarum partium confriktiones. Interdum etiam
(vbi nihil prohibeat) sanguinis ex cubito detractione utendum erit, mox pur-
gare corpus conuenit ex aliquo iam dictorum supra medicamentorum. Post
cuius corporis totius euacuationem, seu purgationem, tutò ad ea, quæ caput
euacuant, accedes, aphlegmatismos uidelicet, & medicamenta alia, quæ nari-
bus induntur, de quibus supra mentio facta est. Caput autem curabis repel-
lentibus irrigationibus primò deinde his quæ digerendo, seu diſciendo ca-
put euacuant; admotis demum his, quæ firmantem ei addere possunt. Repul-
lit nanque eum omphacinum, & rosaceum per se, & cum aceto illutum; & quæ
his sunt similia: de quibus in præcedentibus abundè diximus. Discutit
autem oleum dulcissimum calidum, & magis inueteratum, chamæmelinum,
seu anethinum: si verò crassior sit humorum multitudo, spondilium, aut pulegij
comam, si simbrum, aut folia lauri, metham, seu calamintham in oleo con-
coquas, capitiq; adhibeas. Sic nanque multitudinem euacuabis. eadem hæc
etiam firmitatem parti addunt, iuxta Galeni sententiam. Quapropter vsque
ad perfectam curationem eis, uti conuenit. Omnium verò longè maximè di-
scutit, & perfectè corroborat verbenaca recta, præcipuè uiridis, imò & arida
cum radicibus, & simul cum serpyllo oleo incocta, si ex ea caput perfuderis.
Quin & ipsam per se verbenacam si oleo incoxeris, caputque inde rigaueris,
omni capitis dolori antiquo ex frigiditate, aut ex crassis humoribus orto me-
deberis, eodem Galeno teste secundo de compositione medicamentorum se-
cundum locos. Maximè etiam profunt sub aquario vase nascentes aselli,
millepedæ appellati, si oleo incoquantur. Et hæc de cura cephalææ ex ple-
nitudine

cognitionem conuulsionis primario ortæ: de qua, iuxta Galeni sententiam loquutus fuit Hippoc. apho. 39. sexti libri, cum dixit. Conuulsio fit vel ex repletionem, vel inanitione. Verum præter hanc conuulsionem, alia quædam est conuulsio, quæ per consensum accipit, eodem Galeno teste commento apho. 1. quinti libr. & tertio de locis affect. hanc iuniores medici barbare loquentes, spasmodum non proportionatum ad materiam vocant; cum neque ex plenitudine neruorum partium, neque ob inanitionem earundem originem ducat, sed vel à qualitate quadam, alteratis per continuationem partibus; & proinde ad neruorum principium ascendente, aut à spiritali quadam substantia per iam dictas neruofas partes transmissa fluida, aut veluti ara, quæ licet mole minima facultate tamen quam maxima sit, & ad neruorum principium delata; propter quod huiusmodi motu ipsum concutitur, ut à se expellat quidquid fuerit id, quod à parte primo affecta ad ipsum effertur. Huius verò causa non modo externa esse poterit, ex scorpionum videlicet, phalangiorum, aut alterius venenosi animalis ictu, verum etiam ex quapiam interna causa: ex qua similis assentia, generari poterit, non accedente causa extranea, velut Pelopis auctoritate Galen. 3. de loc. affect. decretum reliquit. Hæc inquam ubi neruofam aliquam partem occupauerit, per continuas partes (ut diximus) usque ad neruorum principium transferri poterit: ac conuulsium motum (modo quo diximus) excitare. Hanc conuulsionem haud egre percipies ex cogitatione partis primario affectæ: cuius modum in vniuersali capite docuimus. Quod si ab externa causa ortum ducat, eam ab egro, aut astantibus discas. Si vero uerum nulla præcesserit, internam esse putabis: quemadmodum per consensum cum ore ventriculi ubi fortius morderetur ab æruginoso humore, qui potius exacta ærugo dici poterat, in quodam adolescente obseruabit Galenus; cui cum totum corpus conuulsus esset egrugine per uomitum vacuata febris statim, & conuulsio cessauit, prout testatur comento apho. primi. 5. libr. 12. meth. med. & 5. de loc. affect. Atqui si quis velit & hanc quoque conuulsionem per consensum genitam, ex inanitione conuulsionem nuncupare, cum humores mordaces vim habeant exsiccandi, ut Galenus inquit commento apho. primi 5. libr. non reclamamus. Verum non adeo exitialis erit, quemadmodum ea conuulsio quæ proprie ex inatione gignitur, ob defectum scilicet humidæ essentia partium neruorum: sed curari utique posset, quia ex siccitate duntaxat, & non ex siccitate, quæ est ab humidæ essentia defectu, & vacuatione ortum ducit, ut videre licet apud eundem Galenum, cum commento prædicti apho. tum eodem 12. meth. med. in fine: & hoc modo intelligendo, quælibet conuulsio tam quæ primario, quam quæ per consensum oritur, erit, ac dici poterit de repletionem, aut de inanitione. ab immodico item frigido si conuulsio fiat, velut Hippoc. apho. 17. 5. libr. & Galen. xii. meth. med. visum est; ex plenitudine dicenda erit, quoniam neruorum corporum substantiam cogens ac constringens, frigidum ad diffundendum difficilia efficit, & propterea ut repleantur, causa est, Galen. teste comm. apho. 13. 6. libr. quanuis si corpus siccum fuerit, & superfluis carens, possit ex frigore conuulsio ex siccitate fieri, nam penetrans in interiores partes corporum neruorum exugit, ac exprimit eas, & hac ratione sicciores eas reddit, ac inanit, ut Philotheo placuit commento eiusdem apho. 17. 5. libr. Maximum tamen ac fere insanabile malum est conuulsio si ex inanitione proprie fiat, ut Aetio & Paulo visum est, curatu per difficile uel potius quod curari omnino non possit, si febris occasione potissimum contractum sit, cum prius sic affecti perierant tempus excogitandi remedia negantes: quemadmodum Galenus 12. meth. med. & in fine libr. de palpi. rigore, tremore, & conuulsione scriptum reliquit. Verum qui à conuulsione, aut distensione neruorum tenetur ex reple-

De conuulsione
quæ per consensum fit.
3. de loc. af. c. 7.

Diuersæ causæ
eiusdem.

Loco citato.

12. meth. c. 8.
in fine.
5. de loc. af. c. 6
in fine.

12. meth. in fine.
1. cap. 8. in fine.

Prognostica.
Aet. li. 6. c. 18
Pau. lib. 3. c. 19.

12. meth. in fine.

Prope finē lib.

3. prorrh. te. 17.
Act. lib. 6. c. 39.

Lib. 3. c. 19.
Cōuulsionis ex
inanitione cu-
ratio.

Ratio uictus.
Loco citato.

Medicamento-
rum ratio.
Citato loco.

Curatio cōuul-
sionis ex reple-
tione.
Cap. ultimo.
Act. lib. 6. c. 39.

ne, Hippoc. auctore 37. apho. 4. libr. febre superueniente liberatur, eadem die, aut sequenti, aut omnino tertia; vt patet libr. de loc. in homine. Et idem auct. apho. 26. 2. libr. dicebat, febrem conuulsioni superuenire melius est, quam febri conuulsionem. Et in epistola ad Demetrium dicebat. Conuulsiones omnibus morbis atre bilis succedentes atram bilem sedant: faciles quoque eas esse ex ytero affecto, si sine febre sint, liquet in prænotionibus. Aphorismo vero sexto, quinti libri de tetano sic decretum reliquit. Quicunque tetano corripiuntur, in quatuor diebus pereunt: si verò hos effugerint, sani fiunt. Reddit Galenus causam in commento, quoniam tetanus morbus peracutus est, ut qui cōpositus sit ex emprosthotono, & episthotono. Et propterea citius in ipso fit iudicatio, non tolerante natura longiori tempore tensionis laborem: quo fit, vt in primo circuitu dierum indicatoriorum passio iudicetur: quanuis neque pueris, neque senibus conuulsio fiat tetanica, Aetio teste. At apho. 1. quinti libr. Conuulsionem ex helleboro letalem esse dixit, & secundo eiusdē lib. conuulsionem ex uulnere letalem efferuit. Nam Galeno interprete, ex uulneribus conuulsiones, ratione sequentis ipsa inflammationis fiunt, vbi partes neruosas attigerit. Et primum quidem videntur conuelli, quæ à directo sunt partium inflammatione laborantium: deinde cum & principium attigerit, passio ad totum extenditur corpus: toto vero vniuersum corpore ab affectu immuni, si laborum, aut palpebra, aut lingua contrahatur, graue symptoma existimandum est, ut Paulus asserit, quod maxima inuehat pericula: licet exiguae partes affectæ videantur. Cæterum quantum ad curationem spectat, scire licet conuulsionem ex inatione, & siccitate ortam (si modo ea curari possit) humectationem poscere, Galeno teste duodecimo meth. med. vniuersa igitur uictus ratio, quod humida sit, oportet. Proinde aer ad humidum vergeat. Somnus præcipiatur consueto longior. Quiescat æger: ab immodicisq; animi affectibus caueat: ac nutriatur cunctis cibis humectantibus, ac sorbitionibus pinguibus, cōcoctu facilibus, ac probe nutriētibus: quiq; facile per omnes corporis partes distribuuntur. Quare contuse pullorum, seu gallinarum, aut phasianorum carnes, & prædictorum aqua carnis quoque tribuatur: siue ex carnibus agnorum, hædorum, aut castratorum: in quibus quandoque ponantur humectantia olera: præsertim si siccitas cum caliditate fuerit permixta. Carnibus quoque prædictis vesci poterunt cum prisana haud humidis oleribus decoctis. Deinceps cum cibis interim vtantur oleo amygdal. dulci, ac saccharo. Pro potu (immodica non affuerit caliditas) vino vtantur tenui, aquoso: quod si febris, ac immodicus calor affuerit, pro potu eligatur aqua hordei, aut aqua, in qua glycyrrhizæ parum, aut cinamomi fuerit decoctum, vt promptius aqua penetret: seu violaceus syrupus permisceatur. Oleo insuper dulci, aut amygdalino, seu hydrelæo calido eos fouere cōpetit, Pauli auctoritate: & si nihil prohibeat, etiam ad lauacrum tepidum eos deducere conuenit dulcis aquæ: post quod aliquo iam dictorum oleorum corpus unguendum erit, tepido eo existente. Frictione lenissima, temperatoque solio vtendum. Insuper post balneum, quibus ipsum competit, ac citra balneum quibus non competit, egroto lac recenter munctum præbendum erit, quantitate congrua, abninum, siue caprillum, pauco addito saccharo, si febris non aderit, aut si ea admodum exigua fuerit. Conuulsiones vero quæ succorum copia, aut inflammatione fiunt, liquido curabis, illam vacuans, huic proprijs ipsius auxilijs adhibitis, auctore Galen. libr. de trem. rigore. palpit. & conuuls. ac post eum Aetio teste. Qua de re nos eius conuulsionis, quæ ex plenitudine ortum ducit primo curationem præcipiemus: deinde ad eam, quæ ex inflammatione excitatur, deueniemus: posthabita tamen ea, quæ ex plenitudine simpliciter dicta oritur. Nanque eius patebit curatio, cū de conuulsione

orta

orta ex inflammatione verba faciemus: cum vtriusque similis quodammodo curatio sit, præsertim quoad vniuersalia spectat. At si ex aliorum succorum redundantia nervosis partibus repletis, conuulsio fiat (potissimum si a frigidis, ac glutinosis, ex quibus nerui ipsi nutriuntur) hac ratione erit curanda quæuis iam dictarum specierum fuerit: cum omnes eadem ratione curentur, Celso auctore eodem cap. 3. lib. quarti. Proinde aer ad calidum, & siccum vergens eligatur. Ideoque in eo conclauis, in quo cubabit eger, eiusdem Celsi decreto, ignis continuus esse debet, maximeque tempore ante lucano; quo præcipue frigus intenditur: cum ipsum frigus apprime cauendum sit. Quinimo libr. de loc. in homine, conuulsioni sic mederi oportet, inquit Hippocrates, ignis ab vtraque lecti parte succendatur, & mandragoræ radix in potu præbeatur minore pondere, quam quod insaniam facit: & ad tendines posteriores sacculi calidi imponantur. Somnus sit mediocris: diurnus tamen fugiendus. Quies ægro præcipienda erit; atq; parres, quæ cotrahuntur, valenter continendæ sunt, & inordinatis resistendum moribus, Paulo teste. oleoq; perfrire eas oportet rutaceo, aut veteri, aut quodam ex hoc genere. Alius sit lenis. Gaudeat insuper æger; & anni perturbationes aufugiat: primisq; tribus diebus tenuissimo vtatur victu. Nam dicebat Celsus, sed diu vitandus cibus, quisquis madendus est, & sorbitionibus vtendum. Proinde cur solius aquæ mulsæ, aut pauco prisanæ cremore contentus sit. deinde ouis sorbilibus cibetur, aut a gallinarum pullis mollibus ius aliquod assumendum. in quo hyssopi, aut serpylli, saluæ, sampsiuci, betonicæ, aut satureiæ parum fuerit decoctum. Assisq; interdum carnibus gallinarum, pullorum, phasianorum, perdicum, aliarumque auium montanarum vesci poterunt ægri: vuaeque passa, ac pineis. Potus, præter id quod exiguus esse debet, aqua mulsæ eligatur: cui etiam saluæ parum, aut cinnamomi fuerit incoctum. A uini autem potu, præsertim circa initia, abstineant. Nam, vt inquit Celsus, eius usus præcipue periculosus: ideoque in longum tempus differendus est. Licebit tamen eo vti, vbi affectus bene processerit; in parua tamen quantitate: cū & ipsum extenuando, ac calfaciendo conferat, Galeno teste commento autho. 3. libr. Auspicandæ; statim eius curatio a venæ sectione erit, modo non penitus a sanguine secretus, pituitosus fuerit succus redundans, cunctis alijs consentientibus. Sanguinem autem afferre conuenit ex media cubiti vena, non vniuersum, sed pluribus (si opus fuerit) vicibus: cum taliter affectis non tantum mittere sanguinis oportet, quantum exigit morbus, sed aliquid symptomati est relinquendum, Galeno auctore primo de arte cur. ad Glauc. cuius causa sæpe sudores eueniunt, & vigilie molestant, & ægroti vires debilitantur, vt ipse inquit. Quod si sudores euenerint, linteis oleo madentibus abstergere conuenit, vbi refrixerint, Paulo auctore. Partes insuper, quæ conuelluntur, valenter continendæ sunt, vt diximus, atque prædictis oleis perfricandæ: acribusque clysteribus vtendum erit. At si pituitosi succi redundantes citra sanguinis permissionem fuerint, hi primo extenuandi, calfaciendi, ac incidendi erunt, adeo vt ad expulsionem idonei sint. Denum purgans medicamentum præbendum erit: præparabis autem aqua mulsæ cum hyssopi decocto, aut saluæ, melle rosaceo, aut syrupo ex stœchade, cum aquis betonicæ, aut sampsiuci. Purgabis vero catapotis foetidis, aut ex sagapeno, cum agarici additione: excipiens pilularum prædictarum foetidarum, aut ex sagapeno 3. i. vel scrup. iij. agarici trochiscati 3. i. vel scrup. ij. & cum aqua betonicæ, melle rosaceo, aut syrupo ex stœcade catapotia fiant. Post quorum assumptionem per aliquod spacium syrapi ex pluribus infusionibus rosarum rubearum, aut persicarum cum aqua betonicæ, & borraginis diluti vnc. ii. iij. vel iij. exhibere poteris, & si opportunum erit, iteranda purgatio erit, præparatione tamen præcedente. At si videbi-

Victus ratio.

Loco citato.

citato loco.

Venæ sectio.
quando compe-
tat.cap. 14. prope
principium.

Purgatio.

Quæ post pur-
gationem tribu-
enda sint.
Aet.li.6.ca.39.
Pau.lib.3.c.20.

Topica,

loco citato,

Citato loco,

tur alijs purgantibus medicamentis uti, ea requiras cap. de cura doloris capi-
tis ex pituita. Huius quoque conuulsionis optimum præsidium est febris su-
perueniens, quæ per initia non fuerit, velut auctoritate Hippocratis, & Ga-
leni aphorif. 26. 2. lib. liquet, & testatur Paulus cap. 20. 3. lib. Communis
quoque non modò distentionis, sed cuiuslibet alterius conuulsionis ex ple-
nitudine ortæ sine ulceratione iuuenibus bene carnosus, ac ætate media cu-
ratio ab Hippocr. & Galen. aphorif. 25. 1. lib. præcipitur. Hæc autem est
multa frigida aquæ perfusio: quæ caloris reuocationem faciens, cum in præ-
dictis fortis fuerit, propterea ex accidenti affectum sanat. quamquam Pau-
lus hoc præsidium damnet, tanquam periculosissimum. Ipseque vitandum
censeo, nisi cuncta, quæ diximus, consentiant. Succurrit tum ipsis conuul-
sis succi centaurei tenuis potus, aut acanthij radices 3. i. vel .ii. cum aquæ
mulsæ unc. ii. vel .iii. vel mirrhæ, seu castorij 3. i. castoreum nanque omnium
securissimum, expeditissimum, ac maxime efficax est, Aetio, & Paulo te-
stibus. quod si robusti sint, panacis liquoris aut ammoniaci tantundem
cum aqua mulsæ bibant, Caput quoque purgandum errhinis, ac apophleg-
matismis, cap. de memoria deperdita, ac de dolore capitis ex pituita iam
dictis: & si opus fuerit, acrioribus quoque utendum. Antidoti quoque
anacardine, theriacæ, mithridati, diamoschi, aut diambæ 3. i. cum aqua
mulsæ præberi poterit. Cervix insuper, ac tota spina inungendo ex oleo
de castoreo, nardino, costino, de nuce muscata, aut de piperibus, aut hi-
perici, vel de vermibus terrestribus parato, separatim, aut permistis, prout
videbitur, castoreumque tritum inspergendum: & ubi perunxeris, deinde
admouere vesicas bubulas, vel vtriculos oleo calido repletos, præcepto
Celsi: oleoque veteri, vel adipe quàm vetustissimo cervicem, scapulas, &
spinam perfricare oportet. Frictio nanque cum omnibus in homine ver-
tebris utilis sit, tum his præcipue, quæ in collo sunt. Propterea die, no-
cteque (interpositis tamen quibusdam temporibus) hoc remedio uten-
dum erit, eodem Celso auctore. Dum autem id intermittitur, cataplas-
ma locis iam dictis adhibeatur: Cuius materia sit, ut Aetio visum est, fœ-
num græcum, & semen lini, farina hordeacea, ac liliacea: quibus resina te-
rebinthina addatur, galbanum, & mel ac oleum multum, in quo deco-
cta fuerit ruta, conyza, artemisia, aut libanotis. infarciaturque aliquan-
do ammoniacum, sit tamen mollissimum, ac leue cataplasma; eoque in-
cumbente prædictas vesicas oleo calido semiplenas desuper adhibeas; ne
cataplasma infrigetur; aut calfactos sacculos ex sale, seu ex milio super-
imponas. Neque erit inutile, præsertim si cerebrum affectum sit, caput
attonsum habere, idque irino oleo calido, aut iam dictorum aliquo made-
facere: demum adeo ipsum velare, ne infrigidetur: sacculumque superim-
ponere ex floribus stœcadis, hyssopi, samoluciac serpylli folijs, casto-
reo ac macere confectum. Vitandæ tamen erunt assidua capitis irriga-
tiones: caput enim inde repletur. nonnunquam etiam congruum erit in ca-
lidum oleum descendere, ac balneari ægrum, vel in aquam calidam, in
qua fœnum græcum decoctum sit, saluiæ, seu rutæ folia, & adiecta olei
pars tertia; non tamen diutius in eo immorari: nam, ut inquit Paulus
in oleum descensus maxime vires deijcit Conferunt quoque ex aquis sul-
phureis, & aluminosis balneæ. Conuulsæ quoque partes pellibus lupo-
rum, aut uulpium vestiri debent. Si uero vehementius dolor increue-
rit admouendæ cervicibus cucurbitulæ sunt, sicut cutis incidatur, Celsi
præcepto. Inquit Marcellus cap. 18. opisthotonicis, & teranicis lotium
caprinum cum aqua mixtum efficaciter prodesse, si ieiunis potui detur:
pariter si castorij, piperis albi, & petroselini æquales portiones simul
tundes,

tundes, & cribrabis, atque inde cochleare unum cum uno cochleri mellis, & aquæ calidæ cyathis duobus ieiuno ad diem dabis: summum opisthotonicis esse remedium, & multis experimentis probatum ait, nec minus & arthriticis conferre. At si ex plenitudine, seu inflammatione conuulsio excitetur, uena secanda erit, liberaliterque sanguinem auferre conuenit: modo pluribus uicibus id fiat, ut diximus; & non uniuersim, propter iam assignatas causas. Deinum clysteribus, eisque acribus utendum: modo non adsit quod impediatur, unum, aut alterum. Quod si inflammatio non cedat, eis utendum erit medicamentis, quæ inflammatio ipsa exigit secundum diuersa eius tempora, indicatione, quæ à parte affecta sumitur, non neglecta. horum medicamentorum meth. à Gal. 13. meth. med. scriptum reperies: aut eorum copiam lib. de simp. medicament. facult. requiras. Quæ uero per consensum conuulsio efficitur, curata parte primario affecta & ipsa quoque curabitur conuulsio: uelut si ex rodentibus succis os uentriculi infestatus conuulsio fiat; his per uomitum euacuatis, conuulsio sedabitur, si opus erit dando illi aquam tepidam bibere: quemadmodum Gal. adolescentem quendam simili conuulsione correptum 12. meth. med. se curasse restatur. At si ex phalangiorum, scorpionis, aut alterius uenenatæ feræ ictu conuulsio excitetur: ad hanc rem in primis Gale. auctoritate tertio de locis affect. conferunt uincula superioribus partibus iniecta: ab his enim præsentaneam præsidium expectatur. Et si in aliquo digito ictus fuerit, is confestim rescindendus erit: nã ex hoc saluus euadet; quemadmodum nonnulli rustici, quorum eodem loco Gal. meminit, ex tali rescissione euaserunt, ac à periculo liberati sunt: potissimum si ex uiperis medicamentum potandum tribuatur 3. i. uidelicet exhibens cum pauco uino albo ac tenui. At si partem abscidendam tenuerit, facta ligatura, ut diximus, paulo supra affectam partem ipsi parti affectæ medicamenta, quæ uehementer attrahunt, adhibenda erunt: tum excaustoria, tum, quæ citra calfactionem id efficiant, ueluti cucurbitulæ: pariter cauterium, & medicamenta: quæ cauteriis similiter escharam efficiat, iuxta Galeni sententiam 13. meth. med. competunt: & si inueniri poterit quispiam, qui ore suo uirus extrahat, id quoque maxime confert: & ipse etiam Gal. theriacam supra affectam partem adhibere præcipit, lib. de theriaca ad Pisonem: cum & ea extrinsecus imposita uenenum trahat. aliaque innumera medicamenta pro diuersa animalis uenenosi ictu à Paulo, & Actio conscripta reperies: & proinde ea subticere libuit. Si uero ex immodico frigore conuulsio fiat, balneis, unctionibus, frictionibus ac reliquis calfacientibus medicamentis haud æget curabitur.

Curatio conuulsionis ex inflammatione oritur.

13. meth. c. 16. & seq. Conuulsionis per consensum generatæ curatio.

Cap. ultimum.

Cap. 7.

Cap. 6.

Cap. 16.

Paul. li. 5. Act. li. 13.

περί τῆς παλύνσεως De resolutione Cap. 14.

QUOD is affectus, qui à Græcis πάρεσις, seu παράλυσις dicitur, à Latinis resolutio nūcupetur, neque unus est, qui nō admittat. Ve si nūquid ubi motus deperditus est, aut partium aliquarum sensus perit, uel cum tum sentiendi, tum mouendi, amissa fuerit, resolutio ea affectio appelletur, non ita liquido constat. Nam Gal. cum tertio de locis affectis tum 1. de caus. sympt. neruorum resolutionem appellat, cum & sensus, & motus amissos fuerit. Cæterum idemmet eodem 3. lib. de loc. aff. dicebat, per neruorum resolutionem interdum sensum duntaxat, interdum motum, nonnunquam ambo simul perire Deinceps subdit. Itaque neruorum resolutio potissimum dicitur ubi motus deperditus est. Vbi uero partium aliquarum sensus perit, eam partem sensus expertem esse: resolutam uero non adeo dicere consueuimus, & si nonnulli hanc affectionem sensus resolutionem uocitent. Ex quibus liquet, interdum Gal. motus deperditionem, interim sensus duntaxat,

3. de lo. aff. c. 10 post principium. 1. de caus. sym. cap. 5. in fine. 3. de loc. aff. c. 10. post me.

taxat, nonnunquam amborum simul amissionem, resolutionem nuncupare: quanquam potissimum resolutio apud eū dicatur, ubi motus deperditus sit.

Aet. lib. 6. c. 18.
Paul. li. 3. c. 18.
Alex. li. 1. c. 10.

Nervorum reso-
lutio quid sit.

At qui eius uerba bene perpenderit, eum sentiisse reperiet, exquisitam, seu ueram resolutionem nuncupare, cum tum sensus, tum motus uim partes amiserint. quam sententiam sectati sunt Aetius, & Paulus, nec non & Alexander Trallianus. Insuper nec negare uidetur, ubi motus, aut sensus, duntaxat pereant: posse non ueram, nec exquisitam sed tamen resolutionem appellari, nec minus collationem faciens inter motus, & sensus deperditionem, asseruit potissimum dici nervorum resolutionem, ubi motus deperditus fuerit. Erit igitur iuxta Galeni decreta, exquisita nervorum resolutio, cum motus, tum sensus amissio: non si quidem nervorum omnium totius corporis: nam huiusmodi affectio apoplexia appellatur, ut infra dicemus: sed ubi alteri laterum, dextro, aut sinistro, aut in aliquo particulari membro id euenit. Quanquam si alteri alterum accidat, resolutio nominabitur, eius scilicet partis, in qua consistit affectus, interdum dextræ, interdum sinistræ.

Locis citatis.

Cur in nervorū
resolutione in-
terim motus, in-
terdum sensus,
duntaxat, quā-
deque ambo pe-
reant.
1. de loc. aff. c. 6
1. de caus. sym.
Cap. 5.

At si in aliquo membrorum idem euenierit, ut in manu, uel crure eiusdem membri resolutio osse dicitur: quamuis & ubi pereat motus duntaxat præcipue, aut sensus, resolutio quodam modo appellari possit eodem modo, ut diximus: id quod etiam confirmavit Cælius Aurelianus lib. 2. cap. 1. cum dixit, Sed est, vel fiet paralytis, nunc sensus, nunc motus, nunc utriusque.

Nec prætereundum erit quod Galenus eodem 1. lib. de caus. sympt. & 3. de loc. affectis, de tertia quadam specie, seu resolutionis differentia pronunciauerit; ubi ex aliqua facta spinali medullæ dispositione ualida, circa primum eius processum, aut reliquis eius partibus omnes æqualiter corporis partes suppositæ resolutæ fuerint, siue ob luxatam aliquam spinæ uertebra. At qui fiat, ut in nervorum resolutione interim sensus pareat, illæso seruatō motu; interim motus, illæso sensu; nonnunquam utrique percant: quanquam Galenus primo de loc. affe. & primo de causis sympt. illud enodauerit, cum eius uerba obscura aliquantisper uideantur, tyronibus præsertim, hic explicare libuit. Illud prius tanquam manifestum, ac luce clarius in eiusdem Galeni doctrina supponentes; quod tam motrix, quam sensitiua facultas a cerebro tanquam a fonte, & parte principe ad motus, & sensus instrumenta per nervos delabitur: qui ex ipso cerebro orti eandem cum ipso substantiam habent, nisi quatenus compactiori materia sunt constituti, ne facile à quolibet parerentur. Quo fit ut, eatenus à cerebri natura recessisse videantur, quatenus ex compactiori materia constituti induruerunt: qua ratione assiduo cerebri auxilio indiguerunt. Nam si tales, quale est cerebrum prorsus remansissent, nulla eius ope indigissent. Natura enim ita comparatum est, Galeno teste 7. di Hipp. & Plat. decretis, ut substantiarum proprietates facultatem etiam sibi convenientium proprietates secum habeant. Vnde fit ut quantum unusquisque nervus à natura cerebri recesserit, tantum etiam sit à uirtute, facultateque eius remotus. & sic omnes cerebri continuitate, recentique semper, ac assidua ab eo informatione indigeant, uelut circumfusus nobis aer continuo fulgore illustratur. & non in semel accepta mutatione perseverat: ut pote qui dum cōtinuam accipit mutationem illustratur: nec sublato illustrante, lux in eo permanet, sed statim fulgor cum illustrante euanescit. Non ab re igitur, si continua, ac recentiam dicta informatione à quauis causa impedita, & facultas quoque à principe parte missa intercipiatur, ne ad animalis tum sensus, tum motus instrumenta pertiāseat, pro ratione diuerforum nervorū affectorū. Qua de re in his partibus quæ duplici nervorum genere participant, ut in lingua, & oculis, nihil habet ambiguitatis quod moueātur quidē sed nō sē tiāt aut illēta sentiēdi facultate, rursus nō mo-

Cap. 9.

Responsio.

ueantur

ueantur: & utriusque simul affectis generibus neruorum nec mœueantur, nec sentiant. Verum in quibus membris duntaxat nerui inueniuntur, si abla-
ta cute subiectus musculus, qui nudus est immobilis uideatur sentiant uero
tangentes, exigua ei noxam accidisse putandum est. At si uehemens fue-
rit uicium, sensum, & motum simul lædi contingit. sensum uero obledi, ser-
uato quidem motu in tali musculo, fieri nequaquam potest tanquam liqui-
dem musculus ipse animalis facultatis partem suscepit, quanta ad sensus exci-
tationem sufficiat; ad eius uero motum non sufficiat: quippe tactionis sen-
sus pati aliquid potius, quam agereprehenditur. Proinde ab exigua faculta-
te functio eis perfici potest, ut quæ non ita ualidis egeat uiribus sentiendi
facultas: & propterea nihil minus, imò etiam magis pati possunt partes, cum
debiles fuerint. Efficit enim imbecillitas, ut facilius affectio à sensu digno-
scatur, Galeno teste 4. de loc. affe. musculorum uero motus in agendo, non
in patiendō actionis efficaciam habet: quapropter plurima indiget animali
facultate. Nunquam igitur accidere deprehendes, ut moueatur quidem nudus
musculus, sed non sentiat: cum per eundem neruum & mouendi, & sentiendi
facultatem suscipiatur: sed aut sentit, & non mouetur, exigua existēte eius noxa,
aut neque mouetur, neque sentit cum uehemens fuerit eiusdem nerui uitium.
At si ad membrum aliquod, pro motu, nerui ad musculos inserantur; pro sensu
vero perficiendo, ad cutē perueniant (non enim qui per musculos dispersi sūt
nerui reliquias quasdam ad cutē impartiunt, ut quibusdā falsò uisum est) fieri
inquā poterit, ut interim sensus, interdū, motus, nonnūquā ambo simul pereāt.
Nam fieri poterit, ut adiacens illi cutis sensum amittat, eo affecto neruo, qui
ad cutem inferitur, ac per eam dispersus est: qui uero per musculos spargitur,
noxæ vacet: & proinde musculus ipse moueatur. At si is, qui per musculum
spargitur neruus offendatur, qui uero per cutem disseminatur, noxa vacet, non
mouebitur quidem membrum ipsum, quamuis sensum non amiserit. id uerò
ob hanc causam euenire solet, quòd neruus alterius lēsus sit, alterius uero
mansit illēsus: & si ab vno principio originem duxerint, fuerint tamen in
via diuisi. Quòd si utrique simul nerui afficiantur, & qui ad musculum deue-
nit, & qui ad cutem peruenit, simul & sensus, & motus pereunt: cum uidelicet
commune principium affectum fuerit. Scies autem hoc, ubi exquisitè cogno-
ueris communia ipsorum principia exquisitè considerando, num cerebrum
ipsum, vel spina sit affecta in eius principio, aut aliqua alia vertebrarum.
Hæc autem in neruorum dissectione percipiuntur. quare solus ille, qui in
his fuerit exercitatus exquisitè ea considerare poterit, Galeno restè primo
de locis affectis. Nam cum non perpetuò vnus pręfinitus afficiatur locus in
ipsa resolutione, sed diuersi affici possint, si cerebrum ipsum affectum sit, non
tamen secundum totum (quia apoplexia generatur) sed secundum partem
dexteram, vel sinistram dignosces: quoniam simul cum dextra, vel sinistra par-
te corporis, faciei quoque partes resoluuntur, dextræ, uel sinistræ. At si dempta
facie, vna prædictarum corporis partum sensu, motuque priuabitur, circa
primum spinæ processum affectum consistere conijces. Verum media pars
eius affecta erit, ea uidelicet, quæ superstat è regione resoluti lateris. Quòd
si omnia inferiora membra, facie excepta resoluantur eodem in loco, hoc
est, in eius initio ipsa spina offensa est, tanquam omnium neruorum commu-
ni origo, qui sub facie existunt: uerum non secundum partem sed ingenti af-
fectione laborans, tota affecta erit. At si accadat quandam duntaxat deter-
minatam partem resolutam esse, ea inuestiganda pars erit, a qua neruos su-
scipit: id quod in anatomice exercitatus haud obscurè inuenies: quemad-
modum si & ipsamet spinalis medulla non secundum eiusdem initium, sed
iuxta alias inferiores eius partes, ac vertebrae lædatur, & suppositæ partes

Cap. 4. in fin.

Cap. 6.
Si cerebrum af-
fectum sit.

Si initium spi-
nalis medullæ.

Si aliqua alia
pars.

i. de caus. symp.
cap. 5.

3. de loc. affe.
c. 10.

Quæ partes af-
ficientur in qua
uis resolutione,

Quis præter na-
turam affectus
sit resolutio ner-
uorum.

1. de caus. sym
cap. 5.

2. de caus. sym.
c. 2. in prin.

Stupor quid
sit.

Resolutionis
signa,

Quem morbum
secedit resolu-
tio nervorum,

Prognostica.

oblata erunt: si ingens fuerit affectio, omnes: si exigua, & secundum partem oblata sit; partes quæ è directo suppositæ sunt, afficientur. Quapropter ex anatome doctus locum primo affectum inuenire poteris notitia præhabita, a qua spinalis medullæ parte partes resolutæ nervos suscipiant: at quemadmodum dignoscendum id sit, scriptum reliquit Galenus tum primo de causis symptomatum, tum tertio de locis affectis. Cum igitur propter priuationem animalis facultatis quælibet resolutio generetur, quæ a cerebro tanquam a primo principio medijs nervis, ac per spinalem medullam, tanquam per semitas, ad sensus, & motus instrumenta delegatur, non immerito cerebrum ipsum, aut spinalem medullam, seu particulares nervos quosdam a cerebro uel spinali medulla ortos, aut denique ipsamet instrumenta in qualibet resolutione affici necesse est. At quo pacto illud distinguendum sit, num videlicet una, uel altera pars primo afficiatur, iuxta Galeni doctrinam, paulo ante ostendimus. Est uero resolutio symptoma in genere noxæ functionum animalium motricum, & sensibilem: læditur nanque utraque facultas in ea, non tamen diminute, ueluti in stupore: qui nihil aliud est, quam difficultas quædam sentiendi, & mouendi, ut patet primo de causis symptomatum, uel imperfecta quædam nervorum resolutio, ut secundo de causis symptomatum liquet: quanquam enim sub eodem genere contineantur tum stupor, tum resolutio, differunt tamen magnitudine, eodem Galeno teste præcitato loco. Quapropter nervosæ partes in resolutione non difficulter sentiunt, & mouentur, ueluti in stupore; sed neque mouentur, neque sentiunt: & propterea utraque facultas in ea ablata est. facultate enim animali omino partes priuatæ sunt, cum resoluuntur. Cuius affectionis indicia scribere non opus erit: cum cuius non medicus modo, sed fere uulgaris prompte ipsam dignoscere ualebit, cum uiderit partem quampiam sensu, & motu priuatam esse. Sectatur autem non unum tantum morborum genus, sed indifferenter penè ex quolibet oriri potest. Interdum nanque ex immodicè frigida intemperie, cum frigidorum, uiscidorum, ac crassorum succorum abundantia, aut absque ea in altera cerebri parte spina, seu particulari nervo excitari potest. Dignoscet inquam id prompte ex his, quæ narrauimus, signis, cap. de dolore capitis orto ex prædictis causis: nec minus inflammatione, seu scirrho in prædictarum partium aliqua ortis, delatione facultatis impredientibus, immo non modo si in eis, uerum in uicinis partibus orti fuerint, nervos comprimentes, resolutionem excitare poterunt: quod ex propriis inflammationis, aut scirrhii signis comprehendet. qua ratione etiam & nervi ipsi comprimuntur, ac resolutio excitatur ab aliquo corpore duro extrinsecus adueniente, aut ubi uel laqueo, uel manibus constringuntur: sunt quoque & ipsi arctiores ex luxatis, fractisue spinæ uertebis, aut aliis ossibus. Similiter ad uulnus, seu ulcus cum cerebri, seu spinalis medullæ, tum alterius particularis nervi sequitur nervorum resolutio: quorum morborum, seu causarum notitia ex proprijs eorum inditijs prompte haberi poterit: uel si externa fuerit causa, ex ægri, altantium que relatione. Resolutio, quæ non per omnia membra, sed in partibus fit, ut Celsus asserit cap. 27. li. 3. nunquam acutus, sepe longus, fere sanabilis morbus est. Quod uero in senibus, atque hyemis tempore frequenter hæc passio, difficile autem in calidis ætatibus, apud Celsium Aurelium liquet eodem lib. secundo, cap. primo. Verum quæ a nervi diuisione oritur resolutio (Paulo teste) insanabilis est: nec minus si ex spinalis medullæ transuersis incisionibus, seu luxatione ualida. Amplius si resolutum membrum minuatur, aut eius color immutetur, non absque ratione difficulter curabitur, aut forte non curabitur. non enim facultate animali duntaxat priuatum esse indicabit, uerum & naturali, ac quodammodo uitali. Nunquid autem ea, quæ dextri la-
teris

teris est resolutio deterior sit ea, quæ sinistri, aut è contra, reliquis iunioribus censendum relinquo. nam quæ circa id dici possent magis fortè puerilia viderentur, quàm huius rei exactiorem doctrinam afferrent. Curabis autem eam, quæ à frigidis, crassis, ac, viscidis succis resolutionem ortum habet, si similis præcipiatur victus ratio, velut præcedenti capite de conuulsione statui-
mus, vt uniuersa uidelicet sit attenuatoria, ac sicciior, Paulo, & Aetio testi-
bus: modicisque cibis, eisdemque siccis, ac potionibus vtantur ægri: sitim pro-
pterea quoad possint, maximè sustineant: & vt summatim dicam, in vniuer-
sum simili victus ratione utantur. Et cum redundantem humorem euacua-
re oporteat, pro eius curatione (Aetio teste) nullum aptius in his reperire
datur principium, quàm à uenæ sectione: siquidem permiserit ætas, habitus,
tempus, studium prægressus, victus, & reliqua, quæ prohibere solent uenæ se-
ctionem: quæ fiat à partibus sanioribus, & ne perfrigerentur ægri, oportet
moderatam, facere detractionem: per quam solum paululum imminuantur
materiam, quemadmodum Aetius consulit. Interpositis autem diebus qui-
busdam à uenæ sectione, alius clysteribus subducatur, parato eorum decocto
ex maluarum, althææ, mercurialis, chamæmeli, betonicæ, hyssopi, & sampsu-
ci, singulorum manipul. s. florum stœcadis, & foliorum rutæ, utriusque drach.
iij. decoquantur in aqua, quoad tertia pars absumatur. Deinde accipiatur præ-
dicti decocti lib. i. & s. salis communis parum, olei communis, anethini, uel
chamæmelini unc. iij. mellis rosacei unc. ii. hieræ picræ simplicis drach. vii.
aut compositæ drach. iij. seu benedictæ laxatiuæ drach. iij. aut confectionis
de dactylis, seu antidoti indi tantundem. Interimque, si uidebitur, trochisca-
ri agarici scrup. iij. aut drach. ii. commiscere poteris. & fiat clyster. Post quæ
non diuersa ratione ab ea, quam in cura conuulsionis docuimus, syrupi, aut
alia decocta, propinandi sunt pro pituitosorum redundantium humorum ex-
tenuatione, ac incisione, ut expulsionem reddantur idonei. Quibus sic paratis,
purgatio exhibeatur aliqua ex his quæ iam dicto capite conscripsimus, paula-
tim à lenioribus ad uehementiora progrediendo. Nanque non semel tantum
sed sæpius purgandi sunt ægri, interpositis tamen semper diebus quibusdam:
etenim ubi pars resoluta est (Celfo auctore) prouidet malo corporis uel san-
guis missus, uel alius ducta. Vtilissima autem est post purgationes theriaca,
& mithridatum, ut Aetius testatur; quæ de re drach. i. alterutrius tribuatur.
Quod si cerebrum primariò affectum sit, magnopere conducit post hæc apo-
phlegmatismis, sternutatoriis, ac nasalibus medicamentis, caput purgiis di-
ctis uti: utpote quæ à capite pituitam ducant. Quod si ipsum affectum non
sit, neque eis utendum erit, sed talibus medicamentis, quæ cerebrum ipsum
roborent. Nanque uniuersa curatio in his à capite initium sumit: hoc enim
radix est, & principium totius affectionis, Aetio auctore, inter quæ hoc utare.

Recipe diambra, antidoti pliris archoticon, & diamoschu dulcis, singulo-
rum scrup. j. pulueris hirundinis præparati. 3. s. seminum coriandrorum præ-
paratorum drach. i. sacchari rosacei drach. iij. cum saccharo dissoluto in aqua
rosacea, fiant tabellæ, ex quibus æger sæpius parum in ore teneat. Auxiliatur
in super huic affectioni (ut Paulo, & Aetio uisum est.) assumptio castorii, aut
opopanacis, aut sagapeni pondere circiter 3. j. cum aqua mulsa. Insuper &
antidotum ex triplici pipere, Paulo auctore. Sed & sarmentorum uitis uiri-
dium decoctum à ieiuniis assidue potum prodest ualde partibus corporis re-
solutis, ut testatur Aetius. Quod si caput primo affectum fuerit, aut spinalis
medullæ initium, à iam dictis euacuationibus non erit incommodum circa
occipitis cavitatem, quo loco spinalis medulla initium habet, unctiones
approximare ex oleo nardino, constino, de nuce muscata, uulpino, de hyperi-
co, castoreo, aut è terrenis uermibus parato, & demum laurino, seu de piperi-
bus,

Curatio.
Victus ratio.

Venæ sectio.

Clysteres.

Preparatio.

Purgatio.

Quæ post purga-
tionem peragen-
da sint.

Unguenta.

bus, aut de euphorbio. At si mauis vnctiones componere, eiusq; vti, excipe ex vulpino, nardino, & de nuce muscata oleo, omnium vnc. iij. addasq; succi hyperici, & saluæ, singulorum 3. ij. castoreij, sagapeni, vtriusq; 3. i. & s. florum stœcadis 3. s. & cum pauca cera, exiguoq; vino albo odorifero fiat vnguentum vel sacculus pariter paretur. R. hyssopi, samplici, hyperici, saluæ, rutæ, & foliorum lauri, singulorum 3. ij. spicæ, mastiches, castorij, florum stœcadis, singulorum scrup. ij. garyophyllorum, maceris, nucis muscatæ ana scrup. s. rosarum rubeorum siccarum manip. s. omnia contundantur, & ex eis sacculi parentur. Non incommodè insuper focus fieri possunt ex salua, rosmarino, hyperico, herba

Sacculi. paraly si hodie vocata, hyssopo, samplico, betonica, pulegio, & calamintha, omnibus in vino albo decoctis, additisque castorij. 3. ij. florum stœcadis, ac spicæ ana 3. j. & s. quibus sæpius reiteratis cum spongijs, seu linteis, aliquod ex prædictis vnguentis, seu sacculis superimponi debet. Quod si neque his morbus cedat, sinapismis, aut per ignem cauterijs, siue per aliud medicamentum candens patrem innuere non dubitabis. Aetij sententiam sectatus. At si nec cerebrum, neque spinæ initium affectum fuerit, sed ex reliquis eiusdem medullæ spinalis partibus oriatur affectio, eis ritè inuestigatis, atque inuentis super easdem iam dicta medicamenta approximare poteris. Simili ratione & si aliquis particularis neruus fuerit affectus, eius origine primo inuenta, prædicta, aut similia medicamenta adhibebis: quemadmodum Pausaniam, Syrum sophystam, qui secundum duos minores sinistrae manus digitos, atque medij patrem dimidiam, in primis sensum difficilem habebat, postea eum omnino amisit, malè curantibus medicis sanauit Galenus, circa dorsi initium ea medicamenta, quæ illis digitis adaptauerant, adhibere iubens, à qua patre nerui, per quos ad manus digitos, præsertim iam dictos sensibilis transmittitur facultas, procedunt, velut tum 1. tum 4. de loc. affe. scriptum reliquit: nunquam tamen cerebrum despiciendum erit, & si priuariò non afficiatur. Prodest etiam resoluti membri, seu torpentis summam cutem exasperasse, Celso auctore, vel vtricis celsam, vel impositio sinapi, sic vt vbi rubere ceperit, corpus hæc remoueantur. scylla quoque contrita, bulbiq; contriti cum chure rectè imponuntur. Conducit quoque & cucurbitulas aliquando sine ferro admoovere: quin etiam fouere aqua calida marina, vel si ea non est, tamen falsa magnopere necessarium est. At si ad sint balneæ calidæ naturales, ijs potissimum vtendum est: in eisq; præcipuè resoluta membra agitanda sunt: in quarum defectu arte balneum parandum erit ex prædictarum herbarum decocto, ac reliquis calfacientibus, eoq; in resolutis parentib. vtendum. Nam siquid aliud, conducent resolutis membris, vt ad ea sanguis, atque calor, & spiritus trahantur, quò fit, vt & melius alimentum trahant, ac concoquant, & recrementa reppellant, & digerant. Post verò cucurbitulas, seu balneas, alienum non erit aliquo prædictorum vnguentorum affectum membrum linire, ac linteis seu vulpina pelle operire: aut aliud componere licebit in hunc modum.

Fokus. Recipe olei nardinis & costini vnc. i. olei de piperibus, & de euphorbio ana drach. tres, succi herbe, quam paraly sim vocant, saluæ, & hyperici singulorum drach. quatuor, florum stœcadis, calaminthæ, hyssopi, singulorum 3. j. castorij, baccarum lauri ana 3. s. seminis sinapis scrup. ij. cum cera, & resina terebinthina quod satis sit, fiat vnguentum, seu cerarum. Si verò ex ingenti frigore citra humorum redundantiam resolutio fiat, inuenta parte priuariò affecta prædictis medicamentis supra eam adhibitis, curabitur, cerebro, ac ipsemet parte resoluta, omnino non neglectis. verum eis quoque auxilia (vt præcipimus) porrigas: posthabitis tamen venæ sectione, purgatione, ac reliquis connumeratis medicamentis, quæ vim vacuandi habeant; sed alternantibus tantum, ac partes roborantibus vtendum. At si ex inflammatione, vel scirrho

Sinapismi. Cauteria.

Pausaniæ Syri historia.

1. de loc. affect. cap. 6
4. de loc. affect. Cap. 4
Que adhibenda sint resoluti membro.

Si ex frigore resolutio fiat, ratio.

in

In prædictarum aliqua partium morris resolutio fiat, eiusdem inflammationis, seu scirrhi curatione sanabitur. Ab aliquo autem corpore duro extrinsecus adueniente, laqueo, uel manibus neruos constringentibus si resolutio exci-
retur per eorundem ablationem promptè curabitur. Sic si ex fractis, aut luxa-
tis spinæ uertebis, seu aliis ossibus, si curari ualeat orta resolutio, ex luxatio-
nis seu fracturæ curatione sanabitur. Similiter si ad uulnus, seu ulcus tum capi-
tis tum spinalis medullæ, aut aliorum particularium neruorum ipsis curatis,
dummodo curari ualeant, & ipsa resolutio persanabitur: propterea ex iam di-
ctis causis resolutionem ortam curare prætermisimus.

Curatio, si ex
aliis causis fiat.

περὶ σπασμῶν κυνικῶν.

De conuulsione canina.

Cap. 15.

SERMONIS affinitate ducti de ea affectione tractare proposuimus, quam
Græci σπασμὸν κυνικόν, latini caninam conuulsionem, medicorum uul-
sus oris torturam appellat. quæ nihil aliud est, quàm mandibularium mu-
sculorum resolutio, Aetio teste. ex qua in obliquum distorquetur os, na-
sus, & oculus, & in summa, dimidia faciei pars. In hac affectione interim cere-
brum, non tamen secundum totum, uerum secundum dimidiam eius partem
afficitur interdum nerui, qui à cerebro ad faciem deferuntur: nonnunquam
uero partes ipsæ, quæ leuiores actiones habent, proprio affectu laborant, Galenò
auctore. 4. de loc. aff. quarum primo affectarum discrimen per copulata sym-
ptomata facillè deprehenditur. Nanque si cerebrum affectum sit primò, non
modò omnes faciei partes affici consueuerunt, ut oculus quoque lædatur,
uerum etiam simul cum ea tota corporis medietas è directo supposita reso-
luta erit, ut in præcedenti capite declarauimus. Si uerò faciei tantum partes
resoluantur in alterutra duntaxat parte, omnes partes quibus a tertia coniu-
gatione nerui adueniunt, ut temporarii, masseteresque muscoli, labra, & pin-
narum resoluuntur, ac ipsius lingue, atque partium oris sensus duntaxat amit-
titur, qua propter neruum ipsum primariò affectum esse putandum est, qui
a tertia neruorum coniugatione procedit. At si forte fortuna una quæpiam
faciei particula, aut in sentiendi, aut mouendi, aut utraque facultate lædatur,
ea sola causam dispositionis continet, atque affecta est: uelut si latus muscu-
lus affectus sit, & labrum ipsum, narium pinna, ac ferè tota Mandibula, & ge-
na utraque resoluta uidebitur. Similiter accidit si supercilium unum dunta-
xat fuerit resolutum, aut palpebra: nanque affectus in ipsis tantum particulis
continetur. Euènit autem cum latus musculus fuerit resolutus, qui dextram
labri partem mouet, ut ipsa ad sinistram deflectatur, uelut si is, qui sinistram
mouet, resoluitur, ipsa trahatur ad dextram, ut semper in aduersam partem
deflecti contingat resolutam partem: trahitur nanque ea a musculis actionem
facientibus, Galenò teste lib. de caus. morb. Nec secus uidebitur ubi quilibet
alius faciei musculus, uel neruus quoquomodo fuerit affectus. Nam semper
ipsa pars in diuersum trahit musculum ubi resoluta fuerit, eodem Gal. aucto-
re 4. de loc. aff. impedita nanque facultate animali, quæ per neruos ad faciei
partes delegatur à cerebro, non ab re partes ipsæ eadem animali facultate pri-
uatæ relaxantur. Oppositæ uero, utpote sanæ existèntes, participesque eiusdè
animalis facultatis, proprium munus perficiunt, præsertim muscoli, qui cum
operantur ad suum principium seipsos contrahunt: & propterea oppositum
ad se trahunt. Qua de re non mirum si in hac affectione per accidens uidea-
tur, figura uitiari, ac morbus in figura oriri: quoniam pars faciei a naturali
figura deflectit: non tamen propter hoc canina conuulsio, morbus in figura
dici

Lib. 6. c. 30.
Canina conuul-
sio quid sit,

Cap. 2. uers. finè
Si cerebrum af-
fectum sit, si-
gnum,

Si faciei partes
duntaxat, si-
gnum,

Si una quæpiam
pars, signum,

cap 7

Cap. 2. in ulti-
mis uerbis.

Cur resoluta
pars semper in
aduersum traha-
tur musculum.

Quis affectus,

præter naturam
 si conuulsio ca
 aina.

dici poterit quāquam ad ipsam is sequatur morbus, ut diximus. uerum sym-
 ptoma est in genere noxæ functionis animalis sensibilis, & motricis volun-
 taria, si sensus, & motus deperditus fuerit, aut alterius sensibilis, seu motri-
 cis, si sensus, aut motus deperdatur: modus autem læsionis erit earum oblatio.

Signa. Neque laborandum erit per multa signa pro eiusdem affectionis notione,
 cum propriè à sensibus dignoscatur, visu videlicet, & tactu, cuius causæ non

Causæ, ab similes videntur esse, quàm eæ, quas præcedenti capite de resolutione nar-
 rauimus, & propterea hic conscribere superuacaneum esset: quamuis ex con-
 uulsione quoque alterius partis faciei musculorum possit & facies ipsa lædi,
 ac perueri: adeo ut similiter figura vitietur, veluti ex neruorum resolutione,
 ut patet lib. de caus. morborum: quæ quoniam curata conuulsione sanabitur,
 propterea de ea non erit noster sermo. Indicant autem spasmi cynici euen-
 tum dolor circa faciei ossa, & stupor in cute eiusdem, ac palpitatio multa in
 ea proueniens. Non despicienda erit eius curatio: nam si proteletur, fortasse
 ipsa speranda non est: sed timendum erit ne in resolutionem, aut morbum

Prognostica. comitiale, vel apoplexiam mutetur. Propterea simili victus ratione serua-
 ta, quam cap. de conuulsione, & resolutione instituimus, confestim pro ratio-
 ne causæ ipsam facientis, ea rescindenda erit, utendumq; & venæ sectione, si
 opus fuerit, aut forti aliqua purgatione: & demum errhinis, ac apophlegma-
 tismis valentioribus, & præter iam dictos, hoc utare. R. radicis pyretri, zin-
 ziberis, castorii, singulorū scrup. ij. piperis, staphidis agriæ an. scrup. i. mastiches
 3. ii. seminis sinapis 3. ss. hyssopi, origani ana scrup. iij. vñ passæ 3. iij. excipian-
 tur omnia trita, & adhibita cera, ac pauco rosaceo melle fiant pastilli mansi-
 les. Proderit etiam eiusdem ligatura: quæ in oppositum equaliter ueluti capi-
 strum quoddam partem resolutam deducat, Paulo teste. Quibusdam etiam &

Lib. 3. cap. 14. sanguinis detractio ex uasis linguæ subiectis confert, eodem auctore. Item
 cucurbitulæ in occipitio iuxta primam uertebam fixæ iuuant, ut ipsemet
 testatur. Reliquis insuper medicamentis tum cerebrum roborantibus, tum
 topicis supra affectam primario partem adhibendis eis utaris, quæ præceden-
 ti cap. conscripsimus. Verum quia non ea maxilla, quæ peruersa esse apparet
 sed opposita resolutione infestatur, ut ex ipsa rei notitia liquet, & Paulo ui-
 sum est; ideo resolutæ parti (ubi oporteat) auxilia adhibenda sunt. & non
 oppositæ, quemadmodum Aetius præcipit. Et quoniam omnia hac affectio-
 ne laborantibus commodant, quæ in resolutione fuerunt relata: ea de re huic
 sermoni finem imponamus. qua ratione & ab aliorum partim resolutionis tra-
 ctatione excusatum esse uelim.

περί ἐφιάλης.

De incubo.

Cap.

16.

VBI quispiam, cum somnum ingreditur, se grandi quadam mole op-
 pressi, inuadique ab alio, & premi imaginatur, ἐφιάλης affectus is ab
 omnibus fere græcis nuncupatur ἀπὸ τῆς ἐφιστάσεως, quod inuadere
 & premere significat: nam hoc malo correpti ab aliquo se inuadi, &
 premi putant, uel quoniam homo quidam Ephiales nominatus hūc affectū per-
 pessus est, Paulo teste ca. 15. tertij lib. At Temison (ut ipse refert 10. suarum
 epistolarum uolumine) ἐπιπλάσσειν a suffocando nominauit. Tota autem me-
 dicorum turba latine incubum, seu incubonem appellat. qui, Aetio teste, au-
 thoritate Possidonii, non est dæmon, sed magis præludium, & præcæmium
 morbi comitialis, aut insanix, uel apoplexiæ. Hunc incubonem aliqui (ut re-
 fert Cælius Aurelianus capitu. 3. lib. 1) ab hominis forma, uel similitudine no-
 men duxere dixerunt, aliqui a phantasia, qua patientes afficiuntur: siquidem
 ueluti ascendere, atque insidere suo pectori sentiant quicquam. Quod uero

Aet. lib. 6. c. 12.

in

in hac affectione cerebrum lædatur, tum Pauli, tum Aetii auctoritate liquet. Constat insuper ex operationum læsione: læduntur nanque in ea cum principes, tum motrices, ac sensibiles functiones. Nam difficilis eo detentos comitatur motus, torpidus in somno sensus, & suffocationis imaginatio, ut Paulus testatur: illudque non ab re, ut fatetur Aetius. nam eisdem prohibentur facultates per nervos transire, oppletis ventriculis cerebri vaporibus crassis, ac frigidis: qui affectum ægrè excitabilem efficiunt, ac vix ad rectam actionem ægri producantur. Ex quibus Aetij verbis liquet, non modo cerebrum in hoc vitio lædi, verum ipsum ut partem instrumentalem, & non similem oblatum esse: afficitur nanque secundum eius ventres, ut ipse testatur: hoc malum non morbus, sed symptoma est in genere noxæ functionum animalium, omnium inquam: nam imaginatio in eo deprauata est, motus difficilis, & sensus torpidus. & propterea functiones hæc, aut debiliter fiunt, ut Paulo visum est, aut non fiunt præsertim motrices, ut Aetio placuit, dum dixit. Vnde etiam immobiles penitus tales permaneant: quamvis demum per multam anxietatem discussio obstruere spiritui, ac attenuato, & apertis meatibus, de repente excitentur. Præcedit hanc affectionem, eodem teste, suffocatio, uocis priuatio, grauitas, & immobilitas. ac comitatur eos, ut placuit Paulo, difficilis motus, torpidus in somno sensus, suffocationis imaginatio, & ueluti ingruentis cuiusdam mali occupatio. Vox suppressitur, aut incerta, nihilque significans editur. eademque perpetiuntur incubo pressi dum dormiunt, quæ morbo comitiali correpti patiuntur in exacerbationibus, Aetio teste, & Paulo, & ferè non nisi in somni initio fit, cum primum a uigilis, in quibus uapores dissipantur, quiescat innatus calor, & ad interna se conuertat uapores generans, ac eisdem cerebrum opplendo, potissimum si eo tempore alimenta conficiat, non tamen perfectè euincat. Huius uitij causa, crassus, ac frigidus uapor ad cerebrum delatus, eiusque uentriculos obstruens, ab eisdem auctoribus assignatur. qua ratione fit, ut crapulæ, ac continuæ stomachi cruditate, ex quibus iam dicti vapores eleuentur, hunc affectum præcedant. Cui malo (ut eisdem visum est) per initia succurrendum erit: inueteratum nanque, & assidue incidens grauis aliquod vitium nuntiat, ut morbum comitalem, apoplexiam aut insaniam, dum paulatim in cerebri uentriculis crassus humor coacervatur. succurritur autem prohibendo ne iam dicti vapores cerebri cavitates occupent. Fiet uero hoc, si victu utantur tenui, ac penitus flatus exorte. qua propter parce semper, uerum parcissime in cæna cibus sumatur, qui boni sit succi, facile concoquatur modice alar, ac non inflat, aut vapores multos ad caput mittat. Verum uident, nisi album, aquosum, ac subastringens sit, moderate sumptum, ac dilutum. In vltima mensa astringentibus utantur cibus, ut pyris, seu cydonijs. cum eorum cibus ea, quæ extenuandi vim habent, permiscenda sunt, ut hyssopus, sampsuccus, serpyllum, satureia, & alia huiusmodi. A sole, frigore, ventis, igne, ac fumo, diurno somno, sic statim a cibo, cauendum erit. Curâdos etiam oportet iacere loco lucido, atque mediocriter calido, adhibita require animi, & corporis abstinentia, usque ad tertium diem, ex sententia Cælii Aureliani lib. primo cap. 3. & ut summatim dicam, simili victus ratione utantur, quam vertiginosis, ac comitialibus præcipiemus. Quod si sanguis redundarit, venam in cubito secare oportet, anteriorem, vel mediam. si uero uiciosi succi magis prædominantur, purgante medicamento ægri corpus euacuandum est, prius tamen exhibitis extenuantibus quibusdam medicamentis pro eorundem humorum præparatione. Quibus partis, si pituita fuerit is, qui redundat humor, ex stomachicis pilulis, & Galeni hiera, aut ex eadem picra cum epithymo, & senna, aut ex pilulis de lapide lazuli ægrum purgabis: quod si maior alijs purgantibus medicamentis uti, capitu de epilepsia, aut de vertigine

Que pars affi-
ciatur.

Morbus quem
sequitur.

Quis affectus
preter naturam
sit.

Eiusdem signa.

Cur in somni
initio fiat.

Causæ.

Prognostica.

Curatio.

Victus ratio.

Venefectio me-
dicamentorum
ratio.

Quæ a purga-
tione exhiben-
da sint.

vertigine ea requiras. A purgatione ea, quæ cum ventriculū, tum caput roborant, exhibeantur: diarrhodon videlicet, aromaticum rosatum, diamoschu dulce, diambra, & alia huiusmodi. Admouenda insuper, purgato corpore vniuerso, capiti localia medicamenta, sunt, irrigationes videlicet, ac inunctiones calidæ; apophlegmatis, ac caput purgijs similiter vtendum: quorum omnium medicamentorum copiam cap. de morb. comitiali inuenies, & de apoplexia. At succurrit particulatim ipsis, ex Aetij, & Pauli sententia, niger pœoniæ fructus, si quindecim eius grana trita cum aqua in potu exhibeantur, idq; continuè fiat, quoad eger sanetur.

περί διῶς καὶ σκοτῆ διῶς.

De vertigine, & tenebricosa vertigine. Cap. 17.

4. de rat. uict.
com. 42. in prin-
cipio.

Quibus conueni-
ant, & differ-
ant uertigo &
tenebricosa.
uertigo.

Loco citato.

Vertigo quid
sit.

Quid sit tene-
bricosa uertigo.

loco citato.

Quæ pars in eis
afficiatur.

4. de rat. uict.
com. 42.

3. de loc. affect.
cap. 8.

Loco citato.

ADEO magnam inter se cognitionem habet affectus is, qui a græcis, præsertim Hippocrate, & Galeno, interdum διῶς, vt patet apho. 17. 23. & 31. tertij lib. interim διῶς, vt liquet 4. de ratione victus, appellatur, & qui ab eisdē σκοτῆ διῶς nūcupatur, vt aph. 17. 4. li. & eodē 4. de ratio-
ne victus cōstat: quorū affectuū primus a latinis vertigo, à reliquis verò tene-
bricosa vertigo nuncupatur: a medicorum autem vulgo scotomia, vt ausi sint
quidam iuxta eorum sententiā asserere inter se prædicta duo nō differre. Nos
vero non modo nomenclatura eos affectus, prædictorū autoritate, discrepare
putamus, verum etiam re ipsa. quòd autem nomine dissideant, ex iam dictis
liquet: at quòd re ipsa distent, ex Galeni verbis 4. de ratione victus potere
poterit, dum asseruit, quòd quando quispiam imaginatur caput circumferri,
tunc διῶς, hoc est, vertigo dicitur, quando autem & tenebricosa simul visio
cum hoc fit, σκοτῆ διῶς, hoc est tenebricosa vertigo vocatur; ab accidenti
nomen sumens, quòd repentinas oculis ingerat tenebras, vt ait Cælius Aure-
lianus c. 2. lib. 1. Ex quibus verbis liquet aliud re ipsa esse, quòd caput dunta-
taxat circumagi videatur: aliud vero quando simul cum eo tenebricosa fuerit
visio, nanque in vertigine dicta (præter tenebricosam visionem) caput circum-
agi videtur duntaxat: in tenebricosa verò vertigine simul cum capitis circū-
latione tenebricosa fit visio. Propterea iuxta Hippocratis, & Galeni senten-
tiam asserimus, quòd vertigo sit imaginatio quædam, quòd caput circumfera-
tur, seu vertatur. σκοτῆ διῶς autem fit, quando quæcunque conspiciuntur,
circumagi videantur, ac de repente simul pereat sensus visus, cum ipsi ægro-
ti putent tenebras circumfundi, quemadmodum Galeno visum est, commen-
to aphorismi decimi septimi lib. quarti; & si per σκοτῆ διῶς interpreter malè
vertiginem intellexerit, ac interpretatus fuerit: nam in hac passione consti-
tutos repentina visus tenebratio, atq; nebula, vt ex eodem Cælio Aureliano
liquet, cum capitis vertigine consequitur, vt omnia secum moueri existi-
ment. At in generationis modo ambo conuenire videntur: cum ob inordina-
tam spiritus flauosi motionem in partibus cerebri generentur, qui vel in ca-
pite localem habet generationem, vel sursum ex infernis fertur, vt 4. de ratio-
ne victus in morbis acutis, & commento apho. 31. 3. lib. liquet. quò fit, vt ea-
dem etiam pars in vtrisque afficiatur, nempe caput, vt constat de vertigine
commento apho. 23. 3. lib. & 4. de ratione victus in morbis acutis, & de aff.
tenebricosa uertigine, tum eodem 4. de ratione victus, tum 3. de loc. affe.
Insuper confirmari poterit ex functionum læsione. in vtrisque nanque ani-
male oblaeduntur functiones: quamuis non omnino eadem, neque
eodem modo: nanque in vertigine deprauatè imaginatio læditur, dimi-
nuteq; visio, vel fortè etiam deprauatè interdum, vt patet Galen. 4. de ratione
victus,

uictus, & commento 15. apho. 3. lib. quam sententiam secta ri etiam uidentur Aetius, cap. proprio de uertiginosis. In tenebriosa autem uertigine cum ipsa deprauata imaginatione, non uisionis imbecillitas, uerum eius ablatio percipitur, nam præter id, quod cuncta uidentur circummagi, derepente simul perit sensus uisus, ut testatur Galenus commento apho. 17. 4. lib. putant enim ægroti tenebras circumfundi, adeo ut interdum cadant, ut patet 3. de lo. aff. Quia de re uertigo symptoma erit in genere noxæ functionum cum imaginatione deprauata, cum uisionis diminuta, seu deprauata. At in tenebrosa uertigine non modo imaginatiua aberrat, sed uisua functio abolita, est, & interim motrix facultas, ut ex iam dictis liquet. & propterea affectiones prædictæ secundum magis, & minus inter se discrepare palam uidentur: nec idem sunt ut a quibusdam uisum est: & si in utrisque imaginatiua facultas uitiata sit ac caput, seu cerebrum afficiatur. quanquam conati sunt quidam Galeni sectatores probare in hisce affectionibus imaginationem non lædi: cum si læderetur, aiunt, non putarent egri se esse deceptos: nam licet uideatur eis caput circonuerti, aut quæcunque conspiciunt, circummagi, sciunt tamen falsam esse uisionem, & imaginationem. At qui nihil obstat imaginationem læsam esse, egrumq; cognoscere uerum, seu falsum illud quod imaginetur; cum hæc cognitio raciocinatricis facultatis, seu cogitatiue, & non amplius imaginatiue sit munus: quæ constare poterit, imaginatiua oblæsa existente, ut in quibusdam phrenitidibus apparet: & proinde quia falsum imaginatur, imaginatiua aberrat: quia uero dignoscit æger se falsa imaginari, ratio, seu cogitatio illæsa erit: quemadmodum de se ipso testatur Galenus phrenitide laborans 4. de loc. affe. Rursus si ad cerebrum prædictæ affectiones attinent, quomodo uisibilis duntaxat facultas oblæsa erit? In utrisque igitur luce clarius patet, imaginatricem facultatem deprauatam esse: at dissident, quod in uertiginosis sensus uisus non simul perit, uelut in scotomaticis, nec concidunt ægri, cum affectio mitior existat: in scotomaticis uero quoniam caput uehementius afficitur, sensus uisus repente deperditur adeo, ut interdum cadant, maxime ubi in circulum circonuertantur: siquidem ipsis ab una ratione euenit, id quod cæteris à pluribus accidere solet, Galeno teste, 3. de loc. affe. si militer si alium quendam circonuerti uiderint, siue totam, aut trochum, aut ipsos quoque in aquis uortices, siue aliquid tale, idem perpetiuntur. Spiritus enim uisuius ad trochum, siue aliud tale, qui circumuolutatur, allabens mouetur, & simul cum illo circumfertur, ut testatur Aetius. quinimo & in ipsis circuitonem euenire uidemus id, quod in aliis, cum in circo frequenter uertuntur, accidit, & proinde ex ipsa appellatione manifestus est, qualis sit scotomaticus affectus, ut patet 3. de loc. aff. Discernitur uero ab epilepsia hæc passio ex Cælii Aureliani sententia, siquidem neque sensibus priuat ægrotantes neque spasmo. id est, diuerso raptu afficit. Nec quicquam refert, si Galenus eodem 3. de loc. aff. de scotomate duntaxat, hoc est, de tenebrosa affectione uerba fecerit, uertiginis autem non meminerit, cum eadem pars in utrisque afficiatur: quod quidem inuestigare eo libro præposuerat, & insuper quoniam de scotomate differens, qui maior affectus est quam uertigo sub eius tractatione & uertigo subintelligi poterat. Quod igitur iam dictæ affectiones non confundantur, nec eædem sint, ac quomodo discrepent, & una ab alia discerni queat, ex superius dictis liquet. Sed quoniam utraque bifariam oriri potest, tum primario affecto cerebro, tum per consensum ex ore uentriculi, Galeno auctore 3. de loc. aff. & Paulo cap. 12. lib. 3. propterea si ex primaria cerebri affectione dependeat, uehemens capitis dolor, grauitasque præcedet aurium sonitus: item olfactus læsio & nonnullis etiam (ut, Paulus testatur) gustus, atque alterius cuiusque sensus, qui à capite initium sumit, ex Archi-

genis

Aet. li. 6. c. 7.

3. de loc. affe.
loco citato.

Quis affectus
præter naturam
sint ambæ affe-
ctiones.

Nunquid in hi-
sce affectionibus
lædatur imagi-
natio.

Responsio.

Ca. 2. in medio.

Cap. 8.

loco citato.

Quomodo tene-
brosa uertigo
ab epilepsia di-
scernatur.
loco citato.

3. de loc. affe.
loco citato.

Si primario af-
fecto cerebro
sint, signat

Siper consensu
ex ore uentricu
li.
3. de lo. af. ca. 8.

Ad quem cere
bri morbum se
quantur.
Causa.
locis citatis.
Flatulosi spiri
tus generatio.
Eodem loco.

Cur in indica
tionibus uertigi
nes fiant.

Prognostica.

Citato loco. 42.

Curatio.

Victus ratio.

genis. testimonio. Si verò ori ventriculi cerebrum consentiat, stomachi morbum, quem græci καρδιωμὸν appellant, accersit: ac nauseam ægri præsentiant, eodem Paulo auctore, & Galeno, ex Archigenis auctoritate eodem 3. de loc. affect. At quomodo fiat, perpetuò ad inæqualem, turbulentum, & inordinatum motum flatuosi spiritus in cerebro iam dictæ affectiones consequuntur. ex quo animalis etiam spiritus in cerebro consistens euertitur, ut Aetio visum est, ut propterea non valeat, ordinatè, & ut decet, ad propria loca distribui. quò, fit, ut ad morbum in uia, hoc est, ad obstructionem ex prædicto flatuoso spiritu ortam hæc symptomata insequantur, simul atque inæqualem cerebri intemperiem. Verùm cum non semper flatuosus is spiritus in capite localem habeat generationem ex inæquali cerebri intemperie, ut patet tertio de loc. affect. sed interdum sursum ex infernis partibus feratur, Galen. teste quarto de ratione victus, & commento apho. 31. li. 3. ex iam dictis signis illud dignoscere poterit; ex grauitate videlicet capitis, ac eius dolore, aliorumque sensuum oblaxione, si in cerebro genitus sit. At si ex ventriculi præsertim ore, aut aliis partibus sursum feratur, eiusdem partis primo affectæ indicia præerunt. Generatur aut flatuosus hic spiritus, non summe languente natua caliditate, prout Gal. asserit eodem 4. de ratione victus. cum si perfecte langueret dissoluere non inciperet, & propterea cum conatur calor ipse natius corporis, humores tum dissoluere, tum effundere, verum ipsos tenuare, & per inuisibilia foramina excernere non valeat, tunc spiritus flatuosus ortum habet: & in capita contentus non ab re inæqualiter, & inordinate mouetur. qua etiam ratione fit, ut sæpenumero hæc symptomata in indicationibus fiant; conatur namque eo tempore natura humores euincere, dissoluere, & demum excernere. hic autem flatuosus spiritus si in cerebro generationem habeat, ex frigido ac glutinoso humore ut plurimum ortum ducit, Paulo teste, & propterea ex quauis leui occasione, calfacto capite, ut puta si sub sole æstimauerint, vertigo seu scotoma excitatur. At si ori ventriculi, aut reliquis partibus cerebrum consentiat ex vitiosis, calidis, & acerbis succis in ipsis redundantibus, eiusdem qualitatis vapores, ad caput delati potissimum iam dictas affectiones efficiunt ut Aetio visum est. Facile etiam prædictis affectionibus corripiuntur, quibus consuetæ excretionibus sunt suppressæ: cruditates quoque, & ardores assidui, & ebrietates eas efficiunt, eodem Aetio auctore: quæ omnia ex egrotantium seu astantium relatione percipi poterunt. Prædictæ autem affectiones parui-faciendæ non sunt: nam uertigo proxima est morbo comitiali, & apoplexiæ quemadmodum Galenus testatur commento apho. 173. lib. utraq; etiam affectiones medium quodammodo obtinent, tum earum quæ periculo uacant, tum perniciosarum, eodem Galeno auctore quarto de ratione victus in morbis acutis. non ergo penitus periculo uacant. Prompte enim ut diximus de uertigine, ita & scotoma permutari poterit in affectus perniciosissimos, ut pote quod proximi sint eisdem, præsertim morbo comitiali, & apoplexiæ: & si ea quæ oculis obuersantur, sanguinolentiora se uideri putent ægri, ad insaniam magis apti sunt, Aetio teste: in qua non imaginatio duntaxat, sed & ratio læsa est ut ipse testatur. qui uero purpurea uident oculis obuersari, apti sunt (eodem Aetio auctore) ad morbum comitalem transmutari. Vehementescit autem scotomatica passio hyeme, ut Cælius Aurelianus inquit uel ueris temporis initio, præterea sæpe futuram denunciat epilepsiam ueteres denique (ut idem ait) parua epilepsiam uocauerunt. Quo autem ad earum curationem spectat, aer eligendus erit temperatus, purus, & lucidus. fugiant autem nebulosum, & crassum, nocturnum. A uetis pariter caveant, maxime australibus. Radios solis & lunæ uident: uelut etiam aspectum rerum uelociter motarum, ut cURRENTIS fluminis, aut in circum, ut rotæ, & trochi, ac profundarum rerum aspectum.

Somnus

Somnus sit mediocris, non immediate post cibum, sed saltem per duas horas post: uitereturque diurnus, ac in loco multum calido factus: neque caput ipsum multum calidum teneat. Ventris excrementa nitendum, ut singulis diebus excernantur: in quo si natura auara fuerit, clysteribus, uel glandibus ea excitanda erit. Exercitio utendum erit temperato, in quo quantum possibile erit caput quiescat, cuius uice frictionibus crebro utendum, mane præsertim, priusquam surgant, quæ a supernis partibus coeptæ ad infima delinant. Ab animi affectibus, seu perturbationibus cauendum, præsertim ira, timore, & mœstitia. Pariter & clamores, contentiones, & cantus fugiendi sunt: uenus quoque omnino uitanda est. Cibi eligendi sunt boni succi, concoctu faciles, flatu exortes, stomacho, ac uentri commodi, sintque modici. Propterea & facietas, non minus & fames uitanda erit. Vinum bibendum, iterum modicum sit, album, & tenuissimum, & non ualde uetus, ne caput percutiat: qua ratione euaporantes cibi, quales sunt cæpa, allium, porrum, atque id genus aliis uitentur: & a cibo ea exhibeantur, quæ uim habeant astringendi, ne uapores sursum ad caput ferantur, & præsertim si uitio stomachi fiant prædictæ affectiones. In ipsa uero accessione excitare ægros conuenit tum odoratis medicamentis, tum frictionibus, & id genus aliis, Paulo auctore: quo tempore, & glandibus, aut clysteriis uti præciperem. Possent autem glandes confici ex hiera, agarico, sale gemmæ, & despumato melle. Clysteres uero ex fursuris, mercurialis, maluarum, betæ, florum chamæmeli, & salis decocto, in quo vnc. iij. olei amygd. dulcium, communis, aut anethini, ii, melis rosacei, & 3. hieræ picræ Galeni adijcias, & utare. Vbi uero conquieuerint, & vires robustæ fuerint, nihilque aduersetur, uena secanda erit, siue principium affectionis fuerit, siue tempus iam progressum fecerit (Aetij præcepto, ac Pauli) humeralis uidelicet, seu externa, aut media, uerum non acruatim sanguis euacuandus, erit, cum ex qualibet occasione ægri concidant, sed pluribus detractionibus, ex quibusdam interuallis vtentes congruam explebimus mensuram. Hoc autem tempore caput irrigetur (ex Aetij sententia) aceto, & rosaceo, admisto polygoni, aut hederæ succo, pro causæ diuersitate. Si uero aliquid sanguinis detractionem impediat, alius subducenda erit, primum acri clystere, postea purgante pharmaco, redundanti humori semper ipsum adaptando: quem admodum idemet Aetius præcipit, præcedente tamen eius concoctione, ac præparatione, bile siquidem redundante ex oxysaccharo, & syrupo de inf. rosarum, succo cichorij, & id genus alijs: hocque demum purgante medicamento utendum, Corticum myrobalanorum citrinarum excipe 3. iij. fiat decoctum in aquis cordialibus; in quo dissoluas mannæ Calabriæ vnc. ij. & s. aut syrupi ex pluribus infus. rosarum rubearum vnc. iij. antidoti diacatholicon. 3. vij. & fiat potio. & si malum non cesserit, aliaque purgatione opus fuerit, catapotia formentur ex rhabarbari cum pauca spica 3. i. & trochiscati agarici, aut pulueris hieræ simplicis scrup. ii. cum infusione, vel succo rosarum. & post aliquod interuallum, vel mannæ Calabriæ vnc. ij. vel syrupi ex pluribus infus. rosarum rubearum vnc. iij. in aqua cichorij, vel borraginis dissolutas assumat. At si crassius fuerit, qui redundarit, succus, pituita uidelicet, aut forte nigra bilis, ab eorum coctione, & præparatione, quæ ex his perficiatur, quæ præcipimus cap. de dolore capitis ex pituita, & cap. de melancholia, catapotia tribue ex arabicis pilulis, aut sine quibus, aureis, vel cochijs, agarico addito. Post quæ, si pituita redundarit, myrobalanorum chebularum decoctum, & syrupum ex pluribus infus. rosarum rubearum exhibe. Si nigra bilis, post catapotia, exhibe senæ, epithymi ana 3. i. corticum myrobalanorum indarum. 3. ii.

G in

Quæ in ipsa accessione faciendæ sint.

Quæ faciendæ, ubi conquieuerint.
Venæ sectio.

Purgatio.

Bile redundantiæ.

Si pituita redundarit, aut nigra bilis.

A purgatione
quæ peragenda
sint.

Inciso arteria-
rum iuxta tem-
pora.
Cap. 8. in me-
dio.

Si per consen-
sum fiant, cura-
tio.

Loco citato.

in aqua fontana, uel lupulorum fiat decoctum. In quo sacchari bortaginati unc. ii: dissolue, aut syrupi prædicti ex pluribus infusion. rosarum rubearum, 3. iii. Post quæ cucurbitulæ cum scarificatione ad occipitium affigendæ sunt, mox apophlegmatismis pituitam a capite per hos detrahentibus superius iā dictis, utendum. Naribusque infundatur aqua hordei cum corticibus cum ana gallidis succo, aut radicis betæ, vel cyclamini. Gargarismis quoque utaris ex origani, & pulegii decocto, cum aceto mulso, ut inquit Aetius. Odor insuper suscipiatur per nares ex amarici, sampuci, & hyssopi, ac florum stœcadis decocto, castoreo, pauco addito, & moscho, ac aceto pauco. Ex pulegio item tuso, uel origano, aut sinapi cum aceto commisto procurare sternutamenta præcipit Theodorus Priscia. libro secundo ad Timoteum capite 3. præsertim scotomaticis. Deinceps æger ad balneum ducatur, præsertim naturale aluminosum, & si caput in balneo supramodum incaluerit, aut ualde calidum caput habeant ægri, rosaceo caput ipsum cum aceto irrigandum erit, in syncope præsertim, & circa frontem, & tempora. Quod si adhuc affectio perseverauerit, neque prædictis cesserit, præsertim si ex uaporibus calidioribus per arterias sursum elatis prædictæ affectiones fiant, arteriæ ipsæ iuxta tempora sitæ supra aures incidendæ sunt, non modo Galeni. 3. de loc. aff. præcepto, uerum et Pauli, & Aetii: quarum incisionis modum addisces ex Paulo libro 6. cap. 4. Quanquam, ut Galenus asserit, non omnes huius auxilii beneficio curati fuerint: tum propterea quod per altiores arterias, quæ ad cerebrum ex ipsius basi per retiformem plexum ascendunt, uaporosus, calidusque spiritus interim elabatur, ac cerebrum implet, tum etiam quod spiritus, flatuosus poterit ex inæquali cerebri intemperie oriri: & proinde si prædictæ affectiones altero prædictorum modorum excitentur, nullam utilitatem ex prædictarum arteriarum sectione egri suscipient. Quare priusquam incidantur, summopere laborandum erit, ut exquisitè illud distinguatur. Inæqualis enim cerebri intemperies in contrarium alteranda erit, quemadmodum & consuetæ excretionis detentæ prouocandæ sunt, si earum retentio prædictarum affectionum causa sit, cruditates, ardores, ac ebrietates corrigendæ, si ex eisdem ortum duxerint. At si ex humoribus in uentriculo, præsertim eius ore contentis, uaporosus spiritus ad cerebrum delatus eas progignat, uomitu curari poterunt ex anethi, & raphani decocto: in quo acetosus syrupus, aut oxymel permisceatur: tepidumque potissimum a cibo assumatur. Quod si non suffecerit, conducet etiam eos purgare ex picra Galeni, aut stomachicis pilulis, myrobalanorum citrinarum, aut chebularum decocto, & manna Calabria, seu syrupo ex pluribus infus. rosarum rubearum, pro ratione diuersitatis uitiosi succi redundantis. Similiter si in aliis corporis partibus redundarint, easdem inspicendo, ex eisdem quoque redundantes succi purgandi erunt, caput ipsum nõ despiciendo, imò ipsum semper roborare oportet, cum dictæ affectiones ad cerebrum pertineant, licet per alterius partis consensum ipsum afficiatur ut patet tertio de locis affect. & propterea uertigines cito emendabis, ut inquit Marcellus in suo de medic. lib. cap. 3. si betæ nigræ succo tempora perlinas: insuper efficacissimum remedium esse ad abolendam eam, si abrotanum tritum in uini potione tepidum bibatur: uel cum oxymelle non acri accipiatur. Et hæc simul de uertiginis, & tenebricosæ uertiginis curatione dicta sufficiant, cum non nisi ad inuicem ratione maioris, & minoris differant, ut iam diximus.

περί ἐπιληψίας.

De epilepsia, seu morbo Comitiali.

Cap. 18.

CVM proxima sit (Galenus auctoritate) vertigo ei affectioni, quam Græci ἐπιληψίαν dicunt, non ab re de ea hic tractandum duxi. Consueuerunt quoque eundem affectum (ut ex Tralliani verbis liquet) non modo ἐπιληψίαν, hoc est, supra comprehensionem nuncupare: nam supernæ partes comprehenduntur, sensusque detinentur, verum etiam quidam hunc eodem affectum, ἱερὸν νόσημα, hoc est, sacrum morbum: sacrum etenim, & honoratum est cerebrum, quod in eo afficitur: alii vero, eo quod validius, & contumax ad amouendum sit, ἡράκλειον νόσημα, hoc est, herculeum morbum appellarunt; quemadmodum Galenus libr. 6. de morb. vulg. testatur. Hippocrates autem puerilem morbum appellare consuevit, ut libr. de aere, regionibus, & aquis, Galeno testante, patet. Quidam etiam falsa opinione decepti sacrum morbum nominauerunt. Celsus vero cap. 23. tertij lib. maiorem morbum, seu comitiale ipsum nominat, eo quod laborantes in comitijs manifestabantur, interrumpiebanturque ea, quo die aliquis concideret: alii etiam aliter nominauerunt, ut idem Trallianus testatur. Sed quoniam parum nostro conueniunt instituto, propterea cuncta ea scribere non oportet: satis etenim erit quoquomodo nominetur, quod eius essentia, seu substantia non te fugiat. namque ut testatur Gal. tertio de loc. affect. conuulsio est omnium corporis partium, non perpetua, sed quæ ex temporum accidit interuallis, cum mentis, ac sensuum oblacione: quam sententiam sectatus est Paulus capit. 13. libr. tertii cum dixit, quod epilepsia totius corporis conuulsio existit cum principum operationum lésione. Differt igitur ab emprosthotono, episthotono, atque tetano: quæ differentiæ sunt veræ conuulsionis, quoniam in iam dictis, perpetua, in morbo comitali ex temporum interuallis conuulsio accidit. Insuper quia in uera conuulsione nullum fit principibus functionibus nocumentum: in morbo autem comitali non modo functiones principes, verum & sensibiles operationes suscipiunt detrimentum: quemadmodum scriptum reliquit Galen. eodem lib. tertio de loc. affect. & libr. de diff. sympt. Cæterum quod cerebrum in hac affectione lædatur, liquido constat. ex Galeno libr. primo de causis sympt. & tertio de loc. affect. quo loco dicebat, Ex his igitur omnibus plane constat in cerebro hanc affectionem consistere. Insuper ex Aetio, qui in omnibus comitialibus morbis cerebrum affectum esse inquit: & Trallianus capitis vitium esse asserit: nec minus & ex Pauli verbis hoc idem confirmatur. Quod si prædictorum auctoritates non suffecerint, ex propriis cerebri functionibus læsis, cum principibus, tum motricibus, & sensibilibus, ut patet ex iam dicta eius definitione, illud patere poterit, (& si plures sint eius differentiæ, ut dicemus. (Nanque in omnibus commune est, quod cerebrum afficiatur, eodem Galeno auctore tertio de loc. affect. & Aetio, qui in hoc ipsum sectatur. Verum nunquid cerebrum ipsum, ut similis pars, an ut instrumentalis noxam suscipiat, nondum liquet. quamvis si quis Hippocratis verba sexto de morb. vulg. rite contemplerit, dum dixit, Melancholici magna ex parte comitali morbo afficiuntur, & contra, morbo comitali laborantes efficiuntur melancholici; percipiet utique, ut instrumentalem partem, hoc est, secundum ventres, & non tanquam similem affectum esse: & si nec Galenus illud indeterminatum reliquerit. nam tertio de loc. affect. dicebat. igitur ut crassus pituitæ succus, ita hic quoque, de melancholico uerba faciens, comitalem morbum solet efficere, ubi in meatibus

Trall. lib. 1. cap. 5.

6. de morb. vulg.
commentario. 6.
com. ultimo.Cap. 7. in prim.
Morbus comi-
tialis quid sit.Quibus a con-
uulsione, & di-
stentione diffe-
rat.Quæ pars in eo
afficiatur.
3. de lo. aff. c. 7.
de diff. sym. c. 3.
1. de caus. sym.
cap. 8. versus fi-
nem.
3. de lo. af. c. 7.
Aet. lib. 6. ca. 133. de loc. af. c. 7.
Nunquid cere-
brum ut simila-
ris, aut ut instru-
mental pars af-
ficiatur.
de diff. in fine.

Loco citato.

cap. primo.

Cap. 7.

Cap. 2.

In quibus cere-
bri uentriculis
hæc affectio fiat.
cap. 7

c. 10. post prin.

c. 6. uetus finē.

cap. 2.

Quis præter na-
turā affectus sit
2. de caus. sym.
c. ul. colligitur.
3. de lo. af. c. 7.

uentriculorum cerebri continetur, siue is medius sit, siue postremus: & 2. de caus. symp. sub his uerbis idem confirmauit, dum dixit. Quemadmodum & apoplexia, & morbus comitialis ob pituitæ in uentriculis ipsius cerebri acerrimam multitudinem accidere videntur: & illud ratione comprobans subdebat. Proinde horum symptomatum tum generatio, tum solutio subitanea est, id quod per corporum intemperiem fieri haudquaquam potest. & eodē tertio de loc. affect. hoc idem approbans hæc uerba conscripsit. Cæterum uelox eius discussio, crassum humorem spiritus meatuum in cerebri uentriculis obstruentem hunc maxime affectum peperisse declarat: & paulo infra subdebat, Sed a crasso semper humore hanc affectionem induci argumēto est, quod & subito fit, & resoluitur confestim: nam subitariam meatuum obstructionem a crasso, viscosoque humore fieri constat. Afficitur igitur cerebrum, non ut similis pars sed ut instrumentaria, quoniam secundum eius ventres in morbo comitiali, ut liquido ex iam dictis patere potest: quamuis & corpus eius parum quodammodo coafficiatur, ut 4. de loc. affect. liquet. Si quis autem altius inuestigare uelit num anteriores cerebri uentriculi, medius, seu postremus in comitiali morbo afficiatur, pro comperto in Galeni doctrina habebit non anteriores, ut medicorum vulgus refert, sed medium, aut postremo affici. Ait nanque Gal. 3. de loc. aff. crassum pituitæ succum, aut melancholicum comitiales morbum efficere, ubi in uentriculorum meatibus retineantur, siue is medius sit, siue postremus. igitur aut medius, aut postremus uentri- culus, & non anteriores ex eius sententia afficiuntur. Ad hæc si impediēte cras- so humore animale spiritum qui in cerebri uentriculis continetur, quo mi- nus possit exire, iam dicta affectio oritur, eodem Galeno auctore; isque ani- malis spiritus proprium ipsius animæ instrumentum sit, tum in sensibilibus actionibus, tum in his, quæ a consilio, & voluntate prodeunt, perficiendis: qui uidelicet in ipsius cerebri uentriculis medio, maximeque postremo, contine- tur; quis inquam inficias ibit eorum aliquem in comitiali morbo affectum esse, & non anteriores præparant nanque, ac conficiunt id si cerebro animale spi- ritum. & non confectum, ac præparatum continent, ueluti postremus, & medius, duo anteriores uentriculi, ut patet 8. de usu partium. & quamuis simul ueluti ductus quidam sint, ac canales ad superfluum effluxionem accommodi ad infernas perforationes in nares, alioquin animal, eodē Gal. teste præcitato li. 8. de usu partium, apoplexijs frequenter prehenderetur, nisi uiam quandam ho- rum excrementorum, quæ sæpe excipiunt, effluxi accommodata naturam præ- parasset: & propterea foras per narium meatus eadem excerneret, non propte- rea dicendum erit, quod oblatiis eisdem cerebri anterioribus uentriculis, comitia- lis morbus fieri possit: cum neque apoplexia ex affectione ipsorum duntaxat generari posset, nisi & medio, ac postremo uentriculo concideretur affectio. opus nanque est in utrisque affectibus, ut tam anterior cerebri pars, quam posterior affi- ciatur, ut patet 4. de lo. aff. propterea detentis præter naturam excrementis in anterioribus cerebri cavitatibus, nisi impartiantur medio, aut postremo, seu medio, & postremo uentriculis, nec epilepsia, nec apoplexia, iuxta Galen. sententiam, generari poterit. Nam uero iam dictus affectus morbus sit in Gal. doctrina, uel symptoma, haud difficulter ex eiusdem uerbis percipi poterit. Nam quod morbus similis non sit, patet tum 2. de caus. symp. tum tertio de lo. af. cum asseruit, non ut partem similem, sed ut instrumentariam, cerebrum in hac affectione lædi. Propterea non mutando cerebri temperamentum cau- sa aliqua comitiales morbum generat: sed ubi ei nocet, ueluti parti instrumē- tariæ: neque enim adeo esset subitanea eius generatio, quam solutio. At quod nec morbus sit in compositione, ut quidam falso sentiunt, & si cerebrum tanquam in- strumentum lædatur, ex eodē Gal. liquet præallegatis locis. dicebat nanque ter-
tio

rio de lo. affect. quòd velox discussio huius affectionis crassum humorem spiritus meatum in cerebri ventriculis obstruentem hunc maxime affectum peperisse declarat. & paulò infra subdebat, quòd impediente humore animale spiritum, qui in ventriculis cerebri continetur, quo minus valeat exire, eadem exoriebatur affectio. & secundo de caus. sympt. morbum comitalem obpuitè in ventriculis cerebri aceruatè multitudinem accidere. Sequitur ergo, vt ex prædictis constat Galeni verbis, comitalis morbus ad ventriculorum cerebri obstructionem, quæ est morbus in via, & non est ipsa obstructio prædictarum cauitatem morbus comitalis, velut quidam, licet falso, asserere ausi sunt: nec insuper in alio genere morborum in compositione connumerari poterit, aut in continuitatis solutione: cum nec illud imaginari queat aliquis, & Gale. ubiq; locorum fatetur, affectum hunc præsertim per essentia genitum perpetuò ad obstructionem consequi. Erit igitur cõnumerandus in symptomatum aliquo genere: quãuis a Celso tanquam vetustissimo auctore, vt qui nullam fecerit inter symptoma, & morbum differentiam, morbus comitalis appelletur. In prædictorum enim symptomatũ numero à Gal. lib. de differentiis sympt. connumeratur. nam cum deprauati motus symptomatũ meminerit, sic ad verbum ait, Si vero non solum totum corpus conuulitur. sed principum quoque functionum prohibitio fiat, symptoma tale epilepsia nuncupatur. In genere ergo noxæ functionum symptoma existit, non tamen naturalium, seu animalium: quæ cum in triplici sint differentia, in cunctis per morbum comitalem noxa existit. Nanque cum de genere sit conuulsionis, eodem Galenoteste 3. de loc. affect. & in eo affectu motrix facultas deprauata. Insuper cum is, qui sic laborat, neque audiat, neque vllò sensu quippiam percipiat, vt idem Galenus eodem loco testatur, erunt quoque in eo affectu sensibiles omnes functiones ablatae. Adhæc cum ratio simul cum memoria oblata sit, cohibitaq; sint principes functiones omnes, eodem Galen. lib. de diff. sympto & 3. de loc. affect. scriptum reliquit, iure fatendum erit in hoc symptom. cunctas animales functiones oblatas esse: verum motricem facultatem deprauatè: principes autem, & sensibiles ablatae. Præcedit hoc vitium (Paulo auctore) corporis, animiq; status minime arbitrarius, tristitia, & eorum, quæ perceperunt obliuio, turbulentæ insomniorum imagines, capitis dolor, eiusque repletio continua, ob iracundiam maxime, pallor faciei, & inordinatus linguæ motus. Nonnulli vero, ipsam quoque mordent. Quamprimum autem malum hoc inuasit, vt idem Paulus testatur, egri concidunt, conuellanturq; stertunt, ac interdum impotens quædam vox eis suboritur, minime aliquid significans. Verum peculiaris admodum eiusdem vitii nota est oris spuma, cum alia communiter aliis quoque morbis euenire possint. Non desunt etiam quibus vrina, & stercus præter voluntatem, excernatur, nonnullis & genitura. Celsus autem dixit eiusdem mali indicia esse, quòd homo subito concidit, ex ore spumæ mouentur: deinde interposito tempore ad se redit, & per se ipsum confurgit. At non ab re admodum peculiare indicium est huius affectionis oris spuma. Nam cum eiusdem generatio ex duarum substantiarum mixtione conficiatur, ranquam ex materia altera spirituosâ videlicet, & altera humida, Gale. teste commento apho. 43. li. 2. & 30. 7. lib. earum autem mixto ambabus in multa perfectis, & multis mutuo complexu paruis ampullis ab ipsis effectis, fit. quem contractum, ac mixtionem nonnuquam violentus motus, & inæqualis vel vtriusque, vel alterius duntaxat substantiæ, nonnunquam vero fortis calor operatur. interim autem & ambæ concurrunt non ab re in ipsis comitalibus morbis, non ex immodico inquam calore, sed propter motus vehementiam, ac inæqualitatem, & violentiam, quæ propter conuulsionem in eis fiunt, spuma generari consuevit:

Loco citato.

Loco citato.

cap. 3.

In quo genere.
symptomatum
reponatur.

cap. 7.

de diff. sympt.
cap. 3.3. de loc. affect. 7.
Signa quæ ipsũ
præcedunt.

Eiusdem inuadentis signa.

Cur oris spuma peculiare sit
signum morbi
comitalis.

Tres comitia-
lis morbi diffe-
rentiæ.

3. de lo. af. cita-
to loco.

Quibus iudiciis
quælibet earum
dignoscatur ac
ab aliis discer-
natur.

4. de loc. af. c. 7.

Galenii historia
5. de loc. af. c. 6.

Altera Galenii
iudicia.

cap. 7.

Ad quem mor-
bum sequatur
hec affectio.
Quæ sit eius cā
Loco citato.

quemadmodum idem Gal. comm. eiusdem aph. 43. testatur; potissimum cum in eisdem corporibus iam dictæ duæ substantiæ reperiantur, spirituosæ scilicet, & humida. id quod nec in vertigine (cum non adeo violentus fiat motus) euenire consuevit, neque in apoplexia, cum non modo vehemens motus, immò neque ullus in ipsa appareat. Hippocrates vero lib. de morbo sacro reddens causam huius dixit, Spuma vero ex ore prodit epylepticis ex pulmone: cum enim spiritus non ingrediatur in ipsum, spumescit, & ebullit, uelut moriens, at libro de flatibus aliam tradidit causam. Relinquitur propterea ut ipsius comitialis morbi sit peculiaris nota oris spuma. Verum quoniam non uno tantum modo is generationem habet, capite uidelicet primariò laborante, sed duobus adhuc aliis modis oriri potest, ita ut tres sint eius differentiæ: quamquam omnibus commune sit, quòd cerebrum afficiatur: quarum una est consistente in ipso cerebro affectu primò, & per se, id quod pluribus epilepticis euenire consuevit. Altera est cum cerebrum ipsum uentriculo, & præsertim ori eius consentit. Tertia uero morbi comitialis species, seu differentia, quamquam ea raro fiat, cum uidelicet à parte aliqua incœperit affectus; qui deinde egro etiam sentiente, ad cerebrum usque ascendat, uelut Gal. 3. de lo. aff. scriptum reliquit: quæ Paulus, Trallianus, & Aetius sectati sunt. Hac de re quibus indi-
ciis quælibet earum dignoscenda sit, ac ab aliis discernenda, opere pretiū erit declarare. Qui primario capitis affectu comitali morbo laborant hoc modo argui poterunt, nanque, ut testatur Trallianus, capite grauantur, oculi obscurantur, & caligant, tardeq; sentiunt: uehemens quoque in his conuulsio apparebit, ut patet tertio de loc. af. At quibus à stomacho uitium hoc oritur, palpita-
tio ipsius percipitur, & turbatio quædā, & erosio. Itē morbi accessionē tū po-
tius ægri sentiunt, irritanturque cū tarde ipsos cibū sumere, aut nullum cōtin-
git, Tralliano, & Paulo testibus: quemadmodū Gal. auctore 5. de loc. aff. cuidā
grammatico iuueni eueniebat; qui quoties vel nimis vehementer doceret,
aut cogitaret, aut in ediam sustineret, aut irasceret, morbo comitali corri-
piebatur, ortum ducente ex ipso ore ventriculi primariò affecto, utpote quòd
facile sentiret, & deinde per consensum cerebro oblato. At si ob aliam quam-
piam particulam morbo comitali laborant, distributionem mali eadem parte
priuariò affecta ad superiora, hoc est, ad cerebrum fieri manifesto percipiunt,
prædicuntq; id quod futurū ipsis est, cum distributio uitij ad cerebrum vergere
incipit, siue qualitas quædam sit, quæ alteratis per continuationem partibus
à parte affecta ad cerebrum ascendat, aut spiritualis quædam substantia trans-
mittatur. His et accedit, ut sine uehementi conuulsione concidant, sed ueluti
saliendo per interualla concuti videntur: quamquam & id commune etiam sit
his, qui à stomacho comitali afficiuntur. Hanc differentiam comitalis mor-
bi à crure initium habentis primum Gal. vidit, cum adolescens adhuc esset, in
puero, qui tertium decimum ætatis annum agebat, narrante puero ipso dispo-
sitionem ipsam à crure initium capere, mox illinc recta ascendere per femur,
lumbos, ac per latera ad ceruicem, donec ad caput perueniret. quod cum pri-
mum tangeret ipsum haud quaquā sibi constare dicebat. Verū quale esset id,
quod ferebatur ad caput interrogatus puer, nihil habuit, quod responderet.
Alius tamen adolescens mentis compos, qui satis poterat, & sentire quod fie-
bat, & alteri enarrare, dicebat ueluti frigidā quandā auram esse id quod ascen-
debat, ut patet. 3. de loc. aff. Tale etiam quidam contingit in his qui à scorpio,
aut aliqua alia venenū eiulante bestia isti sunt. Ceterum cū symptoma sit co-
mitalis morbus, ad morbumq; in ciuitate, seu in via consequatur, eius causa inue-
stiganda erit: quæ à Gal. quoniam subito fit, ac soluitur confestim hæc affectio,
q̃ nulla alia esse poterit q̃ crassus, lentusq; humor 3. de lo. af. adstruitur. Nam
subitariam meatum obstructionem (ut ipse refert) à crasso viscidoq; humore
fieri

fieri constat. Atqui cum crassi humoris in duplici prima differentia reperiuntur, pituitosi videlicet, & melancholici, non ab re ab eodem decretum est, quod velut crassus pituitæ succus, ita & is qui ex atræ bilis naturam habet, comitiales morbum solet efficere: id quod confirmavit Paulus, dum dixit, morbi comitialis modò humorem pituitosum, modò melancholicum causam esse. Tenuis nanque humor, calidusque existens haud ita subito obstructionem gignere valet, sed longo forsitan tempore auctus obstruere posset, non tamen morbum comitiales progignere, qui subito fit, confestimque soluitur. Ij igitur succi sunt, qui cerebri meatus obstruentes, impediensque animalem spiritum, qui in eisdem cerebri ventriculis continetur, quominus possit exire morbi comitialis auctores fiunt. Verum nunquid vnus, vel alter in causa sit, ne sermo proteletur, percipere poteris ex his, quæ diximus indicij succi melancholici cap. de melancholia; & pituitæ, cap. de dolore capitis orto ex pituita. Hæc de causis morbi comitialis primariò affecto cerebro. At si per consensum fiat, sicut diuersus est generationis modus, ita diuersæ eius causæ esse poterunt, quæ vbi ad cerebrum ascenderint, ipsum affligentes morbi comitialis auctores fiunt. Sed mox non iniuria quæret aliquis, nunquid conuulsio comitialis dici possit de repletione, an de inanitione? Cum ab Hippocrate decretum sit apho. 39. sexto libr. eam vel ab vna, vel ab altera, causa gigni posse: eadem sententia quoque confirmata est à Galeno tertio de loc. affect. cui responsum volo ex Galeni verbis, commento aphor. 70. quinti libri, eam esse ex repletione: dicebat nanque conuulsionem ex euacuatione factam acutissimam esse, ac perniciosissimam, eam verò, quæ ex repletione neruorum partium sit, qualis in morbo comitiali, neque acutissimam, neque similiter periculosam esse. Conuulsionem igitur Galenus in his verbis in morbo comitiali factam connumerat inter eas, quæ ex repletione neruorum partium fiunt. Verum adhuc inficias ibit, hoc veritatem fortè habere posse in morbo comitiali per essentiam orto, at in eo, qui per consensum euenit, siue à ventriculi ore, siue ab alijs quibusdam partibus, haud quaquam veritatē habebit; cum nulla repletio partium neruorum in prædictis percipiatur: neque cerebri cavitates obstruantur, cum in eis humor crassus, ac viscidus non comprehendatur, veluti in morbo comitiali per essentiam genito, primariò ipso cerebro affecto. Atqui dicemus nos perpetuò in quouis comitiali morbo conuulsionem fieri, neruorum principio se ipsum quatiente, quò excutiat id, quod noxium est, vt tertio de loc. affect. liquet, quocunque modo ipse excutetur, verum si primariò affecto cerebro exoriatur conuulsio, haud absimilis est eis, quæ à spinali medulla principium habent, conuulsionibus, irrigata explantatione (ex eo humore, qui in cerebro comitialibus comprehenditur) vniuscuiusque nerui: quemadmodum idemmet Galen. testatur eodem tertio de locis affectis, & sexto de morbis vulgar. illud idem confirmavit, cum dixit, Causa autem morbi comitialis (intelligens de eo, qui per essentiam ortus est) crassus, & frigidus est succus congregatus quidem in ventriculis cerebri, comprehendens autem & explantationes scilicet neruorum, & maximè primum principium spinalis medullæ. Qua de re nemo veteri debet, conuulsionem hanc in numero earum esse, quæ ex plenitudine sunt: repleti sunt nanque in ea cerebri ventriculi, irrigati, seu humectati neruorum exortus, ac spinalis medullæ principium: de qua etiam conuulsione eius verba intelligi debent commento aphor. 70. quinti libr. Verum de ea conuulsione, quæ in morbis comitialibus per consensum affecto cerebro, contingit, non absque ratione hæsitandum erit, num de repletione, aut de inanitione dici debeat. nanque in his quoque veluti saliendo per intervalla concuti ægri videntur. At quòd neruorum principium, cerebrum videlicet, huiusmodi motu concutiat,

Num morbi comitialis conuulsio sit de repletionem uel inanitione.
3. de loc. af. c. 6.
Responso.

Cap. 7.

3. de loc. af. c. 7
6. de mor. uul.
commentario 6
commento ult.

Quid sentit
si de conuulsione morbi comitialis per consensum geniti.

ut à se expellat quicquid fuerit, quod à patre primò affecta ad ipsum affertur nemo vereri debet, & Galenus tertio de locis affectis decretum reliquit. propter hoc ergo epilepticæ in his fiunt conuulsiones. Sed si veritatem fateri velimus, ea neque de repletione, neque de inanitione dici poterit, & si dixeris quamlibet conuulsionem, aut ex plenitudine, vel euacuatione fieri, iuxta præa llogatam Hippocratis sententiam, Respondebimus nos illud ueritatem habere in his, quæ per essentiam fiunt, conuulsionibus, & non in his quæ per consensum, ex Galeni doctrina commento aphor. primi, quinti lib. Nanque in his similis aliquis motus cerebro euenit, qualis stomacho interdum à re quapiam molestato accidere solet: quippe cum à ciborum mole grauatur, aut ubi corruptis cibis morfu infestatur: tunc nanque singultu affici conspicitur. sic etiam & cerebrum idem pati existimandum erit, cum aliquod à

Dubium.

Responsio.

Cap. 7.

Quod comitialis morbus semper ad morbum in uia consequatur.

Quato loco.

Quod ab ariditate fieri nequeat.

Pregnostica.

parte primò affecta ad ipsum affertur: quæ licet mole minima, facultate tamen quam maxima est. sed mox in dubium venit num morbus comitialis hoc modo per consensum genitus, velut & is, qui primariò affecto cerebro fit, ad morbum in uia seu in ciuitate sequatur? Cui responsum volo, cum quoque ad morbum in uia, seu in ciuitate insequi: nam licet humor crassus in cerebri ventriculis spiritus meatum obstruens non comprehendatur veluti in morbo comitiali per essentiam genito: constringuntur tamen in hac affectione spiritus meatus, ac cerebri ventriculi, cum primum cerebrum ipsum concutitur, ut à se expellat quodcunque fuerit id, quod contristat. atqui ciuitates partium non modò læduntur, aut pereunt, eis obstructis, constipatis, coalescentibus, aut in se se residentibus: verum etiam constringuntur, iuxta Galeni decreta libr. de caus. morborum. Ad morbum igitur in uia semper comitialis morbus consequitur, impedito animali spiritu, qui in cerebri ventriculis continetur, quominus exire possit. Neque ab ariditate, seu vacuatione ortu ducere potest, quemadmodum Galenus scriptum reliquit eodem tertio de locis affect. id quod probauit ex eo, quod subito fit, & confestim soluitur: etenim breui tempore fieri non posset, ut vel cerebrum, vel tenuior ipsius membrana ad tantam perueniret ariditatem, ut corio simile quippiam pati videretur. Accedit ad hæc, quod in his, qui sic laborant, sensus, & functiones principes confestim detinentur. Occupat autem hoc vitij genus maximè pueros, eosque adhuc paruulos: deinde adolescentes, & iuuenes, minimè vero senes: & decrepitos (Paulo teste) cuius sententiæ se subscribit Cælius Aurelianus libro primo cap. quarto, & propterea (ni fallor) Hippocrates παιδικόν νόσημα, hoc est, puerilem morbum consuevit appellare. habetur hic affectus vnus ex longis affectibus, ut fatetur Trallianus: qui excellentem diligentiam, studiumque requirit. & si per initia neglectus fuerit, frequenter ij, qui eo detinentur, commoriuntur. id quod Paulus confirmauit, dum asseruit quod plerisque hic affectus longus esse solet, nisi cerebris, & vehementissimis accessionibus, uelut acutissimus affectus statim iugulet. Nam si non pubertate, vel menstruorum initio, aut puerperio solutus fuerit, vel si post hoc tempus remanserit, sæpe vsque ad mortis diem prorogatur, nisi congruam medici curationem fuerit assecutus. Celsus quoque testatur hunc morbum comitalem sæpius viros, quàm fœminas occupare, ac solet quidem etiam longus esse vsque ad mortis diem, & vitæ non periculosus: interdum tamen cum recens est, hominem consumit; & sæpe eum, si remedia non sustulerunt, in pueris, veneris, in puellis, menstruorum initium tollit. Magnæ siquidem fiunt corporis mutationes in pubertate, in fœminis maximè propter menstruorum eruptionem. Quare si qui morbi ne hac quidem ætate finiuntur, vsque ad longum tempus perdurare consueuerunt, Galeno teste commento apho. 28. tertij libr. quanquam & ipsemet commento aphor. 7. lib. 5. scriptum reliquerit.

certum

certum esse, quòd neque omnibus sanabitur morbus comitialis ex pubere ætate, nisi & alia rectè gesserint, neque quibus in hac accidit, omnino permanet, si bonam uictus rationem adhibeant. Quapropter non ab re Hippocrates aphor. 45. secundi libr. dicebat, quòd quicumque pueri morbo comitiali laborant, mutatione maximè ætatis, temporum, & locorum, & uictuum quoque liberantur: & aphor. 7. quinti libr. Quibusunque, ait, morbi comitiales fiunt ante pubertatem, mutationem accipiunt: quibusunque autem uigesimoquinto, ferè commoriuntur, & sexto de morbis vulg. ait, Infantium effulgentiæ cum pubertate nōnunquam mutationes habent, &c. Et insuper quòd magna ex parte epileptici fiunt melancholici, & melancholici epileptici, eodem 6. de morb. uulg scriptum reliquit. Aetius uerò testatur, quòd licet difficilem curationem habeat morbus comitialis recens natis paruulis ortus, non tamen ea desperata est. Irruit autem in omni tempore corporibus (ut refert Cælius Aurelianus) sed magis uerno: quo etiam tempore periculosior est, Hippocrate auctore lib. de sacro morbo. Insuper eodem loco scriptum reliquit sacrū morbum inueteratum esse incurabilem: cur uero huic morbo obnoxii aliquando liberentur, maximè accedente, hyeme lib. de flatibus apud eundem Hippocr. legitur. Quòd autem hoc uicio affectis extenuans uictus ratio conferat, cunctis artis medicæ auctoribus liquet, potissimum Galeno, qui lib. de attenuante uictus ratione scriptum reliquit, epilepsias paruas quidem, & etiamnum incipientes eam penitus sanare: inueteratas uerò, ac consumatas inuare non mediocriter. Vtilis est ergo uictus ratio, quæ incidat, atque extenuet: quemadmodum & Paulo etiam uisum est. Quapropter aer ad calidum, & siccum declinans eligendus erit, præsertim si ex pituitoso succo morbus comitialis ortum ducat. Si uerò ex melancholico succo, ad calidum inclinans eligatur, temperatus tamen in pascuis. Somnus quoque sit ei moderatus, & nocturnus: diurnum autem omnino uitent. Exercitia. & frictions profunt etiam capiti, post reliquas omnis corporis partes adhibitæ. Paulo teste. Alius quòd lenis sit, & non astricta eis procurandum erit, ut uentris excrementa deiiciantur, & non detineantur; quod si non sponte ea deiecerint, glandibus, aut clysteribus in eorum excretionem natura prorsanda erit. Deuitādus quoque erit liberalis coitus (quanquam moderatus pro sit:) Ab animi perturbationibus cauere debent immodicis: similiter & sollicitudines, negocia omnia, loci præcipitis conspectum, omniumque terrentium fugere oportet, Celso auctore, cibus conueniens sumi debet, mediæ materiæ: & propterea eis non conueniunt neque sorbitiones, alii quæ molles, & faciles cibi, neque caro, minimeque suilla, ut Celso uisum est. quam sententiam imitatus Alexander dicebat, At carnes vitari debent, donec in totum morbus fuerit discussus, & præsertim suillæ. Similiter etiam legumina, præcipue lenticula. Cum quo etiam conuenit Paulus, sed panis tribuendus est optime fermentatus. Ex uolatibus uero interim carnes gustare potuerunt, gallinarum uidelicet phasianorum, auium montanarum, turdorum, & turturū, ac passerulorum, licet ex his minus pingues eligi debeant, Alexandro teste. quæ decoqui debent cum extenuantium medicamentorum aliquo, ut hyssopo, pulegio, serpyllo, sampso, anetho, & aliis huiusmodi: capparorum frequenter esus mirifice prodest, Paulo teste. Ex oleribus, intybum, caucalidam, gingidum, & decocta porra edāt. A cæpis, dauco, sinyrni abstinendum; cum & caput repleant, comitialesque offendant, Alexandro auctore. Non alienum quoque erit inter pisces erinaceum sumere per interualla: & alios quosdam, qui superfluitate vacent, ut merulam, scordium, aut scarum. Fructus uero cauere admodum salubre est: quanquam uoluptatis gratia modici, & magis a cibo offerendi sunt. Nuces, & palmulæ uitandæ sunt: ac pistachia, & uuas passas super cibū sumere, possunt, præsertim

6. de morb. uul.
commentario, 1.
Tex. 4.
Commentario
7. in fine.

Curatio.
Cap. 1.

Victus ratio.

quæ

Viſus ratio
pueris ſeruāda.

Medicamento-
rum ratio.

quæ leuem aſtringendi uim habent. Coriandrum item ſi comedant, prohibet humores aſcendere in caput, quod maximum adiutorium eſt, Plinio ſecundo auctore, lib. 5. cap. 7. præſertim ſi preparatum ſit eius ſemen. Vinum circuncidendum eſt, præcipue uetuſtum, ac meracum, & copioſius ſumptum, utpote quod caput repleat: uerum ſtomachi gratia, ut coctioni auxilietur (quoniam cruditates cauendæ ſunt) non ab re erit, mediocriter ipſum aſſumere. Sit autem album, & adſtringens, optime dilutum, uel aqua mulſa, ſeu aqua in qua cinnamomum, & coriandrorum præparatorum ſemina fuerint decocta, pro potu utatur. At ſi infans ſit æger, uel etiam lac aſſumit, nihil moliendum eſt, neque agendum quantum ad curationem attinet, Alexandri, & Pauli auctoritate. Nam ætate ad calidiorem, ſiccioſioremque ſtatum uergente, ac uictu moderatiore, ſua ſponte plerumque morbus finitur, ut Hippocratis auctoritatibus, apho. 45. 2. lib. & 7. 5. libr. liquet. Diſcutitur nanque in eis humiditas cerebri uentriculos replens hac ratione, adeo ut ſolius uictus infantium, & eorum, qui lacte nutriuntur, ratio ſit habenda. Quo ſit, ut iuuare nos, curamque habere oporteat ut nutricis lac benignum ſit, & recrementis liberum, ut Trallianus refert, ſi infans lactens ſit. Fiet autem hoc, ſi eadem uictus ratione utatur nutrix, quam ſupra probauimus: hoc tamen ſeruato, quod non ualde extenuantibus utendum ſit, ne plus uafa uteri aperientibus, plurimumque ſanguinem mēſtruū proritantibus, lac imminuatur. Propterea fœniculo, anetho, & aniſo, ac aliis uiridibus utantur, & non aridis, ut quæ magis ſint acria. Verum præter uictus rationem nutricis inſtitutam, Paſſidonij auctoritate, Aetius quædam adhibenda auxilia conſcripſit infantibus ipſis, inter quæ puluis quidam capiti conſpergendus ex cypere, adianto, & iride eſt. Inſuper & illinitionem aſſiduam ex oleo anethino, irino, ac amaracino calidis laudauit: præcipitque eiſdem mel deſpumatum ad delingendum dandum eſſe, & collo alligandum pœonię radicem recentem, quæ ſemper ſtomachum contingat: cuius medicamento auctor fuit Galenus ſexto de ſimplic. medicamentoꝝ facultatibus cap. de pœonia. Sed quoniam non his duntaxat infantulis, & lactentibus, & ablactis, præter uictus rationem utiliter utendi uenia datur medicamentis: quemadmodum non ſemel duntaxat, immò ſæpius experientia comprobauimus: propterea & ea, quibus uti cōſueui recenſere non grauabor. Nāq; & glā dibus paruis ex muris ſtercore, agarico, ſale gemmæ, & puluere hieræ ſimplicis, ac deſpumato melle uti poteris: nec minus & clyſteris ex gallinarum, ſeu pullorum iure, pauco ſale, oleo communi, ſeu amygdal. dulcium unc. ij. mellis roſacei unc. i. trochiſcati agarici ſcrup. ii. aut hieræ picrę ſimpli. 3. iii. uel ambobus ſimul compoſitis utaris: præſertim ſi biennium traſcenderit infans: lingendum quoque præbeto ſæpius parum antidoti pliris archoticon, diambræ, ſeu diamoſchu dulcis ſcrup. i. & ſyrupi de infuſione roſarum, ſeu mellis roſacei unc. i. uel i. & ſ. ſimul mixtis. Interim & antidoti mithridati tantundem accipias, præſertim ſi triennium, aut quadriennium exceſſerit, cum eodem melle roſaceo, aut ſyrupo de infuſione roſarum: nec non & puluerem capiti inſpergendum deſcribam, qui recipit hyſſopi, & ſampſuci ſiccę gran. iii. corticum thuris, maſticheſ ana. gran. iii. ſpicę, florum ſtœcadis, macis, ſingulorum gran. ii. garyophyllorum, nucis moſcatę ana. gran. i. roſarum rubearum ſiccarum 3. iii. terantur omnia, & fiat puluis, qui capiti circa coronalem commiſſuram inſpergatur, aut ex eo paruuli ſacellii paratur, & prædictę captis parti applicentur. non parum etiam conducit & inſcripſtus puluiſculus, ſi eis aſſumendus tribuatur: quo etiam quotidie uti conſueui. Ecipit autem mannæ thuris, maſticheſ gran. iii. nucis moſcatę, ſpicæ, cinnamomi, ſingulorum gran. ii. hirundinis præparatę ſcrup. s. ſeminis, & radicis pœonię gra. iii. pulueris offis cranei uiri, ſi maſculus, fœminæ, ſi fœmina fuerint,

fuerit, gra. v. feminū coriandrorū præparatorum, & sacchari cādidi ana scrup. ii. sacchari oprimi lib. ff. misceātur, & fiat puluis. Tēpora quoque, & locus iuxta narium foramina ex antidoto mithridatico, succæ ruto, ac pauco aceto illinantur: rutaq; ipsa sæpius odoranda erit, ac sub ceruiali substernenda. Interimque infra scripto suffumigio utitor. Rec. ladani 3. i. corticum thuris, mastiches, singulorum scrup. i. rosarū rubearū 3. 4. fiat puluis: quo super prunas adhibito, infans ac domus, in qua degit, leniter suffumigetur. Inungatur præterea spinalis medullæ principium ex oleo nardino, seu de nuce moscata cum oleo rosaceo, seu amygd. dulcium permisto. Qui uerò post puerilem ætatem in hanc affectionem prolabantur in ipsa accessione conuulsæ eorum partes dirigendæ, inungendæ, ac deligandæ sunt: atque ita continendæ, ut in rectum dirigantur. deinde distento ore, uomitus proritandus erit, quò humores ex stomacho extrahantur, pituita que auferatur digitis, aut pennis oleo illitis, irino præsertim demissis. Insuper oportet medicamentis, quæ naribus adhibentur, sensum irritare: uelut peucedano, cyreniaco succo, bitumine, aut cedrina pice. perseverante autem adhuc exacerbatione, glans immittenda erit, ex agarico, sale gemmæ, hiera, & despumato melle confecta. Extremæ partes fortiter uinciendæ sunt, ac confricandæ, confidenterq; castoreum, succumue cirenei cum aceto mulso ori infundere licebit, Aetii præcepto. Acri insuper post hæc clystere utaris, præsertim ipsis reuocatis, decocto uidelicet cētaurii, calaminthæ, aristolochiæ, mercurialis, florum chamæmeli, & furfuris cum sale pauco: in quo unc. iii. uel iiii. olei cōmunis, seu anethini, mellis rosacei unc. ii. agarici 3. i. uel 3. i. & s. hieræ picræ simpl. 3. vii. & antidoti indi, seu benedictæ laxatiuæ 3. ii. vel iii. dissoluas. Deinde recuperatis viribus, per Galen. hieram, agrico trochiscato admisto, seu alio conuenienti medicamento (vbi opus) purgetur. huiusmodi sane est recentis, & acuti comitialis morbi curatio quod si neque his cedat, uerum adhuc permaneat, curandus iam, ut longus est. hos siquidē oportet in longo aquæ potu continere, ex Pauli, & Aetii sententia, quibus etiam (si nihil impedierit) uenam secare confert, non tamen cubiti, sed curum potius, iuxta Galeni sententiam, lib. de curandi ratione per uenæ sectionem, ac Celsi cap. 23. lib. 3. paululumq; sanguinis mittere oportet, eodem Celso auctore, iuxta talum, ex utroque crure uenam incidens. Tempus autem erit adhibendæ uenæ sectionis accessione transacta, aliis cōsentiētibus, ut apud Cælium Aurelianum legitur, quam etiam ex brachio faciendam admittit, quæ admodum & Paulus: tu uero tutius curans ex cruribus potius sanguinem detrahes. Intermisissiq; demum aliquot diebus, purgans medicamentum exhibendum erit, redundante tamen succo prius præparato: qui si pituita fuerit, ex melle rosaceo, oxymellite simplici, aut scyllino, seu syrupo de stœcade, aut hyssopi, in aqua mulsa decocto, seu aliis huiusmodi præparari poterit. Succo autem melancholico redundante, syrupus e fumaria tribuatur, uel ex lupulis seu epithymo, aut seneg. seu epithymi in aqua mulsa decoctum, aut aliis huiusmodi similis, cum quibus semper radicis pēoniæ decoctum commisceri poterit. Postea uerò non semel duntaxat, sed bis, ter, & sæpius (vbi opus fuerit) purgantibus medicamentis ægri purgandi sunt: cauendaq; erit exquisitissima in vnica vice euacuatio. Qua de re redundante pituita pilulis cochijs, aureis, sine quibus, aut de agarico ægrum purgabis, à quibus per duas ferè horas vnc. iii. vel ij. syrapi ex pluribus infusionibus rosarum rubearum, aut persicarum exhibeas. At si à nigra bile hæc passio excitata fuerit à prædictis hunc humorem præparantibus, quæ eundem purgare possunt, tribuas, nempe. 3. i. aut scrup. iiii. ex pilulis arabicis, aut de lapide lazuli, vel de lapide armeno, seu tantundē pulueris senæ, vel epithymi cū scrup. ii. aut 3. i. pulueris hieræ simplicis Galeni catapotia conficias. à quibus per iam dictum spatium vnc. ii. vel iii. syrapi

Reliquis a pueritia medicamentorum ratio accessionis tēpore.

Curatio eorundem ab accessione,

Venæ sectio. Lib. 6. de cura. rat. per uenæ sect. c. 19

Purgatio,

Post purgationē
quibus utēdum
sit.

syrupi domini Augustini, aut prædicti syrapi ex pluribus infus. rosarum absorbere poterit æger. Vbi uero sufficienter purgari fuerint, ægros ipsos lanare non erit inutile, ac cucurbitulas post tres dies cum scarificatione (si opus fuerit) scapulis affigendæ, seu in occipitio: & sequenti dies cataplasma capiti adhibeas, ex pane cocto cum aqua mulsa, cum amygdalis amaris contrito, aut serpyllo, aut calamintha, aut mentha, seu ruta, idq; per triduum continuū dum erit, ex Aetii, & Pauli sententia. Postea radendum est caput, & liniendū neucedam succo in aceto diluto, vel spondylium, seu serpyllum in aceto coquatur, aut iris, & eodem modo illinatur, inde medicamentis uti, quæ sternutamenta citant, hellebori uidelicet, castorii, seu piperis puluere naribus iniecto: aut liquidis errhinis utaris ex aqua hordei, in qua samplucas, aut amarus, serpyllum, calamintha, seu ruta fuerint decocta, & adiecto betæ succo, iris, aut cyclamini: nec minus utiles sunt & mansiles pastilli, qui per os pituitam educant, ex hyssopo, pulegio, pipere, castoreo, chia mastiche, pyrethro, uua passa, & cera confecti, vel aliis huiusmodi superius descriptis utare: in ungaturque spinæ initium ex oleo costiuo, nardino, hyperici, de castoreo, aut de nuce muschata. Quod si neque his cesserit, malum sinapismum capiti adhibe, eorundem Aetii, & Pauli decreto, aut ferro candente in occipitio, & infra, quo loco summa vertebra cum capite committitur, aduras, iuxta Cornelii Celsi sententiam: inuras autem duobus locis iam dictis, ut ipse refert: ut per ea perniciosus humor euadat. Quod si in duobus locis inustionem non perferant, saltem in vno ferro candente aduras. Quo uidelicet summa uertebra cum capite admittitur. Assumere autem castoreum cum aqua mulsa summo pere a Paulo laudatur: & oxymel scyllinum quotidie potū. Aetius uero (Dioscoridis auctoritate) rutæ syluestris semen, cum aqua potum commendat, aut sphondylium eodem modo, & loti eboris ramentorum cremorem, aut foliorum quinque folii 3. i. quotidie potam. Vel si ad dies quinque, aut plures duorum cochleariorum mensura ramentorum eboris, singulis diebus, cum aqua mulsa assumatur. Similiter si æger ieiunus bibat quotidie ex coagulo leporis erui magnitudine aqua dissoluto: & si leporinum non adest, hædino utatur. Assumptionem autem leporini coaguli cum aceto ebibiti, tanquam valde utilem morbo comitiali laborantibus Galenus 10. de simpl. med. facul. summopere commendauit: confert etiam mustellæ hepar sine felle assum, si cum aqua unc. iiii. dabis bibere, ut ait Plin. secundus lib. 3. cap. 10. Ex compositis antidotum diambre, diamoschu dulcis, mithridatum, ac theriacam exhibere poteris. Sunt insuper medicamenta quædā, quæ proprietate quadam, ac tota substantia huic malo aduersantur: quæ quoniam copiose a medicis conscripta sunt consulto prætermisi, velut quædam quoque sunt, quæ comitiales morbum arguunt, & eo affectos collabi faciunt suffita, ut bitumen, lapis gagates, cornu caprillum, & caprini hepatis assati dolor, siue ipsum etiam hepar comestam, iuxta Pauli, & Aetii sententiam. Reliquum est, ut per consensum geniti morbi comitialis curam præcipiamus. Nam si ventriculo primario affecto, fiat, oportet ægro præcipere, ut bonæ concoctionis studiosus sit, eamq; accurate ei procurare, Galeno Auctore 5. de loc. affect. quem sectati sunt, Aetius & Paulus, ita ut ex facili eger concoquat. Proinde panis optime præparatus circa 3. uel 4. horam diei exhibeatur, solus si non fiat: si uero sit crucietur, ex uino madidum albo, atque modice astringente: nam huiusmodi uinum (eodem Galeno teste) ut uentriculum robustum efficit, ita haudquaquam tentat caput: id quod facere solent ea, quæ uehementes uires obtinent. Dare quoque expedit, singulis annis bis, aut etiam ter medicamentum amarum ex aloë: totum nanque uentrem purgat, uiresq; reparat: quo curationis modo iuuenem quendam grammaticum a prædicto affectu Galenus liberauit.

Cap. de coagulo.

Quæ a proprietate morbi comitiales exci-
tent.

Cura morbi comitiales per consensum geniti.

5. de loc. affect.

liberauit. Propterea non ab re & alii simili modo affecti curabuntur: præsertim si in eis flaua bilis circa uentriculum decumbat. At si pituitosum coaceruat uentriculus humorem, atque hinc caput male simul afficiat, & morbum comitiale inducat, prospiciendum est ei (post prædicti succi præparationem, coctionem, & purgationem: quam non picra tantum, sed & agarico solo, aut cum ea misto, perficias (ut os uentriculi ab extra etiam irrigetur ex iis, quæ calfaciunt, & corroborant, bis saltem, aut rer in mense, Alexandri præcepto, oleo chamæmelino, & absynthino: quibus adiciantur styrax, & masthiche: quo præstantius (ut ipse refert) non reperitur: cum & calfacere, & quod imbecille est, firmare potest, ut probe concoquat. Illud tamen silentio præterire nolui, quod non modò in his comitialibus morbis per consensum genitis, uerum & in eis qui per essentiam affecto cerebro, oriuntur, agaricum ipsum non erit prætermittendum: cum & Dioscoridis auctoritate, & Galeni libr. 6. de simpl. medic. facul. & Pauli eodem capite 13. 3 lib. morbo comitiali obnoxios sua facultate sanet: præsertim si ex crassis, & uiscidis humoribus ipse gignatur; quemadmodum neque nigrum ueratrum prætereundum erit, potissimum si nigra bilis epilepsiæ causa fuerit, eiusdem Dioscoridis auctoritate. multum quoque prodest his, quibus stomachus primario affectus est, fefeli, & spondylii radix, ac semen, seu aristolochia rotunda trita, & ex aqua pota. Mirum quoque in modum opitulatur eis assidua crurum scarificatio in talo, seu poplite, eisdem Aetio & Paulo testibus. Alios insuper Galenus uidit conuulsione comitiali, ob oris uentriculi uitium correptos, cum aut non probe coxis sent; aut uini, & quidem meracioris plurimùm potassent, aut ubi ueneri immo dicæ operam dedissent: quibus non alio modo succurrendum erit, quàm prohibita eorum causa, eis procurare, & accuratè concoctionem probam: nullum enim (ut inquit Alexander) est in omnibus quidè affectibus præstantius auxilium, præcipue vero comitialibus. Sin autem nec uentriculus, nec caput comitalis morbi originem habeant, sed ex alia quadam particula initium summat, siue manus ea fuerit, siue pes, illi potissimum parti prospiciendū erit, totaque curatio ei admouenda. Propterea in primis conferunt uincula superioribus partibus iniecta: ab iis enim præsentaneum præsidium expectatur, Galeni præcepto 3. de loc. affect. id quod testatur expertum esse in uiperarum, aspidum, & scorpionum ictibus. quod magis incredibile est propter imminens subitariæ mortis periculum. Inspexit quoque medicos sanasse puerum, cuius morbus comitalis à crure oriri consueuerat, curuato in primis uniuerso corpore ligatoque in medio membro, supra eam uidelicet, partem, quæ primoria dispositione erat affecta, adhibitoque demum medicamine ex taphia, aut sinapi, parti ipsi affectæ. Post igitur totius corporis euacuationem, cum uidelicet malum remittit, ea, quæ adurere, seu exulcerare, extenuare, ac calfacere partē possunt medicamenta, parti affectæ imponenda sunt: inter quæ lepidium a Paulo, & Alexandro cōmendatur. uel medicamentum ex taphia, seu sinapismus: quorum meminit Galenus, eodem 3. de loc. aff. Post omnia commemorata & theriacæ, & naturales balneæ locum obtinent; postremoque curandum ne caput in solatu utatur, ut Paulo uisum est: & de comitalis morbi curatione quouis modo orti, hæc dicta sufficiant.

Agarici Laus.
Diosc. li. 3. ca. 1
Gal. 6. simpli-
cium ca. de aga-
rico.
Lib. 4. cap. 134

Gal. 5. de loc.
aff. cap. 6.

Cap. 7. post me-
dium.
Galeni historia

Loco citato.

περί αποπληξίας. De Apoplexia. Cap. 19:

Est insuper morbus comitalis proximus quodāmodo ei affectioni, quæ αποπληξίας appellatur, ut Galenus inquit commento apho. 15. 2. libr. propterea non ab re post tractationem de morbo comitali, de ea hic tractare intendimus. Posset latine affectus hic attonitus nūcupari,

Quid sit apople-
xia.
Alex. li. 1. c. 16.

Aet. lib. 6. c. 27.
3. de lo. af. c. 10.
in princ.

De diff. sym. ca.
3. in medio.

Quæ pars in ea
afficiatur.
Cap. 10.

Quod cerebrū
in ea ut instru-
mentalis, & nō
ut similis.
Pars afficiatur.
Cap. 2.
3. de lo. af. ca. 7.
in fine.
2. de caus. sym.
cap. ult. in me-
dio.

3. de lo. af. c. 7.
Loco citato.

Cap. 2

Quis præter na-
turam affectus
sit.
De diff. sympt.
Cap. 3.
2. de caus. sym.
Cap. 7.
Signa.

cupari, cum à Celso, hi, qui hac affectione laborant, cap. 26. tertio lib. at-
niti nominentur: quorum (ut ipse refert) & corpus, & mens stupet. Ab Ale-
xandro vero capit. de resolutione, hoc modo describitur, quod ipsa quidem
est totius corporis sensus, & motus abolitio cum principis animæ functio-
num noxa: & Paulus capit. 18. tertio lib. dicebat, sapoplexiam appello, cum
omnes corporis particulæ motum simul, & sensum amiserunt, principalibus-
que animæ functionibus oblesis. Aetius item similiter dixit, quod est priua-
tio sensus, & motus totius corporis vna cum læsione principalium actionum
de repente incidens. Galenus autem tertio de loc. affect. sic de ea scriptum re-
liquit. Cum igitur omnes pariter nerui, tum sentiendi, tum mouendi vim ami-
serint, apoplexia huiusmodi affectio appellatur. & lib. de diff. sympt. apople-
xiam dixit esse affectionem, qua simul & totum corpus resoluitur, & princi-
pes functiones cohibentur. in apoplexijs namque totum corpus derepente sen-
su, ac motu priuatur: quanquam interim sola restat respiratio, eodemmet Gal.
auctore, commento aph. 42. libr. In hac denique affectione quod cerebrum
affectum sit, patet ab eodem Gale. tertio de loc. affect. dum dixit, Igitur apo-
plexia omnibus animalibus actionibus noxam inferens, cerebrum affectum ef-
se manifeste declarat. & Paulus præallegato loco scriptum reliquit, commu-
ne neruorum principum, hoc est, cerebrum in apoplexia affectum esse. Poterit
nec minus & illud ratione inuestigari, ac ex operationum læsione tanquā
ex signo inueniri. Læduntur namque in prædicta affectione, velut ex iam di-
ctis eius descriptionibus liquet, non modo sensibiles, & motrices animæ fun-
ctiones omnes, verum & principes: quarum auctor, fons, ac principium cere-
brum existit. Iplis ergo cunctis oblæsis, de necessitate & cerebrum oblæsum
erit, non modo secundum vnam eius partem, anteriorem videlicet, aut poste-
riorem, imo secundum vtranque in apoplexia, velut etiam in morbo comitia-
li, afficitur, ut patet quarto de loc. affect. Verum cum subito eueniat, sicut &
comitialis morbus, cerebri ventriculos, eosque principes primario affectos ef-
se manifestum est, eiusdem Galeni decreto tertio de loc. affect. id quod confir-
mauit etiam 2. de cau. symp. dum dixit, Quemadmodum & apoplexia, & mor-
bus comitialis ob pituitæ ventriculis, ipsius scilicet cerebri, acervatę mul-
titudinem accedere videntur. Proinde horum symptomatum tum generatio,
tum solutio subitanea est, quod per corporum intemperiem haud quaquam fie-
ri potest. Propter repentinum ergo eius exortum, non propter intemperiem
totius essentię cerebri, sed ob crassum, aut frigidum, aut viscosum humorem,
principales cerebri ventriculos implentem fieri apoplexiam, indicium
est, ex eiusdem Galeni sententia tertio de loc. affect. & Aetii, capit. de apople-
xia. Atqui principis cerebri ventriculi, iuxta Galeni decretum, eodem tertio
de loc. affect. postremus sunt, & medius: quamuis in ea non modo principes ce-
rebri ventriculi afficiantur & corpus minus, veluti in epilepsia, sed & cerebri
corpus quoque vna magis læditur, ut patet quarto de lo. affect. cum dixit, Ve-
rum in caro, & morbo comitali vëtres magis, cerebri corpus minus, in apop-
vero corpus magis affici solet. Nunquid vero apoplexia in morborum nume-
ro, aut symptomatum connumeranda sit, ex prædictis eius descriptionibus pa-
tere poterit. Namque cum omnimoda sit sensus, & motus priuato, ac princi-
pum facultatum cohibitio, non morbum, sed symptoma esse fatendum erit, si-
mul cum Galeno lib. de diff. & 2. de caus. sympt. liquet insuper hoc symptoma
esse in genere noxæ functionum animalium, omnium inquam, motricum
videlicet, sensibilibum, & principum, & non diminute, nec deprauate, sed abla-
te. Qui hac affectione laborant, omni denique motu, & sensu carent, ac tan-
quam mortui viuunt, & oculis clausis instar dormientium, decumbunt, ac ster-
tunt, quemadmodum etiam proinde dormientibus accidit, licet secundum
d iuersum

diuersum modum. læditur quoque in his spirandi facultas, quo à caro discrepat apoplexia, ut patet 4. de loc. aff. quinimo cum plures eiusdem apoplexiæ differentiæ reperiuntur, ut patet apud Hippocratem, & Galenum aph. 42. 2. libr. & 3. de loc. aff. ex nulla alia uia easdem discernere poterimus quam ex uehementia, seu paruitate noxæ ipsius respirationis; sic enim, & affectionis magnitudinem, atque periculum maius, uel minus conijcere poterimus, ut 3. de loc. aff. ab eodem Galeno decretum est. Nam si ipsa prohibeatur, ut nulla aspicientibus uideatur fieri spiratio (non quòd secundum rei naturam, nullo modo spirent laborantes: nam impossibile esset, ut omni spiratione exacte priuatum animal in uita seruari posset: cum spirationem à uita, & uitam à spiratione separari non posse cuilibet pro comperto habebatur, adeo ut uiuentem non spirare, & spirantem non uiuere sit impossibile, ut 4. 5. & 6. de loc. aff. Galenus scriptum reliquit) tunc igitur cum ita prohibeatur respiratio, ut ad sensum ægri non spirare uideantur, maxima, & acutissima erit apoplexia, eodem Galeno teste, commento apho. 42. 2. lib. quamuis uiuere etiam possint animalia quædam, & si nihil omnino spirent; ut ca. de uteri suffocatione dicemus. At si qui apoplectici spirant quidem, sed magna cum ui, fortis adest ipsis apoplexia, adeo ut Galenus. 3. de loc. affec. asserat omnium apoplecticorum pessimam putandam esse spirationem, quæ & intermittitur, & magna cum uiolentia trahitur: quando uidelicet ad sensum spirent: nam si ipsis ea prohibeatur (ut diximus) omnium erit acutissima, ac maxima apoplexia; cum uero spirant, uerum eo modo, quo diximus, fortis adest istis quoque apoplexia, & inter omnes alias, præter iam dictam pessima. Verum minus fortis adest illis, qui neque intentum, neque uiolentum, inæqualem tamen, atque inordinatum, ac præterea intermittentem habent anhelitum: uelut si in aliquibus aliquem seruat ordinem ipsa respiratio, quamuis quodammodo spirandi facultas læsa sit, debiliior si quidem existit hæc apoplexia: & si omnia fiant, quæ sunt necessaria, ut patet eodem commento aph. 42. 2. lib. forte curatur. Quatuor igitur, iuxta Gal. sententiam apoplexiæ differentiæ connumerari possunt, ut ex iam dictis eiusdem Galeni uerbis liquet: quamuis Hippocrates præallegato aphorif. 42. duas tantum meminerit, quæ inter se ratione maioris, uel minoris noxæ ipsius respirationis discrepant. Quapropter eodem 3. de loc. affe. dicebat Galenus, Discernitur autem affectionis magnitudo, de apoplexia uerba faciens, ex noxæ, quam inspirationi infert, uehementia: cum enim naturalem ordinem plurimum egreditur, magnam: cum uero paulum impediunt est, paruum in cerebro noxam esse conijcere oportet. Et insuper eodem 3. lib. de loc. aff. asserit, Porro in omnibus his affectibus, in quorum numero apoplexia quoque continetur, periculi magnitudinem, ex anhelitus magnitudine conijcere oportet. Sed non ab re mox quispiam à nobis quæret, qua ratione fiat, ut Galenus ex uehementi noxæ respirationis potius, quam ex aliarum animalium functionum læsione uehementi magnitudinem uoluerit apoplexiæ significare cum & functiones omnes animales in ea oblesæ sint, ut dictum est. At qui respondebimus nos respirationem ipsam in numero earum actionum, quæ à consilio, & uoluntate prodeunt, esse, iuxta eiusdem Galeni sententiam secundo de motu musculorum. Quapropter musculorum minus est. eamque si libera fuerit, solum septum transversum, modo valeant uires, afficere solet ubi uero ipsum ob infirmitatem spirandi munus perficere non ualeat, tunc intercostalium musculorum concurret auxilium: & si maiori egeat animal respiratione; thoracis muscoli omnes superni, ad spirandi actionem requiruntur, ut liquet quarto de loc. affect. uerum cum opera, quæ uoluntario motu fiunt, in duplici reperiuntur differentia, ut patet eodem libr. 2. de motu musculorum

Cap. 2.

Quomodo distinguantur diuersæ differentiæ apoplexiæ. 3. de loc. affect. cap. 7. in fine. Cap. ultimo.

4. de loc. affect. cap. 7. prope finem.

5. de loc. affect. cap. 1. prope finem.

6. de loc. affect. Cap. 4.

Cap. 10.

Quod quatuor, sint apoplexiæ differentiæ. Loco citato.

Cap. 7. in fine.

Cur periculi magnitudinem Gal. in apoplexia uoluerit significari ex noxa respirationis.

Cap. 5. in medio.

Respiratio quis ac qualis motus sit.

2. de loc. affect.
cap. 7.

2. de motu. musc.
Cap. 6.

Opera que vo-
luntario sunt
motu, sunt in
duplici differen-
tia.

Servi barbari
historia.

2. de motu mu-
scul. cap. 6.

De vtilit. respi.
cap. 1. in princi-
pio.

Cap. 1. & sequē-
tibus

Quod inter oēs
alias functiones
respiratio sit
maxime neces-
saria.

3. de loc. af. c. 7.
in fine.

5. de loc. af. c. 1.
in medio.

c. 4. in prin.

musculorum, nam alia penitus libera sunt, alia uero affectibus corporis ser-
uiunt; priora itaque perpetuo absque impedimento à nobis sunt: posteriora
uero non perpetuo, sed in tempore quodam, & cum mensura. opus respira-
tionis iuxta eiusdem Galeni sententiam, non sub prima continetur differen-
tia, sed sub secunda. Nam licet uoluntatis sit opus, & sponte ab anima fiat, pe-
nitus ipsam retinere longo tempore non ualemus citra mortis periculum:
quemadmodum declarauit seruus barbarus, qui cum uehementi ira concita-
tus mortem sibi consciscere decreuisset, prostratus humi, respirationeque
cohibita, longo quidem tempore immobilis erat, postea uero paulum uolu-
tatus, hoc pacto mortuus est. Licet tamen nobis usquequaque respirationem
cohibere, quoad maximè necessitas urgeat: periculum nanque esset, ne quis
moreretur, nisi respirauerit. quo fit ut ipsam penitus retinere arduum sit: neq;
enim omnes ad moriendum sunt procliuēs, etiam si infinitis malis confl-
ctentur, iuxta eiusdem Galeni sententiam, eodem lib. de motu musculorum.
Et propterea idem Galenus lib. de vtilitate respirationis dicebat, ex eo ap-
parere non vulgarem esse eius vtilitatem: quod ne momentum quidem tem-
poris ea deperdita, sufficere possimus: ex quo manifestum est ad nullam par-
ticularem actionem, sed ad ipsam vitam eam referre, atque necessariam esse,
& propterea si ea priuemur, morimur. Seruatur nanque ex ea innati caloris
symmetria, potissimum cordis, animalisq; spiritus nutritur, ut patet eodem
lib. de vtil. resp. at sexcentis alijs in locis apud Galenum, ex quibus luce cla-
rius excipi poterit, inter omnes animales functiones hanc maximè esse
necessariam: nanque ea abolita, non animalis partem quampiam, seu actio-
nem priuatam esse dicemus, sed vita priuari asserimus; cum vita citra re-
spirationem, & respiratio sine vita esse non possit. hinc patet quòd & si
cunctæ animales functiones in apoplexijs oblādantur, ipsa tamen respiratio,
cum adeo maximè necessaria sit pro vita, vltimo loco noxam patitur, curam
habente natura ipsa de vitæ animalis conseruatione, immò & ipsius spiratio-
nis maximus vsus neruorum facultatem ac operationem excitat. Probauit &
illud signo Galenus sumpto ex somno, tum tertio, tum quinto de loc. affe.
nam quamuis dormientes nulla alia voluntaria fungantur actione, sed omnes
ferè musculorum actiones in eis exoluantur (sola autem respiratio seruatur,
quæ musculorum thoracem mouentium munus est) sensusq; quodammodo
expertes sint: nam neque ipsa anima dormientium omnino quiescit, ut pa-
tet eodem lib. 2. de motu musculorum, sed intermissionem quandam habet
vigoris, quæ non perfecta quies dicitur: & propterea non penitus sensus ex-
pertes sunt, neque omnino à voluntario motu cessant dormientes: sic, non
in apoplexia duntaxat, sed in omnibus soporosis affectibus, quanquam neque
sentiat corpus, neque moueatur, sola tamen respiratio seruatur, alias nec ip-
sum animal uiueret. hoc autem fit propter eiusdem respirationis utilitatem,
ut idem Galenus testatur eodem commento apho. 42. secundi lib. quæ quidē
neruorum uim excitat ad operationem: & ob hanc causam mirandum non
erit, quomodo omnibus alijs musculis motu carentibus in apoplexijs, illi qui
thoracem attollunt, quamuis difficulter moueantur, tamen plerunque, immo
magna ex parte, ut ipse inquit musculi omnes in apoplexijs operantur tho-
racem mouentes, & si raro prius omnes operabantur: quemadmodum & in
vehementibus exercitijs, ubi anhelitus plurimus est necessarius: quanquam
in apoplexijs non ob id, quod auctus fuerit usus respirationis, quem duplicem
esse diximus: sed quia uis ipsa ex imbecillis, ideo omnes musculi thoracis si-
mul coguntur operari, cum si non operarentur, cordis quoque temperamen-
tum solueretur, & animali ipsius necessario sequeretur interitus. Semper
enim mors ad modicas sequitur cordis intēperatias, ut patet quinto de loc.
affect.

affect. cum igitur apoplecticos mori contingat ob id, quod spirare non possunt, ut tertio de loc. affe. liquet: non ab re Galenus ex eiusdem anhelitus documento periculi magnitudinem conicere oportere decreuit. Nam ipsa ad sensum prohibita periculossissima, ac maxima erit apoplexia. At si magna cum violentia trahatur, fortis inquam erit & ipsa. Verum si inæqualis, & inordinata, ac intermittens spiratio fuerit, minus periculosa erit apoplexia: quemadmodum in quibus aliquem seruat ordinem, debilior existit, & si omnes apoplexiæ fiant, propterea quod uis animalis non potest defluere ad partes infra caput existentes. Paulus quoque in hoc uelut in reliquis Galenum sectatus cap. 18. tertij lib. sic scriptum reliquit. Seruatur itaque in apoplecticis modica quædam respiratio: quæ si permultum a naturali functione recesserit, maximum infert malum, si paululum, exiguum. Et quoniam earum generatio subitaria est, ut diximus, non in ipsius cerebri corpore principaliter impedimentum esse significatur, uerum circa eiusdem cerebri uentriculos, eosque principes, ut ostensum est Galeni auctoritate: in quibus spiritus animalis continetur: quo ueluti primo instrumento anima utitur ad animales functiones exercendas. Idcirco non alia ratione ipsi uentriculi afficiuntur, quam & in epilepsia afficiebantur: cum idem locus in utraque patiatur, Galen. teste commento aph. 45. 2. lib. Quare aut ad obstructionem, aut ad constipationem, seu constrictionem prædictorum uentriculorum succedit apoplexia ipsa, ad morbum inquam in uia. Qua propter aut frigidus, aut crassus, seu uiscidus succus eosdem uentriculos affatim opplendo, apoplexiæ causa erit: qui non modo pituitosus esse poterit, ut patet commento apho. 42. lib. 2. & 1. de caus. symp. uerum etiã & melancholicus, quemadmodum testatur idem Galenus commeto aph. 56. 6. lib. quoniam utrisque humoribus, ut ipse asserit, communis est crassitudo, & propterea frigidum, & crassum humorem tam epilepsiæ, quàm apoplexiæ causam esse fatetur, commento eiusdem aph. 45. 2. lib. aut phlegmonosam aliquã dispositionem, quæ in ipso cerebro sit constituta, seu inflammatorium affectum non siquidem uentriculos ipsos obstruentem uelut frigidus, & crassus, seu uiscidus succus, sed eos constipantem apoplexiam gignere, idem Gale. ait commento apho. 42. 2. lib. uocat autem inflammatorios affectus, ut patet 2. de loc. affe. inflammationem, erysipelas, & abscessum. Consuevit nanque maxima constipatio apoplexiam asserre, ut patet lib. de caus. morb. similiter ex immodico uini potu, aut immoderata etiam optimi succi ciborum ingestione, & eorum qui plurimum alimenti præbere possunt, ac uehementibus cruditatibus, admodumque frigidi aeris occursum, casu, aut capitis ictu apoplexia oriri poterit, non alia ratione, quàm ob læsis ipsius cerebri uentriculis, impeditoque propterea ipsius animalis spiritus, ac facultatis ad debitas partes transitu, quoniam hac ratione omnes apoplexiæ ortum dicunt. Gal. teste præallegato commento aph. 42. 2. lib. Verum si ex pituitoso, aut melancholico succo excitetur, ex propriis eorundem succorum redundantie signis, cap. de melancholia, & de capitis dolore ex pituita traditis, conicere poteris: tum quia febris non aderit, quemadmodum si phlegmonosa fuerit affectio ex propriis cuiusque affectus indicibus percipies, at febre. Externa uero causas, quæ, quales ue fuerint, ex instantium relatione intelligere poteris, potissimum si ante actam uitam tibi retulerint. De hac apoplexia in sæpius allegato aph. 42. 2. libr. Hippo. hoc modo prognosticum propalauit: quod soluere eã quæ fortis est, impossibile erit, debilem uero, non facile. Et Paulus præallegato loco de præsentit, dicens, quod apoplexia nequaquam, aut raro curatur, ut quæ mortem in propinquo minetur. Si uero etiam remedia ipsam substituerunt plurimũ cū partis cuiusdã corporis resolutione discedit: nam solutæ apoplexiæ creberrime succedere solet uocata παραπληξια, in quã morbus comitialis nõ finitur, ut patet 4. de loc.

5. de loc. affect. cap. 1.

3. de loc. affect. Cap. 10.

Concluditur ex Galen. periculi magnitudo in apoplexijs, ex ratione respirationis.

Ad quem cerebri morbum sequatur.

Causæ.

2. de caus. sm. Cap. 7.

Cap. 3. in princ. Cap. 3. colligitur.

Causarũ diuersarum signa.

Prognostica.

Cap. 2.

H affe.

aff. quoniam in eo vniuerso corpori conuulsio, & non resolutio: veluti in apoplexia euenit: quæ cum actio deprauata sit, minorem indicat noxam, quam totius corporis resolutio, in qua actio animalis omnino oblata est. Hæc quidem passio, inquit Theodorus Priscianus cap. 7. lib. 2. ad Timotheum, acuta est, & nunquam penitus sociata cum chronicis, nimium sollicita, sine febribus tamen. Aetius verò, Archigenis auctoritate, asserit apoplexiam ex sui natura magnam esse, & vehementer acutam; contingereque, vt qui periculum effugerunt, in diuturnum morbum incidant, resolutionis videlicet aliquarum partium, aut etiam totius corporis, aut violatæ rationis. At Cornelius sic de ea scriptum reliquit, Solent autem, qui per omnia membra vehementer resoluti sunt, celeriter rapi, ac si correpti non sunt, diutius quidem viuunt, sed rarò tamen ad sanitatem perueniunt, & plerunque miserum spiritum trahunt memoria quoque amissa, Quòd autem quicumque sani dolore capitis repente capiuntur, & statim muti fiunt & stertunt, in septem diebus pereant, nisi febris apprehenderit; decretum reliquit Hippocrates aph. 51. 6. lib. & quòd apoplexiæ fiant maxime à quadragesimo anno, vsque ad sexagesimum aph. 57. eiusdem lib. præsertim ea, quæ ex atra bile fit: nullus enim morbus adeò est senili ætati familiaris, vt Gal. testatur comment. aph. 31. 3. lib. Quapropter Aetius senibus magis in hyeme, & constitutione frigida, hanc affectionem accidere testatur. Atqui ex dictis concludimus nos forti apoplexiæ, remedia non esse adhibenda: cum suapte natura exitialis sit, Hipp. auctore: sed si ea debilis sit, quam dignoscere ex iam dictis docuimus, licet solutu neque facilis sit; oportunis tamen auxilijs adhibitis forte curari poterit, Galeno teste: quemadmodum & nos non semel curauimus, potissimum in Illustri Fabritio Maramalo, qui bis, diuersis tamen temporibus, ab ea correptus, oportunis remedijs adhibitis, Deo fauente, liber euasit: Necnon & Illustris Chrysoltoma de Aquino Ruborum comes, quæ cum annos ageret fere sexaginta in apoplexiam incidens, remedijs confestim adhibitis, ab ea liberata est, principesque primo functiones recuperauit, deinceps cum in sinistri lateris resolutionem finita esset apoplexia, sensum primo cum brachij, tum cruris, & motum deinde cruris antea, & demum brachij non longo post tempore adepta est. Qua de re leuis apoplexiæ curatio non prætermittenda erit, & cum ea quoque magna & acuta sit affectio, potius à præsidiorum, quam à victus ratione eius curatio auspicanda esset, quemadmodum mos est plerisque artis medicæ auctoribus. Verum nos ne consuetum ordinem peruertamus, pauca prius de vict. ratione dicemus, mox vero ad eius curationem deueniemus. Collocetur igitur æger in aere ad calidum decliui: cibus vtatur paucis, leuibus, & calidis, deterforia vi præditis, distributionisque facilis, plerunque cum melle edulcatis, vt placuit Aetio. qua ratione gallinarum, seu pupillorum iure, in quo decoctus sit hyssopus, serpyllum, spondilium, seu satuirea, calamintha, aut sampucus, vel denique saluæ folia, vtendum. In quo iure panis quoque optimus macerari poterit. Pro potu, tutius erit vti, aqua mulsâ, aut apomelite cum micis panis, iuxta Pauli sententiam: cauendumq; à vini potione: quamuis si diutius malum proteletur, eo calente aqua temperato (Pauli decreto) vti poterit. statim quoque prædictis taliter ægrotantibus sanguis ex vena detrahendus erit, prædicto tamen eorum periculo, vt ait Aetius: quoniam sanguinis detractio, vel occidit, vel liberat, Celso auctore: adeò vt post sanguinis missionem (vt ipse refert) si non redit & motus, & mens, nihil spei superest. Detractio autem sanguinis è dextra manu fiat, humerali, aut media incisa vena, vbi vires, ætas, & alia non dehortantur: affectus nanque magnitudo id præcipit, tanquam princeps scopus venæ sectionis, Hipp. & Gal. decreto. Verum copia sanguinis, qui decahitur, diuidenda erit

Historia,

Curatio,

Vicus ratio,

Venæ sectio,

erit: cum commouere oporteat tantum; non exoluere vires, & calorem extinguere, vt testatur Aetius; & propterea in euacuatione, pulsus, faciei color, ac inspiratio inspiciantur, vt ipse refert, & si nihil mali consequatur, etiam repetenda est detractio: quoniam aliud curationis genus vix vnquam sanitatem restituit, vt placuit eidem Celso. Post tamen venę sectionem, & vociferationes, & odoramenta excitatoria adhibeantur, ex castoreo, opopanacę, aut galbano, seu sagapeno, & aperto eorum ore, acetum mulsum instillandum erit & pinnę oleo irino imbutę immittendę sunt, & vomitus prouocandus: totūq; corpus oleo calido inungendum est, irino, nardino, costino, de castoreo, aut alijs huiusmodi, vinctisq; ac frictionibus vehementibus in extremis corporis partibus vtendum: & humeris plures cucurbitulę affigendę. Interim caput, prius abrasum, rosaceo cum aceto, in quo serpyllum, aut spondylium fuerit decoctum, seu calamintha, irrigandum erit, seu chamęmelino, vel anethino, vt Paulo visum est, aut anethi, chamęmeli, sampluci, serpylli, hyssopi, fertulę campanę, singulorum pug. ss. florum stęcadis, origani, spicę 3. iiii. in aquę bulliāt, ac vini portione æquali; quo medicamento similiter caput irrigetur. Si verò hæc nihil profecerint, clysteribus vtendum erit, ex decocto turfuris, mercurialis, minoris centaurei, rutę: hyssopi, pulegij, saluie, calaminthę, singulorū manip. s. polipodij vnc. ss. semini fœniculi, anisi ana 3. ii. & parato ex eis secundum artē decocto de eo recipe lib. i. & ss. in quā dissoluas hierę picrę compositę vnc. s. benedictę 3. iiii. confectiois de dactylis, siue antidoti indi 3. iiii. agarici 3. i. & s. melis rosacei vnc. ii. salis communis, seu gemmę parum, olei anethini, chamęmelini, seu rutacei vnc. iiii. commistis omnibus fiat clyster. Nec minus & glandes commendatur, quę ex hiera simplici, seu hieralogodio colocynthide, agarico, & salę gemmę, cum despumato mellę formari poterunt. Interim helleborum addere poteris, aut 3. ii. ex pilulis cochijs: ligentur autem filo; vt pro arbitrio extrahi possint, sintq; notabilis longitudinis, vtpote quinque, aut sex digitorum. Verum si ægri inepti ad venę sectionem fuerint, aut in prædictis malum quoq; perseuerarit, alienum non erit, medicamentum purgans eis præbere (ac non secus interim modo dictis præsidij vti) quod ex pilulis cochijs & agarico, pituita præsertim redundante, componatur: aut ex eisdem pilulis, seu arabicis sumpta 3. i. cum veratri nigri scrup. i. aut 3. s. catapotia formentur: vel aliquod ex modo dictis purgantibus medicamentis præcedenti cap. de morbo comitiali, reliquas, & quia permittit hæc affectio, ac cogit, vt Aetius testatur, vel temere omnia tentare, si vires permiserint, cucurbitulę quoque occipitio cum scarificatione defigendę sunt, theriacaq; mithridato, ac diambra post purgationem vtendum: nec minus & ea, quę sternutamenta excitant, crebrius adhibita profunt, vt puluis castorii, hellebori, seu piperis naribus inspersus. Similiter conferunt quę pituitam per os ducunt, apophlegmatismos nominant: parentur autem hoc modo. Rec. pyrethi, staphidis agrię, piperis an. 3. s. thymi, origani ana 3. i. castorii scrup. i. mastiches 3. i. & s. vux passę 3. ii. cerę albę parum, misceantur, & fiant mansiles pastilli cum oxymelite, aut rosaceo melle: præstat etiam & rubificantibus medicamentis vti appellatis sinapismis, ac alijs, quęcunque capiti admota calfaciendi, ac disficiendi vim habeant, vbi præsertim ea quę diximus, medicamenta non suffecerint. Nec prætermittenda erit inuito circa spinalis medullę initium, ex oleo rutaceo, seu nardino, de castoreo, aut nucę muscata. Et hæc de apoplexię curatione sufficiant, modo ex curari valeat, vt diximus.

Reliqua medi-
camenta quę
apoplecticos
excitant.

Clysteres.

Glandes.

Purgatio.

Post purgatio-
nem, seu venę
sectionem reme-
dia.

Cap. 5.
in medio.

Loco citato.

Per totum.

Nam eas parti
componentium
oculos.
Aet. lib. 7. c. 1.

10. de usu pat. c.
2. in prin.
1. de caus. symp.
cap. 2

In principio.

4. de comp. me.
sec. loc. cap. 2. in
prin. 10. de usu
pat. c. 7. colligi.
cap. 1. & 2.
Quod triplici
vitiis genere
videndi actio
lædatur.

Cum inter omnia sensuum instrumenta oculus mirabili fabricæ excellentia præditus, ad cerebri naturam propius accedat, certiusque, ac subtilius, quam reliqua proprium, ac primum sensibile habeat: siquidem in nullo alio instrumento inuenies neque ipsam cerebri substantiā, neque tantam animalis spiritus copiā, quanta in oculo continetur, Galeno teste 7 de Hipp. & Plat. decretis; propterea post cerebri, capitisque affectus, de oculorum affectionibus tractare duxi: quorum actio uidere est: eorum autem proprium sensibile est colorum genus, cum illos primos, & per se, & solus ex omnibus sensibus uisus percipiat, ut patet eodem 7. de Hippocratis, & Plat. decret. Relicta itaque eorum admiranda constructione, temperamento, ac cunctarum eorundem partium usu, uelut fuse tractatis ab hominibus artis medicæ auctoribus, præsertim Galeno, lib. x. de usu partium, aliisque sexcentis in locis, quia ex eiusdem Galeni sententia in quolibet instrumento una quæpiam reperitur peculiaris pars similis, cui primo, ac per se totius instrumenti actio committitur, aliæ uero cunctæ eidem præstant usum, ea de re in eiusdem Galeni, aliorumque illustrium medicorum doctrina cōpertū est, uisus actionē crystallino humori, tanquam primæ instrumenti parti, tribuendam esse. Præstant uero usum reliqui humores gemini, uitreus uidelicet, & albugineus, ac tunice cunctæ propriæ, quæ tres non a Galeno duntaxat, sed & Aetio aliisque medicæ artis bonis auctoribus connumerantur, quarum una interna magis, græce ἀμφιβλήτορα, latine uerricularis, seu reticularis, secunda ῥαγοειδής, hoc est, uniformis, in cuius medio foramen existit, quod pupillam uocant. Tertia uero κερατοειδής, id est, corniformis tunica appellatur, potissimum a Galeno eodem x. de usu partium, & 1. de caus. symp. ex his denique propriis partibus totus cōponitur oculus. Est insuper & alia oculi quarta tunica, seu mēbrana, quam græci ἐπιπεφυκοίτη, latine uem aguatam uocant: propterea quod aliis, quæ oculum ipsum constituunt tunicis forinsecus ex membrana os caluariæ ambiere quæ περιεράτωρ dicitur, agnata sit ligamentum siquidem existens toti oculo ad circumdata ossa, cum quibus oculum ipsum colligat, simul autem & mouentes ipsum musculos operit. Siquis autem uelit prædictas tres proprias oculorum tunicas in anteriores & posteriores partes diuidere, & hac ratione alio nomine posteriores earum partes nuncupare, ut nonnulli consueuerunt, ac sex, non tres duntaxat oculis proprias tunicas tribuere, cum ad rem tractandam nec obsit, nec conferat, non reclamamus: etiam si ex Galeni seu alterius medicæ artis auctoris scriptis illud elicere conetur. Nos uero tres duntaxat oculorum tunicas connumerauimus, anteriores earundem partes a posterioribus non segregantes: cum & utraque earundem tunicarum pars, siue ante crystallinum humorem, siue post constituerit, eiusdem sit substantiæ, ac ab eodem loco, cerebro uidelicet aut membranis eius, tenui, seu crassâ progerminetur, Hippocratem sectati, qui lib. de loc. in homine dixit, Membranæ autem tres sunt quæ oculos custodiunt. Quartam autem, quæ agnata dicitur iure non uelut propriam annotauimus: cum neque ex cerebro, aut aliqua eius membrana, sed ex ea quæ exterius os caluariæ ambit, pericrania dicta, originem ducat. Nuncupatur autem agnata, propterea quod aliis, quæ oculum ipsum constituunt tunicis, forinsecus agnata sit, ligamentum existens toti oculo ad circumdata ossa, ut patet. 4. de compos. medic. secun. loc. & 10. de usu part. Verum cunctæ nedum prænominatæ tunice, sed etiam dicti humores, ut perfecte visio ipsa absoluitur, a natura conditi sunt. Quod fit, ut ex triplici vitiis genere (ut testatur Galen. 1. de caus. symp.) videndi actio lædi possit: quorum unum est, cum primum sentiendi instrumentum quippiam per

peffum

peffum est, quod crystallinum humorem esse diximus. Alterum cum ministratum primo sentiendi instrumentum partium aliqua fuerit affecta, velut sunt reliquæ omnes oculi partes annotatæ: Tercium est, cum ipsa sentiendi potentia, quæ à cerebro per neruum in oculum ipsum descendente procedit, quomodo fuerit impedita. Quicquid nanque ex iis (quæ iam enumerauimus) fuerit oblatum, animal vel male, vel nihil omnino uidebit, hoc quidem commune est cuilibet sentiendi actioni. Exordiemur autem nos ab iis oculorum malis, quæ eorundem partibus vsum aliquem præbentibus euenire solent initium fumentes ab agnate tunicæ affectibus, ut pote quæ exterior magis sit, ac à frequentissima eiusdem affectione, quam greci proprie ὀφθαλμία, Galeno auctore, eodem 4. de comp. medic. secund. loc. uocant: latini lippitudinem appellant. Quæ nihil aliud est (ut idem Galenus testatur eodem loco, & lib. de differentiis morborum) quam inflammatio eiusdem agnatæ tunicæ, seu tunicæ os capitis, & caluariam ambiens, aut, ut vulgus medicorum appellat, coniunctiuæ. Quod autem in hoc uitio oculus perpetiatur, ad sensum liquet, & proprie prædicta agnata tunica: quamuis iuxta Galeni sententiam eodem lib. de differ. morborum, ex accidenti hoc uitium videantur esse oculi morbus, cum ad totum instrumentum non referatur: neque totius instrumenti primo morbus sit, sed in una quadam ipsius particula similari consistat: qua etiam ratione sit, ut & ipsa uidendi functio ex accidenti quoque ab ipsa lippitudine fuerit impedita: cum neque ipsa perfecte, inherenti membrana taliter affecta absolui possit, & propterea, quod oculus afficiatur, ex ipsa uidendi functione oblatum argui poterit: quamuis ex accidenti (ut diximus) fuerit impedita. Non enim totius instrumenti morbus est, sed unius tantum partis, quæ similis existit, & simularium corporum morbi ex accidenti (ut Galenus, inquit lib. de differ. morb.) ad totum instrumentum referuntur, etiam si compositi sint, ut phlegmone. Nec quispiam ueteri debet, cum è numero inflammationum sit lippitudo ipsa, morbum esse compositum in quantitate, seu magnitudine primo, in intemperie secundo, ac soluta continuitate forte tertio: est nanque phlegmone quælibet morbus compositus, eodem Galeno teste lib. de differ. morb. Dignoscitur ex dolore. ipsiusque adnatæ tunicæ colore ad rubrum mutato adeoque interdum in tumorem ea attollitur, ut ob id omnia, quæ circumcirca oculos sita sunt, usque ad malas quandoque in vehementi lippitudine simul attollantur, ut patet 4 de compo. medic. secund. loc. lachryme quoque ex oculis ipsis resudant. Sed quoniam non vnus duntaxat differentiæ inflammatio in eadem tunica agnata excitari potest, ut Actio, & Paulo testibus constat: maioris tamen, & minoris ratione differentes: quarum una ὀφθαλμία græce, latine concurbatio, reliqua ὀφθαλμία, latine lippitudo proprie, & tertia χημοσίς quam etiam & latini chemosis dicunt nuncupantur. Propterea dignoscet facile primam, quæ nihil aliud est (Paulo auctore) quam color cum humiditate, & rubore à natura alieno, quod non ab interna, sed à foris ueniente causa aliqua orta sit, sole videlicet fumo, puluere, aut oleo, si hæc ad sint: qua de re promptissime etiam ipsa soluitur. Vera autem lippitudo non extrinsecus tantum, sed ex interna etiam causa extatur, nec ita facile soluitur, velut perturbatio. Verum si adeo inflammatio magna sit & dolor uehemens, ut utræque palpebræ ex uehementi inflammatione inuersæ sint, adeo ut uix oculi ab ipsis contegantur, & album oculi sublimius euaserit, rubrumque etiam magna ex parte nigrum occupet, non amplius lippitudo vere, sed chemosis dicitur. At lippitudinis ueræ causæ in triplici differentia esse possunt. Nam vel ex plenitudine totius corporis, ob quæ agnata ipsa tunica repleta distenditur, excitatur; vel ob influentium humorum acrimoniam, ac morsum uehementius eroditur, vel propter aliquam extensionem

Cur de lippitudine prius tractetur.

Cap. 2.
Lippitudo quid sit.

Quæ pars in ea afficiatur.
cap. 13. in prin.

Quis præter naturam morbus.
Loco citato.

cap. 12. uersus finem.
Signa eiusdem.

Cap. 22.

Aet. lib. 7. c. 2.
& sequentibus.
Pauli. 3. c. 22.
Tres differentiæ inflammationis tunicæ agnatæ. Quibus indiciis quælibet earum dignoscatur.

Lippitudinis causæ.

cap. 22. ante me-
dium.

Si ex sanguine
fiat, signa.

Lib. 2. cap. 1

Ex acri humo-
re signa,

Si ex crassis
succis,

Si ex spiritu
flatuoso, signa.

Prognostica,

2. præd. in me-
dio libri.

Cap. 2. uersus fi-
nem,

eius, ex crassis succis, spirituve flatuoso genitam, & proinde vehementes ex his causis excitantur dolores; ut patet 13. meth. med. Qua de re cum diximus lippitudinem inflammationem esse, phlegmonem intelligi volumus, eo modo dictam, quo generationem habere potest ex quauis redundante substantia.

Dignosces autem, si propter totius corporis plenitudinem sanguineus humor influxerit, ac iam dictam inflammationem concitauerit: quoniam cuncta (ut Trallianus testatur) & rubra, & sanguinea sunt, nedum agnata ipsa tunica, sed & facies rubens, & humidior erit. Venæ latiores, sensus grauitatis aderit, & pigritia ad consuetas actiones. Lachryma neque rodens, neque acris apparebit: adde quod temperamentum, & ægrotantis ætas, sanguinis redundantiam attestabuntur, nec minus & regio, & tempus anni, ac præcedens victus ratio. Verum si ex rodente, ac acri humore peruenit, id tibi manifestabit, primum quod totum corpus plethoricum non apparebit, sed potius uitioso humore præditum; adhæc lachryma rodens, & acris aderit: quo fit, ut non solum oculorum anguli, sed etiam malæ uehementer ex tali influxu rodantur, & exulcerentur, ægrique uideantur uri, exiliantque rosionem non tolerantes. Nec minus ex his, quæ præcesserunt, id percipere poteris: nam tristitia, curæ, insolatus, ira, & acrium esus præcesserunt, aderitque ætas, ac temperamentum biliosæ. Si autem ex redundante pituita inflammatio facta sit, grauitas erit uehemens, caliditas parua, & rubedo agnatæ tunicæ exigua, cum qua & facies, ac eiusdem color communicabit.

Similiter quæ præcesserunt, & concomitantur, pituitæ redundantiam arguent. quod si neque feruore neque rosione, aut uehementi grauitate urgente agnata oculi tunica extendatur, adeo, ut rumpi uideatur, ac doleat, lachrymæq; non appareant, aut parua, licet quandoque rubea uidebitur eadem tunica, indicium erit spiritum esse, qui distendat, ac dolorem faciat. At si ab externa causa lippitudo originem ducat, ab ægri, seu astantium relatu percipere poteris. Verum cum magnam partem ad uitæ simul usum, & dulcedinem conferant oculi nostri, Celso auctore lib. 6. ca. 6. summa quoque cura tuendi sunt. Protinus autem, ut ipse refert, orta lippitudine, quædam notæ sunt, ex quibus, quid euenturum sit, colligere possimus. Nam si simul & lachryma, & tumor, & crassa pituita cœperint, si ea pituita lachrymæ mixta est, & ea lachryma calida est, pituita uero alba, & mollis, tumor non durus, longæ ualitudinis metus non est. At si lachryma multa, & calida, pituitæ paulum, tumor modicus, idque in uno oculo est, longum id, sed sine periculo futurum est. Idque lippitudinis genus minime cum dolore est, sed uix ante uigesimum diem tollitur: nonnunquam per duos menses durat, sed quandoque finitur. Præterea si pituita alba, & mollis esse incipit, lachrymæq; miscentur, aut si simul hæc utrunq; oculum inuaserunt, potest esse breuior, sed periculum ulcerum est. Pituita autem sicca, & arida dolorem quidem mouet, sed maturius desinit, nisi quid exulcerauit. At tumor magnus si sine dolore est, & siccus, sine ullo periculo est. si siccus quidem, sed cum dolore est, fere exulcerat: & nonnunquam ex eo casu fit, ut palpebra cum oculo glutinetur: uerum ante Celsum apud Hippocratem hæc eadem leguntur, lib. 2. prædictionum. Non ab re etiam Galen. libro 3. metho. meden. maximam habendam esse curam circa lippitudinis curationem præcepit, cum ex curationis errore, quosdam egre confuseque uidisse euenit: tempore uero suffusione quam *πόχτισιν* uocant, uel pupillæ nimia dilatatione, quam *μυδρασιν* appellant, uel tabe, uel corrugatione, quam *ρυτίδωσιν* nuncuparet, fuisse occupatos, ex uisu potissimum stupefacientium medicamentorum. At hyeme sicca, & aquilonia existere, uere autem pluuioso, & australi, quod necesse sit præcipue mulieribus, & uiris natura humidioribus æstare lippitudines fieri, decretum reliquit Hipp.

Hipp. apho. 11. 3. lib. & aph. 17. 6. lib. Lippientem (inquit) alui profluuium cor-
 ripi bonum . Quidam autem volunt, quod in regionibus meridianis, multi-
 plicetur, & remoueatue uelociter lippitudo, superueniente autem eis frigo-
 re, quod difficilis eadem ipsis fiat, præterea quod in regionibus, & tempori-
 bus frigidis lippitudo minoratur, verum ea quæ oritur praua sit. Primo itaque
 die pro eius curatione, eger loco obscuro cubare debet, iuxta Celsi senten-
 tiam, sic ut à sermone quoque abstineat. Nam uisionis instrumentum splen-
 dorem citra molestiam tolerare non potest, Galeno teste lib. 1. de caus. sympt.
 & 10. de usu part. (quo loco exemplis illud comprobauit tum militum Xeno-
 phontis, qui cum per multam niuem iter fecissent oculis læsi fuerunt : tum
 Dionysii Siciliæ tyranni, qui super carcerem domum clarissimam, ac longe
 splendidissimam construxerat, in quam diutissime infimo, ac caliginoso loco
 carceratos educebat, atque ita cupide lucem intuiti occæcabantur. Recrea-
 tur autem potissimum nigro, & coeruleo, aut uiridi . Frigidus autem, aut cali-
 dus eligatur aer, non tamen immodice, pro causæ ratione . Somno moderato
 utantur ægri, & præsertim nocturno . Exercitium uitent, quietem eligant,
 procurentque singulis diebus alui excrementa excernere ita ut aluus si nõ na-
 tura, arte saltem lenior reddatur clysteriis lenibus, seu glandibus . Animi af-
 fectus omnes proculdubio uitent immodicos, à coituque abstineant . Parco
 utantur cibo, ac potu, præsertim inter initia: immo si fieri potest nullum cibum
 (Celfo auctore) sumere debent, ne aquam quidem: sin minus, certe quam mi-
 nimum eius. nam prima omnium (ut ipse testatur) in eiusmodi casu sunt quies
 & abstinencia . Qualitas autem cibi eligatur eius, qui humorem generat lau-
 dabilem, eos uitando, qui uaporosi sunt, ac tardæ concoctionis, & proinde
 carniū, potissimum quadrupedum animalium, lactisque usus uitandus erit:
 cauendumque ab acetosis, falsis, ac acris . Pro potu, abstinendum à uino est
 circa initia, potissimum ueteri, ac uinoso, sed aqua utantur: in qua coriandro-
 rum præparatorum semina, seu hordeum, aut cinnamomum fuerit decocta,
 aut multæ permissionis aqua malsa, præsertim cū ex crassioribus humoribus
 lippitudo fiat, ac tempore anni frigidus : quo casu & uino quoque uti pote-
 runt, albo tamen, & ad stringenti, tenui, & aquoso . Quo uero ad medicame-
 torum rationem attinet, breuissimo quodam sermone, seu potius oraculo Hip-
 pocrates aph. 3. 1. 6. lib. ex quacunque causa uera lippitudo oriatur, decretum
 reliquit, dum dixit, Dolores oculorum meri potio, aut balneum, aut fomen-
 tum, aut uenæ sectio, aut medicamentum epotum soluit. Quamuis eorum tē-
 pora, & causas (Celfo auctore) parum explicuit, quibus, ut ipse testatur, me-
 dicinæ summa est, & si in eo apho. nihil vel falsum vel quod fieri non possit,
 præcipiat, ut 3. meth. med. testatur Galenus . Verū quo pacto discernendum
 sit, quando, quomodoque dictorum quoque sit utendum. in commento eius-
 dem apho. idem Galenus perbelle declarauit, iubens inquirendas esse dispo-
 sitiones, in quibus meri potio, aut balneum, fomentum, uenæ sectio, aut pur-
 gans medicamentum utile sit . Quoniam (Aetio teste) non eidem homini
 omnia auxilia hæc adhiberi iubet Hippocrates: sed alii uenæ sectionem, alii
 purgatorium pharmacum, alii fomentum, alii balneum, alii uini potum . Est
 proinde cum ex plenitudine ortum duxerit, quæ distensione dolorem efficit,
 si nihil ex sepe relatis impederit, uenæ sectio confert, eodem Galeno teste
 13. method. quem sectati sunt Aetius, Paulus, Alexander, ac Celsus . Venam
 autem secare oportet cubiti exteriorem, humeralem appellatam, atque eam,
 quæ ex directo est laborantis oculi: cum oculorum per sepe dolores grauissi-
 mos è directo uenæ, quam humeralem nominant, sectio intra horæ unius
 spatium compescuit, ut lib. de curandi ratione per uenæ sectionem Galenus
 testatur . & propterea dolentibus oculis (ut ipse inquit) humeralis uocata

Curatio.
 Victus ratio,
 1. de caus. sym.
 cap. 2.
 10. de usu part.
 c. 3, prope finē.

Medicamento-
 rum ratio,

Cap. 1.

Lib. 7. cap. 5.

Si ex plenitudi-
 ne fiat.
 Venæ sectio.
 13. meth. c. 22.
 Aet. lib. 7. c. 8
 Pau. loco cita-
 to, sic Alex. ac
 Celsus.
 Cap. 16. post
 principium.

vena, quæque ex ea deriuata est in cubito incisæ luculentum celeriter commodum asserunt; vsque ad animi deliquium, vbi uehemens fuerit inflammatio, sanguinem auferre idem permisit Galenus: interim uerò eadem uehementiori non existente, viribusque non admodum robustis, nec ætate florente, iterato sanguinem mittere, post modicam sanguinis missionem, iussit interdum eodem die, si ita expedire videatur, interim postridie. Atqui nos stante totius corporis plenitudine, mediam venam prius secare consulimus: cum uix, aut fore nunquam cuncta ea concurrant, quæ vsque ad animi deliquium, sanguinem auferre admittant. qua demum peracta ad humeralem incidendam deuenias. Neque illud pugnare prænominatis auctoribus censemus. Nam supernis duntaxat partibus sanguine repletis, aut ætate, ac viribus & reliquis non prohibentibus, eorum dicta veritatem habere putamus. At si cuncta hæc simul non conueniant modo quo diximus, sanguinem mittere tutius esse nemo vereri debet; & si oportuerit, non semel tantum, sed bis, aut sæpius, humeralem venam secabis, ac cum scarificatione cucurbitulas in occipitio affiges. Conueniet insuper prædictos infernarum partium frictione curare: & si necessitas aliquando urgeat, vincula artubus adhibere & alui deiectionem procurare, ex Galeni sententia eodem 13. methodi, potissimum si biliosi, & acres humores cum sanguine redundarint: quo casu paulo post sanguinis missionem, purgationem adhibebis, Tralliano teste: mox fomenta ipsis laboranti particulæ ex aqua dulci modice calida adhibenda sunt eodem 13. methodi. liquet. Admonendaque insuper sunt circa initia pharmaca repulsoria, quæ nõ uehementem sortita sint astrictionem. Sed tum propria eorũ substantia sint moderatiora, tum lenitiui liquoris admistione adhuc magis talia fiant, potissimum cum uehementi dolore afflicti sint ægri, aut propter inflammationis magnitudinem, aut ob influentiũ humorum acritudinẽ. Cauenda tamen sũt, quæ uehementẽ sortita sunt astrictionẽ, vt diximus: cum ampliorẽ dolorẽ infligat, tunicas exasperando, quã iuuent influxionum impetũ reppellẽdo: quæ uero mediocriter adstringunt, lippitudinibus iã dictis commodissima existunt, ut patet 4. de comp. med. sec. loc. Hippocrates uero lib. de usu humidorum dicebat: vbi modica potabili in spongia vteris, optimũ oculis est. Lenitiui autem liquores, quos dixi talibus admiscendos esse; sunt, eodẽ Galeno auctore præallegato loco, & 13. meth. med. albus oui liquor, fœni græci decoctum, & ad hæc lac ipsum, quod iuuentulæ simulque boni succi fœminæ existat, vberibus ipsius in cotem, in qua collyrium teritur, expressis; quo calidum adhuc oculis infundatur. Ab eis uero anodynis, hoc est, quæ sensum auferendo dolorem sedant, summopere cauendum esse censeo: cum ipsa neque uehementes reprimant fluxiones, sed excerni prohibeant: atque adeo si humores fluentes acres extiterint, corneam erodi contingit. Si uero multi, magis irritari, ac uehementer extendi ac si rumperetur: ex quibus nisi medicamentum fuerit summopere stupefaciens, dolores impatibiles excitantur, Galeno teste commento aph. 3 1. 6. lib. Si uero fuerit adeo uehementer stupefaciens, ut ex eo oculi maximam inflammationem non sentiant, necessarium est simul quidem vim visoriam offendi, adeo quod cessante inflammatione, vel debilitate, vel nihil omnino videant; simul autem & quandam præduram dispositionem, & quæ difficulter sanari possit, in oculorum tunicis derelinqui: hæc de re suspecta habenda sunt talia medicamenta neque liberalius ad mouenda, etiam si in gens dolor urgeat. Sed à uehementibus stupefacientibus abstinendum erit: quibus si forte urgente maxima necessitate fuerit usus, postmodum sanitatis tempore oculi exalfaciendi sunt, velut & reliquæ partes omnes, si eis talia applicuissēs, ut patet 12. metho. med. Frons tamen illinienda erit ex plantaginis, solani, seu semperuiui succo, oui candido, rosaceo oleo, vel

aqua

Renellentia,
Cap. ultimo.
Topica qualia
in principio esse
debeant,
Cap. 22.
Quæ cauenda
sunt.

Lenitiui liquor
res qui sint,
4. de comp. me.
sec. 10. c. 1

13. meth. c. 22.

Cap. ultimo.
cap. 8. in princ.

aqua, bolo armenia, ac pauco aceto. Potuerūt insuper misceri thus, santalum, hypocistis, balaustium, ac hordeacea farina: interim & croci parū: mirificeque dolorem finit, admodumq; feruentes oculorum inflammationes concoquit, Tralliano teste, ex lacte muliebri, vitellis ouorum, & rosaceo, simul mixtis, superimpositum medicamentum. Iterum & crocus cum mica panis, luteisq; ouorum, ac rosaceo, vice autem rosacei aqua rosacea, præsertim rosarum albarum, vtere. Quod si imponi cataplasma res aliquando suadebit, papauerum capitibus in aqua discoctis, ac fœni græci, vel hordei, vel lini seminis farina aquæ immista, cataplasma conficies, ex Galeni sententia eodem 12. meth. med. quo item in vehementis aurium dolore vti poteris. At si ex vehementi acris humoris cōfluentis rosione dolor prouenerit, inflammatioq; excitetur, si quodammodo cum sanguine ijdem permisti sint, venam prius secare humeralem oportet, reuulsiōis saltem gratia: dein purgantibus medicamentis, deorsum scilicet, & reuellendo, & euacuando curare conuenit: potissimum vbi biliosa humorū paruitas in toto corpore superare videatur: tunc nanque iis, quæ totum corpus purgant, recrementisq; liberant, vtilior, Tralliano teste. Nam si recrementa acria non in toto redundant corpore, sed qualitate potius, quàm quantitate peccare videantur, solis balneis dulcis aquæ & temperatis, ægrum citra dolorem liberabis, eodem Alexandro auctore: quemadmodum quendam liberauit tali dolore affectum, ex acrium videlicet humorum influxu, non tamen totius corporis eorundem plenitudine, Galenus solo balneo vsus, vt idemmet testatur commento aph. 3 1. 6. lib. Verum vbi in toto corpore, non qualitate dumtaxat, sed quantitate etiam biliosus succus redundarit, & euacuari ipsum, & ad infernas partes reuellere oportet, purgantibus videlicet medicamentis, quæ ipsum expurgare valeant, manna scilicet cum tamarindorum decocto, aut casia fistula, seu syrupo ex pluribus infusionibus rosarum, vel violarum, cum diacatholico, ac reliquis huiusmodi medicamentis nec minus & ante, & post medicamenta prædicta, alterantes syrups præbendi sunt, pro antedicti humoris acrimonia, seu mordacitate domanda; velut violaceus, rosaceus, ex papauere, seu nymphæa confectus, aut intybi succo: demum ipsi particulæ candidus oui liquor infundendus erit, quo per eum acris fluxio sine offensa eluatur, iuxta Galeni sententiam 13. meth. ac Pauli cap. 22. 3. lib. Vbi autem concocta iam phlegmone ipsa fuerit, & simul corpus vacuum, tum vtique lauaciones in balneo his aptissimæ, ac commodissimæ sunt: nam & dolorem statim sedant, vt præcitato loco testetur Galenus, & fluxionem humoris, qui ad oculos fertur, sistunt, maxima quidem eius parte inter laudum per totum corpus excreta, reliquo vero diluto: seu contemperato. Atqui magna cum consideratione videntur veteres hoc casu, ad oui deuenisse humorem, cum minime mordens sit, & glutinosus: & propterea lenire asperitates omnes, quascunque acris fluxio excitat, valet. Accedit ad hæc, quod cum crassus, ac lentus sit humor, constantius quàm tenuis, & aquosus, in loco permaneat, & cum absque rosione sit, si modice incaleat, dolorem maxime leniat, vt eodem 3. meth. med. patet. Nec minus & lacte iuuentulæ fœminæ, quæ boni sit succi, vti poteris: cōnumeratur etenim & ipsum inter lenitiuos liquores 4. de compos. medic. secund. locos, vt diximus. Ad hæc ipsum cum tenui oui humore, rosarumq; albarum stillatio liquore, seu aqua permistum commodum erit medicamentum, non semel tantum, aut bis in die, sed ter, quater, & sæpius applicatum: vbi vehementior dolor vrgeat, tenuibus lineis linteis in eo madefactis: vbi autem concocta iam phlegmone ipsa fuerit, & simul corpus vacuum, tum vtique laxationes in balneo his sunt aptissimæ; nam & dolorem statim sedant, & fluxionem quæ ad oculos fertur sistunt: maxima quidem eius patet inter lauandum per

Cap. 8.
Si ex erodenti
bus succis fiat.
Curatio.
Venæ sectio.

Lib. 2. 2.

Purgatio,

13. metho, loco
citato.

Cap. ultimo,

Cap. 1. & 2.

Cap. 27.

Si ex crassis
succis fiat, cura
tio.

Citato loco.

Topica qualia
esse debent.13. meth. eodē
loco.

Cap. i.

Animaduersio
in applicandis
eis.

cap. citato.

cap. ultimo.

13. meth. loco
citato.2. de loc. af. c. 9
colligitur.

per totum corpus excreta, reliquo uerò diluto ex Galen. sententia eodem decimotertio meth. med. At si ex crassorum, frigidorumque humorum redundantia, flatuoso uel spiritu lippitudo oriatur, uacuato prius in his quoque toto corpore, auerso quoque humorum momento deorsum, ipsam curabimus, Gale. decreto, eodem 13. meth. med. Euacuabitur autem corpus totum, si pituita redundarit, ea prius præparata, ac concocta cum his, quæ ipsam purgant, quæ in c. de dolore capitis ex pituita reperies. Nec secus si succus redundans melancholicus sit, cum his, quæ ipsum purgant: quemadmodum cap. de melancholia docuimus. Illud nō tamen prætereundum in utraque redundantia, quod si cum sanguine commisti fuerint prædicti frigidi, & crassi succi, ante purgationē, aut media, aut humeralis uena secanda erit; deinceps purgatio adhibenda. Si uerò à sanguine absoluti sint, purgatione duntaxat utaris: deorsum autem humorum impetum auertes frictionibus uehementibus, uinculis, ac cucurbitulis. Ab hinc mox localibus remediis attendendum, non tamen in iis medicamentis, quæ reperiunt, ac reprimunt, immò iis, quæ euocant, atque digerunt, ut eodem 13. meth. scriptum reliquit Galenus, & Paulus lib. tertio cap. 22. Qua de re fouendi sunt oculi ex fœni græci decocto, eo prius curiose lauato, nequid illi, uel pulueris, uel sabuli adhærens, clam lateat. Est namque medicamen hoc, Galeno teste, omnium, quæ oculis applicantur, sine offensa digerens, simile quidem existens quo ad uiscositatem attinet albo ouorum liquori, discussoriam tamen habet facultatem, & moderatè calfactoriam: & ob id multos dolores mitigare consuevit, ut patet quarto de compo. med. secund. locos. Est præterea fomentum oculis ipsis omnino adhibendum per spongiam semel, aut bis, ter, aut quater, uel sæpius in die, prout uehementior dolor urgeat. Fit autem interdum fomentum non per fœni græci duntaxat, sed meliloti, & eiusdem fœni græci decoctum. Verum meminisse oportet, quod priusquam totum corpus purgaueris, nec iam dicta, nec aliud ullum medicamentum digerens, nedum oculis, sed nec aliis quibusuis particulis, applicare debes, ubi in toto corpore redundantia subest. Implebunt namque potius, quàm educent, iuxta Galeni sententiā eodem decimotertio meth. Qua de re expurgato toto corpore à redundantibus succis, crassis, ac frigidis, non modò fœni græci decocto, uerū etiam & aliis digerentibus, ac discutiētibus, seu euocantibus medicamentis uti poteris, uelut si in aqua fœniculi, eufragiæ, & albarum rosarum dra. i. lotæ pōpholigis, quam medicorum uulgus tutiam appellat, aloesq; non lotæ drac. s. dissoluas, aut si arcocollē in lacte asinæ, seu mulieris nutritæ drac. i. assumes, aloes scrup. i. pompholygis drac. s. & in unc. iii. aquæ fœniculi, & rosarum dissoluas. Similiter si aloë ipsa sola in aqua rosarum, & fœniculi dissoluta, quantitate moderata utaris. Quod si totum corpus mediocri habitu in humorum, tum qualitate, tum modo fuerit, sed caput tantum humorum redundantiam ad oculos transmittat, ipsum prius sanandum esse constat, eius affectu explorato, quæ superfluatorū generatio comitatur, ut eodem decimotertio meth. med. liquet: quinimmo diutinas oculorū fluxiones curamus, oculis ipsis dimissis atque ad capitis curationem conuersi. Quod si eius uitium ex genere intemperantiarum fuerit, ex sibi contrariis curatio fiat. Plurimum namque uel frigida intemperies caput uitiat, uel humida; nec dubium est, quin ambæ et congregiātur, ut eodem decimotertio meth. & secundo de loc. affect. clare patet: rariores autem sunt, quæ propter calorem acrem oculis fluxionem immittant. Conducit propterea iam dictis medicamentorum usus, interdum quæ per nares, & os pituitam eliciunt, appellantur autem errhina, & apophlegmatismi, quorum sæpius in prædictis mentionem fecimus. Vbi uero nec in toto corpore humorum copia adsit, nec à capite fluxio ad oculos fiat, uerum crassus sanguis oculorum uenulas intendat, eosque squallidos habeant, & propterea ualde tumidas,

midas, ac plenas sanguine (ut diximus) balneum eis præciendum, temperamentum erit, quo meatus excalfacere, & laxare ualeat: ac deinde uinum meracius exhibere, quo ne dum excalfacere, & meatus aperire ualeat, uerum sanguinem effundere, atque euacuare potens sit, & sui motus uehementia obstructions aperire, iuxta Galeni sententiam apho. 31. 6. lib. quam confirmat Alexander Trallianus, cum dixit, Post temperatum balneum uini potio faciliè in totum corpus, partesque superiores distribuitur, ut non nihil eorum, quæ obstructionem pepererunt, non modo calore ipsius, sed etiâ motos celeritate extenuet, & expellat, simulque etiam particularû (ut diximus) imbecillitatem confirmet, ut ipse quoque partem aliquam illorum, quæ insident, extrudere possit. At si uni potione uti metuat æger, fomentum potius ex calida (cum sit tutissimum, & omnino aliquam afferens utilitatem, uel tanquam causa sanitatis oculorum, uel tanquam signum ad dignotionem) admo uendum erit: sitque ipsum aut ex calida aqua, uel fœni græci, fertulæ campanæ, seu chamæmeli decocto, aut demum cunctis simul commistis. Vbi namque ex eisdem fouebis oculum, nihilque influit, constat totum corpus recrementis esse uacuum, ac fomentis insistendum esse, quoniam discutiens eam, quæ in ipsis continetur superfluitatem, oculis in totum sanitatem restituit. Sin autem humor influat, & dolor, cum primum fomentum adhibetur, suo calore paulum remissus sit, sed paulo post iterum intendatur, tunc tanquam signum dignoscituum proderit, ex quo nos dispositionem comprehendentes, quod euacuatione indigeat eger, ad totius corporis euacuationem peruenimus, aut per uenæ sectionem, eo magis plethorico existente, ac sanguine redundante, aut per purgationem, si uitiosi humores infestarint: neque enim difficile est ad modum alterum ab altero distinguere & propter ea inter omnia connumerata fortia remedia doloris oculorum apho. 31. 6. lib. ab Hippocrate tutissimum est fomentum ipsum ex Galeni sententia in commento eiusdem apho. Rarò autem contingit spiritu m duntaxat flatuosum agnatâ tunicam distendentem ophthalmiam causare: uerum si contingit, uaporatio nibus ex milio, aut milio, & fursure saccellis paratis, curari poterit: alijsque digerentibus, euocantibus, ac dijscentibus medicamentis. quæ autem adstringunt, ac repellunt, uitare oportet Galeni decreto 13. methodi medendi. In quibus uero chemosis fortis contingit, ovi luteum cum muscæ carne tertio, atque ubi ad cerati formam deducta fuerint, linteolo excepta impone, & cō festim sedant, Galeno teste quarto de comp. med. secund. locos.

Balneum quando conferat.

Alex. lib. 2, c. 3

Si ex flatuoso duntaxat spiritu fiat, curatio.

cap. 22.

cap. 8

περὶ πτερύγης.

De vngue oculi. Cap. 21.

Inter alias affectiones agnatæ tunicæ ea a medicis connumeratur, præsertim ab Aetio, quam *πτερύγις* græci vocant, ac a latinis, ut pote a Celso lib. 7. cap. 7. unguis nuncupatur. Vulgus autem medicorum, vngulam appellat, qui (eodē Celso auctore) membranula neruosa est, oriens ab angulo oculorum, quæ nonnunquam ad pupillam quoque peruenit, eiq; officit, sæpius a narium, interdum etiam a temporum parte nascitur. Paulus vero lib. 3. cap. 22. vnguem dixit esse membranulam quandam neruosam oculis sese obtendentem, quæ ab angulo quidem oritur, sed ad usque pupillam peruenit, eamque ubi fuerit adaucta, obtegit: & lib. 6. cap. 18. dicebat, pterygion neruosa membrana est, quæ ab oculi angulo maiore ut plurimū initium capiens, per minorem ad exteriora progreditur, officitq; oculo, motum ipsius, & bulbi contractionem impediens, & quod progrediens totam pupillā cōtegat. Est itaq; membrana hæc neruosa, ut ex iā dictis patet: incipit autē eius augmētū sæpe ab angulo magno appellato, iuxta nasum; rarius autē a paruo, & adhuc rarius a super-

Aet. li. 7. cap. 7.

Vnguis quid sit

1. de can. sym.
cap. 2 in princ.
Cap. 13. colligi-
tur.
Quæ pars affi-
ciatur oculi.

Quis præter na-
turam affectus
sit.
Loco citato.
Signa eiusdem

causæ.

Prognostica.

Victus ratio.

Medicamento-
rum ratio.

Purgatio.

Topica.

à superna, uel inferna palpebra generatur, Aetio teste: extenditurq; usque ad nigrum ipsius oculi, & cum maior facta fuerit, etiam pupillam contegit, & visum impedit, & propterea nō ex accidenti, sed primaria ratione pupillā obscurat, visus acie, aut uitiosam reddendo, aut omnino auferendo, iuxta Gal. sententiam 1. de cau. symp. proprius propterea, & cōpositus est oculi morbus pterygion, totius videlicet instrumenti primo, cum eodem tēpore multæ partes ipsius in eo afficiantur, vt lib. de diff. morb. liquet. Nam licet in agnata tunica primum oriri incipiat, corneam tamen attingit; & vbi plurimū increuerit, pupillam obscurat, visumq; impedit. Ex cuius visus impedimento satis admodum constat oculum ipsum in hoc vitio affectum esse secundum plures partes ipsius: nam & agnata tunica primo, cornea secundo, & pupilla tertio oblaeditur. Et propterea ipsius oculi tanquam instrumenti primo, cōpositus morbus est pterygion, propter eam, quam diximus, rationem, in numero videlicet, ac in excessu (non tamen toto genere præter naturam, vt est lapis in vesica, & lumbrici) eo quod primaria ratione, & non ex accidenti pupillam obscurat, vt eodem lib. de diff. morb. liquet. & quamuis nullis opus sit signis, quibus vitium hoc deprehendatur, cum ad sensum pateat: cum Aetio tamen dicimus, quod in hoc malo album in oculo amplius augefcit, aut caro super excrefcit ex scabra quadam lippitudine, aut assiduus fluxionibus. Cuius itaque occasio magna ex parte scabra præcedens lippitudo est, aut assidua crassorum, lentorumque humorum fluxio, hunc recentem, vt Celsus ait, non difficile est discutere medicamentis, quibus cicatrices in oculis extenuantur. Si inueterauit, iamque ei crassitudo quoque accessit, excidi debet, faciliusque curationem recipiunt pterygia, quæ tenuia sunt, & alba, ex Pauli & Aetii sententia: qui etiam Paulus asserit magnos, & inueteratos vngues solā manum ex postulare, recentiores vero, & magnitudine mediocres præfidijs elidi abstergentibus, qualia aspritudini idonea sunt, & albuginibus. Similem sententiam scriptam reliquit Aetius, dum dixit, Cæterum ex pterygiis ea manu curare oportet, quæ aucta ad nigrum se extendunt; quæ vero parua, & in albo sunt, ea conandum est, ut pharmacis comprimamus. Similiter quod neque crassa pterygia curanda sunt, & eversa, & eminentia, ac indurata, & quæ tempora per consensum afficiunt: sunt enim, vt ipse asserit, maligna, & cancerata. Vniuersa victus ratio talis præcipienda erit, quæ crassos, ac lentos humores extenuet, atque incidat: particulatim autem ex præcedentibus petas, præsertim cap. de dolore capitis ex pituita, ac de lethargo. Quatenus autē ad medicamentorum rationem attinet, relictis magnis, & inueteratis unguibus, qui solam manum ex postulant, Paulo teste, ac ab eodem curationis modum discas lib. 6. cap. 18. similiter & à Celso cap. 7. lib. 7. Recentiores, & magnitudine mediocres curare docebimus, qui abstergentibus medicamentis, vt eidem Paulo visum est, ac ijs quibus cicatrices in oculis extenuantur, curari possunt, Celso auctore. Prius tamen vniuersum corpus à crassis, lentisq; humoribus purgandum erit, & non nisi primum assumptis ijs medicamentis, quæ crassos, & uiscidos humores extenuandi, & incidendi vim habeant: crassi nanque & leniti succi purgari non debent, nisi præparati prius fuerint. Horum autem præparatio ex iam dictis medicamentis fieri debet, & demum iidē purgandi; quorum purgantium medicamentorum materias iterum ex præcedentibus capitibus studiosi petant: neque enim decens est semper eadem repetere. Ab hinc fouendus erit vnguis, aut ex aqua temperate calida, aut ex hordei, maluarum, althæ, & chamæmeli, seminis, lini, seu fœni græci decocto, quoad oculus calfiat. deinde quæ abstergunt medicamenta admoveantur ac repurgant. Inter quæ tanquam modicam habens abstergendi vim, est thus ipsum in tenuissimum puluerem redactum. Item & sæpiæ testa usta cum sa-
le

le ammoniaco (ut Aetio placuit) aut si cum pumice torrefacto, uinoque leuigato illinatur. Vehementem autem absterforiam facultatem habet es ustum; itemque squama eius & flos, ac chalcitis quoque usta, Gal. auctore 4. de comp. med. secun. locos. Verum si talia pharmaca lauentur, exterforia quidem adhuc manent, sed tanto efficacia imbecilliora, quanto mordacitatis magis expertia fiunt, ut eidem Galeno uisum est. Non absque ratione itaque eisdem primo ustis, ac lotis utere, deinceps si eis malum non cedat, non lotis: pariter & si opus fuerit, chalcantho, seu atramento sutorio utare: nam ustum primum, & lotum adhiberem, & si non suffecerit, ustum duntaxat. Inter ea uero, quæ citra mordacitatem extergunt ex sententia eiusdem Galeni eodem loco connumeratur cerui cornu ustum, & etiam caprarum: quæ de re circa initia eisdem uti possumus, ac cum thure mixtis. Nec erit absolum, cum eisdem medicamentis, præsertim generose abstergentibus portionem quandam miscere tragacanthi, seu gummi: sunt enim mordacitatis, ac crimonix expertia pharmaca, uelut foeni græci decoctum, tenuis ouorum liquor, & lac, ut plane constat eodem 4. de comp. med. sec. loc. Paulus uero æs combustum, uel atramentum sutorium similiter combustum, cui gummi parte quadam, ac porcino, seu caprillo felle mixtum, tanquam efficax medicamentum approbat. Aetius autem æs ustum cum pueri incorrupti urina commendat, & Trallianus sepię testam crematam, leuigatamque simul cum sale fossili. Et hæc commemorasse sufficiat medicamenta pro pterygii citra chirurgiam, curatione: nam si ea indigeat, curationis modum scriptum reperias non modo à Paulo, & Celso (ut diximus) uerum etiam ab Aetio lib. 7. cap. 60.

Lib. 7. cap. 59.

Cap. 4. post medium.

Cap. 4.

Cap. 4.

Trallianus li. 2.
Cap. 7. in fine.

περί ὀφθαλμοῦ. De sugillatione. Cap. 22.

EX genere effusionum, quas græci ἐκχυμώσεις, καὶ ἐκχυμώματα appellant, est affectus is, qui ab eisdem græcis ὀφθαλμίων, καὶ ὀφθαλμῶν dicitur; à Paulo ὀφθαλμῶν, latini autem oculorum sigillationem, recentiores uero medici oculi maculam nuncupant. Nec alia ratione hoc uitium sub oculis gignitur, uelut nomen ipsum indicat, quam in reliquis nostri corporis partibus, cum uidelicet tenuibus circa cutem uasis contusis, aut quomodolibet ruptis, sanguis ipse effunditur per fissuras in spatia, quæ circum eadem uasa circumiacent, non vno loco acruatim, ac statim ita excretus Galeo recte 5. de comp. med. secund. locos, in grumos coiens, sed postquam persultationem, hoc est διαπίδναι, ut ipsi appellant, effusio ipsa facta est: contingit sane aliquando, ubi ita coierit, temporis processu liuescere, ac denigrari, parum nimirum grumulis ex disperso in multas cutis partes sanguine coactis. Qua de re Aetius oculi sugillationem dici asserit cum ex ictu, seu plaga quadam, potissimum ruptis, aut contusis uasis in oculorum puniceis. sanguis sub tunicam subierit, & statim quidem cruentus color oculis fuerit, postea uero liuidus. Quod uero in hoc malo oculus afficiatur, nomen ipsum indicat: at quod particulatim agnata tunica, seu cornea dicta, indifferenter affici possit, quæ exteriores quidem oculi tunicæ sunt, modus generationis eius ostendit: sensus quoque indicat, quæ earum fuerit affecta, aliis indiciis non indigens, nam sub qua tunica cruentus statim, postea uero liuidus color apparuerit, aut niger, eadem affecta erit. Verum si ex sugillatione uidendi functio non impediatur, symptoma eam esse dicimus in genere affectus corporis, eorum scilicet quæ ad uisum pertinent. At si uisionem impediat per se primo, ut pote magna existens, & sub cornea potissimum, asserimus non symptoma esse, sed morbum in numero, seu quantitate, siue autem symptoma, siue morbus fuerit malum ipsum, statim uisu comprehendi poterit:

Cap. 1. in princ.

Lib. 7. cap. 20.
Quid sit sugi-
tio.Quæ pars oculi
in ea afficiaturQuis affectus
præter naturam
sit.

- Signa.** rit: nam cruentus oculi color videbitur circa initia, progressu vero liuescens aut nigricans, putantq; ægri rubra omnia quæ aspiciunt. cuius mali immediata causa est, vasorum ruptio, aut confusio. Eorum autem ruptionis causa, **Causa.** potissimum externa, ex ictu, seu plaga est: quanquam licet ratio & interna esse poterit, ut nimia eorundem vasorum repletio, aut ipsiusmet sanguinis in eisdem venis continenti feruor exuperans: quarum causarum discretionem haud difficulter assequi poterit. externas videlicet ex ægri, seu altantium relatione percipies, internas uero ex te ipso perpendes. quibus percepti confestim ad eius curationem, priusquam denigrescat, Galeni decreto, eodem §. de compositione medic. secund. loc. festinare debes. Nam si ingrumos sanguis coierit, ægerrime discuti potest, & temporis progressu liuescit oculus, atque denigratur. Venæ itaque sectione (si opus fuerit) aut purgatione (si ea ægri indiguerint) præmissa, confestim pro eiusdem affectu curatione ad topica medicamenta deueniendum erit: quæ non modo discutiendi ut prædita esse debent, verum parum quiddam ex astringentibus miscendum erit: quoniam vasorum tunica, ex quibus sanguis exilit, disrupta est: quare si ex sola simplici facultate discussoria pharmacum a principio adhibebatur, non solum quod effusum est, discutiet, sed & per fissuras aliquid attrahet ex sanguine in contulis venis contento. Postquam vero in suam naturam redierint venulæ, **cap. 1.** ad discussoria pharmaca citra astringentium, admisionem, oportune transeundum, ex Galeni sententia, eodem §. de comp. medi. secund. loc. quin etiam & ex ipsis discussoriis pharmacis imbecilliora primum adhibenda esse idem consulit Gelenus, fortiora vero inueteratis, & denigrata admouenda. Instillatur itaque prædictis in oculo (Pauli decreto) sanguis palumbi, vel columbæ, vel calidum lac muliebre, cui thuris paululum sit adiectum, aut candidum oui tepidum infunditur, ut Aetio visum est, vel sanguis turturis, seu columbæ Celsus vero prædictis sanguinibus tanquam optimum anteponit hirundinis sanguinem lib. 6. cap. 6. circa finem: quamuis reliquos quoque tanquam commodos approbet, sequentibus autem diebus oculus sæpe fouendus erit per spongiam cum absinthii, aut hyssopi decocto, iuxta eiusdem Aetii sententiam, aut ferculæ campanæ, & fœni græci primum, postea etiam ipsum tantum fœni græci decocto, iuxta Galeni decreta, eodem §. de comp. medic. secund. loc. Post quæ brassicæ folia decocta, & contrita superimposita profunt, & caseus recens parum per salsus pari modo impositus cum & ipse mixtam quanquam habeat facultatem, quare nihil absurdi erit, eo etiam in principio uti. Eiusdem quoque generis sunt rosæ, melilotum, & crocus, ut eidem §. de comp. med. secund. loc. liquet. Inueteratis autem sugillationibus, & denigratis fortiora discutientia medicamenta admouenda erunt: inter quæ sunt raphanus, hyssopum, myrrha, ari radix, organum, myricæ folia, & fructus, cardamomum, & reliqua innumera, quæ à Galeno præcitato loco connumerantur: ex quibus idonea medicamenta parari poterunt.

περί ὀφθαλμῶν ἰκῶν

De Oculorum vlceribus. Cap. 13.

Pars affecta.
Lib. 7, c. 15.

VNum quidem genus est vlcerum in oculis, ut Paulus testatur cap. 22 3. lib. quamuis differentiæ specificæ diuersæ sint, ac diuersimode nuncupentur, ut idemmet auctor asserit, prout diuersæ eiusdem oculi partes exulcerari contingit, nō uno etiam modo. Nāq; tunica agnata interdum, interim corniformis, aut angulorum aliquis, seu palpebra eadem affectione laborant, quemadmodum Seueri auctoritate affirmat Aetius.

Quæ

Quæ verò prædictarum partium exulcerata sit, haud difficile dignosci poterit: cum & prompte sensu visus dijudicetur. Ipse verò affectus morbus est in genere solutionis cōtinui, visionem incommodans, si fuerit notatu dignus, non solum ob id, quòd redundantem humorem coaceruat, sed etiam qua efficit, vt cristallinus humor ex breui spatio cogatur cum circumfusio splendore conuersari. Galeno auctore lib. i. de caus. sympt. præsertim si in corniformi genitum sit ulcus, & quòd præcedens quoque ad interiora vlcus versus pupillam, aliquid aquosi humoris foras effundit, atque hinc imminet periculum, ne sic affectus, ad extremam perueniat cœcitatem. cuius exulcerationis causa, aliquando externa, ab aliqua videlicet re ad oculum illabente, esse poterit, aliquando interna, puta ex acrium humorem erosione, a qua magna ex parte fit. At si externa fuerit causa, facilè ex ægri, seu astantium loquela percipitur. Verum si ex acribus humoribus, ac causa interna fiat. vlcus, ex qualitate doloris, pruriginosa videlicet, aut punctoria, redundantis succi qualitas inuestigari poterit, ægri ætate, ac temperamento, & victu, regione, anni tempore, aeris constitutione, ac reliquis non prætermisissis. Quantum verò ad prognostica attinet, satis sit nosse, quod vulnus seu vlcus corniformis tunicae periculosius sit, quàm reliquarum partium oculi: & si ea ipsius pars, quæ pupillæ obiecta est, fuerit ulcerata, si vulnus ad interiora descendit, magna ex parte taliter affecti obcœcantur, Galeno teste eodem primo de caus. sympt. Quæ vero vlcera in agnata tunica oborta sunt, non adeo periculum afferunt, velut prædicta. Cæterum siue in corniformi, seu agnata tunica, siue palpebris, aut oculorum angulis, aut quaque alia oculi parte vlcus fieri contingat, eandem secundum genus curationem requirit, quam & alia vlcera: quauis ob partis naturam quam lenissima adhibenda sint medicamēta, iuxta Galeni sententiam 4. de comp. med. secun. loc. Nam medicamentorum sylua, quæ proprie ad oculorum vlcera pertinet, vt idem testatur Galenus, itidem scopum habet, vt vlcus mundum seruetur, vt pote partium natura ipsum explente, & ad cicatricem perducente, quemadmodum in alijs vlceribus videre licet, vniuerso tamen corpori præ omnibus prouidentia adhibita, quo id quod redundat in habitu tollatur, Aetio auctore, per venæ sectionem corpore existente pleno, humeralis, seu mediæ venæ eiusdem lateris, aut per purgationem, si humorum aderit acrimonia, ex quibus vlcus fuerit exortum, siue per clysterem. Quòd si cunctis his opus fuerit, omnibus etiam vtendum erit, Aetio teste. Nec minus humorum defluxus auertendus erit ad inferiores partes frictionibus, vintulis, ac cucurbitulis. Quibus autem purgantibus medicamentis vtendum sit, vbi opus fuerit, pro ratione redundantis succi, eo prius concocto, ac præparato, ex sæpius iam dictis studiosi requirant, pariter & convenientem victus rationem, abstinendo potissimum a vino vsque ad declinationem, ac cauendo ea, quæ caput replent, & fluxionem irritant. Quo vero ad topica medicamenta attinet, si vlcus simul cum inflammatione infestet, curationem ex ijs, quæ inflammationem lenire possunt, & concoquere moliemur, non neglectis ijs quæ ad vlcus proprie pertinent, ex Pauli, & Traliani sententia. Qua de re per initia collinium album muliebri lacte dissolutum immittendum erit, instillandumq; ex oui albumine: & cataplasma adhibendum, ex Aetii sententia, ex ouo simul cum eius vitello, cum rosaceo & uino, ita vt leniter tepescat, & lana (vt ipse testatur) exceptum imponatur: poterit etiā applicari, si ex linteo lineo excipiat. Sequentibus autem diebus fomentum fiat ex rosarum decocto, aut meliloti, & infundatur lac muliebre cum ouo repidum, adhibeanturq; linimenta, maxime id, quod ex capitibus papaueris, meliloto, croco & pane paratur, ex quo superna duntaxat palpebra illinatur, quo aperiri possit oculus, & lacrymas influentes excernere

Affectus.

Cap. 2. colligitur.

Causæ.

Prognostica.

Cap. 2

Curatio.

Ca. 3. in princ.

Venæ sectio.

Purgatio.

Auerfiones.

Victus.

Topica.

Paul. li. 3. c. 22.
Tral. li. 2. c. 5Aet. lib. 7
Cap. 22.

Loco citato,

cernere, oculos quoque leniter deligetur, iuxta eiusdem Aetij decreta. Sin autem vlcera sordida fuerint, mulla mediocriter diluta, & fœni græci decocto vtemur, Paulo teste, At si multa fuerit sordes, ad fœni græci succum, parum mellis addere conuenit. Oportet autem fœnum græcum ipsum exactissime purgate, sæpe abluere, ac eo modo madefacere, pura dulci aqua, quemadmodum idem Aetius docet lib. 7. cap. 15: postquam autem purum factum est vlcus, a fœni græci succo abstinendum erit, & collyrio ex thure quod vim glutinandi, ac incarnandi obtinet, vtendum. Eo autē vtaris, quod ammoniacum, sarcocollam, thus, an crocum excipit, cum fœni græci succo, & quandoque cerussam etiam lotam, ac amylum: nam quod aliter græci conscripserunt, acrius quodammodo medicamentum esse videtur, præter id, quod opiū etiam excipiat, veruntamen interdum, robustis præsertim corporibus, & ipso quoque vtare. Eo autem incarnato, ac explanato, aut etiam adhuc paulò profundiori existente, adhibenda sunt collyria, quæ cicatricem inducere possunt, præsertim id, quod Cleoni inscribitur ab Aetio, & Paulo: eius autem compositionem inuenies apud Paulum lib. 7. cap. 16. & apud Aetium lib. 7. cap. 107. Nam ulcera oculorum eandem secundum genus curationem requirunt, quam alia ulcera, ut Galenus inquit 4. de comp. secundum loc. quamquam ob partis naturam quam lenissima adhibenda sint, vt diximus.

Cap. 3.

περί ὧν, καὶ λακωμάτων.

De cicatricibus & albuginibus.

Cap. 24.

Lib. 7. cap. 37.
Pars affecta.Affectus.
Signa.Causæ.
Prognostica.

Curatio.

Vidus.

Topica qualia
esse debeant.

CVratis oculorum vlceribus, cicatrices in eis sunt, quæ Paulo teste, cap. 22. 3. libri, si per summa oculorum sint, a græcis interim ἑλὰν a quibusdam vero νεφέλαι, latine cicatrices, seu nubeculæ appellantur, a quibusdam vero albugines tenues. At si altiores fuerint, a græcis λοκώματα, a latinis vero albugines, & ab aliquibus crassæ albugines nuncupatur. Possunt autem non ab re omnes prædictæ cicatrices albugines nuncupari, cum in oculi nigro albæ appareant. Densata enim corniformi tunica, vt inquit Aetius, subiectus ipsi cæruleus color non amplius translucet ex quibus verbis liquet, quæ oculi pars in albuginibus afficiatur: nam corniformis tunica præcipue: connumerandæque insuper & ipsæ sunt inter morbos in numero: quod si supereminentes fuerint, maximè albescent auctore Aetio. At si planæ, seu æquales, minus sunt albæ: quæ vero magis cauæ quodammodo concolores sunt nigro, earum causa minime inuestiganda erit, cum præcedentia vlcera insequantur. Verum ipsæ, vt testis est Cornelius Celsus lib. 6. ca. 6. duobus vitijs periclitantur, ne videlicet aut cauæ, aut crassæ sint: qua ratione dicebat Aetius callosas, ac diuturnas, & crassas cicatrices curare non oportere; si vero suffusio etiam, aut glaucedo affuerit, vt ipse inquit, vanum est cicatrices extergere. Si quis autem eas extergere velit, quæ curari possunt, victus rationem agro corpori accommodare debet, ex qua moderata materia, & boni succi, per vniuersum corpus diffundantur, ex eiusdem Aetii sententia. Itaque ab omnibus acribus, salis, ac crassi succi cibis abstinere oportet, & moderate boni succi edullis vti, & probè concoctionis maximè curam genere: nec minus & a multo vino abstinere debet æger. Illitio autem oculis facienda erit ante cibum, non statim a lecto, neque ante cænam, priori cibo bene concocto, & vbi ventris excrementa prius deposuerit, & capite, ac toto corpore leuis sit æger. Securius autem erit, iuxta eiusdem auctoris sententiam, leuioribus extergentibus vti: nam quæ attenuari possunt cicatrices, moderate pharmacis extergentibus curari possunt. Vitanda verò

vero sunt acia, & quæ excoriant medicamenta; nam succedentibus ex eis fluxionibus, itemque inflammationibus, & aliquando resolutis cicatricibus ulcera magis profunda fiunt. Interea autem medicamenta, quæ citra omnem molestiam recentes cicatrices exterunt, lac equinum existit, cum modico melle assidue illitum, Aetio teste. Similiter etiâ centaurei minoris succus ex melle ut Paulo. & Tralliano visum est, nec minus & anagallidis cæruleum florē habentis aut chelidonii succus cum melle, seu menthæ succus, eodem Aetio auctore. Extergunt quoque citra mordacitatem, cornu cerui ustum, uelut etiam caprum Galeno teste quarto de comp. med. secun. loc. inueteratas autem, ac alciores albugines tum abstergentibus, cum discutientibus pharmacis curare tentandum iuxta Pauli sententiam. Inter quæ tum Paulus ipse, tum Trallianus sepiæ testam combustam, & cum melle in pollinem redactam, admodum probant. Aetius butyrum liquefactum solum illitum, nec non rumicis hortensis & plantaginis semen in testa exustum, & in cinerem redactum, exacteque tritum approbat: similiter pullorum hirundinum capita detracta in olla exusta, ac trita: galbanum quoque cum melle liquefactum, ac similiter tritum adhibere præcipit. Nec minus uti poteris ære usto, aut eiusdem æris squama, seu flore, prius tamen lotis, eisque solis puluerem redactis, aut cum melle mixtis. poteritque inspergi infra scriptus pulvis, qui excipit cornu cerui usti 3. i. sepiæ teste combustæ 3 s. sarcocollæ 3. i. & s. aristolochiæ rotundæ scrup. i. sacchari 3. iii. fiat pulvis. Et si fortius medicamentum reddere velis, myrrham aut nitri spumans addas, æs ustum, eisdemque squamam, aut florens, quæ ut magis mordacitatis fiant expertia, lauentur prius, ut diximus, hæc pro curatione prædicti affectus comemorasse sufficiat.

Act. li. 7. ca. 29.
Paul. loco citato

Tral. li. 2. c. 5.
Loco citato.
Cap. 4. uersus
finem.

περί φλυκταίνων

De pustulis

Cap.

25.

OR I V N T V R interdum non oculis, potissimum circa corniformem tunicam, quamvis & in eorum albo, & in palpebris interim fieri possint, Aetio teste, pustulæ quædam, quæ à græcis φλυκταίναι, à latinis, ut pote à Celso, pustulæ, à barbaris uenicæ nuncupantur. Hæc inquam ut Paulus asserit, excrescentiæ quædam sunt corniformis membranæ ortæ ex humore quodam subexcoriante ipsius compaginem. Afficitur itaque per hunc affectum oculus, præsertim secundum corniformem tunicas, ut ex eiusdem descriptione liquet: & cum illud sensu iudicari queat, non opus est alia indicia afferre. Estque morbus in quantitate, seu magnitudine præsertim: quamquam & in intemperie, & insoluta continuitate simul morbus dici possit cum de numero tumorum præter natura sit: uerum cum eadem tunica conformis ex quatuor ueluti membranis densissimi ac fortissimis constet, possunt interim sub prima membrana prædictæ fieri pustulæ, aliquando uerò sub secunda, aut tertia, quæ propter quædam in superficie, quædam uerò in profundo eius fiunt. Quod si in superficie, sub prima uidelicet membrana fieri contingant, colorem nigriorem præferunt, eodem Aetio teste. Si autem sub secunda, aut tertia membrana consistant, albidiorē colore pustulæ fiunt; nam licet iam dictarum pustularum color naturalis niger sit, in profundo corniformis tunicæ cum fiunt, occultatur, eo quod tunica corniformis alba est, & cornibus simillima. In quantum igitur, ut idem Aetius asserit, in profundo corniformis tunicæ pustula occultatur, intantum colorem assimilat, & maiorem dolorem inducit, & molestior est. Ex his ergo interstinguendæ sunt pustulæ, quæ in superficie, ab his, quæ in profundo fiunt. Oriuntur autem à sanguine ob plenitudinem, aut ab acris succis, ut idem asserit Aetius, quas causas inter se distinguere, aut dignoscere haud difficile erit, & doloris quali-

Act. lib. 7. c. 29.
Cels. lib. 6. c. 6.
Pustulæ quid
sint.
Paul. lib. 3. c. 12.
Pars affecta.
Aetius.

Signa.

Causæ.
Causarū signa,

I tatem

- Prognostica.** tatem, ac magnitudinem, ipsarumque pustularum colorem, & ægri temperamentum, habitum, ætatem, ac eiusdem anteaactam vitam, anni tempus, regionem, aeris constitutionem, ac reliqua optime perpendas. Verum ex quacunque causa orta fuerit pustula, si superficialis fuerit, curatu facilis erit, difficilis autem si profunda, etiam si tunica ipsa ulcerata sit. Periculum nanque est si in profundo orta sit, ne reliquum corniformis tenue existens rumpatur, & uniformis procidat, ac effluant oculi humores: præsertim si iuxta pupillam ruptio fiat, ut Aetius asserit, aliudque graue consequitur. Nam inducta etiam talibus ulceribus cicatrice, homo non videbit propter inductas cicatrices.
- Curatio.** Quomodo autem superficialis orta pustula ob uniformis tunicæ procedentia propter corniformis rupturam, seu corrosionem distinguatur, sequenti capite explicabimus: cæterum curandæ pustulæ sunt primum, ut multiloquium, stertuationes, iram, spiritus detentionem, splendorem nimium caueamus.
- Ratio uictus.** Inhibeanturque deambulationes, & alii motus ab initio. Cibos assumant molles, ac concoctu faciles. A vino abstineant toto curationis tempore, ex Aetii sententia. Pro potu vero aqua utantur ordeï: vel coriandororum, seu cinnamomi parum in ea decocto. Vtroque autem cibo scilicet, & potu utantur exiguo. Et si totius corporis plenitudo infestaret, vena eis secanda erit, si quid eorum, quæ sæpius diximus, non prohibeat, non semel tantum, sed bis, & sæpius, si opus fuerit. Secato autem humeralem, seu mediam: aut mediam primò, deinde humeralem, prout magis oportunum videbitur. Alius quoque acri clystere excitetur, quo humorum defluxus deorsum vertatur. Pro quo etiam satisfaciunt frictiones, infernarum partium vincula. Verum si humorum mordacitas, seu acrimonia pustularum causa fuerit, purgatione potius utendum erit, eis primum domitis, ac præparatis. Atqui vitanda sunt ex Aetii sententia ea medicamenta, quæ vehementius purgant, & maxime quæ stomacho sunt magis infesta. Quapropter manna, aut pulpa casia fistulæ, cum tamarindorum decocto, & antidoti diacatholicon pauco uti poteris, aut reliquis huiusmodi, deinde ad topica deuenias medicamenta, quæ licet leniter discutientia esse debent, eodem Aetio teste, tamen ubi recentes pustulæ fuerint, & adhuc inflammata, a leniter quoque astringentibus absolui non debent: vitandæ tamen sunt deligationes, tanquam eis infestissimæ. Verum cataplasmata adhibere oportet, ubi inflammatio affuerit, maxime in principio, leuia quidem, sed lata, ut Aetius asserit. Ea vero sunt tenuibus, ac mollibus linteolis illinienda, & super totum oculum imponenda, supercilio, ac mala, & tempore simul comprehenso: & sinenda sunt quoad fuerint madida: postquam vero siccata fuerint, tollenda ea sunt, & alia imponenda, inter quæ commendat Aetius ouorum albuginem, ac luteum tritum cum pauco croco, moderatoque passo, ac pane: additque ipse opii modicum, id quod ipse non auderem, ni maximus infestaret dolor, & in pauca quantitate: vel loco eius Recipe lycii, & croci ana. scrup. i. sarcocollæ scrup. i. & fl. thuris scrup. ij. cum duobus vitellis, ac albuginibus ouorum, & aqua rosacea, fiat liquidum collyrium, & cum mollibus linteolis (ut diximus) applicetur: aut guttatim in oculum instilletur. Procedente vero tempore ouum auferatur, poteritque addi myrrhæ parum, ac fœni græci cremor. Verum vitandum est (ut diximus) ne oculus in his diutius deligetur: est enim eis hoc nocentissimum. proficiente autem curatione adhibendum erit medicamentum quod ex thure, myrrha, & croco paratur, Aetio teste; fomentisque utendum calfacientibus: licet ab initio tepida adhiberi debeant, quæ quod reliquum est, discutere valeant. Parentur autem ex florum chamæmeli, fœni græci, seminis lini, aut meliloti decocto. At si ob multitudinem pustulæ rumpantur, aut ob acrimoniam erodatur, ac ulceretur corniformis tunica, earum curatio petenda erit capit. de oculorum

oculorum vlcerebus. Nec alia ratione pus, quod intra corniformem est generatum curari debet, Galen. auctore 4. de compos. medic. secundum loc. quam pharmacis discussoriis, iam dictis, & propterea de eo separatim tractare non libuit, prius tamen vniuersum corpus euacuato, si opus fuerit. At si eis medicamentis malum non cefferit, chirurgia indiget, prout Galenus docuit in. sine 14. meth. meden.

Cap. 3. in prin.

περί προπτώσεως.

De Procidencia oculi. Cap. 26.

CVM propter erosionem, aut ruptionem corniformis tunicæ, potissimum cum vlcera profunda euadunt, pars quædam vniiformis, seu aciniformis tunicæ procidit *πρόπτωσις* a græcis *ἐκγοισθῆς χατῶνος*, a latinis vniiformis tunicæ procidentia dicitur, a quibusdam barbaris corneæ ruptura appellatur. Describitur autem a Paulo, quod procidentia est vniiformis tunicæ, quæ erosa, rupta ve cornea tunica accidit. Et insuper cum nondum creuit a græcis *μυρικήφαλος* nominatur, eo quod figura a muscæ capiti similis existit, Paulo, & Aetio testibus. Cum vero amplius creauit, & eousque, vt acinum vix representet, *σταφύλομα* a græcis, a latinis vatio dicitur. At vbi plurimum aucta sit, vt palpebras transiliat, *μῆλον*, græcis, vt pote a Paulo, latine malum vocatur. Verum vbi callum obducit, præter id, quod extra palpebras transgrediatur, ab Aetio, & Paulo *κῆλος*, latine clauus nuncupatur: quoniam per omnia clauus capiti similis existit. Affectus hic, quamuis oculi existat, non tamen secundum omnes eius partes, sed in eo tū corniformis, tum vniiformis tunica oblata est, corniformis inquam erosa, vel rupta in soluta continuitate morbo afficitur. Ipsius vero vniiformis tunicæ, morbus in situ est, totiusque oculi, in figura. Quapropter nec vna duntaxat pars in hoc affectu laborat, neque vno tantum affectu. quo fit, vt pupilla ipsa iam dicto affectu diuulsa omnino sit, ita vt aut non appareat, aut a situ, & figura eius sit immutata: quo discriminatur oculi procidentia ab eiusdem phlyctæna, seu pustula, tū etiā, quod id, quod prolapsum est, nigrum, aut cœruleum appareat, in circuitu vero circa fundum eius partis, quæ procedit, labia corrosæ corniformis tunicæ alba apparent, id quod in pustula videre non licet: quoniam ea superficialis existens, similiter vndique nigra est, licet nō exacta nigredine. His itaque indiciis plane distinguere poteris affectum hunc a phlyctæna, seu pustula, iuxta Aetii decreta cap. 29. & 33. lib. 7. Quomodo autem eius differentia, quas quatuor esse diximus, inter se distinguere liceat, ex supra relatis liquet: licet Aetij ipsorum etiam staphylomatum differentias plures conscribat, vt pote cum corniformis ipsa tunica fuerit eleuata, & eminentiam acino vix similem fecerit, aut ab humoribus intra ipsam collectis, aut ex pustula quadam satis profunde inter eius partes consistente, quæ duæ differentia licet tunicam ipsam corniformem eleuent & incuruari faciant, non tamen ipsam rumpunt, seu exedunt. Et propterea eiusdem eleuatio sola, & non ruptura existit. quo fit, vt neque id, quod prolapsum est, cœruleum, aut nigrum appareat; quemadmodum in vero staphylomate; in quo disrupta iam est corniformis tunica, & magnus vniiformis tunicæ prolapsus factus est: cui etiam sententiæ adherere videtur Celsus libr. 7. capit. 7. dum dixit, In ipso autem oculo nonnunquam summa attollitur tunica, siue ruptis intus membranis aliquibus, siue laxatis; & similis figura acino fit, vnde id *σταφύλομα* græci vocant. Verum cum has duas differentias non licet (Paulo teste) vera *σταφύλωματα* appellare, & insuper earum curatio ab ea diuersa existat: cum

Quid sit oculi procidentia.

Paul. li. 3. c. 22.

Paul. loco citato.

Paul. loco citato.

Aet. li. 7. c. 13.

Eisdem differentia.

Quæ oculi partes oblatantur in hoc affectu.

Quod affectus compositus sit.

Quibus discriminetur a phlyctæna.

Lib. 7. cap. 34.

Prognostica.

Curatio.

Cap. 3.
 Pau. loco citato
 Aet. lib. 7. 33

Topica.

vna inflammationis, reliqua pustulæ curationem similem requirat, propterea eas silentio prætereunt, de veri proplafus differentiis, quas quatuor esse diximus, sermonem faciemus: cuius causa erosio, aut ruptio corniformis tunicæ existit, vt diximus. Ex quacunque ergo causa oculi procidentia ad *μυσική φάλην* degenerauit, si medicamēta rite adhibeantur, curari poterit: quemadmodum etiam, licet egrè, recentia *ταφυλώματα*. Verum ibi alborem, aut callum contraxerint, nullus remediis locus est, ex Pauli sententia. Ea vero procidentia, quæ curationem admittit, vt pote quæ ad *μυσική φάλην* degenerauit, aut ad recentia *ταφυλώματα*, repellentibus, simul & adstringentibus pharmacis illi opus est, Galeno auctoritate 4. de compositione medicamento rum secundum locos. quem sectati sunt Paulus, & Aetius. Est vero eius sententia hæc. At vero vlcerata quæ per erosionem tunicæ corniformis fiunt, vt etiam ex vniformi quid pronuat, manifestum est, quod tum propter se ipsam tum ob prolapsionem, repellentibus, & adstringentibus pharmacis illis opus est: conandum vero, vt ex ipsis eligamus, quæ nullam aspritudinem faciunt, ea sunt folia rosarum, flores, & succus, nardi spica, crocus, lycum, & hypocyf- tis. At vehementiorem his astringendi vim habent (vt testatur) acatia, & omphacium. Item balauftium, cytini, & gallæ omphacitides. potuerunt itaq; folia, & flores rosarum in vino astringenti decoqui, aut aqua pluuiali, si adsit inflammatio, aut calor immodicus, & in eo decocto spongiam imbutâ supra affectum oculum applicare, aut ex plâtagine, rubi folijs, virga pastoris, & polygono, ac rosis, vt supra, parato decocto foras fiant. Poterit insuper ex folijs rosarum, ac cydoniis in vino astringenti, aut aqua pluuiali decoctis, acaciæ scrup. ii. croci scrup. s. additis, cataplasma fieri, ac adhiberi, aut ex plantaginis, polygoni, & rubi folijs pariter decoctis, croci gra. iij. lycii, & hypocyf- tidis singulorum scrup. s. nardi spicæ. gra. iij. additis, itidem cataplasma componi: nec minus collyrium ex infra scriptis conficiatur, quo salubriter vti poterit. Recipit autē aloes lotæ, pōpholis præparatæ, sarcocollæ nutritæ ana scrup. s. spicæ nardi, croci ana gra. v. stimeos, seu stibeos vñi, & abluti, quod medicorum vulgus antimonium appellat scrup. i. cum cremore tragacanthi, aut fœni græci, fiat collyrium, & vtare: aut omphacitides gallas tere, baluſtiū, & cy- rinos, ac rosarum flores, & cum succo polygoni, aut virgæ pastoris foliorum oliuæ, aut rosarum vti tor. verum si inflammatio affuerit, mitioribus semper vtaris iam dictis medicamentis, ac simul cum ouo recenti ea infundas. Quæ vero *ταφυλώματα* prædictam curationem respuūt, chirurgia indigēt, vt moderatum ægrotanti decorem concilie mus, non autem vt visum abolitum restituamus: quæ quomodo administrari debeat, disertissime a Paulo libro 6. capite 19. scriptum reperitur: & ab Aetio cap 35. lib. 7. necnon a Celso libr. 7. cap. 7. quo fit, vt nos breuitati indulgentes, id præterit ex proposito censu- mus. Pariter victus rationem scribere nolimus, cum non alia indigeant, quàm ea quam aliis oculorum affectibus laborantibus, in præcedentibus in- stituimus, præsertim cap. de vlceribus, & de pustulis.

περί μυδρίασης

De mydriasi, seu pupillæ dilatatione.

Cap. 27.

Cap. 2.
 post princip.

L

ICE T rhagoidis, seu vniformis foramen, quod pupillâ appellant qua- tuor modis a naturali statu immutari pos sit, Galeno teste li. 1. de caus. sym. nêpe vel ampliati, vel imminutum, vel ruptū, vel in aliquam par- tē detort. seu diuulsū: cū eius amplitudo, siue a natiuitate sit, siue postea accedat

accedat;semper visui incommodat;imminutio verò quæ à natiuitate ince-
 pit,acutissimi visus occasio est:quæ vero postea accedit,praua existit. Reli-
 quorum vero vitiorum nullum neque si à natiuitate,neque si post incidit,
 quicquam quod æstimatione dignum sit,uisui officit.Propterea duabus ulti-
 mis eius mutationibus à naturali statu derelictis,de eiusdē incremento, seu
 ampliatione primo,deinceps de eius imminutione tractare decreui. Appel-
 lant autem ^{μυδρῖς} ^{πῖς} ^{ἰν} græci pupillæ effusionem,seu dilatationem latini: cum
 pupilla ipsa colore quidem nihil euariar,multo vero latior,quàm pro natura-
 li modo efficitur,ut aliquando ad iridis circulum ecedat,Aetio teste,& Pau-
 lo. Ex eo autem,quod perpetuo hic affectus visionem lædat,sive ab vtero,si-
 ue postea contingat,Galenī auctoritate, censendum est oculum ipsum oblæ-
 sum esse,non tamen totum,sed secundum rhagoidis foramen, hoc est pupil-
 lam,ea nanque à naturali statu recessit,& pro quantitate declinationis incre-
 scit iterum ipsius visionis noxa,ut idē Galenus testatur:estque morbus in ge-
 nere conformationis,quoniam immodice pupilla dilatata est,dicebat nan-
 que Galenus lib.de diff.morborum,quod concauitatum morbi,sive obstruan-
 tur,sive immodice pateant,omnes ad cōformationis genus reducuntur:nam
 in omnibus his naturalis conformatio impedita uidetur,cauitate uidelicet
 ipsa à naturali mediocritate secundum excessum recedente. Pro cuius reces-
 sus quātitate quandoque in totum visus impeditur,interim uero uidēt ægri
 verum obscure,& quæ videntur ab ipsis omnia minora, quàm sint putantur
 esse,Paulo,& Aetio testibus;neque id mirum,nam diffunditur in eis visuus
 spiritus. Quapropter siue in prima protinus conformatione,siue postea am-
 plior fuerit pupilla,iuxta Galenī sententiam,eodem r.de caus.sympto.vniucr-
 sus ipsam spiritus implere non sufficit,vnde ipsum diffundi dissiparique ne-
 cesse est,quo fit,ut natiua uitiosa sit,& non naturalis vitio non careat, id q̃
 non accidit in eius imminutione, vt dicemus. bonæ itaque uisioni semper
 incommodat pupillæ dilatatio,seu amplitudo:ceu ex iam dictis plane liquet
 Eius autem causa humor excrementi eius existit,ex Pauli sententia,qui aut
 acruatim,aut paulatim affluit,ab eoque citra sensum,vt Aetio uisum est uni-
 formis;tunica distenditur,& pupilla amplius dilatatur. Sunt qui uelint,Ara-
 bes præsertim,& qui eos sectantur communiter practicanes,ex ipsius uualis
 tunicæ deficcatione interdum pupillæ dilatationem excitari, exemplo corio-
 rum perforatorum,cum exsiccantur;dilatantur siquidem illorū foramina, ut
 ipsi asserunt. Quare sic quoque euenire putant pupillæ,si immodice rhagoi-
 des tunica exsiccat,neque nos illud negamus præsertim cum Galenus illud
 fateatur lib.1.de caus.sympt.dum dixit,continentem causam (ut ita dicam,) dilatationis pupillæ esse rhagoidis tunicæ tensionem,atque ipsam propria ip-
 sius ratione bifariam tendi,aut exsiccata ut similem,aut humectatam ut
 instrumentum; siccitatis uero curatio difficilis est. Verum nos sectantes
 Paulum,& Aetium in hoc,& tanquam sæpius contingentem,ac curatu non
 ita difficilem,tantum eam,quam ipsi assignant causam dilatationis pupillæ
 admittimus modo,humorū uidelicet effluxum:qui acruatim, aut sensim
 & paulatim ad uniformem tunicam feruntur,à quibus ipsa amplius dilatatur
 vt diximus:quòd si suapte natura pupillæ amplitudo fiat,omnino incurabi-
 lis existit;si non naturalis sit,ægre curabilis fit: nam cum membranosa sit
 tunica uniformis,ubi semel distenta fuerit,induratur,neque faciliè amplius
 contrahi potest,Aetio teste. Accidit autem hæc affectio magis pueris pro-
 pter tunicarum debilitatem:insuper & his qui ex natura nigros habēt oculos
 quoniam magnas etiam pupillas habent,& propterea faciliè in hanc affectio-
 nem delabuntur. Quæ utique curari potest,pro eius curatione.attenuate utē-
 dum est uictus ratione,atque uentri comoda,ut testatur Aetius. Auino ab-

Quid sit pupil-
 læ dilatatio.

Aet. li.7. c.52.

Paul. li.3. c.22.

Quæ pars affi-
 ciatur.

Quis affectus
 præter naturam
 sit.

Ca.7.post prin-
 cipium.

Signa.

Cap.1.

Causa.

Vide Auic.li.
 3.fen.3.tract.4
 cap.12.

cap.2. collige.

Prognostica.

Curatio.
 Vicius ratio.

stinendum erit, donec affectio fuerit soluta. Balnei vsus sit rarior: de ambulationibus lentis, ac plurimis, in locis umbrosis utendum erit. Clysterijsque, ut alius humecta sit, & materia ad infernas partes detrahatur. Similiterque infernarum partium frictione, & (si nihil impedierit, affueritque corpori plenitudo) venam, secare oportet, in cubito humeralem videlicet, vel mediam, aut purgantia medicamenta pro ratione redundantis succi adhibenda sunt; quamquam nec ea pluribus vicibus exhibenda erunt, neque vehemente purgantia esse debent: quæ si fieri nequeant, Aetii, & Pauli decreto uenas in angulis oculorum diuidere oportet: deinde cucurbitulam occipitio admouere, & marina aqua frontem, & oculos perfundere, hyeme tepida æstate frigida, tota etiam faciei in aquam mittatur, oculis per tempus quoddam apertis, ut Aetius asserit: quod si marina aqua non adsit, parum salis aquæ misceatur, aut posca aquosa assumatur. Pharmacis autem supra affectum locum subastringentibus utendum erit: nam si valde acria fuerint, humorum copiam attrahunt, distenduntque membranas, & latiore pupillâ efficiunt: si vero vehementer astringant, aut immodice frigefaciant, membranas indurant, ampliusque contrahent, ac coarctabunt pupillam: quod quidem incommodum est: nam hæc res pupillam ad tabem conducit. Sunt autem moderata astringentia, quibus uti poteris, Aetio teste rosa, crocus, spica nardi, correx thuris, pōpholyx, spodium, & acacia, & ut summam dicam, cuncta ea, quæ citra aspritudinē astringunt, atque repellunt, exsiccant ve, quorum mentio ex Gale. sententia in præcedenti capite facta est; ex quibus quoque licebit, prout vsus exigit, medicamentum componere, eisque salubriter uti.

περί φθίσσεως

De tabe pupille.

Cap.

28.

Cap. 7. prope finem.

Tabes pupillæ quid sit.

Pau. li. 3. c. 22.

Cap. 5.

Quæ pars afficitur.

Quis præter naturam affectus sit.

Signa.

causæ.

Aet. lib. 7. c. 23

Cap. 2. collige. Duas esse causas Gal. auctore, inare,

INTERIM quoque contingit, ut iam dictum rhagoidis foramen imminuatur quam imminutionem græci φθισιν appellant, ut patet decimo de vsu partiū; latini vero tabe seu diminutionē pupillæ vocant medicorum vulgus pupillæ constrictionem. Est nanque affectus is oculi, quo pupilla fit angustior, obscurior, atque rugosior, Paulo auctore. Quod vero affectus hic ipsius pupillæ duntaxat imminutæ sit, nihil cornea priuatim affecta quocirca & alteri oculorum magna ex parte accidit, patet eodem 10 de vsu partium, ita ut cognitu facilis sit, neminemque medicorum lateat, quandoquidem (ut Galenus testatur) sanus oculus, qui in propinquo est, affecti uitium prodit. Afficitur ergo oculus in hac affectione secundum eius pupillam, poteritque affectus is ad conformationis genus reduci cum naturalis conformatio corrumpatur, in specie vero in cavitatem, seu via foramine ipso rhagoidis, hoc est, pupilla in se ipsam concidente, & propterea minori reddita, & quamquam cognitu facilis sit is affectus neminemque medicorum lateat, ut diximus Galeni auctoritate, collatione facta eiusdem ægri, ad oculum sanum, tamen ex eo quod his maiora apparent, quàm pro naturali modo, quæ ab ipsis videntur propter pupillæ angustiam (ut Aetio, & Paulo, visum est) argui poterit. Causam uero huius dixit Paulus esse densationem, quæ siccitati potius tribuenda est; Aetius vero ait plerisque hoc contingere ex periculosis debilitatibus, aut ingenti capitis dolore: Differt autem iuxta eorundem sententiam pupillæ tabes ab oculi, macie, seu athrophia, quod in tabe pupilla duntaxat angustior, ac minor efficitur. maciēs uero totum oculi bulbum minorem, ac humiliorem reddit Galenus vero 1. de caus. symp. minorem reddi pupillam morbi vitio ob geminam causam fatetur, quarum una est, ex parte ipsius rhagoidis tunicæ tantum altera, ex parte humoris tenuis albiginei dicti, qui medio loco inter ipsam rhagoidem, & crystallinum humorem effusus consistit.

Atqui

Atqui solui tunicæ affectus (vt ipse refert) extensio quædam, relaxatioque est qualis vtique in externis subinde partibus accidit, cum in articulis ligamentata redundanti humore sunt perfusa. & ne quis opinetur, quod ab eadem causa, eodemque affectu rhagoidis tunicæ excitari possint contraria vitia, pupillæ videlicet cum dilatatio, tum diminutio, eodem libr. primo de caus. sympto. dicebat ampliatiōis pupillæ causam, vt ita dicam, coniunctam esse tensionem ipsius rhagoidis tunicæ; ipsius vero imminutionis, seu paruitatis, eiusdē rhagoidis tunicæ esse relaxationem, qua propter non ad eundem prædictæ tunicæ affectum dilatatio, & imminutio pupillæ consequuntur; sed prima ad tensionem, reliqua vero ad relaxationem: tenditur autem aut exsiccata, vt pars similis, aut humectata, vt instrumentalis. Qua de re quamuis ex ipsius rhagoidis tunicæ humectatione interim pupillæ dilatatio fiat, non vt similis pars, sed vt instrumentalis humectata erit, eodem Galeno auctore, cum vero propter humorem rhagoidis tunicæ minor redditur pupilla, eadē tunica non tenditur, neque vt instrumentalis pars afficitur, sed ex humore relaxatur, atque humore perfusa vt similis pars humectatur. Si autē vitio albuginei humoris pupilla ipsa imminuta sit, hoc vitium in eius defectu consistit: cuius occasione vniformis tunica, euacuato interno eius loco, ac interna eius portione exsiccata, in se concidens contrahitur, ac rugatur, atque iccirco pupillam imminuit. Deterius autem ex talibus affectibus cernere contingit, non vtique propter pupillæ paruitatem, sed quia pupillæ paruitas vitiosos iam dictos affectus sequitur: quorum culpa necessario peius cernit oculus sic affectus, & non propter pupillæ angustiam, eodem Galeno teste: nanque si ad extensionem, relaxationemque rhagoidis tunicæ pupillæ imminutio sequatur, redundanti humore ipsa perfusa affectus hic causa erit, vt oculus deterius cernat, & non pupillæ angustia. At si contracta, ac rugata eadem tunica ex albuginei humoris defectu in se ipsam concidat, atque pupillam imminuat, non propterea quod pupilla imminuta sit, sed quoniā siccior afficitur crystallinus humor ex defectu albuginei, a quo largiter imbuebatur, & rhagoides tunica in se concidens, spatium, quod inter ipsam, & crystallinum interest, angustius efficit: itaque fit, vt idem crystallinus humor cogatur paruo interstitio cum externo splendore commercium habere: eumque sine offensa sustinere nō posse, carens vno ex monumentis, humore videlicet tenui: qui cum adesset, vna ex causis erat, propter quam sine offensa crystallinus humor splendorem sustinebat, atque hæc quidem causa est, cur imminutus is, qui in pupilla est humor, tum deterius cernendi, tum foraminis rhagoidis tunicæ minoris reddendi sit occasio: quemadmodum si ipsa vniformis tunica tēdatur, vt corpus simile siccata, poterit esse causa generandæ dilatationis pupillæ: eritque tunc dilatationis causa ipsius rhagoidis tunicæ, tensio ex siccitate. Parciori vero reddito humore, qui sub eadem continetur, nec ipsa suapte natura siccata est, sed per accidens minori reddito iam dicto humore, nec propterea tenditur, sed in se concidens contrahitur, ac rugatur: & iccirco pupillam imminuit, vtpote non amplius protensa, ac distenta a iam dicto humore sub ea contento: quem admodum accidit cribrorum tunicis: quæ si non extendantur, ipsarum foramina concident, id ipsum etiam euenire poterit, vt testatur Galenus decimo de vsu partium, si ad pupillam ipsam parcior spiritus a principio affluat: & propterea pupilla corrugetur, velut in senioribus, ac annosissimis videre licet: Lococitato
quāquam & ipsis quoque rugosa interdum fiat propter senectæ imbecillitatem corniformis tunica: & propterea malè, aut prorsus nō vident pupilla non immutata. Ex quibus constat spatium omne, quod est post humorem crystallinum, spiritu simul, & humore tenui asidue repleti oportere; & quod in cæteris partibus humor, in ipsa vero potissimum pupilla spiritus inest plurimus.

Prognostica.
c. 2. in princ.

Curatio.
Vicus ratio.

Medicamento-
rum ratio.

mus. Nunquid uero imminutionis pupillæ causa tenuis humoris defectus, seu inopia sit, aut spiritus, seu vniformis tunicæ laxitas propter humiditatem, distinguere haud admodum difficile erit, si ea quæ in oculis apparent, etatem, temperamentum ægri, ac ante actam uitam, & reliqua perpendas. Quo uero ad prognosticum attinet, dicebat Galenus 1. de caus. sympt. non semper malam esse pupillæ paruitatem: quoniam ea, quæ naturalis est, bona existit: siquidem in minori pupilla colligitur spiritus, constringitur, ac densatur: quæ omnia ad sensus bonitatem oculo conducunt. At si morbi uitio, & non naturæ, pupilla minor reddita sit, mala quidem existit, ac multo deterior efficitur, quàm mediocris: quoniam uitiosus sequitur affectus, ut ipse asserit, eoque maxime insanabilis est, si ex tenuis humoris defectu gignatur, minus autem innoxia est si propter vniformis humorem, minor reddita sit pupilla. Nam difficilius est simili corporis particulæ cuius, cum siccata est, humiditatem restituere, quàm eam, cum humectata est, siccare. Ex siccitate ergo si orta fuerit pupillæ tabes, curationem porro contrariam mydriasi facere oportet, vt testatur Aetius: nā victus optimi succi, & sorbilis esse debet. Vinum fuluum, atque odoratum eis adhibere oportet. Somnus præcipit vt cibum excipiat. Balnea quoque conueniunt ex aqua dulci, & capitis ex aqua calida perfusio. Supernas partes exerceant humeros, ac manus cum spiritus detentione, & caput ac facies diligenter confricandæ sunt, oculique insuper summis digitis: eademque facies aqua calida proluatur, & caput post confricationem vnguento, quod moderatè calfacere potest, illinaturi quale est irinum, & modico facto interstitio, oculi rarefaciente, ac acrior medicamento humiditatem attrahente sublinantur, cuiusmodi est, quod excipit ammoniaci scrup. ij. aloes 3. i. crocomagmatis 3. ij. croci 3. s. æruginis æris scrup. i. in defectu crocomagmatis 3, eroci dosis augeatur, turentur, & cum aqua pluuiali vtaris. At si ex humiditate vniformem tunicam extendente, & relaxante tabes pupillæ fiat, curanda ea erit ex his, quæ præcedenti capite de pupillæ ampliacione diximus, aut ex his quæ pro cura suffusionis dicemus; quamuis rarò accidat, & in summa ea adhibeantur medicamēta, quæ vim digerendi, ac exsiccandi citra morsum habeant.

περί ὑποχύματος De suffusione. Cap. 29

Vide Anic. lib.
3 sen. 3. Trac. 4
c. 18
Quid sit suffu-
sio,

Conciliantur
Pauli verba,

IVXTA ipsam quoque pupillam affectus quidam præter naturam oriri cōsuevit, qui a Græcis ὑπόχυμα, καὶ ὑπόχυσις, a latinis suffusio dicitur, Arabes aquam, medicorum vulgus cataractam appellant. Qui affectus, Aetio teste, cap. 51. li. 7. præterfusio, seu affusio quædam humorum est circa pupillam congelatorum, vt vbi perfecta fuerit visum impediat: sub diuersis tamen verbis idem sentire videtur Paulus cap. 22. libr. tertio dum dixit ὑπόχυμα humorum esse affusionem, qui inter tunicam corniformem, & crystalloide con crescentes visum impediunt. Verum idemmet Paulus libr. sexto capite. 21 suffusionem retulit esse lenti humoris in corniformi membrana iuxta pupillam consistentiam, quæ visum impediat, aut certe ne perspicue oculus cernat efficit. Quibus verbis si quis exacte ea perpendat, videbitur Paulum diuersimode in prædictis locis de suffusione locutum esset: nam tertio libro ὑπόχυμα dixit esse affusionem, vsus verbo Græco ὑπόχυσις: in sexta vero dixit esse consistentiam, vsus verbo σκληρότης. Verum idemmet auctor his satisfacere videtur prædicto cap. 21. libr. sexti cum dicebat de iis suffusionibus, quæ nullam manus administrationem requirunt, quæque confirmatæ non erant, tertio libro se pertractasse, de iis autem, quæ confirmatæ sunt, & ex toto conuerunt, in sexto libro verba facere. Non mirum itaque si in tertio li. suffusionem per affusionem descripsit, cū ipsam in via, ac in fieri considerasset, in sexto vero

verò per consistentiam, seu concretionem, cum de iam confirmatis suffusionibus differere proposuisset. Cum autem suffusio ipsam uisionem impediat (Aetio, & Paulo testibus) uerendum non erit oculum in ea affectum esse, & propriè iuxta pupillam, ut liquet ex traditis ab eisdem descriptionibus, inter crystallinum uidelicet humorem, & corniformem tunicam. Qui affectus cum per se primò functionem lædat, hoc est, ipsum uidere, morbus inquam est in compositione, & propriè in numero, non in defectu, sed in excessu, connumeraturque inter eos morbos in numero, qui toto genere præter naturam sunt, uelut lib. de differentiis morb. & 14. meth. med. liquido constat. Cuius uiti incipientis talia sunt signa, ut Aetio uisum est, quod ita affectis ueluti culices quidam parui, ac caliginosa quædam oculis sæpe obseruari uidentur, & quidam ex ipsis piliformia uident, alii uelut lanarum filamenta, aut araneorum texturas: quibusdam circa lucernas circuli apparent, augescente deinde affectione, augescunt iam dicta symptomata. Hæc autem ubi apparuerint, aliquando (ut idem testatur Aetius) pura pupilla apparet his, qui negligentius considerant: aliquando uero colorem maris refert. Verum ubi perfecta fuerit suffusio, eger non uidebit: pupillaque colorem ad albedinem mutat: & omnino non translucet, quanquam plures sint coloris species. Nā quædam suffusiones aerem assimilant, aliquæ uitrum referunt, aliæ albicantes sunt, aliæ ad cæruleum colorem magis mutantur, aliæ uero glaucescunt. Omnes tamen suffusione laborantes (ut inquit Paulus) lucem uident, aut multam, aut paucam, eoque discrimine ab hebetudine, & glaucomate affectis separantur: cum ipsi lucem omnino nullam cernant. Quod si totum rhagoidis foramen à crasso illic consistente corpore obtenebratum sit, utique uidere hominem prohibet, Galeno teste primo de caus. sympto. Si uero non totum foramen obtenebratum sit, sed aliqua pars eius pura supersit, per illam, quæ extrinsecus sunt, singula per se sola, nihilo deterius, quam antea, uidebuntur: nō tamen similiter ut antea uno tempore multa: eo quod angustior, quam prius, factus sit uisus conus. At si in pupillæ centro exigua suffusio constiterit reliquis, quæ circa sunt, partibus puris existentibus, omnia iis, qui sic sunt affecti, ueluti fenestras habere uidentur: cum, quod in medio est, non cernitur, & quasi excisum uidetur. Verum si diuisa, nec inter se coniuncta fuerint crassa corpora, quæ iuxta pupillam consistunt, fluitentque in tenui humore, iis, qui sic se habent, tanquam culices quidam foris obseruari uidentur. Sæpenu-mero etiam ex crassioris quoque humoris consistentia, tanquam idolum aliquod sibi appareat, imaginantur. Eiusmodi autem idoli apparitio plerumque incidit, postquam a somno surgunt, ut idem inquit Galenus, potissimum pueris, & iis, qui plusculum biberunt, aut alias capite sunt oppleto: quamuis prædicta quoque symptomata oriri possint ex tenuis humoris essentia permurata, & alia quædam si naturali colore recesserit, ut patet ibidem. Quibus autem iudiciis confirmata, & quæ iam concreuit suffusio, ab ea, quæ nondum confirmata est, discriminetur, Paulus decretum reliquit eodem 21. cap. lib. sexti ex Galeni doctrina. Pariter & ex eis, quæ confirmatæ sunt, quæ ad educationem manus administratione idonea reddantur, quæ uero non: quanquā nec id intactum reliquit Galenus, qui eodem libr. primo de caus. sympt. scriptum reliquit quo pacto dignoscendi sunt suffusi, si compuncta suffusione visum recepturi sint, an non. Nam quibus altero oculo continentibus, alterius pupillam dilatari contingit, iis, si compunctio administretur, recipiendi visus fiducia est; quibus non dilatatur, horum nemo vnquam reuidit: neque si minimo cum dolore, ac commodissime iis est administrata compunctio. Interim verò contingit, quod similia iis quæ suffusis apparent symptomata adueniēt, oculis ipsis nulla propria affectione molestatis, sed per consensum affectis,

ubi

Pars affecta.

Quis affectus sit.

De disse. morb. ca. 8. in prin.

14. meth. c. 13. in prin.

Signa incipientis.

Augescentis.

Perfectæ.

Suffusionis differenter plures 6, 2. collige.

Loco citato.

Quomodo di-
gnoscenda sint
symptomata si
nulla suffusioni
& distinguen-
da ab his, quæ
propria suffuso-
rum sunt.
cap. 2.
cap. 1. collige.

Loco citato.

Suffusionis cā.
Prognostica.
In fine.

cap. 2. in me-
dio. Quomodo
suffusio q̄ lau-
cescit a vera

vbi exhalationes quædam a ventriculo ascendant, potissimum quando non probe concoxerunt. Et quibus adeo perfectus, sincerusque visus est, vt eum ne vel minimum sensibile fugiat, quippe purior natura, cum crystallinus humor, tum tenuis, & aquosus ijs existit: respondet autem magnitudo talium symptomatum in his semper pro affectus magnitudine: quemadmodum & in alijs quoque, vt patet 1. de caus. sympt. verum distinguenda sunt hæc symptomata, quæ a ventriculo oriuntur suffusorum similia, ab ijs quæ in veris suffusionibus apparent: nam si ob humorum in ventriculo contentorum vitium oborta sint, vtrique oculo similiter accidunt; quæ vero per proprium oculorum affectum alter dūtaxat oculus prædictis visis occupatur: & neque simul in vtroque incipiunt, neque similiter apparent. vt 4. de loc. affe. patet. deinde ex tempore quoque ipso distinguuntur. Si enim tribus, quatuor ve, aut etiam pluribus mensibus (vt Galenus ait) suffusionis apparuerint symptomata, contemplantiq; tibi pupillam nihil tenebrosum videatur, ab ore ventriculi affectum procedere inuenies: si vero non ita multum temporis intercescit, quærendum est in primis, vtrum ex quo incipit affectus, singulis diebus perpetuo huiusmodi apparitio perseuerauerit, nullo scilicet interueniente die, qui omni querela caruerit: an diebus quibusdam laborans exacte videatur conualuisse. Nam continuas suffusionem portendit; intermissio vero, quod malum a ventriculo prodierit, suspicionem excitat: idque magis si vbi perfecte quis concoquens nullum sibi vsum apparere fatetur: sed multo magis, si cum apparuerint uisa, modicus in ore ventriculi doluit: maxime vero si post hæc vomendo eiecta re mordente, mitigata fuerint symptomata. Hæc sunt quæ primo statim die, cum videris hominem interrogando discere debes: quando secundum naturam exquisite se habuerint oculi. Vbi verò altera pupilla tenebrosior, aut turbidior, aut non exacte pura videtur, suffusionis esse initium censendum est: & vt certius id iudicare valeas, tum ciborum, minus tamen, quam consueuerit, assumptorum, & nihil mali succi habentium, tum etiam ex aloe medicamento, quod quidam picram, alii hieram picram appellant, assumptionis experientia, Galeni auctoritate eodem 4. de loc. aff. dignoscere tentabis. Cerebri quoque cognatione similia suffusis symptomata accedere solent in quibusdam phrenitidis speciebus, primario scilicet affecto cerebro, quod ex eiusdem phrenitidis indiciis percipi poterit. Sed quoniam tam si dicta symptomata ex ventriculi, quam si ex cerebri consensu oriantur, veram suffusionem non indicant: curabiturq; affectio partibus ipsis primario affectis diligenter curatis: iccirco eis derelictis, ad veræ suffusionis prognostica, ac curationem redire tempus erit. Nam pro dignoscenda eius causa opus non est diu labore, cum ex frigidis, & crassis, seu lentis succis omnibus consentientibus ortum ducat. de hac autem suffusione Galenus 14. meth. med. talia protulit verba, quod suffusio iam incipiens digeritur, vbi verò diu constitit, digeri nullo pacto potest. Et Celsus lib. 6. cap. 6. sic dicebat. Suffusio quoque quam Græci *ὀφθαλμία* nominant, interdum oculi potentiæ, qua cernit, se opponit, quod si inueterauerit manu curandum est, inter initia nonnunquam etiam certis obseruationibus discutitur. hoc idem confirmauit lib. 7. capitu. 7 Paulus *ὀφθαλμια* curari posse, sed non omnia fatetur: proinde antequam consistat suffusione tentatis succurrendum erit. quæ autem citra manus administrationem curari possunt, & quæ chirurgiam requirant, ab eodem Paulo lib. 6. cap. 21. scriptum reperitur. similiter quæ neutro dictorum modorum curari possunt, sed omnino incurabiles fiunt. Quomodo autem id discernatur, Galenus 1. de caus. sympt. docuit, vt paulo ante diximus. inter eas verò quæ omnino incurabiles sunt, ab Aetio connumerantur, quæ glaucescunt suffusione, cum ex fiant ab humore iuxta pupillam vehementissimè congelato,

ac reficcato, ut ipse testatur. Differt uero ea suffusio à glaucedine propriè dicta, quam Græci γλαυκωμα appellant: nam ea (eodem Aetio teste) mutatio propriè est, siccitasque ac concretio crystallini humoris ad glaucum colorem; & ante Aetium illud idem scriptum reliquit Galenus 10. de usu partium, quæ interdum cum incæperit, curari poterit, ut idem Aetius asserit. Suffusione itaque tentatis uictus ratio attenuatoria uniuersa præcipienda erit, Pauli, & Aetii decreto; nec minus Celsus victum optimum his esse, qui pituitam extenuat, fatetur. Aer propterea ad calidum, & siccum declinet. Somnus consuetus sit breuior, exercitium sit moderatum, potissimum inferiorum partium; quo si uti non poterint, eius loco earum frictionibus utantur. Alui excrementa quotidie natura, aut arte excernant. Ab immodicis animi affectibus caueant, mœstitia præsertim. In eorum cibis utantur iis, quæ extenuandi uim habent, ut hyssopo, pulegio, satireia, sampso, fœniculo, betonica, salvia, & reliquis. A uino uero abstineant per totam curationem: cuius loco pro potu, aquam mulsam, uel ex cinnamomi decocto bibant, ab omnibusque repletibus caput abstineant; itemque à balneo, nisi quis alterius occasionis causa ad lauandum se cogatur, in quo paululum infideat, citroque exeat. A piscibus fructibusque, ac reliquis, quæ corpus humectare possunt, omnino abstinendum erit. Moxque curandi sunt qui ea suffusione tentantur, quæ nondum consistentiam adepta est, circa initia, si nihil impediatur, sanguinis ex cubito detractio, ut Aetio, & Paulo visum est, incidaturque aut media, aut externa, seu humeralis, prout magis expedire videbitur. Deinde ne dum clysteriis acrioribus, quorum formulas in prædictis requiras, verum etiam purgationibus utare, prius tamen his, quæ extenuant, ac præparant redundantes succos adhibitis, uelut est tum oxymel simplex, tum scyllinum, syrupus ex stœcade, aut hyssopo, aut rosaceum mel cum aqua fœniculi, seu eustragiæ, hyssopi, sampso, siue betonicæ. Præparatis autem redundantibus succis, expurgari poterunt ex catapotiiis cochiis, arabicis, aureis, siue quibus, aut lucis, addito trochiscato agarico. Assumas autem 3. i. vel scrup. iiii. ex aliquibus iam dictarum pilularum cum scrup. ii. aut 3. i. prædicti agarici, & cum succo fœniculi, aut eustragiæ, seu syrupo ex stœcade pilulas formato, ac utitor: post quarum assumptionem per aliquod spatium unc. iiii. syrapi ex pluribus infus. rosarum rubearum aut duas mannæ electæ (si necessitas urgeat) ægroto tribuas, utpote ne corpus calefactum, & exsiccatum nimium ex pilularum assumptione relinquatur. A purgatione occipitio cucurbitulæ affigendæ sunt, cute incisa; aut sanguinem ex fronte, uel naribus mittere oportet, Celsi auctore. Et ex interuallis apophlegmatismis, ac errhinis utendum quorū copiam in prædictis requiras, præsertim cap. de capitis dolore ex pituita orto; nec non familiaribus quibusdam catapotiiis uti poteris, quæ sic componantur. R. agarici trochiscati scrup. ii. pulueris hyeræ simplicis Gal. 3. s. trochiscorum ex mirobalanis chebulis scrup. i. cū succo, aut aqua fœniculi, seu syrupo ex stœcade pilulæ formentur, ac exhibeantur. Ab hinc ad topica deueniendum est medicamenta: à mitioribusque incipiendum, cauendumque ab his, quæ impense siccant: nam licet ualenter uacuet, quod reliquum est, ita cogunt, quod ægrè, aut nunquam resolui possit: sed eis utendum, quæ paulatim digerant, uelut est mel cum oleo ueteri, & fœniculi succo ex Aetii, & Pauli sententia. Similiter & Oribasii medicamentum quod ex caucalidis succo, chamædryos, & coronopi, singulorum æquis portionibus conficitur, adiuuat insuper (ut Paulus testatur) ipsius fœniculi decoctum per initia superfusum. Trallianus ex baccis lauri excorticatis, urina pueri uenerem non experti, læuigatis, & pauco gummi suffusis utiliter inungi asserit. Idem quoque ex felle perdicis cum melle, & succo fœniculi illinitionem faciendam esse præcipit. Quidam fel galli similiter cum melle, & fœniculi succo commendant:

glance d'ine est
scernatur.

Aet. li. 7. c. 50.
10. de usu part.
c. 6. in prin.

Curatio.

Victus ratio.

Medicamentorum
ratio.
Purgatio.

Topica.

Trall. li. 2. c. 5.

dant. aut loco fœniculi, succo rutæ, vel eufragiæ, chelidonii, seu uerbene utuntur. Quidam alii puluerem conficiunt ex hirundinum capitibus adustis, cum melle, eoque solo utuntur. Tu autem permiscere poteris aliquem ex prædictis succis; & utere, aut ex myrrha, & fœniculi, seu eufragiæ succo medicamentum componas. & si libuerit, mel quoque addas. Ipse quoque interdum ea uti aqua consueui, quam Neapoli pharmacopolæ parare solent, Socialemque appellant. Cuius descriptio reperitur in quodam libro, qui, Rosa Anglica nuncupatur, feliciterque successit: cuius compositionem hic subscribere placuit. Recipit autem fœniculi, rutæ, eufragiæ uerbene, tormentillæ betonicæ, rosarum sylvestris endiuie callitrichi, anagallidis, pimpinellæ chelydoni, papyri, pœoniæ, foliorum vitis, apii, agrimoniæ, & caprifolii, singulorum partes æquales; triturentur, & pridie ponantur trita in vino albo, secunda in urina pueri venerem non experti: tertia in lacte mulieris, & quarta in melle optimo: quo tempore distillantur, & quod extrahitur vsui referuetur. Hæc de cura suffusionis nondum concretæ, ac confirmatæ: nam ea quæ confirmata est (si curari poterit) manus administrationem requirit: quæ quomodo perficienda sit, Paulum consule cap. 21. lib. 6. & Celsum lib. 7. cap. 7.

περί ἀσπαράσσεως.

De obscuritate seu offuscatione oculorum.

Cap. 30.

NVLLO interdum in oculis malo apparente, contingit, ut cernendi sensus deperditus sit. hunc affectum Græci ἀμαρῶσις, latini offuscationem, seu obscuritatem visu appellant, recentiores praticantes, guttā serenam nominant. Est autem (Paulo auctore) perfectum ut plurimum

Obscuritas visus quid sit.
Pau. li. 3. c. 22.
Aet. li. 7. c. 48.

Hebetudo visus quid sit.

cap. 2. collige.

Quæ oculi pars in eis afficiatur si paulatim fiat.

videndi impedimentum absque manifesto affectu circa oculorum. Aetius vero eodem fere modo prædictum affectum descripsit, quod est perfectum ut plurimum videndi impedimentum eitra manifestam circa oculum affectionem, pura videlicet apperente pupilla, ut minimum, aut semel in totum non videant. Differt autem affectio hæc ab ea, quam Græci ἀμβλυωπία, latini vero obtusionem, seu hebetudines visus nuncupant: nam in hac non omnino aufertur visio, sed notabiliter minor redditur, & proinde est quædam videndi obscuratio ab aliqua causa immanifesta perueniens, ut idem testatur Paulus. Differunt itaque affectiones hæc secundum magis, & minus: increfcit nanque actionis noxa pro quantitate declinationis, ac affectus magnitudine, ut primo de caus. sympt. patet similemque fere curationem requirunt, & propterea una derelicta, de reliqua mentionem fecimus. verum quoniam prædicta affectio, quibusdam paulatim, ac sensim conflatur, aliis autem confertim incidit; si paulatim fiat, læditur in ea oculus, quamuis non manifeste, aut secundum eius visuum spiritum, dum incrassatur, aut secundum tunicas dum densantur, & crassescunt; aut secundum humores, cum crassi, aut viscosi redduntur. Interim visuius spiritus præter iam dictas causas imminuitur, & debilis fit, corruganturque nervi visui, ac tunicæ, ut in senibus accidit. At si confertim incidat hæc affectio, secundum visuius duntaxat nervos oculus affectum erit Galeno teste 4. de loc. aff. & Aetio cap. 38. 7. lib. verum modo quouis genere tur affectio hæc, perpetuo symptoma erit in genere noxæ functionis sensibilibis visuius videlicet: eritque ea ablata ut plurimum, interim autem diminuta valde, neque ex vno raptum morborum genere pullulat, imo ex quouis gigni poterit, ex intemperie videlicet, mala compositione, aut unitatis solutione prænominatarum oculi partium: quorum morborum causæ non paucæ esse possunt; cum si paulatim conflatur affectio hæc, ex incrassato visuius spiritu

ritu

ritu, tunicis densatis, ac crassifacitis, seu rugosis effectis, aut humoribus in oculo crassis, & viscosis redditis gigni possit; pariter ex ingenti tristitia, ex precedenti diuturno morbo, & collapsione, & velut corrugatione neruorum visui; spiritus etiam visui debilitate, & multa imminutione etiam fit: ex quibus etiam causis oculorum hebetudo progignitur. Repentina autem & quæ confertim incidit causa) ut testatur Aetius) est nerui visui obturatio a crassis, ac viscosis humoribus confertim in ipsum illapsis, aut eiusdem nerui resolutio. Dignosces autem dictorum humorum crassorum, & viscosorum copiam, si ab eis neruus confertim obstruatur: quoniam, ut tradit Aetius, absque alia causa necesse est capitis grauitatem consequi, maxime in profundo, iuxta radices oculorum. At si ad eorundem visui neruorum resolutionem affectio hæc consequatur, tarde mouebitur oculus, aut omnino non mouebitur. Cū vero ex violenta plaga in caput facta, aut ex casu à cerebri connexu ruptus fuerit neruus, primum quidem oculus prominentior fit: deinde cauatur, & nō alitur. Præcedunt autē (ut ipse semet testatur Aetius) visus obscuritatem, seu oculorum offuscationē assiduæ cruditates, & meri potus, & insolatio, capitis inustio, ac ardor, aut perfrigeratio, assidua lectio post cibum, aut similiter balnea post cibum, uomitus intēpestiui, immodicus ac intēpestiuus coitus, spiritus derentio violenta ut in tubicinibus contingit: quæ omnia, & his similia dum modica fiunt, visus habitudinem, dum vero immodice offuscationē efficiunt. Fit itaque aliquando offuscatio ab fortes capitis plagas, aut casus ex alto, resolutio aliquando neruo visui, aut rupto, aut peruehementem concessionem humorum copia illata, & visui neruum obturante: quæ omnia, ex ægrorum, seu astantium assertionē percipi poterunt, & una cum prædictis signis prompte distingui. Paulatim vero offuscatio si fiat, non admodum difficulter curari poterit: quemadmodum nec hebetudo, nisi senioribus accidat: nam à moderatis causis, & non ab immodicis ortum ducit. Verum si confertim ob fortes videlicet capitis plagas fiat, aut casus ex alto, omnium mitissima erit, Aetio teste: ea quæ fit ex humorum copia illata propter vehementem concussionem, & visui neruum obturante. Pro curatione autem eius, siue confertim, siue paulatim fiat, aer moderatus eligatur: siue qui parum ad siccum vergat. Somno vtantur moderato, vitentq; diurnum, curentq; vt aluum facile solubilem habeant: idq; saltem per cibos facito, qui etiam præ omnibus bonæ concoctionis esse debent: vitandiq; sunt omnes crassifacientes, immò extenuantes potius eliganter. Vitandus est vini potus, tolerādāq; viriliter est aquæ potio, aut aquæ mulsæ, seu aquæ ex cinamomi decocto. Exercitiis vtendum infernarum partium, & deambulationibus pluribus in vmbrosis locis, vt Aetio visum est; caueant ab assiduo coitu, capitis insolatione, a vehementiori; motu a cibo: vt neque legant, aut scribant. balneum eis non conuenit, virandæ sunt iræ, indignationes, curæ pertinaces, & vehementes perturbationes, ac timores præsertim post cibum: pariterq; & assidui vomitus. Verum eos, quibus oculi confertim offuscantur curare oportet vena cubiti incisa, si plenitudine grauatus sit eger: validissimum enim auxilium in ipsis est venæ sectio, vt testatur Aetius. Incidatur autē humeralis, aut media, deinde interpositis aliquot diebus (ut idem Aetius inquit) fasciam collo circundabimus, ac constringemus: & postquam frontis venæ eleuatę fuerint, rursus exoluemus: & hoc iterum, atque iterum faciemus, quo per spiritus motum humores obturati violenter concutiantur, postea eleuatas angulares venas ab vtraque nasi parte secare oportet, eodem Aetio, & Paulo testibus. post hæc confertim cucurbitula occipitio affigenda est cum scarificatione: nam contingit plerunq; (vt Aetius asserit) statim incumbente adhuc cucurbitula, hominē respicere. Paulus vero hirudi-

Si confertim
fiat, causę.
causarū, signa.

Prognostica,

Curatio.

Vitæ ratio.

Si confertim
fiat.
Medicamentorum
ratio.
Venæ sectio,

Purgatio.

Si sensim fiat.

Topica utrisq;
communia.

nes temporibus admouere iussit, inferioresque partes perfricare. Verum non oportet his duntaxat auxiliis contentum esse, sed viribus reparatis postea corpus totum purgare conuenit, prius tamen redundantibus succis præparatis: explebis autem ea vtraque iis, quæ cap. de suffusione retulimus: nanque communis est huius affectionis curatio ei, quam in suffusis diximus, Paulo auctore, Perseuerante vero adhuc affectione, etiam his quæ naribus infunduntur medicamentis utendum erit, ac apophlegmatismis superius in capite de dolore capitis ex pituita conscriptis. Ceterum si neque his malum cedat, præsertim si ex multis, ac crassis succis ad visorios nervos delatis originem ducat; post omnia iam dicta auxilia, caput sinapismo integendum erit, & quæ adurunt medicamenta occipiti admouenda sunt, cauteria dicta, ut idē Aetius præcipit. At si visus obscuritas sensim accadat, ab angularibus uenis euacuatio (uelut dictum est) facienda erit statim ab initio, his potissimum qui non multo sanguine abundant, deinde cucurbita occipitio affigatur, post ea purgatio fiat. Perseuerante adhuc malo, per modò dicta medicamenta caput purgandum erit, reliquisque paulo ante commemoratis medicamentis utendum. Illitio autem oculorum in omni offuscatione quouis modo conflata per simplicia primum fiat, veluti per mel, aut uetus oleum, aut æqua portione simul hæc mixta, postea etiam aliis compositis vtare, velut est medicamentum à Paulo simul, & Aetio comprobatum. Id autem recipit croci 3. i. myrhæ tantundem, piperis gr. xv. spice nardi scrup. i. succi fœniculis 3. xvj. ammoniaci Thymiamatis 3. i. mellis unc. v. ad omnia leuissime trita fœniculi succum affunde: deinde tere, ac resicca, & admisto melle, ænea pyxide excipe ac vtare. Verum ante illitionem per spongiam in aqua calida marina tinctam fomentum adhibendum erit: aliquando etiam tota facies in marinā tepidam immitenda est. Incipientem quoque offuscationem. aut suffusionem (Galeno auctore 4. de comp. med. sec. loc. circa finem) persanat omne fel cum marrubii succo, ac melle attico. Item si myrrhæ, & piperis æquales partes assumas cum melle, aut si fœniculi succum, & fel taurinum liquidum, paribus portionibus assumas, & mellis atticici duplum, ac illinas, aut croci, & piperis equas portiones felle taurino excipito, atque in collyria redigito, & illinito quibus omnibus pro offuscationis curatione uti poteris, nec minus & hisque paulo ante suffusis approbauimus.

περί νυκταλόπου

De nyctalope.

Cap.

31.

Plinius li. 23.
cap. 7. & li. 28.
cap. 11. & alibi
Aet. lib. 7. c. 46
Pau. li. 3. c. 22.
Quid sit nocturna
cæcitas.
Quæ pars afficitur,
c. 7. prope medium.

Quis præter
naturæ affectus
Causa.

Prognosticum.

PRÆTER dicta vitia quæ oculis contingunt, unum quodā oriri cōsuevit quod Græci νυκταλόπου, quidā nocturnā cæcitudinem, Plinius hos lusciosos appellat. Celsus vero libr. 6. capi. 6. oculorum imbecillitatem nuncupat; ex qua (ut ipse refert) ægri interdum satis, noctu nihil cernunt: ut vero Aetio, & Paulo placuit malum hoc est, quo per diem homo cernit, occidente vero sole obscurius, deinde noctu penitus nihil. Cum itaq; videndi functio in hac affectione læsa sit, ut ex eius descriptione liquet cuiq; constat oculum affectum esse; neque enim fieri potest, ut cernendi functio oblata sit ipso oculo nequaquam affecto, cum actionis noxa qualiscunque sit, cuiuslibet partis proprium est symptoma, ut patet 2. de loc. affe. Est insuper affectio hæc symptoma in genere noxæ functionis animalis sensibilis, non siquidem ablata, nec deprauata, sed debilis. Nam ut dictum est qui tali affectione detinentur, die quidem vident, uerum occidente sole obscurius, & noctu omnino nihil. Illud autem magis fieri uidetur (ut inquit Aetius) propter aliquam capitis imbecillitatem, & maxime uisui spiritus crassitudinem, itemq; reliquorum oculi humorum, actunicarum. Hoc uitium (ut Celsus refert

refert) in foeminam bene respondentibus menſtruis non cadit. Pro cuius curatione, uictus ratio ex toto attenuatoria præcipienda eſt, uitandaque omnia craſſefacientia, ab initio etiam à uino abſtinendum eſt: & ſi bono habitu præditi fuerint ægri, curari debent ex uenæ cubiti ſeſſione, humeralis uide licet, & deinde ex angulis oculorum ſanguis mittendus eſt, moxque ſi uitioſi redundarint humores, conuenienti pharmaco purgentur: aut per clyſteres alius inaniatur. Quibus autem id perficiendum erit, ſæpius ſupra adnotaui mus. Poſt uerò uniuerſalem euacuationem, utendum eſt his, quæ pituitam per os ducunt, & quæ per nares purgant, & ſternutationes quoque ciende ſunt: quorum iterum copiam in prædictis requiras. Verum inter ea, quæ naribus infunduntur, tanquam maxime commodum ab Aetio unum conſcribitur: id autem recipit piperis, ſtaphidis agriæ, ſingulorum ſcrup. ii. ſinapis ſcrup. i. tundito, ac cribrato, & radicum betæ ſuccum adicito, ut mellis liquidi conſiſtentia fiat, & contrita naribus infunde, ac attrahere iube, atque, ut ipſe aſſerit, hoc ad dies quinque, aut ſeptem facito. Poteris autem eiſdem ſtaphidis agriæ, & piperis 3. i. excipere, & ſinapis. 3. s. foliorum ſampſuci pug. s. in aqua decoquito, cui quartam partem ſucci radicum betæ adicito, & per nares attrahere iubeto. Inſuper præcipit idem Aetius. ac Paulus, ut ante cibum bibendum tribuatur hyſſopi decoctum, origani, aut rutæ, & ſi his remediis affectus non aboletur, rursus purgatio molienda erit, quam ipſi ex ſcammonio, & caſtoreo conſiciant, addit tamen Aetius. ſal. uerum ſi hoc medicamento uti libuerit, ſcammonii non 3. s. ſed ſcrup. s. aut paulò plus aſſumas: nam purgatio hæc (ut idem teſtatur Aetius) ſæpe eſt ueſtigio ab affectione liberauit, aut multò meliorem diſpoſitionem induxit. Et iterum poſt paucos dies dandum eſt purgatorium medicamentum pituitam, & bilem ducens; aut ſi paulò ante dicto medicamento uti nolueris, ut pote in debilioribus corporibus, inſcripſto utaris ipſum iterando, interpoſitis quibuſdam diebus, ut uidebitur. Recipit autem pilularum lucis maiorum, aut arabicarum ſcrup. iiii. uel cochiarum 3. i. cum ſcrup. ii. aut 3. i. agarici trochiſcati, formentur catapotia ex ſucco feniculi, aut ſyrupo ex thœcade, & exhibeantur. Oculi uero illinantur melle deſpumato. quo inieſto ad ipſum continendum oculi ipſi claudantur, aut oleo uetuiſſimo ſimiliter illinatur, uel aluminis ſciſſi partes duæ, & ſalis ammoniaci pars una trita cum melle, aut muliebri lacte, ſublinantur: fel quoque hirci ex melle illinitum paucis diebus uitium tollit, ut inquit Alexander. Quidam uero (Celfo auctore) contrito ſemine portulacæ mel adiciunt eatenus, ne id ex ſpecillo deſtillet, eoque inungunt. Verum tum Celfus ipſe, tum Alexander, Paulus, & Aetius cum Galeno quarto de comp. me. ſecun. loc. iecoris hircini ſaniem, quæ dum aſſatur effluit, colligere præcipiunt, atque hac oculos oblinire iubent: iecurque ipſum maximè hircinum aſſatum cum ſale, ſi minus, caprillum ſi comedendum exhibeatur, eis prodeſſe aſſerunt. Similiter ſi dum ipſum aſſatur, elatum uaporem apertis oculis excipiant, uirandus tamen eſt perpetuo frequentior acriorum pharmacorum uſus: ipſum quoque fel capræ, perdicis, aut hirci ex interuallis cum melle illitum idem commendauit Aetius, licet etiam, ut Celfus inquit, iſdem medicamentiſ non inutiliter uti quæ uel cicatrices, uel aſpritudinem extenuant. Contingit uerò quandoque, quamuiſ raro quibuſdam, ut noctu quidem melius uideant, interdiu autem deterius, & ſi noctu luna appareat, nihil cernant, eodem Aetio teſte, in quibus multum attenuari ſpiritum, aut tunicas rareſieri, & propterea ſpiritum diſſipari, ac uiſum obſcurari fatetur, noctu uerò craſſefieri, colligique ac ſenſum mouere. His autem oportet (ut ipſe teſtatur) robur oculis addere, quamquam Herophilus uice uerſa eos curabat, medicamentiſ uidelicet, quæ ad opſ, qui noctu non uident, magis faciebant: nā cum ſimul multus, ac æthereus fuerit

Curatio.

Victus ratio.

Venę ſectio.

Purgatio.

Topica.

Alex. li. 2. c. 6.

In fine.

De contrario affectu oculorū

c. t. in medio.

fuerit animalis spiritus, is res quæ distant, & uidere, & exactè discernere potest, Galeno auctore primo de caus. sympto. cui uerò paucus fuerit, sed purus, is ut res propinquas planè discernit, ita distantes, haudquaquam uidet. At si crassior simul fuerit, & multus, res distantes uidet quidem, sed non ad unguem discernit; qdemadmodum cui humidior simul fuerit, & exiguus, is neque exactè, neque porrò uidere potest. Cum itaque prædictis paucus, isque tenuis spiritus fuerit, aut idem propter rarefactas tunicas dissipatur, mirari non oportet, si noctu melius, interdiu autem deterius uideant: cum simul noctu colligatur eisdem, ac crassescat animalis spiritus, & propterea sensum moueat.

περί αἰγίλωπος.

De agilope. Cap. 32.

Aegilops quid sit.

Lib. 3. cap. 22.
Pars affecta.
Affectus.

Causa.

Prognostica.
Lib. 7. cap. 35.Curatio.
Vene sectio.

Purgatio.

INter maiorem oculi angulum, & nasum quidam affectus oriri consuevit, quia græcis αἰγίλωψ dicitur. Est autem Galeno auctore quinto de compositione medicamentorum secundum locos paruum quoddam abscessui simile tuberculum inter nasi os, & magnum iuxta oculi angulum ortum, & rumpitur sane sæpe in angulum. quibus uerbis liquet ægilopa Galenum nominare tuberculum hoc, tam si disruptum fuerit, quàm ante eruptionem. Paulus uerò (utpote Galeno iunior) distinctius (mea quidem sententia) prædicti uicii meminit; retulit namque ægilopa abscessum esse inter magnum oculi angulum, & nasum, qui si rumpatur, negligaturque in fistulam uertitur usque ad os, priusquam uero erumpatur in ulcus abscessus, anchilops dicitur. Anchilopa itaque nuncupauit. Paulus hoc uicium priusquam erumpatur in ulcus: eo autem in ulcus uerso, ac rupto, ægilopa. Pars quæ afficitur cum in eius descriptione, tum ad sensum patet. Affectus ipse morbus est in compositione primò, in magnitudine uidelicet, & proprie in excessu: cum quo intemperies, ac soluta continuitas complicatur. Verum eo disrupto, morbus erit in soluta continuitate, primo, cum de genere ulcerum sit. Progignitur autè à uitiolis succis ad prædictam partem delatis, aut toto, uel à quibusdam partibus transmissis. Est uero affectio hæc ægrè curabilis (ut Aetius testatur) propter corporum tenuitatem, & subiecti ossis putredinem, seu corruptionem: ob situs etiam uicinitatem (ut idem inquit) ipsi quoque oculo damnum infert, aliquando per naturale paruum iuxta angulum foramen. Ipse quoque Galenus præcitato loco, cum iam dictum malum in angulum rumpitur ægre curabile reddi, nisi mature occurratur, asseruit: non enim potest ab acribus medicamentis curari, cum ex eis oculus coafficiatur, atque ita affectæ etiam partis inflammatione augeatur. nec ob id solum ægre affectio ipsa curabilis est, sed propterea quod cum multa liquida pharmaca in experimentum assumi possunt, ea non tolerat locus ipse: necessario enim ex eis oculum aliquid influit, neque uero adhærere huiusmodi queant citra obligationem, quæ totum oculum complectatur, quam impossibile est (eodem Galeno teste) tot diebus aliquem perferre posse, quot ad mali curationem requiruntur. Quapropter Apollonius (ut ipse refert) nulla pharmaca ad ægilopas scripsit: Archigenes uero paucis enumeratis. deinceps ad curationem ipsorum per chirurgiam progreditur. Incipiente itaque inflammatione, uictus ratione probe instituta pro auersione eius, quod influit, eiusdem lateris in cubito uena humeralis incidenda erit, si quid non prohibeat, alijsque diuersionibus, cucurbitulis inquam, frictionibus, ac vinculis utendum. Ab hinc redundantes quoque uitioli succi purgantur medicamento vacuari debent, ne posthac amplius ad affectum locum fluant, eligendaque ea sunt, quæ leuiter purgandi uim habeant, pro ratione tamen redundantis uitioli succi, quo etiam tempore repellent.

repellentia medicamenta iuxta affectam partem adhiberi possunt. Verum si perseverauerit affectio, tentandum est per discussoria medicamenta, quæ citra mordacitatem operantur, eam curare, Galeno, & Aetius testibus. Coasficitur nanque oculus (vt diximus) ex acribus: & in ipsa affecta parte inflammatio augefcit. In hunc ergo vsum probe facit medicamentum ex glaucio, & croco, vna cum perdicii herbæ succo quàm parietatem vocant, compositum si imponatur, iuxta Pauli, & Alexandri sententiam: crebro autem ipsum permutare oportet, vt idem Paulus refert: etenim statim immutatum vim suam amittit. huius medicamenti vfu Trallianus testatur incipientes, & nondum in pus conuersos ægilopas prohibuisse, ne in suppurationem mutarentur: & proinde eos curasse. Præterea ex alica cocta in aceto, & probe trita, quam etiam commendabat. Paulus, non modo incipientes ægilopas, sed etiam inueteratos iam, & in pus conuersos mirabiliter se curasse testatur idem Trallianus: præcipitq; vt probe leuigata imponi debeat: quòd si etiam pus inhære secens deprehendatur, rumpit ipsum, & vsque ad os penetrat, adeo validum est medicamentum vt ipse fatetur: ruta quoque satiuua vna cum lixiuio, quod primum distillauerit, contrita, cocta; & imposita pulchrè admodum ægilopas emendat, & ad vsque os permeat, per initia tamen hoc prædium modice rodit, postea vero non item: ac mirum est (vt inquit Paulus) quod ne cicatricem quidem indecoram hoc præsidium relinquat: vfu quoque probatum medicamentum quoddam Trallianus conscripsit: Recipit autem id internam arundinis membranam, id quod rotundum circa nudos inueniri consuevit, acceptam melli iniicito, ac particulæ affectæ imposito, mutans quotidie quater; & vbi locum probe repurgaueris, mulla cum spongia ocularia ablutio: ad hæc (inquit) prædictam arundinis membranam per se imposito, & miraberis. Antequam vero ægilops in pus vertatur, & postquam ruptus fuerit abscessus cochleas cum testis suis tritas imponi præcipit Paulus, interdum aloë, vel myrrha admista, habet nanque medicamentum hoc desiccandi vim probe quoque facit thus cum columbino stercore recenti impositum, vt Galenus Archigenis auctoritate 5. comp. med. secund. locos testatur: aut erui farina cum melle. Curant quoque ægilopas (si non profundum corruptum fuerit os) chamæmeli folia commansa imposita, aut maluæ folia commansa, si cum sale imponantur prius tamen, quàm disrumpatur, radix item lilii recens ad emplastrum formam trita, & imposita ægilopas curat, Aetio auctore: rumpit enim & repurgat, prout experientia cognitum est, & vsque ad perfectam curationem cicatrice includit. Arnoglossa quoque herba cum modico sale trita, & appolita ægilopas destruit, vt apud Plinium Secundum libr. 1. de re med. cap. 23. legitur: item nucis combustæ cinis iniectus sanat. At in quibus affectio diuturna os corrumpit, aut ad angulum in fistulam abiit, nec prædicta contulerint, ad chirurgiam confugiendum, quàm a Paulo petas, libr. 6. cap. 22. ab Aetio libr. 7. cap. 86 a Celso vero libr. 7. ca. 7.

Paul. loco citato.
Alex. lib. 2. c. 8.

c. 2. in prius.

περί ὠταλίας.

De aurium dolore.

Cap 33.

QUoniam aurium vsum proximum a luminibus natura nobis dedit, Celso auctore libr. 6. cap. 7. secundumque locum obtinet auditus sensorium in tenuitate a visu, velut gustus sensorium in crassitudine secundum locum obtinet a tactu, vt patet 4. de loc. affectis propterea expediti ab oculorum affectibus, ad eos, qui in auribus euenire consueuerunt transeundum est, ab earum dolore primum exordientes: quoniam hoc potissimum symptoma artem ad curationem incitat, vt testatur Alexander: quam & ipsæ quouis morborum genere affici possint, vt 1. de caus. sympt.

Cap. 2. post med.
Alex. lib. 3.
Cap. 1.
Cap. 3. collige.

K decretum

Ca. 2. post prin.

Com. 13. i prin.
cipio.

Cap. 3.

Primum audiē
di instrumentū
quid sit.

Quid per aurium
dolorem intel
ligatur.

Partis affectū
notitia.

Affectus quis
sit.

Com. 13. in prin
cipio.

cap. 1.

Causa.

Earundem ch
m signa.

Pan. li. 3. c. 23.

Alex. loco cit
to.

Cap. 1.

Prognostica.

decretum reliquit Galenus, earum primo instrumento, aut partibus, quæ illi visum aliquem præstant, seu audiendi facultate laborantibus, ex quorum omnium culpa lædi hanc functionem contingit. Nomen autem sumpsit hæc affectio cum ab affectu ipso, tum a parte affectu, ut patet 2. meth. med. verum cum hic dolor in evidentibus auriculis infestare possit, nec minus & interim affligit in profundo auditorii meatus, ad quem locum nervus auditorius peruenit non ex longo intervallo ab ipso cerebro, quem dolorem aurium propriè nominare consueverunt, ut testis est Galenus 3. prognost. cuius audiendi meatus finis ubi nervo dilatato coniungitur proprium, ac primum est audiendi instrumentum, ceteræ autem ipsarum partes eidem visum præstant, ut primo de caus. symp. liquet. Ea de re cum aurium dolorem dicimus, in quacunque earum parte, ex quavis causa ortus fuerit intelligere volumus; quanquam potissimum de eo qui in profundo oritur. Quod verò in eo aures afficiantur ex ipsa liquet nomenclatura. At nunquid sola circa meatum cutis, seu evidentes auriculæ affectæ sint, vel ipse auditorius meatus in profundo, ex ipso doloris sensu, tum etiam ex eiusdem vehementia discere licebit: vehementior nanque erit si in profundo fiat, ut eodem 3. prognost. patet. Quis autem affectus sit dolor, hic iterum asserere superuacaneum est, cum id fusius disseruimus cap. de dolore capitis in principio. Insequitur insuper non aliter, quam ceteri, dolor hic interim ad earundem aurium inæqualem intemperiem, interdum ea earum continui solutionem, aut si utroque modo affectæ sint pro diuersitate causarum, quæ earundem aurium dolores excitare solent, quas omnes Galenus 3. de comp. med. secund. loc. conscripsit: docuitque simul modum dignoscendi eas: a quo ceteri auctores græci, Paulus, Aetius, Alexander ceperunt. Quidam nanque ex frigida intemperie ortum habent a frigidis ventis in peregrinationibus susceptis, aut ex balneis frigidis; quos dignoscet, si tum prægressa, tum præsentia percontatus fueris, antegressas quidem ex ægri, aut astantium relatione, præsentia verò ex te ipso, quoniam dolor alte infestabit, fixus quidem citra gravitatem, vel distensionem, vel ardorem. Verum si ex calida conceptus fuerit intemperie dolor, ex prægressa quapiam insolusione, sed æstuatione, aut ventis calidis, seu medicatis aquis, in quibus quidam ob delitias se lauant, aut ob corporis commoditatem, id perdisces, doloremque feruidum sine gravitate, seu tensione sentient ægri. Quod si ex frigidis, glutinosis, crassisque succis proritetur dolor, qui obstructione eum potius concitant, iterum artificiosa quadam coniectura deprehendes prægressa, & præsentia percontatus; cum cibi pituitosi, & mali succi, ac potus frigidiores, humidioresque præcesserint: temperamentum, ac ætas frigida, similiterque anni tempus, & regio, ac aeris constitutio: capiti quoque, ac aurium gravitatem ægri sentiunt. Verum si distensio quidem orta fuerit, gravitatem vero in capite, vel aure neutiquam percipiant ægri, fueritque antegressa frigiditas, spiritum flatuosum, & crassum transitum non habentem, doloris causam esse manifesto constabit, qui haud alter quam inflammatio partes distendens dolorem excitat. At si gravitas, distensioque simul ac calor, & dolor pulsatilis, simulque etiam febricula quædam oboritur, inflammationem efficientem esse causam doloris, qui sanguinis exalfecti influxu originem habueris, bona ratione estimare licebit, quemadmodum Paulus, & Alexander visum est. Excitantur autem interdum ex chorbis, seu saniosis humoribus in aurium corpore genitis consimiles dolores, quemadmodum ex mordacium humorum illapsu forinsecus facto contingunt, eodem Galeno teste 4. de comp. med. secund. locos: quoniam vero maius imminet periculum in aurium affectionibus, quam in oculorum vitiis, ut testatur Celsus: nam vitia oculorum intra ipsos nocent: aurium inflammationes, doloresque interdum

interdum etiam ad dementiam, mortemq; præcipiant; propterea inter initia protinus magis succurrendum est, ne maiori periculo locus sit, ut ipse inquit. Non absque itaque tatione Hippocrates 3. prognost. refert, quod aurium dolor cum febre continua, ac vehementi difficilis est: periculum enim delirij, mortisq; imminet: nam natu minores septimo die, aut citius ab hoc morbo interimuntur; natu vero maiores multo tardius. Febris enim ac delirium minus eos infestant; & aureis eis ob id antea suppurantur, sed per has etates reci diu euenientes morborum, plurimos interimunt: minores vero natu priusquam suppurentur aures, interimuntur. Alexander autem, siue meatus auris (dicebat) siue alia ipsius quæpiam interna particula frequenter inflammatione laboret, acutissima pericula vicinia regionis, & genere substantiæ inducit: redditq; ipse rationem: nam neruus qui internam auris superficiem sublinet, cum sit sensibilis, validos dolores acutosq; excitat, ut etiam cerebrum in consensum perducatur, ita ut febres, & deliria sic affectis oboriantur: interim vero moriantur, nec minus cur citius iuuenes, quam senes ex eodem affectu intereant asserit: quanquam & ante ipsum non Hippocrates modo, verum etiam & Galenus eodem 3. prognost. scriptum reliquerant. Cum itaque non ex vna duntaxat causa aurium dolor excitetur, quo fit ut neque vna sit eiusdem curandi, seu victus ratio, sed iuxta causarum diuersitatem diuersimode quoque sit instituenda; propterea cuiusque causæ speciatim victus institutione prætermittenda, quoniam ex his, quæ prius diximus facile præcipi poterit pro causarum varietate cuiusvis doloris auris curationem præcipimus, quæ cum multæ iam dictæ sint, tantum numerum remediorum esse oportet, quantus est efficientium causarum. Dolores igitur a sola frigiditate obortos calfacientia medicamenta quam celerrimè curant, Galeno auctore 3. de compositione medicamentorum secundum locos, veluti est oleum amaracini, nardinum, rutaceum, laurinum, aut de castoreo: quod si maxima fuerit perfrigeratio, benefacit oleum addito pipere exquisitissime trito, aut si multum, veteri oleo exiguum omnino euphorbii admisceas, styracem, casiam, seu calamum odoratum: pariter quoque confert irinum oleum: & ruralibus quoque hominibus, si alium in oleo contundas, vel feruefacias, atque ita infundas, aut si magnam cœpam exculpas, deinde oleo eam expleas, & in feruenti cinere moderate calfacias: atque ita auribus infundas. At si ex calida intemperie aurium dolor originem duxerit, seu ex medicatis aquis, oui candidum in aurem dimissum, ipsum mitigabit, si tepidum paulatim cum lacte muliebri infundatur. Plurimum vero iuuantur ex succo perdicii cum modico rosaceo, aut solani, seu coriandri vel astulæ regiæ: Nec minus & amygdalino oleo, vel oleo in quo lumbrici, seu aselli, qui in aquosis, & humidis degunt, fuerint incocti. Coriandri item succus cum lacte mulieris immixtus, & auriculæ infusus dolorem mirifice tollit, ut Plin. secundo visum est libr. 1. de re medic. c. 10. Quod si ex aqua medicata excitatus fuerit dolor, circa auditorium meatum, oleum assidue infundere cōuenit, quo ipsum eluamus, ut testatur Galenus: deinde lana molli exterere, rursusque infundere. iuuatur quoque plurimum ex adipe anserino, atque item vulpino: similiter si oui candidum cum muliebri lacte tepido fuerit infusum. Pro communi nanque præcepto habendum erit, ut quicquid auribus adhibeatur, mediocriter calidum esse oporteat, ex communi omnium medicorum sententia: poterit quoque per exustionem ore aqua attrahi. Si vero quis vno pede auri affectu proximo exiliat (ut inquit Aetius) inclinans quodammodo se ipsum aquam facile excernit. At si ex flatuoso spiritu, aut crasso, lentoque humore aurium dolores fiant, eis vtendum medicamentis erit, quæ obturatione liberant, abstergunt, atque incidunt, citra tamen vehemētē rofionē, præsertim in quibus dolor magnus, &

Tex. 11.

Lib. 3. cap. 5.

Tex. 13.

Curatio, si ex
frigiditate ori-
tur aurium do-
lor.
Cap. 1. in prin.

Si ex caliditate
curatio.

Si ex medica-
mentis aquis cu-
ratio.

Commune præ-
ceptum pro au-
rium curatione

Aet. li. 3. c. 75.
Si ex flatuoso
spiritu, aut fri-
gidis succis
fiat curatio.

Loco citato,

Lib. 3. c. 1.

Si ex inflam-
matione fiat, cu-
rat, e.

Lib. 6. c. 80.

lib. 3. c. 5.

g. i. in princ.

copiæ suspitio sub est: cuius generis sunt album, & nigrum veratrum, amygdalæ amaræ, & ex tribus aristolochijs, quęcunque fuerit ad manum, & iris illyrica: iniicies autem & cinamomum, si habueris, aut casiam, illo non præsent: nec minus & cucumeris sylvestris, ac bryoniæ radice & centaurij magni: iterum radice, seu parui coma vtendum: & omnino omnia amara conferunt: nanque citra mordacitatem, & absque molestia expurgant hæc, meatus disijciunt & dissecant obturata, vt eodem 3. de comp. med. liquet. commendatur item à Paulo fel ouillum cum oleo communi, vel amygdalino, insuper porri & cepæ succus tepidus cum melle. aut origanum cum melle, & lacte muliebri si instilletur. Ad vehementiores autem aurium obstructions fel caprillum cum succo porri inditum (ut ipse inquit) confert. Alexander autem fel bubulum, aut ouillum instillatum, seu capræ vrinam continuè infusam commendat, similiter si felle taurino floccum imbutum, leuigatumq; auri imponas. Priuatim autem Paulus ad dolorem, ob flatuosum spiritum refert, quod conferat strenue cucumis ex aqua calida fota, autique dimissa. Conducit quoque vaporatio ex ruta, sampfuco, castoreo, & milio. Verum si in toto corpore, aut saltem in capite prædictorum crassorum humorum adsit redundancia, priusquam modo dictis medicamentis vtaris, corpus totum, aut saltem caput purgante medicamento exonerabis, præcedente tamen eorum coctione, ac præparatione; aliàs fluxionis causam præbent, & dolor amplius irritabitur. Dolore autem auris ex inflammatione oborto, statim sanguis excubito mittendus est, media, seu humerali vena, velut plenitudo maior, vel minor, ac vires magis, vel minus valentiores videbuntur: deinde auxilia aggredi quæ inflammationes sedare possunt, vt Alexandro, & Paulo visum est: alijsq; reuulsionibus vtendum, frictionibus, vinculis, cucurbitulis, ac clysterijs, vt humorum fluxus inhibeatur; si & biliosus sanguis redundare videatur, à venæ sectione, purgatione vtendum erit, quæ vim habeat leniter bilem educendi: hanc autem studiosi ex prius dictis requirant: demum moderata existente inflammatione rosaceum cum aceto tepesactum adhibendum erit. Oleum quoque dulce, & calens per specillum lana inuolutum (Paulo teste) continuò adhiberi potest: aut adeps anserinus, seu vulpinus cum rosaceo: extrinsecus vero ea, quæ dolorem leniunt (ut ipse testatur) materiamq; impactam concoquunt, superaccommodare oportet. Si vero vehemens fuerit ex inflammatione dolor, mitigabit ipsum (Aetio auctore) oui candidum tenue cum lacte muliebri tepidum infusum. Mitigant quoque feruentes inflammationes (eodem auctore) rosaceum cum auriculæ muris, aut polygoni, vel portulacæ, seu ramentorum cucurbitæ succo, si tepidè instillantur. Item aselli, sub hydriis stabulantes, seu intestina terræ cum rosaceo cocta, ac oleum amygdalinum, quod insuper cum aliquo prædictorum misceri poterit: vbi vero maximus, ac vehementissimus ex inflammatione dolor vigeat, necesse est stupefacientibus sensum vtii: cum videlicet propter dolorem ad mortis discrimē æger redat, vtendū is tamē, quæ leniter sensum stupefaciūt, ut inquit Paulus; nō enim mediocre periculum est, ne cerebrum, neruo, per quem facultas audiendo erogatur vicinū, consortij lege afficiatur: neque sæpius eis vt oportet, sed vbi coactus fueris semel duntaxat, aut iterum offerre conuenit, Alexādro auctore, præsertim si opio vtaris; miscetur autem opium muliebri lacti, & oui cādido: quæ ipsa & per se sæpe aurium inflammationibus profuere, Galeno teste 3. de compositione medicamentorum secund. loc. Excipiatur autem opij pars vna, castorij partes duæ, & cum lacte mulieris, seu oui albumine, aut vino dulci tepido instillantur, Paulo auctore: quanquam Galenus velit, quod in vehementissimis doloribus pari mensura castoreum admiscendum sit, in non tam vehementibus dupla: verū multò ante vsum, tempore præpara

præparatum id esse conuenit. Porro hoc medicamentum, quod ex castoreo, & papaueris succo conficitur non solum aurium sedat dolorem, sed etiam oculorum, & dentium, si auribus instilletur, vt 12. method. med. patet. Verum eo vtendum est, cum maximè necessitas vrgeat: cum nonnihil (vt ipse Galenus inquit) partes lædat, ac eas imbecilliores reddat ex refrigeratione; velut reliqua anodyna: nisi post in sanitatis tempore easdem partes excalfeceris; liquor vero, quo hæc diluuntur ex musto sapa fit: multo enim magis quam dulcia vina dolorem hæc sedat: quomodo hæc miscenda sint à Galeno eodem 3. de compositione medicamentorum secundum locos decretum est. Similiter quo pacto eadem, aut similia medicamenta auribus vehementer dolentibus injicienda sunt, docet: idem Asclepiadis auctoritate, serosum cruorem, qui à carnibus bubulis, dum torrentur, destillat, si calidus infundatur, commendat. Extrinsecus autem omni ex parte oleo calido, aut nardino, quod adipem anserinum habeat, locus fouendus erit, aut rosaceo, seu amygdalino; & si doloris vehementia exigit per spongas calente aqua imbutas, in qua chamæmeli flores, fœnum græcum, & melilotum fuerint decocta, fomentum adhibere conuenit. Quod si imponi cataplasma aliquando suadebit, papauerum capitibus in aqua coctis, ac fœni græci, vel hordei, vel lini seminis farina aquæ immixta cataplasma conficies, ex eiusdem Galeni sententia eodem 12. meth. med. Et si externa videantur auris inflammatione tentari, nō alienum erit, farinam hordeaceam, aut triticeam sapæ, aut vino dulci adstrictionis experti in octā cataplasmatism modo inducere, Tralliani auctoritate. Vbi autem dolor inueterauerit ac in pus inflammatio degenerare incipiat, Pauli medicamento utitor, quod ex lini seminis succo conficitur, vna cum rosaceo, aut chamæmelino; solutumque instillabis.

περί ἤχων τῶν αὐτῶν.

De aurium sonitu. Cap. 34.

ALIV D vitij genus aurium est, vbi aures intra se ipsas sonant: atque ex hoc quoque fit, ne externum sonum accipiant, Celso auctore, eodem cap. 7. libr. sexto. quod vitium Græci ἤχον vocant, latini (ut Cel- sus) aurium intra se ipsas sonitum: medicorum vulgus, aurium tum sonitum tum tinnitum, seu sibilum appellat. Est autem sensus sonitus quidam intra se ipsas aures externum sonum impediens, ne ab ipsis accipiat, quemadmodum ex eiusdem Cornelii uerbis percipi potest. In qua affectione meatus auditorium, potissimum secundum eius extremitatem, vbi dilatatum neruum attin- git, oblæsum esse constat: cum & ipse sensus audiendi, qui in iam dicta parte perficitur, affectus sit. Affectio verò ipsa symptoma est in genere noxæ fun- ctionis sensibilis deprauata: sentit enim audiendi facultas id quod sentire non deberet, & propterea eius actio deprauata dici debet. Cuius affectionis cau- sa neque vna esse poterit; nam interim ex flatuoso spiritu generatur, quan- doque ob exquisitam sensus audiendi subtilitatem ex ore ventriculi exhalan- tibus vaporibus ad aures ipsas; quemadmodum in oculis similia suffusionis symptomata, Galeno teste tertio de compositione medicamentorum secun- dum loc. partium etiam ex humore crasso obstructo, interdum ob ipsarum au- rium imbecillitatem, quemadmodum in ijs, qui ex morbo se recolligunt acci- dere consuevit. fit præterea & ratione crisis (Tralliano teste) ut in quibusdam febribus euenit, quemadmodum Galeno etiam, & Paulo visum est. Propte- rea non conuenit citra artem, aut cognitionem, aut curationem auspicari; quamuis certa cognitio dictarum causarum principio haberi non possit.

K 3 artificia-

Ca. 8. in medio.

Loco citato.

Ca. 3. prope me-
dium.

Tral loco cita-
to.

Aurium soni-
tus quid sit.

Pars affecta.

Affectus.

Causæ.

Ca. 1. post prin.

Tral. li. 3. c. 6.
Gal. loco cita-
to.

Signa canfaris.

artificialem tamen quandam coniecturam ex causis forinsecus laceffentibus (si quis ipsarum vires norit) facere licebit, vt si ex pregressa capitis plaga, aut tali morbo, vel ex cruditate, seu largo vini potu, aut violento, & multo vomitu, vel ob pharmacorum auricularium vsum aurium sonitus fiat: ægri quoque temperaturæ, & habitus dignotio ad inueniendam causam conducunt, vniuersaque præcedens victus ratio: quin etiam si vel paulatim congregetur, vel coaceruatim irruat sonitus, id ipsum quoque ad inuentionem affectionis confert: insuperque si per interualla repetat, vel continentur hoc symptoma perseueret, vt testatur Galenus. Si igitur sonitus nunc excitentur, nunc cessent, & spatio interposito reuertantur; intelligito ex spiritu flatuoso, cui facilis non patet exitus prouenire; maxime si præcesserint cibi,

Ex spiritu flatuoso**Ex auditu subtilitate,**

Ex humoribus crassis, & viscidis.
Ob locorum imbecillitatem,

In crisis.**Ex externis causis.****Prognostica.****3. prorr. tex. 18.****Curatio.**

Si ex spiritu flatuoso, & crasso lentoque humore fiat, curatio.

qui flatus generare possint, & multæ cruditates, vt Alexander testis est. Si vero ob flatum ventosum, cui transitus interclusus sit, sonitus fieri suspicatus quispiam fuerit, vt inquit Calenus, & ob hanc rem desiccantibus, & attenuatoriis, ac discussoriis pharmacis admotis nihil profecerit, simulque apophlegmatismis vsus sit: & toto capiti prospexerit, tunc sane ob auditu subtilitatem sonitum fieri coniectandum erit: præsertim si acuto audiendi sensu æger præditus appareat: & propterea certa cognitio, post vsum pharmacorum artificiali coniectura exhibitorum huius præsertim causæ tempore contingit quod si propter humores crassos, ac viscidos sonitus accidat, inde cognoscas, quod neque repente oboriatur sonitus, sed paulatim increseat. Insuper quod etiam grauitas percipiatur, præcesserintque cruditates, balneorum intempestiuorum vsus, & alia quæ crudos humores generare solent. Verum ob locorum imbecillitatem si ortus fuerit sonitus, ex his quæ præcesserunt colligere poteris, utpote præcedentibus morbis quibusdam, a quibus conualescunt ægri: ijs nanque accidere consuevit. Si vero in febribus sonitus fiat, aut harum crisis prompte ex eisdem causis progigni dignoscas. Ex causis vero externis si excitetur, quæ sane ea fuerit, ex ægri, seu astantium sermone patebit. Perpetuo autem permanente sonitu, per essentiam aures affectas esse indicium erit: velut si per interualla repetat, per sympathiam, hoc est, per consensum, vt interim quiescat, deinde excitetur, post videlicet repletionem, aut inanitionem, vel motum, aut vehementem calorem, seu frigus. Leuissimum quidem hoc vitium est, vbi ex grauedine fit, peius vbi ex morbis, capitis vel longis doloribus incidit. Pesimum, vbi magnis morbis venientibus, maximeque comitiali, prouenit, vt auctor est Celsus. Hippocrates vero libr. primo prædictionum dicebat, in febre ardenti sonitibus aurium accedentibus cum visus hebetudine, & grauitate in naribus accedente, melancholico modo mente mouentur. Cuius quoque vitii curandi ratio pro causarum diuersitate variari debet; propterea relicta victus ratione, quæ iterum neque vna duntaxat esse poterit, sed pro causarum ratione instituenda erit: poterunt que studiosi ex his, quæ diximus in præcedentibus, haud difficulter ipsam percipere; hic pro efficientem causarum varietate docebimus curationem. Si itaque ex flatuoso crassoque spiritu, aut humore lento, & crasso aurium sonitus ortus fuerit, totius corporis, aut capitis saltem, purgatione præmissa, præsertim vbi lentis, & crassis redundarint succi, catapotijs arabicis, aut cochijs cum agarico, aut similibus: errhinis quoque, ac apophlegmatismis: desiccantia, ac attenuatoria, & discussoria pharmaca auribus ipsis ad mouere oportet, vt oleum amygdalarum amararum, aut oleum, in quo castoreum, cumini, seu ruta, anethum, seu nardus fuerint incocta, quibus & acetum, & mel admiscere poteris, si vehementius attenuare, ac discutere velis, quæ omnia affectæ auri instillantur: quam etiam inclinare poterunt adeo, vt per arundinem, seu aliud instrumentum vaporem intus suscipiant ex aqua, in qua prius fuerint oleo decocta

decocta, sampſucus, ruta, ſtoceas, abſynthium, hyſſopus, pini folia, & origanum Saccelli item parari poſſunt ex betonica, ſampſuco, ruta, hyſſopo, chamæmeli flore, pini, lauriq̃ue foliis; qui calfacti auribus imponantur. Facit inſuper ad inueteratos aurium ſonitus: (Aetio teſte, Apollonii auctoritate) caſtoreum, & ſpica, nardi q̃uis portionibus cum aceto. & roſaceo, ſi inſtilletur. hoc idem commendant Galenus ex mente Archigenis 3. de compoſitione medicamentorum, ſecund. locos; & ad Apollonii mentem porri ſuccum cum lacte muliebri, aut roſaceo, inſundendum præcipit. Similiter rutam, & cuminum pari menſura trita & aceto diluta, admitto melle ſi inſundas: aut amygd. amararū oleū cum melle mixtum. Cæpas quoque, & allium, & adipem anſerinum pari menſura trita, & excolata ſi inſundas conducit. Verum ſi ob ſenſus audiendi ſubtilitatem ſonitus fiat, prædictis pharmacis ex ſtupefacientibus ſenſum quippiā admiscendum erit; velut eſt mandragoræ, aut papaueris ſuccus iuxta Galeni ſententiam, aut roſaceum cum pauco aceto, & pauciſſimo opio vtendum; aut oleum in quo inteſtina terræ cocta ſunt inſundendum erit, vt Aetius præcipit: verum magna cum prouidentia, ea quæ ſenſum ſtupefaciunt, adhibenda erūt, minima quantitate, & à leuioribus ſemper inchoando. At ſi in febris ſonitus fiant, minimè interturbandi ſunt: vt plurimum enim ſtatim ſedantur, Galeno auctore, ac Paulo. Si autem poſt morbum perſeuerauerit, abſynchi decocto foueri aures debent, vt eodem Paulo, atq; Alexandro viſum eſt: & acetum, roſaceumque inſundi, vel radiculæ ſuccum cum roſaceo, aut veratrum nigrum cum aceto iniicito: vel aloem optimam cum vino mulſo, Aetii præcepto. At ſi propter imbecillitatem accidat aurium ſonitus, vt inconualeſcentibus euenit, temperatum aliquod oleum non nimis calidum, aut frigidum, prout neceſſitas vrgeat, inſundendum erit, chamæmelinum videlicet, anethinum, vel roſaceum. Per conſenſum vero præſertim à ventriculi ore orto aurium ſonitu eidem parti, quæ primo afficitur, proſpiciendum erit: ex quauiſ autem cauſa ortus fuerit aurium ſonitus, vbi inueterauerit, confert hoc medicamentum, quod excipit ſeminis porri, & caryophyllorum ana ſcrup. j. mōſchu gra. v. cum ſampſuci, & rutæ decocto (interim pauco vino dulci additu) auribus inſtilletur.

Aet. li. 6. c. 78.

Cap. 1.

Si obſenſus ſubtilitatem fiat.
Curatio.

Si in febris fiat.

Ex imbecillitate.

Per conſenſum ſi fiat.

περί δυσκοίαν, καὶ κωφώσεως.

De difficili, seu graui auditu, & ſurditate. Cap. 35.

Contingit inſuper, vt quiſpiam difficilius, ſeu grauius, aut omnino nihil audiat. Appellant autem primum vitium Græci *δυσκοίαν*, ἢ *βραχυκοίαν*, ἢ *ὀτὶ κωφώσιν*, latini vero (vt Celsus) auditum grauem, interim difficilem appellant, eos, vero qui hac affectione laborant ſurdos, aut etiam ſurdaſtros, ſiue grauiter, & difficulter audientes. Tales vero Græci *ὀτὶ κωφός*, *δυσκοίαν*, καὶ *βραχυκοίαν*, nuncupant, vt teſtis eſt Galenus 3. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos; vtpote qui exiguas voces penitus non audiunt, magnas autem vix percipiunt. Reliquum ſiquidem vitium à Græci *κωφώσις*, à latinis ſurditas dicitur, vbi auditus in totum offenſus fuerit; adeo vt neque magnas, neque exiguas voces ægri percipiant; his quippe affectionibus aures ipſæ perpetuo læduntur, vt ex earum oblæſa functione liquet: quanquam & ipſæ obledī poſſunt per ſe, vt ſi earum audiendi primum inſtrumentum, aut aliqua alia pars idem uſum præſtās afficiatur. Per accidens vero ſi earum facultas affecta ſit, neruo videlicet, per quem facultatem ſuſcipiunt, aut cerebro, à quo eiſdem facultas trāſmittitur

Surdaſtri qui. Auditus difficultis quis dicatur.

Cap. 1. circa finem.

Surditas quid. Quæ pars in eis afficiatur.

1. de loc. affect.
cap. 6. in prin.
3. de loc. affect.
c. 1. in prin.

Quis affectus
præter naturā
sit.

4. de loc. affect.
c. 2.

Quos morbos
secentur.

1. de diff. symp.
c. 3. in medio.

causæ.

Earundem si-
gna.

Si ex biliosis
succis, signa.

Si a crassis hu-
moribus, signa.

Prognostica.
Paul. 1. 3. c. 23

1. Pro 1. 102. 32

Cap. 1.
Si ex bilioso
hant humore,
curatio.

Alex. lib. 3. c. 9
Paul. loco cita-
to.

potissimum ea parte, unde nervus oritur, perpetientibus, poterunt nanq; ex accidenti aures affectæ dici, si earū facultas læsa sit, siue ratione nervi, siue cerebri: quoniam eo tempore priuantur eo, quo præsentē secūdu naturam operabuntur. Hunc lēſionis modum meminit Galenus, cum 1. tum 3. de loc. affe. quanquam hoc modo affectis auribus nullū vitii nec se sensu, nec alia ratione ortum in eis manifestabitur; verum illeſo apparente auriū foramine: interim quoq; & reliqui sensus, qui a cerebro etiam facultatem suscipiunt perpetiuntur, & in ipso quoque cerebro aliquis lēſionis sensus innotescit: quo casu cerebrum affectum erit, aut præter audiendi facultatem nihil oblæsum est, & tunc nervum proprium affectum esse haud absurde conicimus, Galeno auctore 4. de loc. aff. Verum quoquomodo orta sit affectio hæc, symptoma existit in genere noxæ functionum animalium sensibilium, & proprie sensus auditus; quæ functio non deprauata, sed diminuta in primo affectu, in secundo vero ablata est. Insequatur autem vtræque (vt testatur Galenus 1. de diff. symp.) aut morbum in intemperie, aut in compositione, aut in soluta unitate. Verum cum quidam prædictorum morborum ex propriis eorum indiciis prompte dignoscantur, seorsumq; propriam curationem requirant; nam non auditus duntaxat læsionem, sed aliam quoq; cum ea offensam præstare solent, veluti est vlcus, abscessus, quivis præter naturam tumor, obortus in aure callus, seu tuberculum; ea de re his prætermisſis de ea duntaxat surditate, seu subsurditate loqui instituiamus, quæ ex redūdantibus succis, calidis vel frigidis (media intemperie potissimū) excitari consuevit. Quamobrem dictarū causarū signa trademus, quibus recte iudicari, & inter se distinguī valeant. Si enim a Biliosis humoribus surditas, vel subsurditas accidat sursum vergentibus, de repente, potissimumq; in febribus infestare solent, natura, ætas, ac habitus biliosi quoque erunt: similisq; præcessit victus ratio, tempus anni, regio, ac aeris constitutio. Si autem a crassis humoribus ad aures decumbentibus oriantur, cum aurium, tum capitis gravitas aderit, ac reliqua quæ pituitosos humores indicant: ob sordes interim, quæ cerebro in auribus gigni consueverunt, prædictæ affectiones excitantur: quæ quoniam & dignatione, & curatione facile patent, & tolluntur, propterea neque de his etiam mentionem fecimus. Quæcunque autem ab origine, vel paulo post, sed longissimæ, & absolutæ surditates constituuntur, nullo remedio eliduntur, Paulo teste. Quæ vero non absolutæ quidem sed diurnæ tamen, & ipsæ curationem non recipiunt, aut certe difficilissimam, vt idem Paulus testatur. Surditas quoq; (vt inquit Hippocrates lib. 1. prædictionum) in morbis acutis, & turbulentis consequens, mala est. Verum quæ ob biliosum humorem ad superiora impetum facientem nascuntur, surditates, vacationibus per medicamentabilem ducentia ex facili abolentur. Quidam etiam sua sponte affectu liberantur, bile inferius descendente: quod quidem Hippocrates apho. 18. 4. li. confirmavit, cum dixit. Quibus biliosæ deiectiones superueniente surditate cessant: & quibus surditas superuenientibus biliosis deiectionibus cessat: & eodem lib. aph. 60. scriptum reliquit. Quibus in febribus aures obsurduerunt, sanguinis ex naribus fluens, aut alius turbata, soluit morbum: valde quoq; suspectum habere oportet gravem auditum, vt 3. de compositione medicamentorum secund. loc. testatur Galenus: quoniam paulatim augescens temporis progressu perfectam surditatem inducit: Hæ affectiones, si ob biliosum humorem sursum vergentem ortæ sint, ex facili aboleri possunt: nam quidam sua sponte a malo liberantur, bile inferius descendente, quemadmodum Hippocrates testatur; aut sanguine ex naribus fluente. Quidam vero per medicamentabilem ducentia eis exhibita, facilem curationem recipiunt, Alexandro, & Paulo testibus: quorum materias in

preceden-

precedentibus studioſi requirant Viſtu quoque conuenienti contemperandi erunt, eoque bilioſus humor permutandus; cuius iterum ſæpius in prædictis mentionem fecimus. At ex crudis, craſſisque humoribus prognatas ſurditates uel grauem auditum, vniuerſa uictus ratione attenuatoria prius inſtituta, ſi nihil prohibeat, venæ ſectiōe curabis; media, aut externa incifa in cubito vena, potiffimum ſi recens fuerit affectio, aut cum ſanguine permixti ſint redundantes crudi, craſſique ſucci; diutina autem exiſtente affectiōe, uel à ſanguine, abſolutis redundantibus prædictis ſuccis, vel ſiquid aliud venam incidere impedi erit, omnino purgatione vtendum erit, humoribus prius tamen concoctis, ac præparatis: ex qua purgatione ne dum totum corpus, ſed caput præcipuè ex iam dictis ſuccis inanitur: eaque non ſemel duntaxat, ſed bis, ac ſæpius (ſi opus fuerit) utendum. hanc autem ex prius dictis eligere poteris, præfertim cap. de dolore capitis orto ex frigidis, craſſisque ſuccis. A qua purgatione, medicamentis, quæ per os, & nares pituitam eliciunt (Alexandro, & Paulo auctoribus) vtare: nec non & eis, quæ ſternutamenta cient, Item & Balneis ſua ſponte ſcaturientibus, & horum inopia, marinis aquis corpus abluere confert, prout iidem auctores præcipiunt: omnique modo caput ipſum, præfertim ubi graue, ac repletum fuerit, exſiccare ſaluberrimum erit, ſimulque corroborare, Galeni auctoritate 3. de comp. med. ſecund. loc. atque ex eiſdem ſententia in ipſam aurem immittenda ſunt pharmaca, quæ craſſos, & uiſcoſos humores ſindant, ac ſecent, attenuentque: ex quorum numero (præter ea, quæ ad ſonitus tradita ſunt) erit abſinthium cum aqua decoctum, ac per arundinem pro fomento adhibendum, ita ut alteram arundinis partem cavitati auris adaptes: alteram verò foramini operculi ollæ inferas; quò vapor, qui exhalat, ad auditorium meatum allabatur: vtaris autem hoc potiffimum (Apollonij auctoritate) ad auditus grauitatem repentinam, & ob dolorem capitis obortam: baccis que lauri, aut foliis eiſdem in aqua decoctis ſimiliter utitor, aut origano itemque hyſſopo, aqua quoque marina, & aceto uti conuenit, omnis item piſcis fel, perdicis, aut capræ infuſum prodeſt, aut erinacei terreſtris cum oleo: fel inſuper tauri cum anguis ſeneſcens aceto exceptum, & aurium meatui inditum, grauem auditum ſoluit, Aetio teſte, aut rutæ ſuccus cum melle, ſeu caſtoreum cum oleo anethino, ut Paulo uiſum eſt. Fomentis quoque vtendum, quæ per ſpongias ſunt ex aliquo prædictorum decocto, & caſtoreum cum baccis lauri, & aceto permixtum in aurem inſtilla. Nam mirificè conducit cum hoc, tum reliqua connumerata medicamenta, & ſi ualentiffima ſint; ſuſtinet enim (ut inquit Galenus 6. meth. med. in fine) auditorius meatus ualentiffima medicamenta, quamuis non ſolum uſq; ad cerebri duram membranam pertineat. ſed etiam neruum contingit, qui in ipſum à cerebro deſcendit, ut diximus. Plinius Secundus lib. 1. de re med. cap. 12. inquit, quod ſuccus hederæ mundiſſimus cum vino inſtillatus plurimum facit: item allium, & cepulas cum adipe anſeris, ſi colas, & infundas: oua quoque formicarum (vt idem refert) contrita ſurditatem aurium, quâquam vetuſtiſſima ſit, ſanabunt: caprillum item fel inſtillatur grauiter audientibus, & prodeſt; ac bubulum lac cum felle caprino mixtum, & infuſum auriculis grauiter audientibus reſtituit auditum, eodem auctore. Libro autem de medicamentis quæ ad manum ſunt Gal. aſcripto legitur, quod leporis fel recēs cum pari melis portione mixtum, & in cephæ corio tepefactum in aurem inmiſſum ei, qui nihil audiat, auditum reſtituit.

Curatio ſi ex
frigidis, ac craſ-
ſis ſuccis ſiant.

Purgatio.

Cap. 1. uerſus ſi-
nem.
Topica.

Vide Gal. lo-
co citato &
Act. lib. 6. c. 79.

Loco citato.

In principio li-
bri.

Parotides quid
sint.

Cap. 2. in prim.

Pars affecta.

Affectus.

causæ.

Barndem si-
gna.

Lib. 3. c. 10.

Gal. loco citato
Pau. li. 3. c. 23.

Prognostica.

Curatio.

Venæ sectio.

Topica.

Post aurium affectus, deinceps opportunè visum est de eo affectu agere, qui in adenibus iuxta aures adiacentibus oriri consuevit: nominant autem hunc Greci παραποτιδα, à latinis quoque parotis nuncupatur. Sunt autem parotides ex inflammationum genere, quæ glandulis circa aures affectis fiunt, Galeno teste 3. de comp. med. secund. locos. Ex quarum descriptione liquet quæ partes in eis afficiantur, quia adenēs iuxta aures; quod absque alio indicio, sola inspectione patebit. Affectus vero (cum è genere inflammationum sint) erit morbus in quantitate, propriè in excessu primò, sicut reliquæ inflammationes, secundariò verò in intemperie, & soluta continuitate: id quod dignoscere ad sensum licebit, absque alia signorum inuestigatione. Harum autem causa non vna duntaxat esse poterit: nam quandoque ex redundante sanguine, eoq; non immodicè crasso gignuntur: id quod dignoscēs ex tumoribus magnis, rubrisq; existentibus, ex doloribus continuis vehementibus, atque grauantibus, & temperamento, ætate, & habitu, sanguineis existentibus, præcedenteq; victus ratione multum sanguinem gignere potente, & reliquis huiusmodi. Fiunt insuper ex biloso sanguine, ac tenuiori; quod cognoscere licebit, eo quòd tumor sit rubicundior citra grauitatem, igneus erysipelati persimilis: ægerq; uidebitur tanquam ardere, & tangentes manifestam caliditatem percipiunt, vt Alexander testis est. Quæ præcesserunt, ac comitantur pariter bilem redundantem arguent, vt habitus, ætas, temperamentum, ratio victus, ac reliqua. Verum si à melancholico sanguine prouenerint, neque ruborem habebunt, neque dolorem adeò ipsæ inferunt, sed tumorem quendam scirrhusum, quemadmodum si ex pituitoso sanguine fiant, laxum tumorem, qui œdema dicitur, repræsentabunt, nihil habens dolorificum, aut renitens: nec minus & quæ præcesserunt melancholicum sanguinē, aut pituitosum apta fuerunt procreare. Consueuerunt autem indifferenter cunctæ oriri, Galeno, & Paulo testibus: interim ex humoribus in capite impactis, atque ab eo ad iam dictas partes transmissis, interdum autem citra capitis affectionem in febribus, natura superfluos humores ex vasis effundens ad regionem inter cutem, & subiecta corpora deponit iudicatoriè; quo tempore & glandulæ ex effusis humoribus participant: prædicto quæ affectu laborant; At Celso auctore lib. 6. cap. 16. parotides oriri solent, modo in secunda valetudine, ibi inflammatione orta, modò post, longas febres, illuc impetu morbi conuerso. Accuratè igitur inspicere debet tum qualitas, tum quantitas materiæ influentis, & parotidas excitantis, vt inquit Alexander: nam quædam ipsarum ratione crisis concoctione apparente fiunt, quæ neque prauæ, sed curatu faciles existunt: multosq; magnis periculis liberarunt; aliæ verò ex copia cruda contingunt, quæ naturam grauant, simul, & nonnihil irritant: quare etiam procedente tempore periclitantur, & medicis multa tentantibus, vix ad suppurationem, aut concoctionem perueniunt. Victu itaque congruo, maximè & subiecto affecti, causæque eius effectrici accommodato in primis constituto, si sanguis redundare videatur, per venæ sectionem ipsum euacuabis: præsertim si vires permittant, antequam ullam curationem parti adhibeas, Galeni, Pauli, ac Alexandri decreto: qui enim (vt inquit Alexander) nulla vacuatione præmissa, statim ad inducenda cataplasmata transierunt, aut aliud quod discutere, aut extrahere parotidas potest, hi manifestò auctores extiterunt, cur egri strangularentur. Incidenda tamen erit eiusdem lateris humeralis vena. A sanguinis autem missione ad topica deueniendum est medicamenta: quæ minimè repulsoria (vel uti

(veluti in reliquis inflammationibus uri conuenit) esse debent, præsertim cū neque malignum sit, neque multum quod influit, neque corpus humoribus ex æquo plenum sit, tunc nanque prima pars curationis partium inflammatarum à reprimentibus, ac repellentibus exordienda erit. Verū in parotidibus, siue paucū sit quod influit, siue multum, benignum, aut malignum, aut corpus ex æquo plenum, aut non plenum, Galeni decreto tertio de compositione medicamentorum secundum locos, etiam præcedente totius corporis euacuatione nunquam eis vtendū erit: & si Celsus eodem libr. sexto cap. decimosexto interdum ea admittat, cum videlicet sine morbo intumuerit; tutius tamen erit si ab eis abstineas semper, sed maturari, & quā primum aperiri commodius est, vt ipse inquit, præsertim si ex aduersa valetudine fiant: quanquam considerandum sit (vt ipsemet testatur Galenus) num vehementi impetu fluxus illabatur, vel non: nam primo casu nihil nos curiosius agentes, iuxta Hippocratis sententiam aphor. 20. primi libr. omnia naturæ permittimus. Si enim siue cucurbitam, siue aliud pharmacum humores ex alto ad cutem attrahens admouerimus, vehemens dolor hominem apprehendit: vnde & vigilæ fiunt, & febres succedunt, ac vires exoluuntur, Galeno teste, præcitato loco. Mitigare igitur, & nō humorum influxui opitulari tunc potius conuenit per cataplasmatum maximè lenientiū vsum: veluti est, quod ex frumēti, aut hordei, aut seminis lini farina, cum aqua mulsā aut fœni græci, seu althææ, seu chamæmeli decocto conficitur. Item quod ex lapatho, & axungia insulsa constat, vt inquit Paulus, & quęcunque alia, quę ad hæc cōmoderatè humectam habent caliditatem; per quam mitigare dolores valeant, ac influentes humores concoquere, ac suppurare possunt, in eundem vsum corporibus præsertim mollibus, eunuchorum, puerorum, mulierum, & eorum, qui teneram habent carnem, eiusdem Galeni auctoritate, butyro locum illinemus: & si vehemens fuerit dolor, butyrum, & adipem suillum simul liquefaciemus, & modica cera adiecta, vt mollius cerarum fiat (ut inquit Aetius) imponemus. At si non uehementi impetu influxus irruat, humoreque adhuc altè delitescēte, parotis in tumorem non attollatur, iuuari natura debet, ut affigēs humor ex profundo ad cutem attrahatur, pharmaca attractoria, aut fomenta assidua adhibendo: atque si hæc nihil memorabile efficiant, etiam cucurbitam affigentes, vt inquit Galenus. Nam si in altum recurrat colluies, periculum haud mediocre subsecutum est, vt Paulus testatur: optimum utique hic videbitur naturam adiuuare: quod si moderatè fuerint parotides, ac mitiores, vt pote quod neque multa copia influat, neque dolor vehemēs adsit, neque caliditas cū humore, sanare eas poterimus faciliē (ut inquit Galenus, & Paulus) foribus ex muria vtentes, & cataplasmata magis calefacientia, & discutienda adhibentes, cum neque ipsæ ad suppurationem festinent, neque uehementem dolorem inducunt, ueluti esset ceratum ex butyro, & œsypo paratum, quod ostrea vsta, aut buccinas, aut purpuras assumeret, ut inquit Aetius: vel ex eisdem ostreis vstis, anserinoque adipe, veteri insulso, & butyro, accera compositum quod quidem efficacissimum est, vt ipse inquit: quamuis hæc eadē medicamentum ante Aetium Galenus conscripserit tertio de compositione medicamentorum secund. locos: nisi quod pro adipe anserino suillum apposuit veterem, insulsum. Verum si non ita mitiores fuerint parotides, attractoris pharmacis (vt diximus) ac discussoriis vtendum erit, fomenta assidua adhibendo ex florum chamæmeli, fœni græci, seminis lini, & fertulę campanæ decocto. Quod si ex crassiori humore, ac frigidiori excitentur, in aqua, & vino decoctum parari debet ex prædictis, adiiciq̃ poterit hyssopus, serpyllum, samplucus pulegium, & reliqua, quę euidentiore vim discutiendi habent. Post forus ex oleo amygdalino, chamæmelino, aut anethino locum illinemus: aut cataplasma

Ca. 2. in prin.

Lib. 6. c. 39.

Cap. 2. ante me
dium.

Cap. 44.

ca. 1. post prin.

Loco citato,

taplasma ex hordacea farina, & semine lini, in iure fœni græci, chamæmeli, aut althææ decoctis adhibebimus: frigidioribus autem, & crassioribus existentibus succis, oleo irino, aut liliorum alborum, sampsucino, aut rutaceo utar, aut cataplasmate ex erui, seminis lini, & fœni græci farina cum ficuum siccarum, & chamæmeli iure decoctis, addita mulsâ, & cum his cucurbitæ quoque affigendæ sunt, præsertim si nihil memorabile efficiant, bene item discutit parotidas iris illyrica contuosa, cocta ex passio more farinæ ordacæ calida bis, ter ve imposita, ut inquit Scribonius Largus, eiusdem iridis illiricæ puluerem cum hordei farina in mellicrato decoctum commendat Theodorus Priscianus cap. 8. libr. primo ad Thimotheum. Quod si ex his tumor non discutitur, sed etiam dolor perseveret, necesse est tandem, ut ad ea quæ suppurationem excitare, & materiam possunt concoquere digrediamur: velut est frumenti farina cum caricarum decocto, oleo, item quod ex polline, & quod ex fermento constat pharmacum, Galeni auctoritate: lapatum quoque, & axungia porcina, si in hydrelæo coquantur, idem præstant, ex Alexandri sententia. Postquam vero in pus parotides transferint, materia mutata, id quod tibi innotescit ex rigore præter rationem, & febre, quæ prius non erant, ac maiori dolore præcedentibus, tempore quod pus conficiebatur, ac demum delitescen- tibus, tunc aut per sectionem pus elicere oportet, aut sane per acre medicamentum abscessum rumpere, aut tentare, ut ipsum per medicamenta attractoria, & tenuium partium vim habentia discutiamus, Galen. teste eodem 3. de compositione medicamentorum secundum locos. Verum si ipsæ parotides inueteratæ fuerint, citra omnem molestiam discuties, & emolles, si buccinas vstas, & ostrea, omnia adipi veteri porcino liquato admisceas, ac supra affectum locum adhibas, Aetio teste: hoc idem efficiet, si prædictorum cinerem cum melle admisceas, aut si ficus marina aqua incoctas, vel marrubium cum sale imponas, ex Pauli sententia, seu melius Archigenis: quoniam eius esse hæc medicamenta fatetur Gale. 3. de comp. med. secun. loc.

περί βλαβῆς ὀσφύσιος καὶ ἐνὶ τῷ παρῳ.

De lésione olfactus, & narium vitij Cap. 37.

De instrumēto
odoratus c. 3.
in medio.
4. de loc. aff. c. 2.
post med.
Pars affecta,

Pau. li. 3. c. 24.
Aet. li. 6. c. 96
Odoratorū sen-
sus quo loco fi-
at.
Ca. 3. post prin.

Ca. 6. post med.
Quibus iudicis

CV M ordine instrumentorum sensus, tertium locum ad dignoscendam tenuem substantiam odoratus teneat, Galeno teste, cum lib. de instrumento odoratus, tum 4. de loc. affe. & propterea in quatuor aliis sensorijs, tãquam mediū cōstituitur, ea de re absolutis auriū affectibus, ad eos qui olfaciendi facultati, ac naribus contingunt transeundum esse censui; prius tamen de ea odoratus lésione, quæ non in meatibus nasci est, pertrahere decreui: quæ qualiscunque fuerit, siue difficilis, diminute videlicet, seu ablâte oblæsa functio, siue deprauata noxa non eorum meatuum, qui naribus conspiciuntur, erit, sed vel anteriorum cerebri ventriculorum, aut eorū meatuum, qui ὁμοειδῆς græce, latine coliformes appellantur, ex Galeni sententia: tertio de loc. affect. in fine: quem sectati sunt Paulus, & Aetius. Nanque (ut idem Galenus testatur) odoratorum sensus in prioribus cerebri finibus perficitur, elatis ad ipsos per iam dicta colli foramina vaporibus, cum natura in fabricandis cuiusque sensus instrumentis, similitudinem sensibilū secuta sit. & propterea vaporis quodammodo simile proprium odoratus instrumētum esse oportebat, ut lib. de instrumento odoratus liquet. In ipsis itaque cerebri anterioribus ventriculis, qui etiam vaporosum quandam spiritum continent, ut patet octauo de usu partium, odoratorum sensus perficitur, nō ab re iuxta Galeni sententiam. Quapropter olfaciendi facultate oblæsa, ad priores cerebri

rebri ventriculos referatur affectio, si simul cum ea vox non oblæsa sit, sed in columis seruabitur: verum, si vox quoque mali contagium senserit, laboriosior quodammodo reddita, colatorius osibus oblæsis affectio tribuenda erit, quemadmodum Paulus testatur. At si cerebri priores ventriculi affecti sint, eorum affectio, aut ex intemperie sola, aut etiam ex humorum opia oriri potest. Si vero colatorii meatus affecti sint, obstructio duntaxat eorum, & non intemperies sola in causâ esse poterit; & proinde licet odoratus oblæsiio perpetuo symptoma sit in genere noxę functionis sensibilis proprie olfaciendi, siue ea functio diminuta sit, ablata, seu deprauata, nõ ad vnum tamẽ genus morborum sequitur: sed si colatorii meatus affecti sint, utpote obstructi (vt diximus) morbum in compositione & proprie in via comitabitur ipsis autem incolumibus existentibus: anterioribus vero cerebri finibus affectis in, intemperie morbum sectabitur. Quibus autem indiciis olfaciendi læsio dignoscatur, nequaquam scribere oportet; cum ex ipsius ægri relatione prompte modus læsionis eius percipi possit. At habita notitia, quod olfaciendi facultas ex affectione anteriorum cerebri ventriculorum oblæsa sit, cum ipsi intemperatura quadam affecti sint, mox qualis sit ea ventriculorum cerebri ac ipsius etiam cerebri intemperies, inuestigandum erit: quæ non alia via tibi innotescet, quàm ex his notis, quas conscripsimus, cum de dolore capitis pertractauimus: siue ea intemperies sit sola, siue cum alicuius succi redundantia, propterea non est cur iterum de eis hic mentionem facimus. Verum si odoratus offensio obturatos colatorios meatus sectetur, ex detentis præter consuetudinem narium excrementis, muco, ac destillatione vt plurimum progressis, cum his quæ diximus percipi poterit: quanquam etiam ex malis quibusdam redundantibus succis prædicti meatus obstrui possunt, ventriculiq; oppleri, ac aliena intemperie affici: qui ex propriis eorum indiciis haud difficulter comprehenduntur, potissimum vbi deprauata functio fuerit. Non itaque despicienda hæc affectio erit, præsertim vbi anteriores cerebri ventriculi, nedum intemperie affecti, sed humore opplati sint; quoniam præter id quod spiritus animalis, qui in ventriculis continetur, ac cerebrum ipsum intemperie quadam afficiatur, hæsitandum erit de futuro caro, morbo comitali, aut apoplexia humoribus ipsis diu detentis, ac adeo auctis, ut pleni ventriculi sint, non anteriores modo, sed medius saltem, aut etiam postremus cum eis, quemadmodum euenire solet, si ipsis plenis existentibus tota nocte supini cubemus, Galeno teste, lib. de instrumento odoratus. Insuper si odorandi functio deprauata sit, magna ex parte periculosa existit, præsertim si in acutis morbis accidat, & odor quispiam putridus, ac foetidus sentiatur. Verum si ex sola cerebri intemperie olfaciendi facultas oblæsa sit, contrariis duntaxat remediis curabitur: calidis, si frigida fuerit intemperies: & frigidis, si calida; humidis, si sicca: & siccis, si humida fuerit: quemadmodum in cura doloris capitis ostendimus. Ex humorum autem copia, siue cerebri ventriculos opplente, siue colatorios meatus obstruente, si odorandi functio oblæsa sit, ea prius, aut sanguinis missione, aut purgatione euacuanda erit (ut inquit Paulus) prout ipsa humorum copia exigit: & deinde ad topica medicamenta deuenire. Sed quoniam magna ex parte, qui ventriculos opplent, ac colatorios meatus obstruunt redundantes succi frigidi, ac crassi sunt, ea de re, si ita contingat odoratum oblædi, vniuersa victus ratio, quæ attenuatoriæ sit facultatis, instituenda erit. Proinde domus in qua degunt taliter affecti, moderatè calida sit oportet, pro temporis anni ratione: in siccioribus locis diuersentur: gymnasiisq; pro viribus vtantur, ac moderato somno nocturno: nã diurnus, & diuturnus incòmodus eis existit: dum autẽ dormiunt ceruicalia sublimia habeant, & in latus reclinentur, non tamen secundum affectã par-

dignoscatur & pars facit affecta.

Quis præter naturam affectus sit.

Quos morbo sectetur,

Causarum cognitio,

Prognostica,

Cap. 6. in fine,

Curatio,

Victus ratio,

Medicamento-
rum ratio.

tem, præsertim si contingat vnum ex colatorijs meatibus esse obturatum, ut inquit Aetius, Archigenis auctoritate; ex interuallis quoque acrium rerum esus adhibeatur. Hac victus ratione instituta, ac totius corporis purgatione præmissa, non semel duntaxat, sed bis, & sæpius, si opus fuerit, si præsertim purgans medicamentum valentissimum non sit, commodus erit vsus eorum pharmacorum, quæ pituitam per eos ducunt, quorum formulas supra requiras; aut ex staphide syluestri, mastiche, & vua passa componas: nec minus & caput ipsum per ea quæ naribus infunduntur, purgari debet, prius eis utendo quæ in præcedentibus conscripsimus: denique efficacioribus, ceu est elaterium cum lacte, aut cyclamini succus. Ipsum quoque cyclaminum siccum tritum (ut inquit Aetius) insuffla, aut nigellam tufam, ac cribatam. & oleo vetustissimo addito probe tritam per nares infunde: & pharmacum per inspirationem vehementius attrahere iube: aquam autem ægro in ore continendam exhibe; quo medicamento vsus fuit Galenus in quodam adolescente, qui à diuturno tum grauedine, tum destillatione odorandi sensum læsum habebat ut patet lib. de instrumento odoratus. Hic ubi per triduum hoc auxilio vsus fuisset magnopere ab eo adiutus fuit: quarto autem die cum eodem medicamento sic vsus esset, ut spiritum violentius, quam antea, attraheret, grauem in intimo capite morsum percepit; qui tamen, ut sensim leniretur, postera die penitus conualuit: vtiliter etiam nigella assumitur cum aceto, ut refert Aetius. Sternutatorio item vtendum, primum simpliciori, deinde efficaciore, quale est veratrum album leuissimè tritum; odoramenta quoque assidue adhibeantur, veluti est narcissus, cysimbrium, aut serpyllum odoratum, mētha, polyum & thymbra: quanquam omnium vtilissimum sit castoreum aceto dilutum quin & potum castoreum tritum cum aquæ mulsæ cyathis tribus, præ multis auxilijs proderit, eodem Aetio teste: verum efficacius redditur, aceti scyllitici cyatho dimidio addito. Vtilissimum quoque ipsis existit acetum scyllinum quotidie à ieiunis trium cochleariorum acceptum. Cæterum si pertinacior fuerit affectio, adeo ut adhuc auxilio aliquo opus habeat, radendum est caput, & sinapismus adhibendus usque ad frontem: & si opus fuerit, ne dum fronti, sed faciei, ac naso adhibere oportet, & postea lauare: quin & theriacæ sæpe assumptio magno erit præsidio, Paulo auctore.

περί ὀζανῶν.

De ozænis.

Cap. 38.

Ozænæ quid
sint.
Aet. lib. 6. c. 90
Alex. lib. 3. c. 11
Pars affecta.
Affectus.
Causæ.
Cap. 3. in prin.

Crognostica.
Puratio.

EX genere uero ulcerum sunt ea narium uitia, quæ Græci ὀζανῶν, latini quoque non alio modo quam ozænas appellant, ex fædo odore quem habent, sic dictæ. Sunt namque ozænæ ulcera circa nares, plures quæ crustas, & odorem fædum habentia, Celso auctore cap. 8. lib. 6. aut vlcerum curatu difficilia, putredinosa, grauiterque olentia, ut ex Aetio, & Alexandro colligi potest. In quibus quod nares afficiantur, nullo alio indicio opus est, cum ex inspectione patere poterit, ac ægri narratione; similiter quod morbus sint in soluta continuitate: nam in vlcerum genere continentur, ut diximus: id quod etiam visu facile deprehendi poterit. Earum autem causa humores acres, ac putridi sunt, ex ipsorumque influxu generantur: ut Galenus testis est 3. de compositione medicamentorum secund. loc. Nam si acres solum fuerint humores, egrè curabilia vlcerum producere consueuerunt, non tamen graueolentia, eodem Galeno auctore præcitato loco. Relinquitur ergo, ut ozænæ, ex acrium, & putredinosorum humorum influxu procreentur: & propterea differre ab his vlceribus, quæ ex acrium duntaxat humorum influxu fiunt, non tamen graueolentia sunt. De hoc malo sciri quidem debet (ut inquit Celsus) quod vix ei succurri possit, nihilominus tamen quædam tentanda

da sunt quanquam curatu sit difficile. Cibo itaque modico, qui neque acer, neque ualentissimus sit, est utendum; pariter & potu: & si suspicio adsit copiae humorum in toto corpore redundantium, ea prius aut sanguinis missione, aut purgatione auferenda erit, Paulo teste. Demum quoniam ex capite in nares acrium, ac uitiatorum humorum defluxus prouenit, quamprimum caput siccetur, ac roboretur oportet, Galeno auctore eodem 3. de comp. med. secun. loc. eoque siccato, ac roborato ad naris purgationem progrediendum erit, scopo hoc in ozænis proposito, ut affecta pars permixtae facultatis pharmaca, tum repellentia, tum discutiētia resiccetur: repellunt autem tum austerā, tum acerbā, quæ communem adstringentium appellationem habent, discutiunt uero calida, & sicca facultate prædita. Qua de re caput ad cutem tondatur, assidue quæ uehementer perfricetur: demum quæ siccandi, ac firmandi facultate prædita sunt syncipiti, ac toto capiti præraso (ut dictum est) imponantur, ueluti est oleum myrrhinum, rosaceum puluis corallorum, ac santalorum, rosarum rubearum siccarum, mastiches, & mannæ turis, acetum, & alia huiusmodi: quorum sylvam studiosi petant cap. de dolore capitis. Ex Aetii autem, & Alexandri sententia tale medicamentum imponi debet; excipit uero myrrhæ, thuris, singulorum unc. i. cochleas integras quinque, quibus ceram, & albumina ouorum duorum addito, commiscetoque, ac medicamentum capiti cum lintheo diebus 6. continuis inducito. Postquam itaque per prædicta caput corroboraueris, ad nasi curationem accedes, præpositum iam scopum habens: in nares itaque ipsam mel cum exiguo modo resinæ terebinthinæ coniiciatur, ex Celsi sententia; quod specillo quoque lana inuoluta sit, attrahaturque spiritu is succus, donec in ore gustus eius sentiatur: sub his enim crustæ resoluuntur, quæ tamen per sternutamenta elidi debent. At puris ulceribus (eodem Cornelio auctore) uapor aquæ calidæ subiiciendus est; deinde adhibendum aut lycium ex uino dilutum aut menthæ, seu marrubii succus, seu omphacium, sicut horum cuilibet mel adiciatur: inuoluendumque lana specillum est, & in eo medicamento intingendum, eoque ulcera implenda sunt; rursusque linamentum inuolutum, & oblongum eodem medicamento illinendum, dimittendumque in nares est, & ab inferiore parte leniter deligandum, idque perehy men, & uer bis die, per æstatem, & autumnum ter die fieri debet. Verum Galenus (Archigenis auctoritate) calaminthæ succum naribus infundendum in ozænis præcipit: aut ipsammet aridam calamintham per fistulam insufflandā iubet, & ad naris ulcera ex malorum puniceorum succo in æneo uase ad medietatem cocto paratum medicamentum perline; aut malum punicum dulce, integrum, in uino coctum tertio, & forinsecus imposito: poteritque ex cerusa, & argenti spuma simul contritis, eisque dum teruntur, uinum, & oleum myrtheum adiciendo donec mellis crassitudinem fecerit, medicamentum parari, eoque ulcus illiniri, eiusdem Cornelii auctoritate. Interim si uetus fuerit ulcus præsertim, myrrham, plumbum ustum, ac alumea prædicto unguento permiscere poteris, sutorium atramentum ustum uel sal ammoniacum, simulque cum his mel, & acetum, ex quibus constat cum ozænarum, tum etiam aliorum narium ulcerum curatio. Verum autem Aetii medicamentum ex mente Oribasi prætermittere nolui, excipit autem spumæ argenti, & cerusæ 3. vi. plumbiusti, & loti 3. iiii. myrrhæ, aloes, singulorum. 3. 2. gallarum 3. i. uino, & myrteo oleo dilutis utere ad narium ulcera; facit etiam & ad sedis vitia, ulcera scilicet, seu rimas, eodem auctore.

Vidus ratio.

Pau. li. 3. c. 24.
Medicamento
rum ratio.

Ca. 3. post prin.

Topica capiti
adhibenda.

Topica naso
applicanda.

Li. 6. c. 93.
Optimum me-
dicamentum.

περὶ πολύποδος

De polypo.

Cap. 39.

Lib. 6. c. 3.

Quid sit polypus.

2. meth. c. 2.

3. de comp. med.

secund. loc. c. 3.

Pauli. 3. c. 24.

Acti. li. 6. c. 90.

Pars affecta.

Affectus præter naturam.

causæ.

Ca. 3. in princ.

Prognostica.

Curatio.

Cap. 3.

Qualia medica-
menta cōferant.

Velut ex ulcerum genere ozænæ, sic quoque ex genere tumorum præter naturam affectus quidam in naribus generantur, qui à Græcis πολύποδες, à latinis ueluti à Celso, polypi quoque nuncupantur. Sumpsit autem hic affectus nomen à similitudine ad aliquid extra positum, uelut elephantiasis, & cancer, ab elephante, & cancro, cum quibus similitudinem habent, ut testatur Galenus 2. meth. med. propterea ab eodem Galeno 3. de comp. med. secund. loc. asseritur polypum tumorem esse, qui præter naturam in naribus generatur, polypodis carni assimilis, iuxta substantiæ proprietatem: quem etiam sectati sunt Paulus, & Aetius: nam polypi marini carni proprietate essentiæ, & colore & compage similis existit, eodem Aetio teste. Celsus uero cap. 8. lib. 6. dixit, quod polypus est caruncula, modò alba, modo subrubra, quæ narium ossi inhæret, & modo ad labra pendens: narem implet, modo retro per id foramen, quo spiritus à naribus ad fauces descendit, adeò increfcit, uti post uiam conspici possit, strangulatque hominem, maxime austro, aut euro flante, fereque mollis est, rarò dura, distatque polypus, iuxta eiusdem Celsi sententiam, à reliquis carunculis, quæ naribus nascuntur quoniam illæ similes sunt mulieribus mammis, ac in imis partibus narium, quæ carnosissimæ sunt, inhærent, & si eiusdem naturæ sint polypi, & carunculae, quas Græci σαρκώματα appellant, Paulo Auctore. Nares ergo in eiusmodi affectionibus affectæ sunt, ut ex iam dictis, ac oculorum inspectione patere potest, ac affectus, seu morbus in quantitate existunt, cum è genere tumorum præter naturam sint, Galeni, Pauli, Aetii, & Alexandri auctoritate: ex quorum essentiæ proprietate manifestum est (ut inquit Galenus, & Aetius, post eum) eos ex crassis, & uiscosis humoribus generari; quare non est, cur laboremus notas hic conscribere, quibus morbum hunc dignoscamus, cum ad sensum pateat, nec eas, quibus eiusdem morbi causa dignosci possit: quoniam manifestum est (inquit Galenus 3. de compositione medicamentorum secund. loc.) affectionem hanc ex crassis, & uiscosis humoribus generari: & proinde non ab re Celsus asseruit morbum hunc ferè quidem ferro curari, quamuis interdum medicamentis quibusdam inarescat. Verum si cancerosus ferè polypus fuerit, attingi non debet, ut idem testatur: quamuis magis spiritum impediat, & nares dilatet, raroque talis polypus fiat, cum sæpius mollis sit. Ceterum liquet, in huiusmodi affectibus considerata cuiusque corporis natura, sanguinem (si nihil impediat) mittendum esse. nec non medicamentum purgans offerendum (Alexandro teste) debita prius uictus ratione instituta: deinde caput radi, siccarique, ac roborari medicamentis appositis debet. Nam hæc communis cura ambobus his est, polypo uidelicet, & narium ulceribus, seu ozænis, auctore Galeno 3. de comp. med. secund. loc. pituitam quoque per os educti conuenit, apophlegmatismis uidelicet, in præcedentibus conscriptis: nanque ex crassis, & uiscosis humoribus dictum est polypum generari. Qua etiam ratione sit, ut eis etiam topicis medicamentis, qui curari possunt polypi indigeant, quæ mittam facultatem habeant, ut uidelicet partim adstringant, partim secent, & attenuent, partim etiam discutiant, & exsiccant, eodem Galeno auctore, præcitato loco. Verum nequaquam ea adhibenda erunt, ni prius caput resiccetur, ac corroboretur: si opus fuerit, ante omnia uena secare, ac purgare oportet, ut diximus: quæ caput roborant, atque exsiccant præcedenti capite requiras, eisque utare: post quæ eunuchis maximè, aut corporibus mollibus, & humidis, ut pote quæ nullius pharmaci ferre possint adhibitionem, sed ab omnibus irritantur, ipsis aridis contusis,

hæc

ac probe tritis, atque inditis vitior: magnopere enim citra omnem mordacita-
tē iuuamentum præstant: quoniam aut nihil nocent, aut omnino citra mole-
stiam opus suum perficiunt, vt testatur Galenus. Ipse quoque tanquā proba-
tissimum reperisse, asserit, nedum polypis, sed etiam ozænis, quod ex malis pu-
nicis constat pharmacum: sint autem pari numero, ac magnitudine ex tribus
eorum differentiis, austeris scilicet, dulcibus, & acidis accepta, eaque recentia
& matura contundenda sunt, atque integra diligēter confrigenda quo succus
ex eis exprimi possit, quem vbi modice decoxeris, si liquidior quā oportet,
videatur, stanneo vase depositum asseruare oportet. Quod vero ab eo reliquū
est solidum, & crassum, rursus diligenter contundendū, est, vt à contusione
rursus in pila atteri, ac leuigari possit, indeque collyriorum formæ effingi,
quæ congruam ad ægri narem proportionem habeant. Induntur enim hæc in
naris, quā polypus obsedit, meatum, quo citra mordacitatem, dolorisque
consensum, qualem acria pharmaca excitare solent, per longiorem moram
ipsam expurgent: quod si humectior, & mollior tibi appareat polypus plus
ex austeris malis punicis coniciet, si durior, ex acidis: quoniam vero mole-
stum est perpetuo collirium sustinere. licet etiam quandoque intermittere.
atque interim succum antea expressum, & in stanneo vase depositum, ac adser-
uatū in nares infundere: atque etiam circa illas partes, iuxta quas nasus ad
palatum perforatus est, liquidum ipsum expressum succum illinire, vel cum
penna, vel cum lana, specillo duos nucleos, siue cuspides habenti obuoluta
nec parum etiam confert prædictum collyrium ex malis punicis effectum, si
vbi exaruerit, probe contundatur, cribeturque, ac leuigetur indeque insuffle-
tur, aut etiam per specilli nucleum indatur. Omnia autem hæc (vt testatur Ga-
lenus) assidue facere oportet, vt nunquam ab affecta parte pharmacum absit,
cum facile ab humiditate eluatur. Parari item potest medicamentum ex spu-
ma argenti drac. iij. cerusæ drac. iiii. malicorii drac. ii. & aluminis scissilis tan-
tundem: quibus tuis, & cribratis in mortarium coniectis, cum vino odorife-
ro ad mellis crassitudinem redigito: postea vero myrteo oleo affuso conuas-
sato, in pyxide plumbea seruato, vitior. Poteris insuper Pauli medicamento
vti, robustis præsertim corporibus, aut eo, quod excipit atramentum suto-
rium cum aceto, aut eo, quod recipit squamæ æris drac. viii. atramenti suto-
rii drac. vi. sandarachæ 3. iiii. veratri nigri 3. ii. misceantur, & naribus insufflen-
tur. Ad inueteratos autem polypos maximè commendauit Alexander pulue-
rem ex quatuor metallicis compositum, chalcantho videlicet, chalcitide, ære
ciemato, & misy. Accipias autem hæc æquali pondere singula, & seorsum te-
ras ex aceto, postea omnia simul misceas ex vino subigens, donec glutinosum
fiat, ad mellis spissitudinem: deinde in ollam recentem conicias, quam oper-
culo imposito, lutoque oblitam in furnum dimittas, vt in carbones illa redi-
gantur, dein furno exempta cum vino teras, atque iterum similiter torrefa-
cias, redigasque in puluerem, eumque reponas, & cum necessitas postulat, vta-
re. Prædictis etiam medicamentis vti poteris ad reliqua narium sarcomata.
nonnullaque alia reperiēs apud artis medicæ eximios auctores, quæ nos bre-
uitati indulgentes ex industria prætermisimus.

περί ἑνὸς αἱμορροΐας.

De sanguinis ex naribus eruptione. Cap. 40.

INter narium affectus, quæ ex ipsis sanguinis eruptiones sunt, à Galeno
3. de compositione medicamentorum secund. loc. connumerantur, à Græ-
cis ἑνὸς αἱμορροΐας dictæ. Quapropter quod nares affectæ sint cunctis
L. liquet

Cap. 4.
Pars affecta.
Affectus.

Cap. 1. in medio
Quod quolibet
sanguinis pro-
fluuium uni ex
tribus causis tri-
buatur,

Cap. 2. in med.
Anastomosis
ex quibus cau-
sis.
Diuresis.
Diap. desis.

Si ratione vasa-
rum fiat, signa.

Si sanguinis ra-
tione, signa.

Si ex parte fa-
cultatis fiant, si-
gna.

liquet, non tamen per essentiam semper afficiuntur: similiter quod affectus ipse symptoma sit in genere excretorum immodice, toto genere præter natu-
ram. Verum id non vnum duntaxat morborum genus sectatur, velut etiam
reliquæ sanguinis eruptiones, sed interim Galeno teste quinto meth. meden.
vasorum diuisiones, interdum eorum orificiorum refectionem, quandoque
earundem tunicarum rarefactiones sequitur, quamuis non modo vasis ipsis ma-
le affectis, sed etiam ipsi sanguini, aut denique facultati interdum occasio tri-
buenda sit, ex eiusdem Galeni sententia tertio de caus. sympt. dico autem vasa
ipsa male affecta, ut cum molliora vel duriora, seu tenuiora fuerint, à natura,
seu aliqua superueniente causa extra vterum vitiata; sanguinem vero male af-
fectum appello, vel cum adeo viciosus sit, ut vasa quibus continetur, erodat,
vel cum adeo est auctus, ut à vasis contineri non possit, ut interim ea disrum-
pat, interdum eorum ora referet. Ex parte vero facultatis sanguinis proflu-
uium efficitur cum ipsamet facultas ora vasorum aperit. Non ab re itaque
sanguinis ex naribus eruptio vni saltem ex prædictis causis tribuenda erit.
Nanque aut vasis ipsis male affectis venis scilicet aut arteriis, eorum ore aut
referato, aut tunica eorum diuisa, vel rarefacta, propter quod & sanguinis, vel
propter *ἀναστομίσιν*, quam Græci dicunt *διαρροίαν* aut *διὰ πηδῆσιν* è va-
sis profluit: vel sanguini ipsi, etiam male affecto, aut ipsi facultati, quæ ora
vasorum aperit, tempore quo excernit ea, quæ sibi molesta sunt. Hinc Ga-
lenus prædicto libro quinto method. medend. anastomosim fieri asserit, tum
propter eorum imbecillitatem, tum etiam propter sanguinis copiam, qui im-
petu quodam ad os vasorum ruat; aut propter eiusdem sanguinis acrem quæ-
piam, quæ illi extrinsecus incidat, qualitatem. Diuresim vera, seu diuisionem
vasorum tum ex vulneratione, tum cōtusione, tum ruptione fieri: at dia-
pedesin ex ipsa quidem tunica rarefacta, sanguine vero tenuato, oriri fatetur
quanquam etiam ex gracilium vasorum ore adaperto fieri possit. Verum si ex
parte vasorum aliquo modo affectorum sanguinis è naribus profluuium fiat, id
dignoscere haud difficile erit, siue interna siue externa fuerit causa: nam ne-
que indicia aderunt sanguinis redundantie, neque his, qui profluit sanguis,
viciosus apparebit, nec corpus cacochymum erit, aut crisis tempore in acutis
morbis excernitur. Si autem ex aliqua externa causa affecta fuerint vasa,
ut casu ab alto, ictu, exercitio vehementi, mora in sole, ac reliquis huiusmo-
di, ex egri, aut astantium assertione id percipere poteris. Verum si ex nul-
la externa causa vasa affecta sint, interna perquirenda nunquid molliora vi-
delicet fuerint: id quod à redundante humiditate percipies: aut duriora, ab
ariditate; aut tenuiora ab inedia reddita sint vasa, seu a natura talia constru-
cta fuerint: & proinde eorum ratione fuerint rupta, referata, seu rarefacta. Si
vero nullum istorum adsit, videndum erit nunquid adeo auctus fuerit sanguis
ut vasis contineri non possit, & propterea ea rumpat, aut referet, id quod di-
gnosces ex signis, sanguinis redundantiam indicantibus, aut ipsemet sanguis
non valde auctus, sed viciosus adeo sit, ut vasa, quibus continetur, erodat:
id vero percipies, tum ex qualitate eius, qui profluit, sanguinis, tum ex re-
liquis signis, cacochymum corpus indicantibus, & pro natura diuersa ipsius
cacochymæ, poterit etiam qualitas vitiosi sanguinis indagari, num pituito-
sus videlicet; biliosus, aut melancholicus fuerit, qua de re profluuii cau-
sa erit sanguinis. Verum si neque affectorum vasorum, aut affecti sanguinibus
indicia adsint, præcesseritque acutus quispiam morbus, ipsi facultati, seu na-
turæ, quæ eam, quæ sibi molesta sunt excernit, ora vasorum aperiendi tri-
buenda occasio erit profluuii ex naribus sanguinis: quod, ut ex prædictis
elicere poteris, quandoque fit cum functionis alicuius noxa, interim ue-

rō ipsis viribus haudquaquam oblatis, sed robustis existentibus: quanuis hoc profluuium toto genere præter naturam sit, respectu excretæ substantiæ: præter uaturam tamen dici non debet, si in tempore expellatur, hoc est, si id, quod molestum est, expurgetur, id quod perpulchre decretum reliquit Galenus libro primo de diff. sympto. Verum ex quacunque fiat causa sanguinis profluuium ex naribus, non despiciendus erit: nam cum superfluit, seu longo tempore perseuerauerit, timendum erit, aut animi deliquium, aut iocinoris imbecillitas, ac infrigidatio, & demum cachexia, & hydropisis: quamuis auctoritate Hippocratis sexto de morb. vulg. ijs, qui de colores merito modo sunt, parum profit, quibus vero colores rubicundi, non similiter, & quibus capita sunt, quæ facillè tolerant prodest; quibus secus, non: libro autem tertio prædictionum idemmet Hippocrates dicebat, Ex naribus erumpente sanguine cum exiguis sudoribus per frigescentia maligna, ac praua: item quod post sanguinis eruptionem nigrorum per aluum transitus, malum praua etiam sunt valde rubra. Eiusdem auctoritate Aetius libr. quinto capit. 124. inquit, fluxium sanguinis è naribus in quarta die in febribus fientem, pessimum signum esse: multitudinem enim significat in toto corpore, aut in capite: addit autem Hippocrates in Coacis prænotionibus, si non aliud quid boni coinciderit, verum quinta, minus periculosum esse. quanquam forte ea sententia potius de narium stillicidio veritatem habeat, id nanque prauum esse signum, præsertim in ardentissimis febribus idem Hippocrates cum Galeno testatur, cum primo prorrheticorum, tum primo de morb. vulg. maxime si quarto fiat die, nam tunc absoluta morbi malitia significatur, vt apud eosdem patet primo prorrheticorum: nihil enim (vt inquit Galenus) eorum, quæ decretoria existunt exigue secerni conuenit. quapropter vnum duorum indicabit, aut copiam, quæ tolerari a facultate nequit, vel imbecillitatem naturæ, quæ proponit superflua excernere, sed non valet. Et propterea velut perniciosissimum est in ardentibus febribus nares parum stillare, sicut eis familiarissimum existit, largum sanguinis profluuium, præsertim in iunioribus minoribus natu, infra trigessimum quin. um annum ætatem agentibus; cū in hac ætate sanguis plurimus sit, facultas valentior, atque etiam calor exuperās, eisdem Hippocrate, & Galeno testibus, tum primo, tum tertio prognost. Fluere quoque sanguinem ex naribus recto itinere commendauit Hippocrates, è contrario vero culpauit, cum eodem libro tertio prædicto num dixit. Sanguinis eruptiones ex contrario malæ sunt, velut in splene magno, si ex dextera nare fluat, libro quinto aphor. 33. idem inquit Hippoc. Menstruis deficientibus sanguis ex naribus fluens, bonū. Quod autē in crisi bus sanguinis ex naribus profluuiū quibusdam iudiciis præcognisci possit, & quibus (immò quod magnæ imperitiæ sit id non præcognoscere) scriptum reliquit Galen. tum tertio de crisi bus, tum primo de arte curatiua ad Glauc. circa finem. Sit autem victus ratio vniuersa pro eius curatione (si vitio vasorum, aut ipsius sanguinis fiat) in frigidans & adstringens tenuis quoque vbi ex sanguinis copia fiat; boniq; succi, & concoctu faciles cibi exhibeantur, potissimum vbi vitiosus fuerit sanguis, sint que contrariæ qualitatis redūdātis succi in sanguine. Verū is sanguinis fluor qui à facultate efficitur, quoad iudiciorum sit, nulla particulari indiget victus ratione, aut curatione. Vbi vero concitata natura mediocritatem non obtinuit, sed immodicè sanguis fluxerit, ita vt vires imbecilliores reddantur, simili victus ratione vtendum erit, ac curatione, quibus in prædictis utimur; & propterea velut frigida, & adstringenti victus ratione, sic quoque frigidis, & adstringentibus medicamentis pro eius curatione vtendum erit, Hippocratis decreto, cum aphorismis 13. quinto, tum 37. septimo libro. Verum nec omnino, nec sine discrimine, nec omni tempore iam dicta me-

In fine.

Prognostica.

Commentario

3. text. 21.

Tex. 14. & 15

Paulo post principium.

1. prorrh. tex. i.

& lib. 3. tex. 49

1. de morb. vulg.

commentatio 2

tex. 63.

1. prorrh. loco

citato.

1. pregn. com.

33.

3. progn. co. 16.

tex. 33.

3. de cris. c. ult. ante finem.

1. ad Glauc.

cap. ult. ante

medium.

Curatio.

Victus ratio

qualis cōperat.

Medicamentorum

ratio.

Cap. 6.

Venæ sectio.

cap. 11.

Pau. li 3. c. 24.
Aet lib. 6. c. 94.
Purgatio.

Topica.

c. 4. in prin.

dicamenta circa loca, unde sanguis profluat, sunt adhibenda, Galeno auctore quinto meth. med. sed postquam in alia prius loca auerteris: auertitur autem sanguis, atque ad alia membra conuertitur: tum ad cōtraria reuersus, tum ad proxima deriuatus: propterea si resolutus adhuc æger non sit, vena sub eo cubito incidenda erit, qui profusioni e directo responderet (vt ipse iubet) siquid aliud non prohibeat, & vbi paulum detraxeris, mox vnā horā intermittens rursus detrahes: post iterum, atque iterum, pro laborantis viribus. Hoc namque auxilio reuulsorio, idemmet Galenus fatetur, libro de curand. ratione per venæ sectionem, validam sanguinis ex naribus eruptionem sedasse: expedit autem non multum, ac affatim sanguinem educere, sed paulatim, ac moderate, vt diximus. Hoc etiam tempore conuenit artuum frictione, deuinctio- neque vti, tum hypochondrio directe supposito cucurbitam defigere: præter hæc, priusquam ad topica remedia confugas, iterum ad contraria reuellen- dum, vtendumque affixa in summa ceruice cucurbita: est namque hæc sangui- nis ex naribus profusionis auersio, eodem Galeno teste: hanc vero cucurbi- tam cum sanguinis detractione occipitio agglutinari præcipit Paulus, cum Aetio. Verum siquid venæ sectionem impediatur, reliquis iam dictis reuulsoriis auxiliis vtare scapulis etiam si (videtur) cum scarificatione cucurbitas affi- gens, venæ sectione derelicta, demum ad ea, quæ refrigerant, atque adstrin- gunt, topica medicamenta confugas. Et si purgatione quoque egeant, utpote vitioso existente sanguine ea quoque prius tribuenda erit, pro ratione vitiosi succi in sanguine redundantis, decocto videlicet vtens myrobalanorum citri- narum: in quo syrupus ex pluribus infusion. rosarum rub. aut manna cū rha- barbaro dissoluantur, si bilis redundarit: At si pituita, agarici, & myrobalano- rum chebularum decocto cum syrupo ex plari. inf. ros. rub. aut persicorū vti- tor. Atra vero bile redundante, senæ, epithymi, & myrobalanorum indarum decoctum cum dictorum syruporum aliquo exhibeas: nec minus assumere pos- sunt saccharum, aut syrupum myrtinum, rosaceum, è papauere, seu ex nymphæa, quantitate moderata, vel è pastillis de spodio, aut de terra lem- niæ, aut antidoti mictetæ dictæ 3. i. cum vnc. ii. aut iii. aquæ acetosellæ, aut plā- taginis. Extrinsecus vero, vniuerso videlicet fronti medicamenta imponenda sunt in frigidantia, ac adstringentia, vt diximus cuiusmodi esset spongia ex aqua frigida, seu rosacea madida, sæpius adhibita, aut hippureos succus, quam caudam equinam vocant, seu herba ipsa trita fronti imponatur, ex Aetii sen- tentia: similiter quoque saluæ folia trita, aut gypsum oui candido subactum: quibus omnibus absolum non erit parum aceti addere, seu linteam in aqua frigida, aut rosacea cum pauco aceto mista, madefactum iterum, atque iterum imponas. Idemmet Aetius cochlearum carnes cum aceto tritas, aut cochleas vltas, & tritas cum aceto imponi iussit: & Apollonii auctoritate cochlearum carnes cum thure tritas naribus indito dixit, & sanguis sistetur: iisdem etiam frontem integer: ex succo quoque polygoni, portulacæ, semperuiui, seu so- lani, si vnc. s. assumas, boli armenicæ, ac terre lemnicæ ana drac. ii. omphaci- tidis gallæ drac. i. lapidis hematidis drac. i. & s. cum ouorum albumine, pau- co aceto, ac aqua rosacea medicamentum parabis, quod fronti imponatur, ex aqua etiam rosacea, ac plantaginis, solani, & cichorii succo, pauco aceto ad- dito, epithemata supra iecur adhiberi possunt, potissimum si ex dextra nare fluat sanguis: naribus præterea ipsis medicamenta sanguinem sistentia inden- da sunt, veluti est medicamentum Galeni quinto method. meden. scriptum, ex manna thuris, & aloe, candidoque oui liquore confectum per contortum linamentum intus: extrinsecus vero leporis pilis additis, naribus admoueatur; ouorum testas vrito, ac terito, de quibus duas partes sumito, & de galla omphacitide partem vnā, & linamento intorto aqua, aut aceto tin- do

cto excepta, indito, vt inquit Aetius: ipsum quoque gypsum oui candido subactum, nedum fronti sed naribus quoque imponendum asserit: vel thus confringito, & polygoni, aut porri succo diluito: in eoq; linamentum obuolurum indito, Galeno auctore 3. de comp. med. secund. loc. ex Hiraclidis auctoritate: ex cuius etiam sententia metham tritam, aut spongiam siccam immittendam præcipit. Aetius verò asininum stercus vltum insufflandum præcipit: aut eiusdem asinini stercoreis recentis succum, cum porri succo, & aceto per linamentum inditum: commodum insuper eis est per ceram, aut linteola aures obturare, & in ore aquam pluuialem frigidam continere, caputq; non in sublime leuare, sed alias partes, quæ infra caput sunt sublimes facere, eiusdem Galeni decreto, præcitato loco. Paulus vero cinerem combustorum asellorum demesticorum inspirandum præcipit, vel eorum succum instillandum: lapidis quoque molaris aceto extincti vaporem naribus suscipiendum consulit. Inquit Marcellus suo lib. de med. cap. 10. quod infundere in aurem acetum acre, cuius è regione sanguis pluit, aut in vtranque mittere, si ex vtrâque nare manabit, confert: pariter iniicere intus in nare cochleæ viuæ carnem per se, aut cum thuris polline tritam, ipsæ item cochleæ tritæ cum aceto naribus inditæ, quamuis magnos fluores sanguinis compe-
scunt, eodem auctore.

c. 4. in prin.

περί ὀδονταλγίας.

De dentium dolore. Cap. 41.

INter dentium affectus, is præcipuus esse videtur, qui à Græcis ὀδονταλγία, à latinis dentium dolor dicitur, à symptomate, & parte affecta nomen sumens, vt patet secundo metho. med. Hic nanque' maximis tormentis annumerari potest, vt inquit Celsus lib. 6. c. 9. verum interim non manifestè in ipsis apparet affectio, quemadmodum si ipsius dentis corpus fuerit affectum: & si quidam id affirmare contendant, asserentes. cum dens sit os, dolore affici nequaquam posse: illud tamen cum ratione ex Galeni verbis libro sexto decimo de vsu partium, & libr. de ossibus, dum asseruit eos inter ossa duntaxat euidentem sentiendi vim habere, tum experientia in se ipso. 5. de compositione medicamentorum secund. loc. confirmatur. percepit nanque manifestè in semetipso non dolentem modò, sed etiam pulsantem dentem, quemadmodum carnosæ partes inflammatione vexatæ consueuerunt. Interdum verò propter affectum neruum, qui ex tertia coniugatione distributus, omnibus dentibus ad eorum radices substernitur dentium dolor excitatur. Non raro autem propter gingiuarum inflammationem, & ipsi dentes dolere videntur: quos iterum dolores idem Galenus tanquam in se ipso expertus, fieri posse testatur, testimoniumq; præbet id asserentibus eodem lib. 5. de compositione medicamentorum secund. loc. Atqui dentem in proprio eius corpore affectum percipies, quoniam ipse æger dicit se sentire circa corpus dentis dolorem in profundo obortum: nec vllum apparebit in gingiuis inflammationis indicium: neruo autem ipso affecto, qui ad radicem tendit substratus est, quanquam imaginationem confusam, indiscriminatam, & incertam plerisque exhibeat: nanque videtur ac si ipse dens doleat, in propria substantia affectus: id tamen percipere poteris ex vehementissimo dolore, qui in profundo valde ab ægris sentitur: nec ipsis dentes liuidi, aut quouis alio modo in eorum substantia, seu qualitate mutati apparent: similiter nec gingiuæ, & exempto dente, parua adhuc doloris portio remanet, leuiori tantum dolore reddito ex dentis exemptione. At si inflammationis gingiuis dentiū dolor excitetur, ex earū inspectione promptè id percipere poteris. Cæterum quæcunque pars in dolore dentium affecta sit per-

Cap. 2.

16. de usu part.
c. 2. ante med.
Lib. de ossib.
c. 5. in prin.

tribus modis
fieri posse, ut
dens doleat.
5. de comp. me.
secund. loc. c. 8.
in prin.

Loco citato.
digna, si in pro-
pria substantia
afficitur.

Si eiusdem ner-
uus signa.

Si propter gin-
guas, dens do-
leat, signa.

c. auzæ. petuo dolor ipse symptoma erit, veluti de reliquis doloribus in antedictis asseruimus: subsequiturque vel continuitatem solutam, vel inæqualem intemperiem, aut vtrunque: quo fit, vt & ipse dentium dolor ex quacunque causa soluente continuum, ac inæqualem intemperiem potente inducere, progigni possit. Nos vero exordiemur à simplicibus intemperiebus, modum conscribentes, quo singulæ dignosci valeant; nanque eis cognitæ manifestæ quoque compositz percipi poterunt ex predictarum intemperierum mistura. Calida itaque existente affectione ex intenso dolore, subrufa facie, calidoque totius corporis temperamento, vigente ætate, tempore anni, regioneque, & aeris statu, ac ante acta victa consimili percipies. Ex frigiditate vero si dentes dolore afficiantur, ex contrariis indiciis poterit innotescere, ex figuraque tum capitis, tum reliqui corporis, & ex ea, quæ præcessit diætæ, iteq; exercitio, ac reliquis, quæ ad hunc ordinem referuntur, vt inquit Aetius.

Diversarū cau-
sarum signa.

Lib. 8. c. 28.

Lib. 8. c. 29.
Corrosionis den-
tium causa.

Galien. prin.

At si ab humiditate dolore dentes afficiantur, ex vniuersi corporis mistura in primis, ac capitis, quæ ad humidiores uergit, tibi manifestabitur, si delicatius vixerint, domumque habuerint in humidiori loco sitam, instet tempestas humida, & hora verna, cum afficitur, laxioresque sunt dentes vna cum circum adhærentibus corporibus, ac necessario mobiles, vt idem testatur Aetius veluti eorum corrosio, seu perforatio ex humorum acrimia, & erodentium influxu efficitur, ex Galeni sententia: quanquam multis hæc laxitas, ac dentium mobilitas ex humiditate citra doloris sensum accidat: nam humiditas per se dolores inferre non consuevit, immo ad eam nullus consequitur dolor, Galeno auctore 2. de compositione medicamentorum secund. loc. quantum ad qualitates ipsius attinet, ob multitudinem tamen instrumentalium partium morbum faciens, dolorem interim parit. Si vero à sicca intemperie dolore afficiantur dentes, intolerabilis fere eos, qui taliter afficiuntur, dolor concomitabitur: totius corporis temperamento, & maxime caput sicca intemperie erit affectum, sitis aderit semper, nisi adsit frigiditas vna cum siccitate minimum etiā sputi eiiciunt sic affecti, præcessitque autumnalis tempestatis constitutio, & vita erumposa, tenui accedente diætæ: præterea regio sicca & ambientis nos aeris status consimilis. Compositam autem intemperiem, si ea, quæ diximus indicia complicabis, facile agnosces, quæcunque ea sit propter quam doleant dentes: nam si verbi gratia, calida & humida fuerit, totius corporis temperamento sanè calidum, & humectum erit: caputque habebit, æger quod facile eiusmodi humiditate impleatur. Cuius coma, plurima est. & subrufa, regio calida, & humida, tempus anni. vernum, aeris quoque status calidus, & humidus erit, qualis est austrius. Sicqueque si calida & sicca, aut frigida & sicca, seu frigida & humida intemperies erit, ex iam dictarum simplicium intemperaturarum indiciis simul mixtis ipsam inuestigabis. Verum si vna cum predictarum qualitatum excessu, & humorum multitudo affuerit cognoscendus erit affligens humor, cum ex reliquis circa corpus signis, tum ex consequenti dolore; flaue nanque bile dolor pungitius comes: existit: pituitam vero sequitur vna cum frigiditate distensio locorum; nigra vero bile affligente sensus aderit, velut si corpuscula quædam in profundo confringantur. Vbi autem æqualiter omnes humores augeantur, multitudine horum in corpore coacervata grauitas concomitatur. Ex sapore quoque species in fluentis humoris argui poterit: nam si amaritudinem sensu perceperint egri bilem; si fæcedinem, pituitam: si acedinem, nigram bilem portendit. Ceterum quoniam per omnem fere animantis ætatem, incrementum accipiunt dentes: idque non nisi ex nutrimento eis delato: nam impossibile est citra nutrimentum aliquam partem incrementum suscipere, quantum autem augescunt, tantum in ciborum mansu deteruntur, Galeno teste. id vero quod au-
gescant

gescant euidenter sæpenumero apparet in his dentibus : qui exemptis oppositi sunt , vtpote qui semper augescunt : propterea duabus affectionibus in vniuersum ipsi obnoxij sunt , & his quidem contrarijs, indigentia videlicet, & abundantia eius, quod defertur ad eos, alimenti. Verum inopia, aridiores & macriores, alimentumque non sentientes, & ob id tenuiores dentes reddit, redundantia verò consimilem in eis affectionem excitare potest, qualis est circa carnosas partes inflammatio, iuxta eiusdem Galeni sententiam præcitato lib. 5. de compositione medicamentorum secund. loc. At fiat vtcunque dentium dolor (quoniam vt diximus Celsi auctoritate) ipse quoque maximis tormentis annumerari potest, & Gal. lib. 2. de compositione medicamentorum secund. loc. inter maximos dolores ipsum annumerauit, propterea eius curatio paruifacienda non erit. Et idem Galenus lib. 5. de compositione medicamentorum secund. loc. scriptum reliquit, dentium tenuitatem ob alimenti inopiã curari non posse, cum laxari, tum, & moueri ipsos necessarium sit: compage quoque ipsorum laxiore facta, nanque non solum ipsi dentes, sed & locelli eos complectentes sunt attenuati: quam dentium affectionem senibus accedere inquit citius, aut serius, velut etiam magis, aut minus. At ea dentium affectio, quæ proportionem ad inflammationem habet, præter id, quod magis iuuenes corripit, curationem quoque recipit. qua de re si ex caliditate dentium dolor excitetur, victus ratione instituta, vt decet, præsertim in cibo, & potu, quoniam prisana, alica, lactucis, & cucurbita, & quæcunque tandem his potestate sunt propinqua vesci debent, eisque modicis, mollibusque vtendum, ne mandentis dentes irritent; id quod seruandum erit in quouis dentium dolore, ex quacunque fuerit ortus causa. A uino autē abstineant, & aqua vtantur, in qua semina coriandrorum præparatorum fuerint decocta, aut cinamomi minimum: frigidis quoque medicamentis pro eius curatione vtendum erit, eis tamen non immodicè, præsertim actu frigidis, nisi vehementissimus dolor vrgeat. nanque ex immodicè frigidis lædi dentes consueuerunt; Hipp. & Gal. testibus, aph. 18. 5 lib. Illud item seruandum erit in cunctis adhibendis auxilijs, quòd vbi gingiua affecta fuerint, conuenientia ad hanc rem remedia locis affectis nudis adhibenda sunt: quæ sanè aut omnis mordacitatis expertia sint, aut mediocriter acerba, & terrei temperamenti: quapropter acetum, ut actum, & hostilem glandium deuita, inquit Aetius: suo enim acore gingiuas corrodit: propterea maximè consolatorium eis existit (vbi fortè doluerint, & inflammatae fuerint) lac asininū, vt ipse testatur: pimpinella quoque herba trita, & apposita tumorem gingiuam emendat, vt inquit Trotula. Vbi verò dentes solum patiuntur, aut cum eis simul substratus neruus, & pelliculæ, cum ipsis curatiuis pharmacis, ea, quæ tenuiū partium in sua substantia existunt adiicimus, quo vis ipsorum in profundum perferatur: & siquidem calidius sit morbus, ea quæ refrigerare possunt, & simul tenuium partium existunt, commiscemus: si verò frigidus, calida tenuium partium adnectimus. Hac de re calida existente affectione (vt diximus) ad collutionem oris præparabimus in aceto albo decoctam radicem halicacabi, semperuium minus, portulacam, perdicium, quod parietariam vocant, & glycyri zam: si etiam cum uino violas decoxeris, & ore teneas, conducit, Q. Sereni auctoritate. Quod si intolerabilis existit coloris sensus (ex Aetij sententia) vtendum est hyoscyami folijs, aut semine papaueris hortensis, & semine lactucæ in aceto albo decoctis. Poterit quoque in ore detinendum exhiberi oleum rosaceum, seu myrteum cum pauco aceto albo permixtum, quo item rosaceo cum modico aceto diluto, caput madefacere oportet, idemq; auribus instillare, aut terrenos vermes oleo decoctis in proquinquam aurem instilla, ex eiusdem Aetij decreto, eodèq; rosaceo, seu myrteo, aut ex nymphæa, vel papa-

cap. 8. a princ.
Prognostica
cap. 1.

Cap. 8.

Curatio. doloris dentium ex caliditate.
Victus ratio.

Medicamentorum ratio.

Animaduersione dignum.

Lib. 3. c. 27.

Cap. 5.

Serenus cap. de uino dentium.

Si exfrigiditate fiat dolor, curatio.

Videtur ratio.

Medicamentorum ratio.

Lib. 8, cap. 29.

Loco citato.

Capite proprio

Cap. 9.
Curatio doloris dantis ex humiditate oris.
Videtur ratio.

Medicamentorum ratio.

Alex. li. 3, c. 13
Aet. lib. 8, c. 29.

vere parato oleo, de foris partes (dolenti denti) vicinæ inungendæ sunt. Si vero ex frigiditate dentes dolore afficiantur, vniuersa victus ratione ad caliditatem vergente instituta prius, ita vt cibi sint ptisana cū pulegio decocta, aut cum ruta, aut cui post cocturam additum sit piper; similiter & alica, & inter olera petroselinum, & reliqua similia: potus autem sit vinum, modicū tamen. Ad oris tandem collutiones deuenies, easq; præparabis ex origano, calaminata, hyssopo, dictamno, ac satireia, in aceto, seu vino decoctis, aut tithymalli radicem, seu chameleonis, eryngii, aut verbasci, vel veratri nigri, & capparis radicem in eodem aceto, seu vino decoquas, vnumquoque enim eorum taliter decoctum, ac ore collutum dolores dentium sedat, qui à frigiditate sunt oborti Aetio auctore. Verum ad eos, quorum sensus citius afficitur, hæc in posca decoquantur: pinguium quoque lignorum, veluti cedarum, ac picearum decoctum ipsis prodesse asserit. Contunduntur autem hæc, accum caricis decoquuntur, affuso vino, eoq; dentes colluuntur. Ipsas quoque tedas in oleo decoquere licebit, eumq; calidum in ore continere. quin & ipsas conquassatas solas circa affectum maximè dentem, ore detinere, commodum existit. Caput autem chamæmelino, anethino, irino, seu rutaceo madefacere confert: similiter extrinsecus loca dolenti denti vicina: itemque auribus castoreum cum nardo in oleo decoctum infundatur. Suffitum quoque (præsertim si omnes ex æquo doleant) ex canis motui dente (ita vt fumis inde progressus ore excipiat) commendat Aetius: deinde ipsum dentem vstum, & modico aceto tritum, calidum in ore retinendum præbet. A totius etiam essentia proprietate senecta serpentis confert in vino, aut aceto cocta, vt patet 11. de simplicium medicamentorum facult. eadem quoque exusta, & trita, accum oleo ad mellis solidi spissitudinem redacta, dolentiq; imposita danti succurrit, eodem Galeno teste (ex Archigenis auctoritate) lib. 5. de comp. med. secund. loc. Ex humiditate autem affectos dentes, eosq; vacillantes curare conuenit per victus rationem, ad siccitatem vergentem, accum diuturniore ciborum abstinentia. Cibi itaque eis tribuendi sint sorbiles, alica, panis ex iure pullorū madidus, similia, aut oriza, seu polenta cum aqua mulsa: neque malè conuenit eis milium, & lenticula, volucres montanæ, & ficiores. Ex oleribus brassica, & similia. In potu aqua est exhibenda, sed non multa, aut aqua mulsa: & si hauc ferre nequeunt, ad aquam modicum vini ad datur. Tempore verò affectionis fouere conuenit locum cum milio, & sale: collutiones exhibendæ adstringentes, & exsiccantes, aut salæ, nisi gingiua si mul sint affectæ: quare gallas, quas omphacitides appellant, ex acri aceto decoctas, & alumen aceto permistum exhibebimus: similiter malicorium, citynos, myrti baccas, balauftia, oliuas, & rubi folia cupressi pilulas, ac rumicis syluestris radicem, & quæcunque alia acerbam in se qualitatem complectuntur, cum aceto puro, aut posca, seu vino si decoquas, conducunt, si eis colluere os præcipiamus, atque retinere adhibitum liquorem oportet supra locum dolentem diutius. Alexandri præcepto; parari tamen debet, vt sen sui ægri maximè gratum, & conueniens sit, ex Aetij sententia: nam iudicata, & perpenſa medicamentorum potentia, plus, aut minus exhibere oportet, iuxta etiam experantis humoris multitudinem: nec minus quoque conducit si oliuarum albarum, contusarum succum accipias, & cum rutæ succo, ac melle permisceas, eoq; dolentes dentes confricaueris: postea verò inspergas puluerem nardi indicæ cū pari pondere aluminis rotundi, & salis duplo, ex eiusdem Aetij testimonio. Nec etiam parum confert illitio ex confectioe demoris maximè si alumen scissile habeat adiectū, & ex ea, quæ ex nucum succo apparatus; si etiam gallæ 3. ij. & s. myrrhæ 3. ij. & corticum mali punici tantundem accipias, & ex aceto vtare, magnopere prodest, Alexandro teste

ste; & vel alumen, & myrham troglodyticem inspergito: nam sicca insper-
siones semper eis sunt cōuenientes, ut inquit Aetius, aut cum aceto, seu melle
illinito: pentaphyli quoque radix desiccata, & in puluerem redacta insper-
saque cōfert, veluti etiam eiusdem radix ex vino, aut aceto cocta confert, si ex
ea dentes colluantur: similiter & cornu cerui in posca decoctum: innume-
raque alia reperies conferentia, tum apud Galenum libr. 5. de compositione
medicamentorum secund. loc. tum apud Aetium lib. 8. cap. 29. Quod si ob
ætatem senilem quibusdam dentes laxentur, ac mobiles fiat, auxilium ca-
pient. & quodammodo iuuantur ex pharmacis adstringentibus, quæ gingiuas
confirmant, densent. & ad arctius complectendum dentes adiuuent: si vero ex
percussione, aut casu dentes laxentur, maximopere his prodest alumen scissi-
le cum myrha troglodytica tritum, ac inspersum: atque id vbertim, & con-
tinue facere oportet, vt idem testatur Aetius; nam ipsos confirmat, stabilic
quoque mobiles dentes (Pauli auctoritate) aloë inspersa, vel thus vel alumen
scissile, aut galla, seu rubi radix per se, aut cum vino incocta. A siccitate autem
dolore affectis dentibus cibus conueniens erit succus ptisanæ, micæ panis ma-
defactæ ex gallinarum iure, cucurbitæ, malue, oua sorbilia, & quæcunque iis
profunt, qui humectatione indigent. Potus sit vinum album, aquosum, aqua
dilutum: medicamenta autem austera, & acerba vitent; nam maxime con-
traria eis existunt: minimum itaque adstringentes, mediocriter humectan-
tes collutiones apparare oportet, vt aquam calidam per se ex qua iterum per
spongiam extrinsecus vapor admouendus erit ex furfuris item decocto, aut
radicis dulcis seu maluæ collucio parari poterit: similiter ex ptisanæ succo,
aut amylo cum sapa, aqua calida diluta: lac etiam per se: maxime asininum
confert, & alia quæcunque his sunt similia, auctore Aetio. Haftenus ergo sim-
plicium intemperierum, ex quibus dentium dolor excitatur, curam ostendi-
mus, manifesta vero & ex his fiet ea, quam compositæ requiruntur, nimirū
& ex iam dictorum mistura signorum cognoscibiles, & ex ostensorum auxi-
liorum temperatura curam accipientes: qui enim formam tractandi simpli-
cēs morbos cognouerit, in promptu habebit, & circa mixtos conuenientia
remedia inuenire, potissimum si excessus iuxta qualitates tantum contige-
rit: nam tunc scopus curationis ad alterationem solam dirigendus est, ita ut
contrariis qualitatibus eam permutes. Eas vero intemperaturas, quæ una cū
qualitarum excessu, cū substantia etiam quadam consistunt, seu humorum
multitudine, palam est primum oportere corpus euacuare, aut redundantem
humorem per conuenientem purgationem detrahare: deinde eas ad tempe-
riem reducere, nisi quid impedierit: cuius rei in omni corporis intemperie
memorem esse conducit, ex Galeni, Pauli, & Aetii sententia. Qua de re si,
ob humorum multitudinem, sanguinisque redundantiam dentium dolor ex-
citatus fuerit, per venæ sectionem euacuare conueniens erit: incidereq; opor-
tet venam humeralem appellatam, quæ si non contingat, eam, quæ media
existit, incidere conuenit, iuxta Aetii decreta: incidantur tamen ea quæ è dire-
cto laborantibus dentibus sita est: & si opus fuerit vena, sub lingua quoque
secabis, aut cucurbitas scapulis affiges. At si quid prohibeat venæ incisionem
facere, modico, & tenui victu superfluum detrahit humorem, vt idem præ-
cipit Aetius. Euacuatio autem vniuerso corpore, dolentibus dentibus ea
adhibenda sunt, quæ reprimunt, atque repellunt. demum ea, quæ partim re-
pellunt, partim quoque discutiunt; pauca tamen sunt affectiones quæ re-
pulsoriis tantum indigeant: nam hæc duntaxat, quæ minorem habent cau-
sam, & propterea cogimur sæpius in principio etiam discutientia admiscere
aut paulo post, vt 6. de compositione medicamentorum secund. loco. testatur
Galenus. Quanquam si doleant propter gingiuarum inflammationem, præ-

Gal. li. 5. c. 9

Pau. li. 3. c. 26.
Curatio dolo-
ris dentium ex
siccitate.
Victus ratio.
Medicamento-
rum ratio.

Lib. 8. c. 31.

Curatio dolo-
ris dentium ex
multitudine hu-
morum horti.
Venæ sectio.
Lib. 3. c. 32.

Loco citato:
Topica qualia
competant.

Cap. 3. in prin-

sentis-

Cap. 9.

Aet. li. 8. c. 20.

Quibus utendū
est, si dentes in
propria substā
tia, aut a substra
to neruo, affecti
sint.

Si ex deflexu
calidorum hu
morum dentes
doleāt, curatio,

Si ex confluxu
frigidorum suc
corum, curatio,
cap. 9.

Ad dentium fo
ramina, ac liui
ditatem,

sentissimum remedium est, vt pote citra molestiam, & absque asperitate repellens, discutientesque citra mordacitatem, cuius rei inflammatio præcipue vsus existit, oleum inquam lentiscinum caliditate temperatum, ore retentum: esto autem id recens: nam vetus tanto recenti deterius est, quanto calidius, Galeno auctore 5. de compositione medicamentorum secun. loc. quem sectatus est Paulus cap. 26. lib. 3. nec minus etiam si iuxta aliam partem dolor oriatur, eum sedat, lentiscinum, vt idem testatur Galenus, magnopere tamen cauendum ab alterutris ipsorum intensis, tanquam inflammatis dolorosis existentibus: nanque à vehementer adstringentibus partes similem quiddam contusioni perpetiuntur, earum substantia vehementer condensata, ab acribus verò erosioni quid simile contingit merito igitur moderatum in vtraque facultate immoderatis præfertur, eiusdem Galeni sententia. Qua propter Aetius post lentiscinum oleum, asininum lac in ore retentum commendabat; similiter & sapam, aut palmarum stillamentum eodem modo calidum ore retentum. Verum ad palmularum stillamentum quo crassities eius diluatur, aquam calidam affundendam esse iussit: valeat etiā semperuiui minoris decoctum per se, aut cum rosaceo melle, sapa, vel palmularum stillamento in ore retentum. Dentibus autem ipsis in propria substantia affectis, aut substrato eis neruo, vehementissimis vtendum est medicamentis siue quis repellere, siue discutere velit: & propterea (vt Galenus asserit) pleraque ipsorum ex acerrimo aceto præparantur. Colluatur itaque aceto, in quo decocta sic galla, Paulo auctore. vel halicacabi radix, alterci semen seu folia, ac solanum, vel myrti folia: nec minus & eis vti poteris medicamentis supra conscriptis pro cura doloris eorum orti ex calida, tum humida intemperie, ea inuicem miscendo: poteris tamen processu temporis, quæ discutiendi facultatem habent, admiscere, vt hyssopum, melilotum, fœnum græcum althæan, pulegium, origanum, & alia eiusmodi: Ad stupefacientia autem medicamenta, nisi summa urgente necessitate, deueniendum nequaquam erit, eisque paulatim vtendum, & non nisi in humorum calidorum defluxu, qui si ex bilis redundantia fiat, ex qua interim eroduntur dentes, vniuersi corporis, tum etiam capitis prius ratio habenda erit ipsum purgando medicamentis, quæ talem vim habeat: quorum mentio, tum cap. de dolore capitis ex bile, tum in plerisque alijs locis, à nobis facta est. Postquam purgationem per resiccationem vitiati influentis humoris ex localibus auxilijs factam cura perficienda erit: quorum iterum syluam perquiras ex his, quæ diximus pro cura doloris dentium ex caliditate, tum etiam ex caliditate, & humiditate. Cæterum si dentium dolor ex frigidorum humorum confluxu ortum duxerit, post iterum eorum a toto corpore, ac à capite inanitionem (quocasu præstat valde apophlegmatismis vti, vt 5. de comp. med. secun. loc. patet) quæ similem habeat facultatem adstringendi mediocriter ac validissime discutiendi medicamenta, ac calida magis adhibenda sunt, quemadmodum est ruta, seu polium, pulegium, origanum, hyssopum, seu capparis radix si in aceto, aut vino decoquantur, ac ex eis collutio oris fiat, Conducunt quoque ea, quæ supra scripsimus, medicamenta pro curatione doloris, dentium cum ex frigida, tum ex humida intemperie. Nec minus & iam superius conscripta auxilia conferunt quædam ad dentium foramina, seu ad eos liuidos redditos, cum etiam ex humorum vitiatorum influxu id patiantur. Si vero nulli prædictorum malum ipsum cedat, & dolor vehementer perseueret dens ipse tollendus erit, potissimum si liuidus, aut perforatus, ac vacillans fuerit, idque aut medicamentis, quæ ab artis medicæ auctoribus eximijs commendantur, aut fero perficies: nam si corrosus fuerit dens, & mouetur, eximatur inquit Hippocrates li. de affectionibus, si vero non corrosus est, neque mouea-

mouetur, dolorem etiam exhibet, per vitionem resiccatur. Stupori autem, dē-
tium benefacit porrulaca commanducata, vel oleum quod immaturæ oliuæ
fuderunt infricatū, vel amurca vetusta in æreo vase cocta, donec mellis spif-
situdinem habeat, si perungatur, Paulo auctore, præcitato loco.

Ad dē-
tium stu-
porē,

περί ἀφθῶν.

De aphthis.

Cap. 42.

IN oris superficie interim vlcerationes quædam igneæ quippiam calidi-
ratis habentes exoriūtur, has Græci ἀφθα. medicorum vulgus alcolas ap-
pellat. Summa igitur oris pars cum ab eis occupetur, Galeno teste 6. de
comp. med. secund. loc. & commento aph. 24. 3. lib. haudquaquam partem
ipsam affectam inuestigare difficile erit, cum ægro tantis ore adaperto prom-
ptè oculis eam cernere liceat; pariterq; ad tactum iudicari poterit, cum cali-
diores, quàm conueniat, tumidioreq; oris summæ partes sentiantur. Affe-
ctus ipse, cum exulceratio quædam sit, liquet, neque alijs indicijs indiget pro
eius cognitione, quàm visu, & tactu, velut ipsa pars affecta. Earum autem
causa neque vna esse poterit: nam si lactentibus pueris excitentur, quibus vt
plurimum fieri consueuerunt, Galeno auctore aut vitiosum lac nutricis, quod
non paruum in se serosam contineat partem, erit in causa, quoniam hæc
pars vim habet abstergerendi, quam ob molliciem oris summæ partes lacten-
cium infantium sustinere nequeunt. Quare non mirum si incorporibus mol-
libus ex tali lacte per oris summa fiant exulcerationes, ex Galeni sententia
in commento eiusdem apho. 24. 3. lib. id autem percipere poteris ipsa lactis
qualitate inspecta, aut si lac vitiosum non fuerit, propterea quòd ipsum non
probè concoquunt infantes lactentes: ea de re cōtingit propter hanc causam,
iam dictas exulcerationes oboriri, eodem Gale. teste libr. 6. de. comp. med.
secund. loc. Ijs vero, qui ad perfectam ætatem peruenerunt, ac non lactenti-
bus pueris, nedum aphthæ fiunt propter acredinem eorum, quæ bibuntur, ac
comedunt, verum etiam propter vitiosorum humorum ad os defluxum,
vt lib. 8. cap. 39. inquit Aetius. Ortas autem aphthas ex eorum quæ come-
duntur, & bibuntur acrimonia, promptè ex ægrotantis, seu astantium ser-
mone ipsis interrogatis percipere poteris: reliquæ vero ex earum colore
diuerso comprehenduntur, nam rubicundiores cum fuerint, sanguineum hu-
morem præualere ostendunt: flauiores autem amarum bilem: nec minus si
tangas immodicam percipies in eis caliditatem: quamuis valde maiorem in
flauioribus, & ex bile dependentibus. At si albescentes fuerint, pituitosiores.
Liuescentes vero, & nigrescentes, atræ bilis succum præualere ostēdunt: quas
geminas, si tangas, haud quaquam immodice calidas reperiēs. Ex corporum
insuper temperatura, ætate, habitu, ac præcedente victus ratione, plenius id
conicies. Ex eis facillè curantur, quæ pueris lactentibus fiunt, Galeno aucto-
re: iis quoque ætatis ratione maxime contingunt, vt inquit Hippocrates,
præcitato apho. 24. 3. lib. quæ verò accidunt iis, qui ad perfectam ætatem
peruenerunt, non ita facillè: potissimum, vbi ob vitiosorum humorum de-
fluxum excitentur, quamuis Celsus lib. 6. cap. 11. velit longe periculosissimas
aphthas esse in pueris: in viris autem, & mulieribus idem periculum non esse:
cum non ita facile ab eis consumuntur; quibus suis verbis cum Galeno con-
ciliatur, qui voluit facillius curari eas in pueris, utpote quia ex moderate
adstringentibus sedentur, id quod in adultis nequaquam fieri potest, aut per-
quàm rarissime; mitiores etenim sunt in pueris lactentibus, quia ex mitiori
causa fiunt, quamuis ætatis ratione ab eisdem facillius quàm viri consuman-
tur, vt inquit Celsus. at si ab affluente vitioso humore fiant aphthæ, vt inquit
Galenus 3. de morb. vulg. id quod sæpius prouectioribus accidit, semper
prodeunt

Pars affecta,
9. de comp. me.
secun. loc.
c. 4. in prin.

Affectus.
causæ, si lacten-
tibus accidunt.

causæ, si non la-
ctentibus fiant.
c. 4. in prin.

Signa,

Prognostica.

Celsus cum Ga-
leno cōciliatur.

3. de morb. vul-
commentario 3
com. 12. in fine,

Cap. 4. in prin.
Curatio earum
si lactentibus ac-
cidant.

Cap. 4

Si maioribus
pueris, aut æta-
te perfectis fiat
Curatio.

prodeunt cacoethes. Harum omnium periculosissime existunt, quæ ex atra-
bile originem duxerunt, propter humoris malignitatem: quæ vero diuturnæ
fluat, & progressu temporis putredinosum quid acquirunt, ac malignæ eua-
dunt, ægre solubiles sunt; à medicisq; nomē appellantur, hoc est depascentia
vlcera, malo nimirum semper ulterius serpente, nec medicamentis cedente:
vt propterea fortioribus indigeant medicamentis, vt patet eodem libr. 6. de
compositione medicamentorum secundum loc. Quæ itaque lactentibus pue-
ris accidunt ex his, quæ moderatè adstringunt, sedantur, vitioso tamen prius
nutricis lacte conuenientibus cibis, ac potibus contemperato: aut si id ipsum
probe non concoxerint infantes vt probè concoquant, procurabis; simulq;
prospicies & ipsi nutrici bonam concoctionem. Quapropter cibis leuibus
alenda erit, & his, qui facilè non corrumpuntur, vt præcitato loco Celsus præ-
cipit: potio, si febricitat puer, aquæ, si sine febre est, vini diluti prebenda erit:
admiscereq; cibis conuenit lentem, cotonea mala, & ex pyris quippiam ad-
dere, sorbis, mespilis, ac conenis: quandoque etiam in cibos, qui manduntur,
de lactuca, seride, solano, & portulaca permiscere licet. Et si infans quid man-
dere queat, ea quoque tribuenda sunt, vt mandantur: præsertim si valde inflā-
mata fuerit aphthæ, est quoque infantis os, pharmacis illinendum, præsertim
si subrubras videris aphthas, in principio quidem iis, quæ moderatissimè ad-
stringunt, ac frigefaciunt: deinde vero iis, quæ citra mordacitatem discutiunt.
Si verò subflauas videris aphthas, iisdem quidem vtendum sed magis refri-
gerantibus. At si pituitosiores; & subalbidæ fuerint, adstringentibus simul,
& abstergentibus vtendum erit, velut, si nigrescentes fuerint, his quæ gene-
rose discutiunt vti licebit. In principio itaque si subrubræ fuerint aphthæ in
faucibus ipsis pharmaca illinenda sunt, quæ moderatissimè adstringunt, &
frigefaciunt, Galeno auctore 6. de compositione medicamentorum secund.
loc. deinde vero ea, quæ citra mordacitatem discutiunt, nam moderatæ aph-
thæ maxime in tenellis corporibus moderatis pharmacis opus habent, vt ip-
se asserit, cuius farinæ sunt, syrupus ex succo rosarum, è portulaca, ex ompha-
cio, aut ex plantagine, vel ex moris, seu rubi moris, aut ex malis punicis aci-
dis: puluis quoque parari posset ex lentium farina, ex rhu, rosarum flore, ac
eisdem ipsis rosis siccis. Collutiones insuper moderate adstringentes ex ru-
bi decocto, rosarū, aut plantaginis, balaustrorum, & santalorum, admisto, ali-
quo ex iam dictis syrupis componantur, eisdem quoque, si subflauas videris
aphthas, vtitor: sed magnis refrigerantia eligas; quo casu solani succo, aut eius
decocto vti valde conducit. At si neque his malum cedat, adiicienda erunt
prædictis, quæ citra mordacitatem discutiunt, vt mel rosaceum, aut vinum
præsertim dulce, in quo prædictorum aliquod dissoluatur, aut decoquatur.
Albescente vero & pituitosiores aphthas adstringentibus simul, & detergen-
tibus similiter moderatis, curabis. Eiusmodi sunt, manna thuris, glycyrrizæ
succus, nux cupressi, & maltiche. hæc cum foliorum myrti, aut oleæ decocto
misceantur, & eo aphthæ illinantur: quæ iterum cum aliquo ex paulo ante
commemoratis syrupis miscere licebit. At si liuentes, & nigrescentes fuerint
aphthæ, ex vua passa exacinata, & aniso, tritis cum melle, seu melle rosaceo
illinendæ erunt. Confert insuper & florum chamæmeli, fertulæ campanæ,
anethi, seu fœni græci puluis, qui pariter cum melle, seu rosaceo melle mix-
tus illiniri poterit: & si mitius velis parere medicamentum, puluerem ex ali-
quo iam dictorum cum syrupo myrtino, aut ex moris, seu portulaca permi-
scebis. Cæterum si in maioribus pueris, aut ætate perfectis aphthæ exoriantur,
eiusdem quoque generis pharmacorum facultatibus, aucti tantum ipso-
rum viribus vtendum erit: verum non equaliter omnibus, sed maxime eo-
rum corporum naturas simul considerabis, num molles sint, & humidæ, ve-
lut

lut eunuchis, & mulieribus, ac pueris; aut duræ, & aridæ, veluti in piscatoribus, nautis, venatoribus, atque agricolis: nanque robustioribus istis corporibus fortiora adhibenda erunt pharmaca, mollioribus debiliora, ex eiusdem Galeni sententia, præcitato libro sexto de compositione medicamentorum secund. loc. Quo vero ad victus rationem attinet, abstinendum erit ab acribus, salis, & acidis, tum eduliis, tum potibus, ac à cunctis, quæ vitiosos succos generare possent; quemadmodum (Apollonii auctoritate) eodem loco, præcipit Galenus: victuque alendi sunt boni succi, facilisque concoctionis, cum aliquo ex prædictis oleribus, seu fructibus permisto. Et si sanguineus præualuerit succus, priusquam topicis vtaris medicamentis, vena secanda erit, si nihil impediatur, interna, seu humeralis: & si opus fuerit, iteranda venæ sectio erit. Si quid vero venæ sectionem prohibeat vt in pueris infra decimum quartum annum, sanguinis misio per affixas cum scarificatione cucurbitas scapulis fiat, aut per hirudines, eodem loco; seu in cubito admotas, veluti Neapoli consueuimus. At si hæc non suffecerint, ex venis sub lingua sanguis quoque prædictis mittendus erit. Quod si totius corporis plenitudo non adsit, sed quispiam vitiosus redundarit in toto corpore succus, is primo vacuandus erit, adhibito purgante medicamento, quod talem vim habeat, bilem scilicet educendi, si bilis; pituitam, si pituita; nigram bilem, si succus melancholicus redundarit. Vacuato autem corpore, medicamenta, quibus adstringendi facultas inest, ad mouenda sunt a principio: consequenter vero his, quæ vim discutiendi obtinent admiscenda erunt. Primo tamen moderatis, quæ supra retulimus, vtare. Quod si ea non suffecerint, omphacio cum vino austero, & subastringente vtaris, aut rhus, quod sumat appellant, oleæ, seu myrri albæ folia cum prædicto vino decoquantur, quo oris collutiones fiant: nec minus & gallarum decoctum cum vino cōfert, gallas insuper contusas, si in aqua decoquas. & cum præcolato decocto parem mensuram mellis permisceas, rursusque decoquas, donec ad mellis crassioris spissitudinem redigatur, maximo remedio erit, vt inquit Aetius, præsertim pueris, & inueterato iam malo: prædictis vero deinceps, si malum eis non cedat, fœnum græcum, melilotum, glycyrrhizæ radicem, myrrham, aut anisum permiscere poteris, aut etiam sal ipsum, si robustiora corpora fuerint, mandadæ insuper sunt oliuæ muria conditæ, cum adstringant & discutiant, Apollonio teste, nec minus portulaca melle tincta si manducetur confert. Ex erui quoque farina, & melle aphthæ extegendæ sunt: & de num galla cum melle illinenda erit, vt auctoritate Archigenis, Galenus approbat, eodem sexto de compositione medicamentorum secund. loc. similiter misy, alumen, & rhoem cum melle. In perfectis etiam, & duris corporibus, ex proposito idem Galenus eodem loco, misyos vsu cum vino adstringente per omnia commendat: poterit autem huius medicamenti vis (vt ipse inquit) tum intendi, tum remitti, prout magis, vel minus vinum fuerit adstringens: & prout crassius aut liquidius efficitur pharmacum ex misyos, ac vini mistura. Porro si putredinem aphthæ vertantur, quas amplius aphthas appellare non cōuenit, eodem Galeno teste, præclare facit (vt inquit Aetius) ex gallarum decocto, & melle præscripto illitio: nec minus egregie facit, centaurii minoris exusti cinis, illinitus cum melle: priuatim vero cōuenit cornu cerui tritum, aut atramentum sutorium vsutum, cum melle etiam tritū, seu æris erugo, siue squama similiter cum melle: siccum item pharmacum, quod ex rosarum floribus, rhoe, croco, & costo, constat, magnopere confert, si cum melle illinatur, eodē Aetio auctore: si vero proserpāt aphthæ, quæ nome appellantur, summe eis facit fœniculi radice vsu cinis (ex monumentis Archigenis) per se, & cum melle illita, vt inquit Aetius. Itē amurca in greco vase, donec in mellis crassitudine cogatur,

Victus ratio,
cap. ultimo.

Sanguinis misio.

Purgatio.

Topica qualia
adhibenda.

ult. post med.

cogatur , decocta , ac illita: nec minus confert, gallarum, aluminis, & balustiorum puluis, æquales singulorum partes assumens, per se, aut cum melle illitus.

περί καταρρέων, βραρυχῆς, καὶ γρῦζης.

De destillatione, raucedine, & grauedine. Cap. 43.

cap. 9. In prin.

Quot modis de
stillatio dicatur
seu defluxio.
3. de cau. symp.
c. 4. in prin.
Destillationis
communissime
sumptæ differē
tiæ plures.
Cap. 9.
Loco citato.

Paul. cum Gale
nus conciliatur
Cap. citato.

3. prog. com. 16

Cap. 1. collige.

CONTINGIT non rarò, vt capite malè affecto, superuacaneum quoddam ex eo in subiecta membra confluat, promptissimè quidem in os, & nares impetum faciens, Galeno auctore sexto de sanitate tuenda: & licet diuersas suscipiat nomēclaturas, pro partium diuersitate, quæ excrementa suscipiunt, vt dicemus, tamen quo nomine nuncupetur ea affectio, quæ communis est omnibus, haud admodum liquet: nam (vt Celsus inquit libr. quarto, cap. secundo) Hippocrates κορυζαν nominare consuevit, nunc verò (vt ipse asserit, & nos quoque obseruauimus) apud Græcos in grauedine hoc nomen seruatur, velut destillationes, καταρρέων appellat. Cum itaque capitis fluxio ad subiectas partes indifferēter nullam habeat propriam nomenclaturam: nec apud Græcos, nec apud Latinos, seu Arabes, poterimus prout abusus insuevit, & græcum nomen significat καταρρέων Græce, latinè defluxionem appellare: Celsius Aurelianus libro secundo capit. septimo influxionem nuncupauit, communissimè tamen vocabulo ipso vtens. Nam si communiter sumatur pro omni defluxione, quæ ex capite ad pulmonē per asperam arteriam fluit, aut pro omni ea, quæ à capite per venas ad partes inferiores defluit, intelligi debet, Galeno teste commento aphor. decimisecondi, tertij libri: propriè autem καταρρέων Græci nominant, vt idem Galenus asserit lib. tertio de caus. symp. cum quod superuacaneum est, à cerebro in os defluat; quem etiam latinè propriè destillationem nuncupare debemus: velut si in nares excrementum defluat, κορυζαν Græci, grauedinem latini appellant. At si in fauces, vt inquit Galenus præcitato loco, aut in laryngam, ut sexto de sanitate tuenda ipse asserit, ex capite excrementa decidant βραρυχῆς à Græcis, raucitas à Latinis nominatur affectio: nam principio vocem raucam facit; procedente verò tempore paruam. Si verò longius etiam procedit malum totam adimit, vt patet eodem sexto de sanitate tuenda: quamuis Paulus velit, cap. 28. libr. tertij. Quod si excrementius humor per palatum, ex capite in fauces decumbat, καταρρέων Græcè, Latinè destillatio nominari debeat. Si verò in guttur, & asperam arteriam destillet, vocatur tunc malum Græcè βραρυχῆς, vel γρῦζης: conciliari tamen cum Galeno posset de catarrho, quòd & si per palatum in fauces excrementum aliquod defluat, ad huc in ore suscipitur; a quo & tum gula, tum aspera arteria excrementi decursū excipiunt, eodem Galeno auctore, sexto de sanitate tuenda. sunt enim fauces spatium illuc laxius, quod inter gulam, & guttur præiacet, vt liquet commento aph. 3. 4. 4. li. & tertio progn. quapropter & os cum his simul afficitur; & ore affecto, ac superuacaneum excipiente, contingit, & eas quoque coaffici, vel dicas faucibus exiguum excrementum suscipientibus fieri etiam catarrhum, quoniā vox nondum mutatur, & rauca redditur. Sic etiam de brācho differendum erit, nam raucitas nedum gutture affecto, verum etiā & faucibus ipsis, multo tamen humore imbutis superuenit, velut ex Galeni sententia asseruimus: sunt enim ambo vocis organa, vt ipse inquit septimo de compositione medicamentorum secund. loc. præcipuè tamen fieri consuevit, si in guttur, & asperam arteriam excrementius humor destillet, vt inquit Paulus. Cæterū si in alias partes: capiti subiectas ab eo fluxio procumbat, pro partium varietate

varietate diuerfas suscipit nomenclaturas, vt si in gurgulionem vna, aut si aliter in tumorem attollitur, alio nomine; si in glandulis, quæ in oris termino vtrunque iacent, antiades; si in ijs, quæ proximæ eis sunt, paristhmia nuncupantur. Si in reliquis partes aliam quandam appellationem suscipiunt, de quibus omnibus modò tractare non intendimus, sed de tribus duntaxat prænominatis fluxionibus, catarrho videlicet propria dicto, coryza, & brancho, hoc est, de destillatione proprie dicta, grauedine, & raucitate verba faciemus. Est autem cum his, tum reliquis omnibus non nominatis vitijs commune (vt inquit Paulus) descensus excrementitij humoris ex capite in subiectas partes: quem descensum, defluxionem, seu destillationem (quantus communissimo vocabulo) nuncupare fas erit. Quod autem in hac affectione cerebrum primo oblæsum sit, liquet ex Galeni verbis tertio de caus. sympto. cum dixit, catarrhi; & coryzæ causa est cerebrum: & post pauca, iterum dicebat, ergo qualis in ventre passio ex mala concoctione fit, tale est in cerebro prædictorum vtrunque. patere insuper illud poterit & sexto de sanitate tuenda: quo loco capiti in prædictis affectionibus prospiciendum esse iussit, tanquam ipsius mali fonti. Ex ipsiusmet quoque cerebri operationibus oblæsis, ac eiusdem excrementis quantitate, & qualitate mutatis, confirmari potest. Quanquam cum eo in grauedine nares coafficiantur, in destillatione seu catarrhos, os ac interdum fauces; in raucitate larynx, seu aspera arteria; aut ipsæ quoque fauces, si immodico humore imbutæ sint. Affectio ipsa symptoma est in genere excretorum immodice, ut Galenus inquit, eodem tertio de caus. sympto. quod quidem interim ad ipsius cerebri intemperiem consequitur calidam, uel frigidam, quo casu ut similis pars ipsum afficitur: interdum uero eo impleto, & velut instrumento oblæso symptoma hoc excitatur, ut Galenus testis est præcitato libr. de caus. sympto. At tibi declarabunt, quæ nam fuerit capitis dispositio siue calida, siue frigida, qualitas, & quantitas excrementorum, nec non causarum, quæ præcesserunt contemplatio, Galeno auctore tertio de loc. affect. cum itaque cuiuslibet defluxus ex capite ad iam dictas partes, causa sit intemperies calida, aut frigida, cerebro tamen ut parte similari affecto, aut multitudo uaporum, seu humorum in eo contentorum, si ut instrumentalis pars cerebrum ipsum affectum sit: quanquam eius affectio quoquomodo fiat, similis sit affectioni uëtris ex mala concoctione, ut patet eodem tertio de caus. sympt. propterea singulæ dispositiones propriis indiciis inueniendæ sunt. Nam si frigida fuerit, tum ex quantitate excrementorum, quæ maior, erit tum ex qualitate, quod frigida minime mordacia sint cognoscēs; caputque undique & frons uis distenditur, ac meatus, quos ethmoides uocant, clauduntur, ne uox deorsum per nares transmeet, ut inquit Paulus: frigidaque præcessit uictus ratio, temperamentum potissimum cerebri, ac ætas, tempus, anni regio, ac æris constitutio, aquilonia. Hæc nanque frigida cerebri intemperies cogens amplius, & comprimens quodammodo caput (velut manus spongiâ aqua imbutam) exprimit cerebrum ipsum, quo fit, ut ad loca capite inferiora eius excrementa decendant: adhæc cum quod ad ipsum cerebrum prouenit pro nutrimento, sua frigiditate concoquere non possit, effectum ei velut excrementum, iterum ad infernas partes illud conueritur, cum nequaquam continere valeat: nec minus cum ex infernis partibus in ipsum vapores ascendant, nequaquam digeri, ac discuti ab eo ualent: qui iterum multiplicati, ac crassiores redditi, ut ad subiectas partes delegentur opus est, nullam siquidem in parte aliqua corporis plenitudinem digeri hyems, ut inquit Galenus commento aphor. 13. tertij libr. quare nec frigiditas, confert, etenim frigida intemperies dum nihil absomit humoris quodammodo incremento confert, eodem Galen. auctore 6. de sanitate tuenda. & 1. de morb. vulg.

Da quibus differentiis tractabitur.

Quid sit omnibus commune.
Quæ pars afficiatur.
ca. 4. post prin.

c. 9. post prin.

Quis præter naturam affectus.
cap. 4.
causæ.
Loco citato.
Causarum cognitio.
Ca. 5. post med.

Cap. 4.
Si ex frigida cerebri intemperie fiat, signa

6. de san. tuenda.

1. de morb. ual.
commētiario 2.
Com. 7.

Si ex calida in
temperie signa.

Circa finem.

Cap. 7.
Curatio.

Victus ratio.
Lib. 8. cap. 53.

vulg. qua ratione etiam fit, ut ex accidenti propter frigidam intemperiem ce-
rebrum repleatur, ac ut instrumentum à plenitudine infestetur; id quod præ-
ter iam dicta, si ex frigidis succis fiat, dignoscet ex capitis, tum distensione,
tum grauedine, citra tamen calorem, ac mordacitatem, oculorum, seu faciei
rubedinē: præcesseruntque nonnulla, à quibus caput faciliè repleti frigidis hu-
moribus potuit, ut nimia repletio, & præsertim frigidorum alimentorū, ac
potuum, aut frequentes cruditates assumptorum ciborum, qui in ventre inco-
cti perseverantes nequaquam infra excernuntur: ijs quoque si febris superue-
niat, ab ea iuvantur, Paulo auctore, præcitato loco. At si ex æstu grauedinem
quispiam, de stillationem, seu raucedinem concipiat, his particulæ, quæ fluxio-
nem suscipiunt, incalescunt, acris tenuisque humor destillat, tum per nares, tum
per os, faciesque rubescit, & nasus, ut idem inquit Paulus. Hos etiam magna
ex parte febris comitatur, quamvis ab ea minimè iuventur, tumescere insa-
per facit nasū, & interim exulceratur tum nasus ipse, tum reliquæ partes flu-
xionem suscipientes, cum ea acrior fuerit, Hippoc. auctore; libro de veteri me-
dicina: & si manum fronti, capitique admouēas, immodicè calentes has par-
tes reperires: quod si ætas, temperamentum, habitus, anni tempus, regio, acris
que constitutio præcesserint, ac fuerint calidæ, certius id manifestabunt. Est
autem huius defluxus causa, calida cerebri intemperies, non si quidem cogēs,
ac constringens, veluti frigida, sed cerebri humores extenuans, ac dissoluens;
atrahendo quoque per se, & ipsa caput replet, præsertim ubi vinum ultra mo-
dum potatum fuerit, aut copia ciborum, calidorumque præassumpta, aut bal-
nea calidiora, seu largior perfusio capitis ex aqua calida præcesserint: nam &
hec suapte natura caput replent, quemadmodum austris, ac austrinæ pluviæ,
& cuncta, quorum natura calida est, & humida: omnia nanque talia apta sunt
caput replere, ut testatur Galenus commento aphor. quinti, tertii libri. quo
casu præter iam dicta, aderit capitis quoque levis dolor, ac grauitas cum ma-
nifesto caliditatis sensu. Aptiores autem sunt, qui temperaturam calidam ca-
pitis habent, ut ab externis causis in destillationes incidant, velut frigidam ha-
bentes temperaturam paratiores sunt, ut ab internis causis destillationibus
corripiantur. Verum si raucedines, & grauedines in ualde senibus fiant conco-
ctionem non admittunt, inquit Hipp. apho. 40. secundi libri, cum ex frigi-
dis oriantur causis, & facultas eorum imbecilla sit, ita ut eas concoquere non
valeat. Celsus vero scriptum reliquit, quod si in nares ex capite destillat hu-
mor, leue est; si in fauces, peius; si vero in pulmonē, pessimū est; quod si in aspe-
ram arteriam destillet, peius erit, quàm si in fauces; non tamen ita pessimum,
ut si in pulmonem, quemadmodum cuilibet patere poterit. Cunctæ vero de-
stillationes breues, & si neglectæ sint, longæ esse consueuerunt, ut idem in-
quit Celsus, nihilque pestiferum, nisi quod pulmonem exulcerabit, eodem te-
ste: quanquam neque omnino salubris sit, aut curatu facilis, si ex destillatione
caput asperæ arteriæ, aut ipsa eadem exulceretur, potissimum si ad eius carti-
lagineam substantiam peruaserit, quemadmodum liquet septimo de usu par-
tium: considerate itaque oportet, cuiusque destillationis præcedentem cau-
sam, ac præhabitam diætā, atque ita remedia contraria afferre, ut inquit Ae-
tius. In vniuersum autē pauco cibo, & quiete utendum est, vitato etiam fri-
gore, & calore, & præsertim si repētina fiat mutatio, modo ad frigus, modo ad
calorem. Hæc nanque res (ut testatur Celsus cap. secundo lib. primi) maximè
grauedines, destillationesque concitat: protinusque abstinendum esse à sole, bal-
neo, vino, & venere idem Celsus præcipit cap. 2. lib. 4. temperatus ergo eli-
gitur aer, ut neque impensè calidus, aut frigidus sit: verum si causa fuerit frigida,
parum ad calidum inclinet; si calida, parum ad frigidum. Caueant uentos, cum
austrinos, tum aquilonios, vitentque somnum longiorem, & diurnum, mode-
ratus

ratus tamen in nocte confert; procurandumq; erit, vt singulis diebus alui excrementa excernantur, si non natura, saltem arte, balanos, aut clysteres adhibendo, abstineantq; ægri ab immodicis animi affectibus. Cibis vtantur concoctu facilibus, & boni succi cum frigidis aliquatenus, aut calfacientibus leniter permittis, prout diuersa exigit dispositio. Sorbitiones tamen maximè profunt, vt inquit Paulus aut amyllum p̄isana oua, sorbilia, panis in aqua cum amygdalarum succo decoctus, aut cum pini fructibus, in causa frigida. Ac ius vero caseum tenerum, ac recentem, tanquam utilem, comestum commendat; & in frigida causa cauliculos brassicæ, ipsarumq; brassicā, coctos, & comestos: nec minus si à ieiunis ipsimet cauliculi crudi edantur, butyrum quoq; eis vtile existit, & quibusdā robustioribus porri quoq; probè cocti, potissimum in raucedine. In causa vero calida lactucæ cauliculos parumper feruifectos comedant, etiam si in posca ipsos intingant: poterunt quoque vti pane dulciario confecto ex amygdalis ipsis, & saccharo, aut ex pini fructibus, & saccharo confectis, si ex frigida causa ortum habeat defluxus; caueant vaporosos cibos, vt capas, allia, sinapi, ac reliquos. Prædictorum autem ciborum quantitas, præterquam quod moderata perpetuo esse debeat, minor tamen in cæna, quam in prandio sit, & post cibum neque legant, neque scribant, Celso auctore cap. 5. lib. 1. pro potu deuitent vinum; loco cuius aqua ordeï in calido defluxu, aut aqua, in qua parum radicis clycyrrhyzæ, seu cinnamomi fuerit decoctum, si ex frigida vtantur, aut radicis glycyrrhyzæ decocto, vel ipsamet radicem dulcem cum cinnamomo, in frigida, seu cum hordeo in calida fluxione decoquant. Poterunt quoque qui ex frigiditate defluxu corripiuntur, aqua malsa pro potu vti, aut aquoso vino ipsius vero potus quantitas sit exigua, nam procurata sitis multum confert, vt Theodorus Priscianus inquit lib. 2. ad Timotheum. cap. 7. quo vero ad medicamentorum rationem attineat, ex Gale. sententia 6. de sanitate tuenda. in quouis defluxu ex capite ad subiectas partes, capiti saltem prospiciendum est, ipsumque sanandum, veluti mali fontem, ac firmandum modo liceat, etenim origo, & principium catarrhi è capite nascitur, eodem Theodoro Prisciano teste. Qua de re si ab ipsa caliditate sincera, aut ex frigidi tate fluxiones contingerint, & nulla alia facultate participauerint, sic sanè sedabuntur, vt inquit Hippocrates lib. de veteri medicina, vbi ex frigido in calidum permutatæ fuerint, & ex calido in frigidum. Vbi itaque calida præpolleat intemperies, ijs pugnandum est præsidij quæ dolori capitis ex tali causa contracto conueniunt, præstatq; æstatis tempore eorum caput rosaceo perungi potissimum omphacino; frequentique balneo potabilis aquæ ægros fouere oportet, quo & calidos vapores, qui in capite sunt, euocemus, & totum capitis temperamentum melius reddamus Gale no teste, eodem 6. de sanitate tuenda, ipsumq; caput copiosiore aqua calida, moderatè tamen perfundendum erit, vt inquit Paulus: nec propterea Celso pugnabimus, qui protinus à balneo abstinendum præcipiebat; nanque aut sponte nascentes aquas interdicebat, vel in frigida intemperie circa initia ipsum prohibeat. At si frigida intemperies caput infestet, calefacientibus, iuxta præallegatam Hippocratis sententiam, fluxio sedabitur, in calidum intemperie permutata: caput itaq; nardino, rutaceoq; oleo perungi debet, Paulo teste, irinum vero non solum illinitur, sed etiam naribus instillatur, vel chamæmelino, seu anethino vtare. Verum si nedum calida fuerit cerebri intemperies, sed calidi quoque in eo redundant succi, ac forte febris inuaserit, totius corporis plenitudine existente, sanguis mittendus erit ex externa cubiti vena, quæ humeralis dicitur, siquid eam non prohibeat, eaq; iteranda cubiti si opus fuerit, potius quam semel multam quantitatem sanguinis extrahere: at si quid eam prohibeat, redundantes humores alijs euacuationibus purgare, ac

Medicamentorum ratio.

Loco citato.

Si ex calida cerebri intemperie fiat, curatio

Cap. 6.

Si ex frigida,

Si ex calidorū succorum redundantia fiat, curatio. Venæ sectio.

Purgatio.

deorsum trahere oportet, clysterijs videlicet, cucurbitulis, frictionibus, ac purgantibus medicamentis: prius tamen quam ea tribuantur, concoqui ac temperari calidorum humorum acrimonia debet, ac eorum intemperantia: indigent enim hoc omnes fluxiones, quæ ex humorum acrimonia fiunt, teste Hip: præcitato loco. Temperantur autem si syrupum violaceum, rosaceum, ex nymphæa, papauere, aut ex cannis tribuas cum aqua hordei, aut decocto radicis glycyrrhizæ, seu borraginis. Tribuas verò vnc. j. & s. vel ij. ex prædictorum syruporum aliquo cum vnc. iij. ex aliqua prædictarum aquarum: quibus pluries assumptis purgare poteris ægrum ex cassia fistula, seu manna vnc. ij. videlicet cassia fistulæ, aut ij. vel iij. ipsius manæ; & si videbitur addere poteris vnc. s. seu 3. vij. antidoti diacharotico, aut decoctum trochiscati agarici 3. j. vel scrup. iij. capitisq; demum applicentur ea topica medicamenta, quæ in capite de dolore capitis commemorata sunt, balneis item dulcis aquæ, ac reliquis, quæ supra in calida intemperie approbauimus, vtendum; & cum somnum ingreditur, diacodium ore contineat, sæpiusq; eo vtantur etiam, si vigilet, poterisq; eum in tabellis conficere, velut Neapoli vtimur, præsertim his, qui liquidum medicamentum ipsum sumere abhorrent; somnum etenim dulcem infert, & reprimat influxum, vt inquit Aetius. Frigido autem redundante humore, præsertim in capite, per ea, quæ talem purgant medicamenta, corpus, & caput vacuabis: in quem usum conferunt acres clysteres, prius tamen quam purgantia tribuas medicamenta, ex rosaceo melle, syrupo de glycyrrhiza, aut de hyssopo, iuiubino, aut ex succo borraginis, præparari, ac concoqui redundans succus debet, cum aqua betonicæ, aut sampfuci, & demum pilulis ex hiera & agarico confectis euacuari, aut ex pilulis arabicis, aureis, & interdum cochiis, ac similibus, post quas (si videbitur) unc. ij. aut parum plus, vel minus roridi mellis, aut syrupi ex pluribus infus. rosarum exhibe. Idoneum quoque erit, post vniuersalem purgationem medicamentum, quod pituitam per os educat, præbere, ac à capite cucurbitulis, frictionibus, seu vinculis humores retrahere, ipsumq; prædictis calidis oleis irrigari. Item sacculi capiti ipsi admouendi sunt, qui taliter componantur. Recipe hyssopi, sampfuci, florum chamæmeli, meliloti, ana 3. j. & s. florum stœcadis, spicæ, singulorum scrup. j. mastiches, ligni aloes, maceris, cuiusque 3. s. rosarum aridarum 3. iij. terantur singula, & in sericum, seu tenuem linteum lineum immittantur, sacculusq; formetur, & coronali futuræ imponatur, quo etiam loco sinapismus, aut igneum cauterium (vbi diuturnior fuerit affectio) vtiliter adhiberi poterit. In utroque item defluxu ex calida, aut frigida intemperie orto, suffimenta adhibere conuenit, si ex calida intemperie fiat, paretur vt infra. Recipe manna, seu corticis thuris, ladani, mastiches, singulorum scrup. s. santalorum rubeorum, & luteorum, & corallorum rubeorum ana 3. i. rosarum rubeorum, siccarum, incompletarum 3. iij. fiat puluis, & (vbi vsus exigat) carbonibus ignitis inspergatur: frigida vero existente cerebri intemperie, hoc modo suffimentum paretur, maceris, ligni aloes, spicæ mastiches, corticum, seu manne thuris, singulorum excipe scrup. s. hyssopi, & sampfuci sicce ana scrup. i. ladani 3. i. florum stœcadis, & gariophyllorum 3. s. rosarum rubeorum siccarum 3. ii. vel iii. paretur puluis, & modo iam dicto vtare. Particulatim vero (vbi ad nares fluxio decumbat, si calida ea fuerit) conuenit ex aqua tepida per nares vaporem excipere; aut ex maluarum, hordei violarumq; & florum chamæmeli decocto; frigida aut fluxione existere, ex sampfuci, hyssopi, serpylli, betonicæ, pulegij, seu betæ decocto excipiendus vapor erit. Ex eisdem quoque caput purgia fiant, quæ insuper parari poterunt ex his, quæ cap: de dolore capitis commemorauimus: verum nequaquam fieri debent, nisi prius purgatum fuerit corpus, ac iam dictis medicamentis caput firmatum, aut saltem ipsi prospectum; melanchii quoque

Topica.

Si ex frigidorum
humorum redun-
dantia fiat, ca-
ratio.

Purgatio.

Topica.

Suffit us.

Si ad nares de-
fluat.

quoque, seu cumini vsti odorem suscipere commendavit Paulus, frigida præsertim fluxione existente: nec minus confert pulegium odorare: demittantur autem singula in serico, aut lineo linteo. Si vero in os defluat calida fluxio, ex aqua hordei, violarum, aut maluarum decocto, cum glycyrrhizæ radice oris collutio fiat, frigida autem existente fluxione ex hyssopi, pulegii, sampsaci, ac aridarum ficuum decocto colluatur os. priuatim etiam & ipsi raucitati conferunt compositiones, quæ sub lingua tenentur ὑπογλωττιδαι Græci appellant, quo paulatim eis liquefcentibus, asperæ arteriæ summū, id quod ipsum defluit, suscipiat, paulatim etiam relaxatis musculis ipsius gutturis.

Hoc autem ex industria fieri oportet, ne tussis excitetur, fiet autem si spinus cubet, iuxta Galeni sententiam 4. & 5. meth. med. ac 7. de compositione medicamentorum secundum loc. Talia sunt pilulæ, bechicæ dictæ, ac ea compositio, quam Neapoli alufam vocamus. Conficitur autem ex amylo, tragacantha, amygdalis dulcibus, seu ipsarum oleo, & saccharo: poterit quoque hæc compositio in tabellis formari, nec minus & id pharmacum sub lingua tenendum erit; quod loch. de papauere nominant, si à causa calida raucitas fiat; & si a frigida, loch. quod sanum, aut illud, quod de pino appellant. Sæpius quoque veluti lambendo, diutissimè tamen in ore tenens sensim, ac paulatim deglutiendo, assumat ex syrupo de cannis, aut ex dulcibus malis puniceis, ex adianto, glycyrrhiza, seu hyssopo, aut ex decocto, quod ex hordeo, radice dulci, vua passa, caricis, adianto, & hyssopo paratum sit, saccharum addendo, aut mel, si frigida fuerit causa. Præstat item) ex Galeni sententia eodem 7. lib. de compositione medicamentorum secundum loc.) glycyrrhizæ decoctum cum sapa admixtum: & si magis discutere, & extegere velis, caricarum decocto vtaris per se, aut cum aqua hordei, vel cum in aqua radix dulcis fuerit decocta. Reliqua, quæ pro curatione raucedinis conducunt, inferius requiras, cap. de tussi, priuatim autem valde confert, si ipsa glycyrrhizæ radix, aut eiusdem succus sub lingua teneatur.

Si in os defluat

Raucitati conferentia.

4. meth. c. vii. in medio.

5. meth. c. 2. in prin.

7. de comp. med. dica. sec. loc.

Cap. 1.

Cap. 1. post me.

περὶ φλεγμονῆς καὶ ονίδος.

De inflammatione gurgulionis. Cap. 44.

Inflammatum sæpenumero pars quædam, quæ circa os continetur carnosâ in summo, siquidem ore dependens, tanquam aliquod vocis plectrum, existens, Paulo auctore lib. 6. cap. 3. i. apparebit autem ea, si quis aperto plurimum ore toto, linguam deprimat: hanc ipsam carunculâ veteres Græci) vt inquit Galenus 6. de compositione medicamentorum secundum loc.) duobus nominibus appellare consueuerunt. Nominant nanque interim γάργαρα, interim vero κλωνία, quod a latinis gurgulio, & columna dicitur: a posterioribus autem medicis fere omnibus Græcis (vt ipse asserit) κλωνία, id est, columella, vocatur: quod si quidam sint, qui γάργαρα, id est, vnam ipsam nuncupent, eorum meminisse non præstat: nam non particula ipsa, sed vna aliqua eis affectio γάργαρα, hoc est, vua nominatur, cum scilicet vux acino simile summum gurgulionis appareat, vt inquit Aetius cap. 40. lib. 8. hanc etiam solam gurgulionis inflammationis speciem Hip. vnam appellat, vt liquet apud Gal. lib. de tumor. præter naturam in fine. Fit autem vua cum pituita de capite ad gurgulionem descenderit, & gurgulio præces dependet, ac fit rubicundus, eodem Hip. auctore lib. 2. de morb. temporis autem progressu nigrescit: & eodem libro dicebat, vnam fieri, cum summa gurgulionis pars aqua impletur, & rotunda sit ac perlucida, & spirationem intercipit: quanquam raro

Cap. 3. in prin.

Dux differentia inflammationis gurgulionis.

Circa principia.

Pars affecta.

Affectus.

Cause.

6. de san. tuen.
cap. 9. in prin.
3. de caus. sym.
Cap. 4.

Prognostica,

Tex. 26.

Curatio.

Vitus ratio.

Cap. 4.

Medicamento-
rum ratio.

Loco citato;

Venæ sectio.

Diversiones.

Purgatio.

(vt testatur Gale. præcitato lib. 6 de compositione medicamentorum secundum loc.) hæc affectio circa columellam contingat, sed valde sæpe inflammatur, quemadmodum etiam & raro alia quædam affectio, quam lorum vocant, circa gurgulionem etiam accidit, cum videlicet nimium ignitus gurgulio ipse gracilescit, & loro similis propendit, vt inquit Aetius, vtrunque autem nomen (vt Paulus refert præcitato loco) à similitudine factum est: nam si longior, tenuisque fuerit, columella nuncupatur, si vero crassior in rotunditatem creuerit, feraturque deorsum, vna dicitur. Inflammato itaque gurgulio, quomodolibet aperto plurimum ore toto (vt diximus) si quis linguam deprimat, eam partem affectam esse visu diiudicabit, nulloque alio indigebit signo. Quod verò ea affectio inflammatio sit, morbum siquidem in compositione primo (vt sæpe diximus) ex dolore, tumore, & rubedine ipsius collumelle, cum febre, ac deglutiendi difficultate diiudicabitur. Prouenit autem affectus hic, cum ex capite ad gurgulionem ipsum fluxio deferretur, quemadmodum 6. de sanitate tuenda, & 3. de caus. sympt. liquet: hæc inquam fluxio cum sanguinis, tum aliorum humorum à capite descendentium fieri poterit, verum quo pacto id discerni queat, præcedenti cap. fusius ostendimus: quare vt hic iterum repetamus superuacaneum duximus. Inflammato gurgulione ac in tumorem aucto, nitendum erit omnibus moliminibus, præter chirurgiam, ipsum curare, ac extenuare, Hipp. auctore 3. prog. nam quoad rubidus magnusque fuerit gurgulio cum periculo secatur, & scarificatur: & cum talem scarificationem, seu sectionem sanguinis fluor, & inflammatio comitabitur, eodem Hipp. ac Galeno auctoribus, præcitato loco. Quod si interdum chirurgia vti oporteat, cum videlicet, pars gurgulionis summa maior, ac linidata, seu orbiculata fuerit, superior vero tenuior, quem affectum (vt diximus) vnam appellat; vbi aluum subduxeris præstabit manus admolari, vt ipsi met testantur, ne æger stranguletur, potissimum vbi aliis adhibitis medicamentis malum non cedat: nam neque in prædicta affectione ad eius excisionem festinandum erit: quapropter vna vehemens inflammatio terrere quoque debet, Celso auctore libr. 6. capi. 14. quò sit, vt in hac affectione abstinencia necessaria sit, vt ipse inquit. Conuenit vero eadem fere victus ratio, quæ in reliquis inflammationibus, potissimum autem in principio, conducit quies, & inedia, vt 6. de compositione medicamentorum secund. loc. Archigenis auctoritate, testatur Galenus. Quo verò ad curandi rationem attinet, vbi vniuersum corpus humorum multitudine fuerit refertum, aut eorundem malitia vitiatum; tum priusquam ad localia remedia perueniamus, venæ sectio, aut purgatio administranda erit; acresque clysteres adhibendi, vt & vniuersum corpus euacuetur, humorumque mouentum, qui ad affectam partem feruntur, transferatur: hoc nanque & rationabile est, & multa experientia indicatum, ac cognitum, vt testis est Galenus, eodem lib. 6. de compositione medicamentorum secund. loc. qua etiam ratione Celsus dicebat, quòd & sanguis rectè mittitur, & si id aliqua res prohibeat, alius vtiliter ducitur. Si itaque corporis plenitudo adsit, vena cubiti statim secanda erit (si nihil prohibeat) media, aut externa, prout maior, aut minor fuerit corporis plenitudo. cucurbitæque cum scarificatione ceruici affigendæ: & si his nec cedat affectio, venæ sub lingua secantur, eiusdem Archigenis decreto: alius præterea aeri clystere, aut glande subducenda erit reuulsionis nedum euacuationis gratia: in quæ etiam vsum frictionibus, ac vinculis extemarum partium, cucurbitulisque cum iuxta scapulas, tum iuxta nates vtare. Vitiatis vero humoribus redudantibus qualiscunque is fuerit, purgandus erit: & si simul cum sanguine fluxerit, nec alienum erit ante purgationem (reuulsionis saltem gratia) humeralem venam in cubito secare, paucamque sanguinis copiam extrahere, ac demum purgationem adhibere

adhibere, concoctis tamen ac præparatis redundantibus succis, si dabitur occasio, quo etiam tempore clysteribus uti poteris. Sit autem purgans medicamentum non validum, sed leniendo vacuans, veluti manna, casia fistula, syrumpus ex pluribus infusion. rosarum, aut violarum, cum quibus interim antidotum diacatholicon permisceas, præsertim si redundans succus, aut corporis natura eius, qui purgari debeat, id exigat. His autem peractis, aut si neutrum prædictorum adsit, statim ad curationem per localia remedia peruenire debemus, quæ eius naturæ esse debent, ut fluxionem reprimant; quemadmodum in alijs omnibus morbis, qui ex humorum influxu contingunt. Sint igitur adstringentis facultatis, & si quidem moderatus sit influxus moderate adstringentis, quæ, austera priuatim dicuntur: ubi verò vehementior fuerit influxus vehementioris adstrictionis, quæ acerbæ nominantur: ambo enim adstringunt, sed debilius austera, vementius autem acerbæ, ut patet quarto de simp. med. facult. & sexto de compositione medicamentorum secundum loc. Collutiones itaque moderate, si quem moderatus fuerit influxus ex palmulis decoctis, quandoque sola aqua, quandoque modico melle incocto, vel ex rosarum decocto, pampinorum vitis, rubi, cytinorum, siliquarum, radicum minori, & malorum austeriorum, ac pyrorum, sorborum, interim cypri parari poterunt. Fortiores vero (ubi vehementior fuerit influxus) sunt, myrri, & baccarum eius decoctum, & ex acerbis cotoneis malis, aut virgularum tenerorum ilicis, arbuti, similacis, & vniuersi quercini generis, similiterq; & glandium, mespilorum item, & cornorum decoctum: at generosissimum est gallarum decoctum, rhois culinarij, ac curiarij, myricæ fructus, vtriusque mali punici floris, & putaminis: horum itaque vnumquodque & singulatim, & cum alijs decoctum in aqua gargarizandum exhibere oportet, iuxta Galen. sententiam sexto de compositione medicamentorum secundum loc. & Aetii præcitato loco: quin iuxta eorundem decreta, aridis quoque tritis columellam contingere opus est, ita ut summissæ, & paulatim ad superiorem, & extrinsecam regionem afferantur, & per cochleare, aut specilli concauum supra linguam immittantur: ex his ipsis modetata quidem sunt rosæ, & flos ipsarum, & prædictarum plantarum germina exsiccata, ac hypocistis, & omphacium siccum. Et si frigidior fuerit fluxio, aloe, cyperus, & iunci rotundi odorati flos, ac rheon ponticum confert: pariter si fortioribus indigeas, rhus obsoniorum, siue culinarij conducit, balauustum, cytini, malicorium, galla, & magis exacte cum omphacitis fuerit: nec minus conferunt hypocistidis, vix acerbæ, ac glycyrrhizæ succi, ad solem æstiuum exsiccati, adeo ut conteri queant. Vbi vero gurgulio à nimium adstringentibus remedijs compressus fuerit, tragacantho, sarcocolla, & amylo vtendum erit. At ubi generatus affectus in gurgulione maiorem habuerit causam, impossibile erit ipsum per repulsoria perfecte sanare, ut inquit Galenus, maxime ubi ægri corpus fuerit humoribus multis refertum, aut particula affecta natura debilis ob id igitur cogimur, sæpe quidem in principio, sæpius vero paulo post admiscere quippiam ex discussorijs, & si dolor affuerit simul vehemens etiam ex mitigatorijs. itaque tunc opus est vnicuique prædictorum pharmacorum aliquid ex discussorijs addere: & cum hæc omnino multa sint, a mollioribus auspicandum erit: ab actibus namque inflammata exacerbantur, cuius farinae sunt chamæmeli flores, foenum græcum, fertula campana, anethum, althææ radix iridis, mel, erui farina, thus, aut myrrha: & si mitigatorijs hoc tempore indigeas ex contusa radice dulci, melle, & dulci aqua pari mensura simul coctis, medicamentum paratum cum prædictis admisceas, aut id solum gargarizandum præbeto. Cæterum tu perspecta (ut Galenus inquit) inflammationis magnitudine, ac caliditate, & considerata influxus quantitate, ampliusque copiam

Topica quæ cōperant.

4. de sim. facult. cap. 7.

6. de comp. sim. med. secundum loc. cap. 3.

Loco citato.

Capit. 6. 7. & 8.

De laxata co-
lumella,

Leco citato,

Cap. 53.

humorum in toto corpore per coniecturam affecutus, pharmaco, in quo aut adstringentium, aut discutientium vis excellit, vteris. Procedente autem tempore, vbi iam dictis inflammatio non cesserit, discutioria medicamenta tuto adhiberi possunt nisi ad duritiem vertatur ipsa gurgulionis inflammatio: nam tunc emollientibus medicamentis vtendum esset, quæ cuius naturæ esse debeant lib. quinto simplic. medicamentorum facul. requiras: cuiusmodi sunt radix & folia althææ, semen lini, fœnum græcum, & alia huiusmodi, è quibus gargarismata parari possunt. admiscere eis item poteris hyssopum, aut glycyrrhizam. Verum si ad suppurationem inflammatio vergat, mitioribus collutionibus, & gargarismis, eisque concoquentibus vtendum erit: quo casu præstat decoctum ex caricis per se solum, aut aqua mulsa permistum, seu sapa, aut pti sanæ succus, in quo vix passæ sint incoctæ: radicis insuper [dulcis decoctum, aut furfurum lotura calida, id quod in reliquis omnibus seruandum erit medicamentis, vt temperate calida sint. Ea vero suppurata, post puris eruptionem extergentibus, & desiccantibus medicamentis curari debet, aqua hordeicum melle rosaceo mista, aut aqua mulsa, & reliquis huiusmodi. Euenit etiam aliquando, vt citra inflammationem nimium humectus gurgulio laxior fiat, & propterea linguæ radici, ac faucibus propensus incumbat, quemadmodum in destillationibus continuis contingit, Aetio auctore; quam affectionem Græci γαργαρεῖν χαλαρόν, Latini laxatam columellam, barbari casum vix appellant, quæ affectio quoniam eandem curandi rationem postulat, quæ eius exigit inflammatio, propterea seorsum de ea pertractare nolimus. Pro ratione itaque confluentis succi venæ sectio, aut purgatio præcipiatur, quibus corpus totum, ac caput primo vacuetur. His tandem peractis, collutionibus, gargarismis, ac reliquis medicamentis aridis superius descriptis vtaris, adstringentibus scilicet, & exsiccantibus. Priuatim autem (vbi subalbidus, & exanguior gurgulio sit) ex origani triti in aqua, & aceto decocti, ac caricarum cremore misto ac gargarizandum vtitor: aut loco origani, hyssopo vtare. apium quoque, & laur. folia trita, & vino, aut lentis decocto diluta, gargarizato, Apollonio auctore. Arida quoque medicamenta parabis ex gallæ omphacitidis, aluminis scissi, ac salis ammoniaci partibus æqualibus, quibus tritis, ac simul mistis expleto cochleari vnam contingito: hoc autem velut validissimo medicamento vtare, repellendi, ac discutiendi vim habente, iuxta Galeni sententiam eodem sexto de compositione medicamentorum secundum locos. puluis autem, quo vtimur nos, hic est. Recipe piperis, cinnamomi singulorum scrup. s. corticum thuris, & gallarum ana scrup. i. rosarum rubearum siccarum drac. ii. conterantur, simulque, & modo quo supra vtare. His qui casum vulæ patiuntur sic subuenimus, inquit Trotula, puluerem zingiberis, pyrethri, & cinnamomi decoquimus in vino, & facimus gargarizare, & puluerem horum calidum vulæ apponimus, tu autem vtare hoc medicamento, vbi ex pituita fuerit laxatus gurgulio. Marcellus autem libr. de medicamentis capi. decimo quarto brassicæ crudæ folium leuissime tritum commendat, ex eo vero succum exprimito, quo vix contacta potenter subleuatur. Cinis itē testarum ex ostreis, aut hirundinum exustarum cinis tenuissime contritus, cū melle mistus, vix illitus prodest; similiter si rosæ siccæ part. ii. & myrti parte i. cum aqua mulsa decoquas, & gargarizandum præbeas. Denique nonnulla medicamenta, præsertim compolita consulto hic scribere prætermisimus, pro cura præsertim inflammationis columellæ, quæ cap. de angina studiosi requirant. Verum vbi cunctis iam dictis auxiliis gurgulionis malum non cedat, tam si oblongior, tenuisque præter naturam fuerit, quàm si in rotunditatem creuerit, eius summo vix acino simili existente, ne continuo irritetur tussis, vigilæ, interim etiam strangulatus subsequatur (vt inquit Paulus cap.

31. lib. 6. (is excidendus erit, modo quo ipse præcipit præcitato loco, ac Aetius cap. 41. lib. 8. neque tamen festinandum erit ad eius excisionem (vt diximus) Hippocratis auctoritate lib. 3. prognost. & Galeni 14. meth. med. iis obseruatis, quæ tum ipse, tum etiam cum eo Galenus, eodem loco præcipiunt.

3. prog. text. 26.
14. meth. c. 23.

περί ἀντιάδων φλεγμονῆς.

Deglandularum infra linguam inflammatione.

Cap.

45.

OMNIBVS hominibus carunculæ quædam exiguæ naturales ex aduerso in oris termino vtrinque iacent, Galeno teste tertio de caus. sympto. has Græci ἀντιάδας (vt Aetius refert cap. 48. lib. 8.) latini glandulas barbaram sectantes medicinam amygdalas appellant: quamuis Galenus non partes ipsas verum cum ipsæ è defluxu, præsertim ex capite, tumore, aut inflammatione afficiantur ἀντιάδας præcitato loco nuncupauit: Paulus autem per ἀντιάδας, tum libr. 6. cap. 30. tum libro tertij, cap. 26. scirrhum tumorem paristhmiorum intelligit. Si vero in contiguas his partes fluxio decumbat, seu inflammatio excitetur παρισθμια, tū præcitato loco tum commento aphor. 26. 3. libr. idem Galenus appellauit, dum asseruit παρισθμια (quæ latinè tonsillas vertunt) inflammationes esse locorum ad histmum artium: intelligit autem per isthmum partem illam quæ os, & gulam interiacet: nominatur autem ita per methaphoram quadam ab his, qui proprie dicuntur isthmi, qui angusti quidam terre transitus sunt, sitæ inter duo maria, hæ autem inflammationes nonnunquam solius tunicæ sunt, ventri, gulæ, faucibus, totique ori communis: nonnunquam vero vt idem inquit Galenus præcitato loco) & subiectorum ipsi musculorum: quamuis has partes & non eorum inflammationem, tum Paulus libr. tertio, cap. 26. tum Aetius lib. octauo, cap. 45. παρισθμια vocant & latini tonsillas vertunt, Celsus forte putantes imitari, qui libro sexto, cap. decimo. postquam de dentium dolore caput exegisset, de tonsillis, ac earum cura pertractat: At nunquid per tonsillas, id quod Græci παρισθμια dicunt, partes quasdam intelligentes, subaudire velit, aut quas ἀντιάδας nuncupant, siue vtrasque, ex eiusdem Celsi verbis haudquam percipi poterit, cum dixit. Si vero tonsillæ sine exulceratione per inflammationem intumuerunt &c. Nos autem cum Galeno, quicquid alij sentiant, per ἀντιάδας glandularum, quæ sibi ex aduerso in oris termino vtrinque iacent, præter naturam tumorem, seu inflammationem intelligi volumus, per παρισθμια vero, cum contiguæ his partes tale quippiam perpetiantur, à partibus ipsis affectis affectiones prædictæ fortasse talem nomenclaturam suscipientes. deducto itaque ore manifestè (vt inquit Aetius) apparent glandularum tumores maiores, citra quidem inflammationem earum substantia concolores, Vbi verò inflammatae fuerint, rubicundæ apparent, ac dolorem inferunt. Si verò partes eis proximè inflammentur, accidit ita affectis difficultas transgluciendo, dolor, aliquando etiam & febris, eodem Aetio auctore, velut etiam glandulis ipsis inflammatis, nedum transglutitionis, verum etiam & spirationis difficultas aderit: ex quibusmet indicatijs, & earundem partium inflammatio percipi poterit. Quæ quisnam morbus sit, non semel duntaxat in præcedentibus diximus, nec opus erit eiusdem inflammationis causas iterum repetere, cum similes esse poterunt cum his, quæ gurgulionis inflammationem efficiunt: priuatim autem (vt refert Aetius) in modò dictis partibus inflammatio excitatur, παρισθμια præsertim infantibus adhuc lactentibus, ex haustu lactis, pueris propterea quòd multo cibo se

Cap. 4. in prin.

ἀντιάδας
quid sint.
παρισθμια
quid.
Lib. 8. c. 48.

Partes affectæ.
Lib. 8. c. 45.

Affectus.
Causæ.

Loco citato.

Prognostica
Eodem loco.

Curatio.

Victus ratio.
Loco citato.

Medicamento-
rum ratio.

Animaduersio
circa topica ad-
hibenda.

Vene sectio qui-
bus competat.

Purgatio.

Topica.

explent, reliquis autem hominibus plerunque euenit à nimia meri potione, & à multa, ac audiore deuoratione ciborum, maximè acrium, & asperorum; frequentissimè nanque (vt idem testatur Aetius) *παιδοφύλα*, quæ tonsillas vocant, cum partes sint calidæ, & humidæ inflammationem incurrunt, quæ etiam affectione magis arripiuntur hi, qui plurimo sanguine abundant, nec non infantes, & pueri, vtpote teneram habentes misturam, id quod Hippocrates, præsertim in pueris confirmavit, aphor. 26. tertij libr. quoniam uerò tam *ἀντιφύλα*, quàm *παιδοφύλα* dictæ, eandem ferè curationem exigunt, ac similem victus rationem requirunt, non ab re propterea vtranque inflammationum communem curationem hic conscripsimus. Incipiente itaque inflammatione cibum subtrahere oportet, vt inquit Aetius, qui vero offeruntur, modici sint sorbiles: & ventri commodicibus quoque in hac valetudine (Celfo auctore) lenis esse debet, ne ex asperet. verum vbi tanta sit inflammatio, vt spiritum impediat, à cibo (vt ipse inquit) abstinendum, neque adsumendum quicquam præter aquam calidam est, exhibendus itaque his est aquæ potus, præsertim febre simul irruente, aut aqua hordei, seu ea aqua in qua coriandrorum præpararorum semina fuerint decocta, aut etiam cinnamomi exiguum (& vt vno verbo dicam) ea victus ratio instituenda erit, quæ & in reliquis inflammationibus. Quod si leuis fuerit inflammatio, circa initia gargarismi adhibendi sunt adstringentes, & repellentes, id quod præcipiebat Celsus, cum dicebat, gargarizandumq; est ex reprimentibus, velut est rosarum, aut palmarum decoctum, myxæ, aut lenticulæ, aut ipsius etiam fursuris ac reliquorum, quæ in principio inflammati gurgulionis assumunt: cauendum tamen, ne mel in principio ad gargarismos adiciamus, ne per acrimoniam malum irriteremus, vt Aetius inquit. Remittente autem inflammatione, & decrescente, mel in gargarismos admiscere conuenit, eodem Aetio, & Paulo testibus: quo etiam tempore calidiores gargarismi prosunt, quanquam etiam circa initia medicamenta actu tepida exhibenda sunt, frigus enim non tolerant inflammata, sicut neque plurimum calorem; vt testatur Aetius. Vbi verò vehemens fuerit inflammatio, adeo vt periculum suffocationis suspectum sit, priusquam adstringentia medicamenta adhibeantur, vena cubiti incidenda est, præcepto Aetij, repetitia etiam sanguinis detractio, maximè si iuuenis sit æger, & multo sanguine abundet. Vena autem incidenda erit externa, aut si multo sanguine totum corpus fuerit refertum, media primum, & deinde externa. Et si venter non probè egerat, iniiciendus est clyster, aut glande immissa irritare oportet: nec absolum erit si cum sanguine calidi, ac vitiosi succi redundarint, præsertim si febris ad sit, purgante medicamento vti, quod leniendo purget, quemadmodum præcedenti cap. præcepimus. Post euacuationem reprimentibus quoque vtendum est medicamenti, superius iam dictis, deinde ptisanæ succum, in quo decoctæ sint vixæ passæ, gargarizent, aut calidam fursurum decoctionem, aut sapam tepesactam; vel decoctum radicis dulcis, aut ficum, & hisopi decoctum extrinsecus autem leniter fouere conuenit spongijs expressis, ac madidis in aqua, in qua flores chamæmeli, althææ, maluarum folia, fœnum græcum, seu fertula campana fuerint decocta. Cataplasmata quoque imponenda sunt ex farina hordei, seminis lini, aut fœni græci, aut his simul mistis. verum si ex vlu acriorum collutionum, seu gargarismorum inflammatio ex asperetur, & mordacitas inde accidat, Aetij decreto, leniores gargarismi colluendi sunt, qualis est succus ptisanæ tepidus, aut lac etiam tepidum: permanente verò, ac immorante diutius inflammatione, atque vbi tonsillæ ipsæ subrubri coloris fuerint, neque melius à prædictorum remediorum admotione habuerint, permutationem in pus expectare oportet: cito enim tonsillæ abscedunt, ex

Aetij

Aetij sententia. Dignosces autem (vt ipse inquit) quoniam inflammationis si gna augeantur, & acerbationes ad vesperam fiunt fortiores cum horrore, & inaequaliter aliquando etiam cum febre: quae hoc tempore coadiuuare oportet, vt quam citissime suppuratio fiat, exhibeantur propterea gargarismi calidiores, velut aqua mulsa calida, & decoctum caricarum, ac hyssopi cum radice dulci. Extrinsecus vero cataplasma imponatur, ex eisdem Aetij sententia, ex hordeacea farina, & foeno graeco cum decocto caricarum, & altæ, ac melle, aut vapor aquae calidae intrinsecus, sed aliquando diutius admouendus erit, donec ea suppurentur, & per se aperiantur, vt Celso visum est. Confecto autem pure dolores minuuntur, & inflammationis tumor mollior redditus digito cedit. Quare tunc (vt Aetius præcepit) acriores collutiones exhibendæ sunt, vt abcessus rumpantur: cuius generis sunt pulegium, hyssopum, thymum, calamintha, & thymbra in sapa, aut aqua mulsa decocta, & gargarizata. Si vero pure substante non rumpuntur, hi tumores ex Celsi decreto, iucidendi sunt, deinde ex mulso calido ad gargarizandū per se, postea etiam ad misto lenticulæ, vel rosarum decocto atque id faciendum, donec in totum soluantur, ac penitus ad cicatricē perducantur, ex Aetij, & Pauli sententia. Modico autem tumore existente, ac exulceratione, furfurum cremori, ad gargarizandum paulum mellis adiiciendum est, & vbi plurima vlcera sint, eodem furfurum cremore, vel lacte gargarizandum est, Celsi decreto. Modus autem sectionis, si non per se aperiantur, ac situationis ægri tum ante, tum post sectionem, ac patrato oponere, quæ conducant auxilia, ab Aetio cap. 45. & 48. libri octauī: & à Paulo ca. trigesimo, libri sexti describuntur. At si prædictis partibus crustosa, pestilentia, ac serpentina vlcera oboriantur, siue ex præcedente influxu, seu inflammatione, siue ex equalis alia causa fiat, nulla fluxione præcedente, seu præcedentibus aphthis, vt in pueris euenire consuevit aut nonnullis virginibus, circa vigoris ætatem mensium purgationem appetentibus, totius corporis curatione præmissa, ac reliquis diuersionibus, & iam dictis medicamentis adhibitis pro earum curatione. Priuatim (vt Paulus inquit) exhiberi debet medicamen diamoron ex aqua calida, vel aqua mulsa, quæ rosarum inspersarum florem obtineat, vel costum, vel rhus siccum, seu decoctum. Aetius autem gargarismos probat ex lenticulæ myxarum, ac palmarum, seu furfurum decocto cum melle, & ptisanæ succo: & post principium, hydromelitis iridem, costum, ac aristilochiam infarciendum præcipit, vel siccum pharmacum ex rhoe, flore rosarum, croco, & costo adhibendum: At paulus ex malo punico dulci cum cortice tuso succum exprimit, & eius partes sex assumit, quæ vni mellis mistæ coquuntur, donec eis mellis spissitudo sit, quo medicamentum perungi tonsillas præcipit. Similiter si partes duæ gallæ omphacitidis sumantur, aluminis una, & salis ammoniaci tostī tantundem, & aridum medicamentum ex eis apparatus a proximes. Verum vbi post acria, irritantia ue medicamenta, ægri dolorem sentiant cum radice dulcis decocto, amylo, seu tragacantho lenire oportet; & vbi vlcerum depastio constiterit, lacte gargarizandum erit, reliqua autem medicamenta à Paulo reliquas, præcitato cap. 26. lib. 4. & ab Aetio cap. 46. lib. 8.

Si abscedant
tonsillæ, signa.

Serpentium ul
cerum eodē lo
co ortorum, cu
ratio,

περι πυρρῶν.

De agnina.

Cap. 46.

NON procul à iam dictis partibus alterum morbi genus, si quod aliud quoque vitium acutissimum existit, vt Trallianus refert libr. quarto cap. primo, pestiferum, atque acutum vt Celsus inquit lib. 4. ca. quarto, quod quidem à veteribus medicis, vt pote ab Hippocrate πυρρῶν appellat, vt tertio prognost. liquet: quanquā idē affectus. 4. de ratione victus, siue Hippocratis sit, siue alterius auctoris, πυρρῶν nominetur, & πύρρον, ἢ πυρρῶν.

3. prog. tex. 21
4. de rat. vict.
tex. 30.

Alex. loco cita
to.

Pau. l. 3. c. 27.

4. de loc. affect.

c. 3. circa prin.

Anginæ differe
tiae quatuor,

4. de rat. uictus
com. 30.

Angina quid
sit.

Partes quæ affi
ciuntur,

Communia fi
gna.

Cels. loco cita
to.

Aet. lib. 8. c. 47.

Tex. 21.

Propria signa
cuiuslibet par
tis affectæ,

Cap. 3.

Affectus quis
sit angina.

Signa eiusdem.

Causæ.

Com. 30.

Com. 21. & 22.

ἡ στυνάρχη, hoc est, a suffocando dicta, a latinis angina. Posteriores autem Græci ut Alexander, & Paulus, ac quidem reliqui ante eos, quorum Galenus meminit, licet non nominatim quatuor de loc. affect. & commento aphor. 34. quarti lib. affectum hunc quadrifariam diuiserunt, prout quatuor diuersæ partes in eo affici possunt: nam internis gutturis musculis inflammationem patiētibus, *στυνάρχη*, externis vero *παρὰ στυνάρχη* nuncupant, pari modo interioribus faucium musculis inflammatis *στυνάρχη*, externis. vero *παρὰ στυνάρχη*, ab eisdem appellatur, ut idem Galenus testis est præcitatis locis, Paulus cap. 27. lib. tertii, & Trallianus præcitato loco. Verum quoniam, ut Galenus inquit eodem quarto de ratione victus in morbis acutis, ad curationem nominibus opus nobis non est: nam tum primum homines res ipsas neglexerunt, cum nimio studio nomina quærere inciperent. Propterea ad rem ipsam deuenientes dicimus, anginam inflammationem esse musculorum gutturis, aut faucium: per anginam, intelligentes omnes iam dictas inflammationes, tam ad guttur, quam ad fauces peruenientes per fauces internum oris locum, ubi simul gulæ, & gutturis partes extremæ conueniunt; per guttur vero eā asperæ arteriæ partem, quæ velut caput eius: musculos autem earundem partium voco, tam internos, quam externos. omnium prædictarum partium indicia communia sunt, Celsus, & Aetio testibus, transglutiendi tum cibi, tum potus difficultas, ac spiritus, ut Celsus inquit, eis includitur. Iuxta Galeni vero sententiam in cunctis spiratio quoquomodo deterior redditur, nullo existente vel in thorace, vel in pulmone vitio; qui in hoc, velut in reliquis, Hippocratem sectatur. Verum una pars cum afficitur, ab altera discerni poterit, velut magis, & minus transglutiendi difficultas, siue spirationis noxa fuerit, ac reliquis indiciis. Nam ubi interni musculi gutturis fuerint affecti, nihil coloris, caloris, & molis conspicuū erit, nec in ceruice, nec in faucibus, ut tertio prognost. testatur Hippoc. adeoque spirationis difficultas augetur, ut nisi recta ceruice trahatur aer, sensus quoque angustiae ac dolor plurimus in guttute erit, & febris non lenis: vox insuper simul cum spiratione læditur, ut patet quarto de loc. affect. Externis vero duntaxat ipsius gutturis musculis inflammatione patientibus, prædicta omnia aderunt, remisse tamen: nam neque angustiae sensus, neque dolor, licet circa guttur adsint, adeo vehementes erunt, pariter nec spirandi difficultas. At si dolor fere prædictis similis adsit, calorque, rubor, ac moles fauces offendant quæ omnia aperiendo os, ac linguam deorsum comprimendo, oculis cerni possunt, nec admodum difficulter spirent, fauces ipsas affectas esse iudicabis: interdum etiam lingua ipsa similiter cum faucibus coafficitur, quemadmodum ubi non solum fauces, sed ceruicem quoque rubor occupauerit, & forte pectus comprehenderit: nec vehementer ægri dolore affligantur, nec fere difficulter spirent, & extrinsecus partes circa fauces inflammatae cuilibet apparebunt, exteriores earum partes affectas esse nemo verebitur. At quæcunque prædictarum partium affecta sit, affectus ipse morbus erit in compositione primo, & prope in magnitudine, cum inflammatio sit: quem tum ex iam dictis, tum etiam ex dicendis indiciis, facile percipere valebis: namque æger nec cibum deuorare, nec potionem potest, difficulter spirat, potissimum ubi gutturis partes afficiantur, interim ore conuiuet quandoque eo aperto aerem trahit, febrisque sæpius aderit: accidit etiam eis potum assumptum quandoque ad nares reflecti: dolore quoque afficiuntur, & excedente interdum inflammatione, & lingua, fauces in tumorem attolluntur. Omnium autem prædictarum inflammationū ortus ex fluxione est, eius præcipue, quæ ex capite defertur, quemadmodum Galenus testatur quarto de ratione victus in morbis acutis: & quamuis fluxio hæc magna ex parte biliosior sit, eodem Galeno auctore tertio prognost. ita ut perspicue erysipelas,

las, aut inflammationem erysipelati similiorem committat : tamen eodem quarto de ratione victus in morbis acutis, ac quarto de caus. pulsuum, tum ex calida, acrique ac tenuis substantiæ humoris fluxione, tum etiam ex frigida, pituitosa, crassa, ac glutinosa prouenire posse fatetur : quod nequam negare visus est, eodem tertio prognost. & commento aphor. trigessimii quarti, libri quarti, quinimo acres, ac tenues fluxiones, propterea quod per angustiores venas facile penetrant : tales autem sunt (vt ipse refert) quæ guttur ambiunt, in ipsum potissimum decumber e ait. Contrarium autem in crassis, frigidis ac viscosis contingit, cum non ingrediantur vniuersas venas, quæ admodum strictæ sunt, incapacioribus detentæ, veluti ex sunt venæ, quæ in faucibus existunt latiores, quàm eæ quæ gutturis, in ipsis siquidem impactæ in præter naturam tumorem eas attollunt : ex quibus Galeni verbis li quidò constat, nedum anginas ex calidis succis, verum etiam frigidis oriri posse, ac potissimum vbi fauces inflammantur ex frigidis succi ortum habere, vbi vero gutturis partes ex calidioribus, ac tenuioribus. Verum quo pacto fluens redundans succus percipi valeat, aliis quoque notis ostendere conabimur : nanque gutturis musculis inflammatis si ex sanguine copioso conflante inflammatio exoritur, spirandi, ac deglutiendi difficultas maxima erit, maxima quoque angustia, & grauitas coniuncta erit, ac febris non exigua corpusque totum, ac caput plenum sanguine videbitur. Temperamentum, habitus, ætas, anni tempus, regio, ac aeris constitutio, præcedensque victus ratio sanguinis redundantiæ attestabuntur. Biliosa vero in prædictis musculis defluxione decumbente, quæ magna ex parte est, præter spirationis, & deglutionis difficultatem, quæ non adeò vehemens, vt in prædicta aderit, velut nec angustia, citrà fere grauitatem plurimum dolorem, ac intolerabile quoddam incendium circa guttur sentient ægri, morsum, acrimoniam, sitim, ac oris amaritudinem; simulque acuta febris aderit magis : nec minus temperamentum, ætas, & habitus, præcedensque victus ratio, ac reliqua redundantem bilem manifestabunt. At si circa fauces prædictorum humorum fluxio fiat, ex maiori mole, calore, diuersoque colore, præter iam dicta, vna ab altera secerni poterit : minor enim moles maiorque calor, ac rubor ad flauum inclinans in biliosa fluxione aderunt, velut maior moles. minorque calor, rubensque color ad opacum inclinans decumbentem sanguinem indicabunt. Quod si mixta fluxio fuerit ex vtrisque, & permixta quoque iam dicta indicia erunt : & pro vt magis, & minus alter reliquum superat, vincent quoque vnius, vel alterius indicia. At si frigidus, crassusque sanguis, ad prædictas confluat præsertim fauces, quas, potissimum (vt diximus Galeni auctoritate) infestari solet, paucus aderit dolor, tumor fere citrà ruborem, aut cum exiguo, & obscuro laxior quodammodo apparebit, licet interdum crassiori existente humore durus consistet, febris nulla aderit, aut forte exigua, & lenta. Corpus totum, ac præsertim caput pituitoso sanguine refertum erit, ac proinde temperamentum, ætas, habitus, tempus anni, præcedens victus ratio, ac reliqua id promptius indicabunt : cum omnia frigidi sanguinis ac pituitosi redundantiam attestentur. Verum præter iam dictas causas Hippocrates 2. de mor. vulg. & Galenus 4. de loc. affect. quos sectati sunt Paulus, & Aetius, ex luxatis ad anteriores partes ceruicis vertebra anginam ipsam oriri posse fatentur. Vnde cauus apparet locus, & cum extra attingitur, dolore afficitur, ut inquit Aetius, atque hæc species (vt ipse refert) proprie, *κρυάχ-α* à veteribus est appellata. In qua etiam lingua ex propriis locis excedit à luxata vertebra iuxta radicem suam impulsâ infestatque magis difficultas circa respirationem. Vnde coguntur aperto ore semper hiare, atque aerem attrahere, nec citrà suffocationis periculum (vt Galenus inquit 4. de loc. affect.) laborantes

4. de rat. uicibus
com. 30

4. de caus. puls.
c. 20. in medio.
Quod nedum ex
calida, sed ex
frigida quoque
fluxione fieri
possit angina.
3. prog com. 21
& 22.

Si ex sanguine
copioso fiat, si-
gna.

Si ex bile, si-
gna.

Si ex frigidiori
fiat sanguine
signa.

2. de morb. vulg.
sect. 2. post me.
4. de loc. affect.
c. 3. circa finem.

Loco citato
de morb. uul.
sect. 2. post me-
dum.
Cap. 3.

Cap. 9.
Loco citato.
Conciliantur
Galen. uerba, &
Aetius cum eo.

Citato loco.

Comit.

Prognostica.

Tex. 21.

Tex. 25.

borantes difficulter deglutiunt, atque dolore afficiuntur, idque præcipuè cum potus eis per nares refilit: hæc vero omnia, tum ex Hippo. secundo de morb. vulg. tum ex Galeno quarto de loc. affe. transcripsit Aetius, & hanc pro quarta anginae differentia connumerauit, cum vnam tantum posuerit circa fauces ortam, reliquam in internis gutturis musculis, alteram quoque ubi tam externi, quam interni gutturis musculi affecti fuerint: de qua etiam Galenus eodè quarto de loc. affe. quorundam auctoritate commemorat: licet commento aph. 34. lib. quarti, vnam dixerit inter quatuor anginae differentias ab aliquibus positas esse eam, in qua externi gutturis musculi affecti sunt, & non ubi gutturis partes, tam externæ, tum internæ similiter affectæ sunt, velut quatuor de loc. affe. asseruit. Verum dicimus nos primo Aetium non defecisse in narrandis anginae differentijs cap. 37. lib. octau. nam in prima differentia, quam posuit, ubi fauces fuerint inflammatae subintelligi potest, tã intus, quam extra: & sic πρὸς σπυδαίῃ non déreliquit. Secundo asserimus Galenum ex aliorum auctoritate, vnam anginae differentiam posuisse, ubi externi gutturis musculi fuerint affecti, aut externæ gutturis partes, vt commento aphor. 34. lib. quarti patet: nec propterea dictis suis pugnare videtur, cum quarto de loc. affe. fatentur quartam differentiam esse, ubi gutturis partes tum externæ, tum internæ, affectæ sunt: nam exteriorum primò meminit, quæ primò in eadem differentia afficiuntur: deinde si per consensum, magna siquidem fluxione existente, interiores quoque gutturis partes afficiuntur, non propterea non eadem erit differentia: cum ea in qua minori existente fluxione, externæ duntaxat gutturis partes inflammationem patiuntur. Cæterum eorum, qui anginam ex colli vertebri in anteriorem partem luxaris fieri perferunt, propterea vltimò loco mentionem fecimus, tum quoniam raro contingit affectio hæc, tum etiam quod in ea (vt primo prorrheticorum testatur Galenus) gutturis musculi inflammantur: nonnunquam etiam ii, qui gulam gutturis iungunt. Quare etiam inflàmatis quoque musculis oritur angina hæc, & propterea anginam omnè non immerito diximus esse inflàmationem, quæ in gutture, aut faucibus sit. Hæc inquam cum acutissimus affectus sit & statim mortem inducat, Tralliano auctore necesse est etiam protinus ad eis eius curationem festinare. Inter eas vero grauissima est ac celerrimè interimit, quæcunque nec in ceruice, nec in faucibus conspicuum aliquid efficit: hæc enim & eadem die, & 2 & 3. & 4. strangulant, vt inquit Hippocrates 3. prognost. nam cum in neutro prædictorum appareat aliquid præter naturam, existimandum est intra gutturis corpora laceßere inflammationem, ex qua strangulantur vt Galenus testatur, in prædictis textus Hippocratis expositione, de qua iterum aph. 34. 4. lib. sic scriptum reliquit. Si febrè habenti suffocatio repente superuenerit nullo tumore in faucibus existente, letale. At quæcunque dolorem similem prædictæ anginae infert, attollitur vero, ac ruborem in faucibus efficit, admodum quoque exitiosa est, sed paulò longior quam prædicta. Quibus verò fauces rubent, & ceruix hæc diuturnior est eodem Hippocrate auctore: maxime vero ex ea seruantur, si ceruix, ac pectus ruborè traxerit, neque ad interna reuertatur erysipelas, gutture siquidè nequaquam pariente, sed aut in ceruicem, aut in hæc vtraque decumbente. Securissima vero inflammatio, erit si rubor quam maxime roras vertatur, id quod aphor. 37. lib. sexti comprobauit, cum dixit, ab angina habita, si tumor fiat in collo bonum, & aphor. 49 septimi asserens, Ab angina habita, tumor, & rubor in pectore superueniens bonum extra enim vertitur morbus. Si autem in pulmonem conuersio fiat, dementiam parit, suntque ex ea magna ex parte purulenti, vt eodem tertio prognost. liquet, de qua idem Hippocrates aphorismo decimo quinti libri sic scriptum reliquit. Quicunque ab angina liberantur, ijs, ad pulmonem vertitur, & in septem diebus pereunt, si vero

vero has auferunt, suppurantur. At quæ ad cutem transmutantur, aut à principio ita deferuntur fluxiones, quod ipsæ, quæ in profundum decubuerunt, multo salubriores existant, constat omnibus, vt 4. de ratione victus inquit Galenus, Paulus vero inquit; pueris rato talem affectum oboriri nisi cum ceruicis uertræ affectæ loco excidunt, id quod Hippocrates innuit apho. 26. lib. 3. Verum illis (eodem Paulo teste) seu curationem non recipientibus, ac deploratis manum admoliri non oportet. Iuuenibus autem fere accidit affectus hic, Aetio teste. Et propterea (Archigenis auctoritate (in principio tanquam compediarium, & præceptum auxilium omnis angina (vt ipse inquit) venæ sectionem requirit: Qua de re optima victus ratione instituta, fere uelut in reliquis inflammationibus, nisi quod parciore tunc cibo tunc potu in hanc utantur: nanque copiosiore periclitantur, vt Alexander testis est: sintque humidi molles, ac liquidi: quo fit, vt primum omnium idem Alexander ac, Paulus mulsam aquosam exhibendam approbent, eaque tribus diebus utendum, à tertio die cremorem ptisanæ offerendum commendant cum dulci quadam portione vt inquit Paulus. Vice autem aquæ mulsæ hoc tempore uti poterimus aqua hordei per se, aut cum saccharo, & deinde ptisanæ cremore: moderatio re autem facta inflammatione, per liquida ouorum lutea tribuunt, non multa tamen loco quorum (ubi vires exigant) ptisana cum iure pulli confecta utitur, aut optimo pane in tenues partes redacto, ac eodem pulli, seu gallinæ iure decocto utaris, vel eo gallinarum, seu pullorum contusorum iure, quod vulgus consumarum brodium appellat, & in summa, cibi egri viribus respondeant ex Pauli decreto, Protinus ergo anguina infestans (ex Alexandri, Pauli, & Aetii sententia (venæ sectionem adhibere necesse est, siquid eam fieri non prohibeat, verum sanguis non vniuersim, sed pluribus interpositis vicibus euacuandus erit, quare etiam 3. & 4. (vt Alexander asserit (ipsum detrahendum oportet. Nam particulares euacuationes causam potius ex ipsis locis affectis elidunt: cum lata autem vniuersimque facta euacuatio animi defectionem excitat, suffocationisque periculum propterea eis superuenit, dum materia tota in affectam partem collectim prorumpit, aut perfacile à faucibus, aut guttore ad pulmonem deferretur, & inenitabile periculum infert. Venam vero cubiti incidere (vt prædictis visum est) mediam, ubi corpus totum plethoricum est, aut humeralem è directo ubi non sit, vt mihi videtur, vel primo mediam, deinde humeralem incidas; pluribus etiam vicibus si opus fuerit, neque tamen angustiore facere venæ incisionem conuenit, vt Aetius asserit, ne sanguis velut percoletur, & crassior eius pars intus remaneat, potissimum ubi crassior sanguis huius affectionis causa existit. Confert autem in hac affectione corpus totum vacuare, ac excrementis ipsum vacare, geminam ob causam, ut Galenus inquit 4. de ratione victus in morbis acutis, nempe tum ob eam, quæ à vacuatione est, reuulsionem, tum quod vacuato corpore cum a parte affecta, quod influit, expellimus, id facilius consentit, nihilque (si calido aliquo vaporare volueris) à corpore ipso parti calfactæ mitteretur. Corpus igitur totum præcitato loco Galenus vena secta vacuare iussit, & purgatione, & clysteribus. In mulieribus (ex Tralliani decreto) ubi detentis mensibus in hanc affectionem incidunt tali, seu malleoli vena incidenda est, moderateque sanguis (vt diximus) educendus; nanque ex hac venæ sectione duplex eis commodum subsequi solet, nempe consuetarum, vacuationem redditus, & affectus liberatio: Idem etiam in viris tentandam, si ipsos sanguinem per venas, in uno extantes, vacuare solitos, didiceris. Quod si hæc parum proficiant, eas quoque venas incidere conuenit, quæ sub lingua, sunt neque multum differendum, sed eodem die id facito; vt inquit Alexander, aut saltem sequenti id quod etiam 4. de ratione victus scriptum reperitur, ubi habet, Sanguinem

ergo

Com. 30.

Curatio.

Victus ratio.

Medicamentorum ratio.
Venæ sectio.

Loco citato.

Tex. 30.

cap. 19. ergo ex brachijs detrahes, mox venas, quæ sub lingua sunt, secabis. Galenus
Purgatio. vero de eis eodem loco sic asserbat. Venæ, quæ sub lingua sunt, eam quæ
faucibus est, phlegmonem sine medicamentis vacuant & lib. de curandi ra-

Com. 30 tione per venæ sectionem; talia protulit verba, Quocirca quæ in gutture, &
arteria graui torquentur inflammatione, in principio quidem, apperta in-
cubite uena, post principium autem in ipsa lingua, magnifice prodest, inci-
sis videlicet venis, quæ in ea sunt, ambabus. Post venæ sectionem potissimum
vbi alij humores redundarint secundum erit (Celsi auctore) ducere aluum,
id quod etiam præcipit Galenus prædicto lib. 4. de ratione victus in morbis
acutis, cum dixit, corpus igitur totum vena secta, vacuare oportet, & pur-
gatione, & clysteribus: primum nanque venam secare iussit, tanquam maxi-
mè necessarium, & deinde etiam purgatiue, & clysteribus utendum: nam

Post medium. reuellit per huiusmodi euacuationem ab affectis quoque partibus. Ve-
rum ante eos Hippoc. lib. de loc. in homine illud idem decretum reliquit,
dum dixit, sic affectis (loquens de angina) à venis, quæ in brachijs sunt, san-
guinem detrahes, & simul aluum inferne subduces, quo id, quod morbum
exhibet, detrahatur: ea de re & si difficulter deglutire valeat, post venæ se-
ctionem purgans medicamentum tribuendum tamen erit, leniendo tamè ua-
cuans, velut est casia fistula, manna, syrupus ex pluribus infus. rosarum vel vio-
larum, vel ipsummet saccharum violaceum Et si ex crasis succis fluxio facta

Cap. 3. sit antidorum diacatholicon, aut agarici decoctum prædictis addas: confert
nanque purgatio, vt Galenus inquit sexto de compositione medicamentorū
sec. loc. gratia euacuandi vniuersū corpus & trāsferendi infra humorū momē-
tum qui ad affectas partes feruntur: conuenit etiam & clysteribus vti interdū
etiam acrioribus potissimum vbi aliquid venæ sectionem, & purgationē pro-
hibeat, aut eis exhibitis, adhuc malum non cedat: nec minus reuulsione gra-
tia conferunt, extremorum partium frictiones, aut vincula. Similiter si pedes
aqua calida foueantur, vt inquit Paulus. Cucurbitulæ item scapulis hac ra-
tione affigendæ, citra scarificationem: & vbi malum longius prorogetur, post
prædictas euacuationes, cum iam materia influere desierit, cucurbitam cum
scarificatione opponere oportet sub mento, si tumor circa fauces, & mail-
las persistet. Si vero nullus extrinsecus tumor appareat, veluti in ea angina,
quæ occulta appellatur, in qua gutturis partes, præsertim internæ afficiuntur,
circa ceruicem cucurbitula admouenda erit, iuxta primam, aut secundam ver-
tebram, vel hirundines applicandæ. Quo vero ad localia medicamenta at-
tinet, in vniuersum id scire oportet, quod neque reprimentia, seu astringentia
sola, neque discutientia prædictis affectibus conferunt, licet temporum ratio-
ne habita, alias repellentia alias discutientia potius miscenda sunt, ceu in
morbi initio repellentia, potius in statu potiore ex parte discutientia. In de-
clinatione vero, ea quæ valentius discutiunt adhibere oportet, Alexandro
teste: nanque nonnulli, qui admodum adstringentibus duntaxat, aut discuti-
entibus anginam curare tentarunt, in grauiora pericula egros duxerunt, vel
suffocationem acutissimam inducentes, vel inflammationem augentes. Hoc
idem asserbat Gal. 6. de compositione medicamentorum secun. loc. cum de
gurgulionis inflammatione loquebatur. Paruæ etenim sunt (vt ipse inquit)
& affectionis nomine vix dignatæ à medicis, quæ confestim sedantur; quò
fit, vt raro inueniantur, quæ vno duntaxat medicamentorum genere indige-
ant, siue repulforium, siue discussorium: fuerit: facultati quoque auxiliorum
aduertere oportet; etenim imbecilliora, mollioraque medicamenta imbecil-
lioribus, & mollioribus corporibus accommodanda sunt, nempe pueris
mulieribus, & eunuchis, ac horum similibus: valentiora autem durioribus
& fortioribus corporibus: semper enim quod adhibetur remedium contra-

Topica qualia
esse de beant.

Cap. 3. rium

rium quidem superanti affectui esse debet, familiare autem, & amicum egrotantis habitui, ut idem Trallianus refert. Itaque ubi initium sit cum multa inflammatione, ea, quæ leniter adstringunt, offerenda sunt primum, Aetio teste; velut est rosarum, lentium, myxarum, palmarumq; decoctum, aut flos rosarum ex hydromelite, seu rhus cum hydromelite decoctus: ijs nanque per initia gargarizandum erit, vel (ut inquit Paulus) gargarismi fiant ex eo medicamento simplici, quod ex moris est, cum rhus decocto, aut potius utaris eo medicamento, quod ex sylvestribus moris conficitur: deinde eodem medicamento composito, quod mora recipit, vel eo, quod ex nucibus: quod medicamentum fatetur Galenus ex succo nucum viridum præparasse, nullo doctore usus, cum ex Alexandria in patriam rediret, idque experientia comprobasse in quodam hortulano, ab vua, paristhmiis, & antiadibus ferè suffocato, quo medicamento gargarizare iussit hortulanum: & quoniam valde tenuis succus apparebat, præcoxit ipsum, & mel commensuratè admiscuit: atque ubi ad mellis compagem redactum esset, hortulano utendum reliquit: & cum celerrimam videret utilitatem ipsi inde oboriri, præstabile ratus fuit in multis experiri, & ex eo sufficiente experimento accepto, semper ipso usus fuit, & eo magis optimum iudicavit quod etiam coctum cum melle cum gustasset, nihil insuaue haberet: & propterea testatur eius vim se expertum esse multum aliorum stomaticorum facultatem excedentem. Sunt autem ea (ut idemmet testis est Galenus 6. de compositione medicamentorum secund. loc. id quod ex moris constat, & id quod ex succo rubi mororum præparatur; & tertium quod ex musto, & quarrum quod ex punicorum succo, & quintum id, quod per astringentia mala componitur: quæ omnia proprie quidem stomatica appellantur, quoniam ad vuas paristhmiæ, ac omnes quæ in ore sunt derepente inflammationes conueniunt. At qui ex iam dictis utiliter gargarismi, quibus quotidie utor, componi possunt: Mirum enim inquit Galenus præcitato loco) quam mixturæ ipsorum utiliores sæpe fiant ipso simplici usu, ut si vnc. ii. medicamenti ex moris, & tantundem medicamenti ex succo nucum excipias, & cum aqua hordei libra vna, & aquæ rosarum vnc. iiii. ac aceti albi vnc. i. permisceas, quo medicamento gargarizare iubeas: vel aquæ hordei lib. ii. recipe in qua rhus 3. iiii. decoquantur, ac addas mytrine aquæ lib. s. medicamenti ex moris rubi, aut ex moris vnc. iii. medicamenti ex nucibus, aut ex malis punicis vnc. iiii. aceti albi vnc. ii. hoc etiam tempore in rotulis medicamentum paretur, quod assidue teneatur in ore ac sensim deglutiatur. Accipit autem diacodii 3. ii. pulueris hirundinis præparatæ scrup. i. seminū coriandrorum præparatorum 3. i. sacchari dissoluti in aqua rosarum, quantum satis sit. Procedente uerò tempore (potissimū ubi frigida fuerit fluxio) addere poteris scrup. i. vel. ii. antidoti diamoschu dulcis, aut pluri archotici: quo etiam tempore sæpius paulatim tamē, ac sensim ex syrupo rosaceo violaceo, iuiubino, de cannis, ac reliquis similibus exhibere poterimus, iubentes, ut quam diutissimè in ore teneant, ac paulatim eum defluere permittant. Morbo verò crescente, vigente, ac consistente, ijs magis utendū medicamentis, quibus discutiendi facultas inest, velut est caricarum, aut furfurū seu glycyrrhizæ, in aqua multa decoctum, aut hyssopum, tymum, calamintha, seu pulegium, similiter in aqua multa decocta, vel hordei. Recipe manipul. s. vuarum passarum vnc. i. palmularum, & caricarum, ac myxarum ana numero quinque glycyrrhizæ 3. iiii. hyssopi 3. iii. coquantur secundum artem in lib. ii. fontanæ aquæ, donec medietas absumatur: cui decocto percolato, adiciantur mellis rosacei, vnc. ii. medicamenti ex moris vnc. i. & aceti albi parum, vel vice mellis, rosacei, & aceti oxymelitis simplicis vnc. i. & s. vel vnc. ii. commisceas, & fiat gargarismus prædictos: etiam decocto adicere pote

Galenus histo-
ria,

Cap. i.

6. de comp. me-
dic. sec. loc. c. 3

Com. 30.
Topica.

Quæa tota sub-
stantia confe-
rant.
6. de comp. me-
dic. secund. loc.
cap. 1. in medio
10. de simp. fac.
c. proprio.

Cap. proprio.

cap. 3.

Cap. de pgonia

ris thymum, pulegium, calamintham, origanum, fœnum græcum, aut mentham odoratam, quam hedyosmon vocant, potissimum ubi ex frigidis, ac crassis succis orta fuerit inflammatio: ii nanque succi acrioribus indigent medicamentis, quæ scilicet secare, & in tenuia diuidere, & tum glutinosa, tum crassa confringere possint, auctore Galeno 4. de ratione victus in morbis acutis: propterea & eodem tempore medicamentis, quæ ad exteriorem superficie[m] reuellere possint, ac attractoria facultate polleant, ab extra vten- dum erit; quæ etiam tum concoquere, tum discutere valeant: ad mouere igitur spongiæ oportet, quæ in calidum oleum dimittantur, vt Celsus inquit. Nec minus conferent, si oleum fuerit chamæmelinum, aut anethinum, seu liliaceum, aut irinum, si materia fuerit frigidior; aut ex cassia fistula, & oleo amygdalino, seu aliquo prædictorum cataplasma fiat, se seminis althææ, maluarum, & lini cremorem assumas, & cum fœni græci, ac hordei farina, decoctoq; chamæmeli, meliloti, & caricarum, cataplasma formetur, atque applicetur. Inungitur quoque haud inutiliter locus ex oleo chamæmelino, anethino, seu amygdalino cum butyro, atque anseris pinguedine: & si libeat esypum, aut dialthæam immisceas, vel eisdem per se vtare. optimum quoque cataplasma erit ab Alexandro scriptum: constat nempe ex hordeacea farina, semine lini, palmulis ex aqua coctis, item croco, & mica panis simul incoctis, & (si videtur) adicere poteris ficus siccas. Placuit tandem, quæ a tota tere substantia conferunt in fine conscribere, quorum vnum a Galeno, Musæ auctoritate 6. de compositione medicamentorum secund. loc. & libro decimo de simplicium medicamentorum facultate conscribitur: excipit autem caninum stercus album, quod quidem efficitur, ubi sola ossa canis edenda duobus continue diebus exhibeas, minimeq; ferens prouenit. hoc igitur accipito, & resiccato, tritumq; cribrato, & vsus tempore melle diluito, atque tunc vt deuoretur illinito, quam penitissime vt transglutiere possint, aut alicui alio medicamento admisceas, quod huic affectui congruat, velut est medicamentum ex moris, seu de nucibus, seu mel rosaceum: hoc enim pharmaco, inquit Galenus, fortius nullum nouimus, neque in angina, neque in magnis paristhmiis, aut his quibus ex glandulis suffocations periculum imminet. Præstantissimum quoque remedium est (Paulo auctore, atque similiter efficax) hirundinum vstarum cinis: quamuis ante eum Galenus 11. de simpl. med. facult. ipsum cum melle commédasset; pariter (vt testatur Aetius) cochlearum in hortis repertarum citra testas, aut cancrorum vstorum cinis cum melle confert. Siquis autem pullum hirundinis comederit (inquit Celsus) angina toto anno non peritabitur, seruatumq; eum ex sale (cum is morbus vrget) comburi, carbonemq; eius contritum in aquam mulsam, quæ potui datur, infricari, & prodesse. quod medicamentum, quamuis idoneos auctores ex populo habeat (vt ipse refert) tamen cum neque habere quicquam periculi possit, inferendum suo operi credidit, & si in monumentis medicorum non legerit, quamuis ego legerim apud Gal. 6. de compositione medicamentorum secund. loc. quo loco Archigenis medicamenta ad gurguliones inflammatos meminit: quinetiam si compluribus linis, & maxime marinæ purpuræ, collo viperæ iniectis, illis viperam præfoces, eaq; postea cuiuspiam collo obuincias, mirifice profuerit tum paristhmiis, tum omnibus iis, quæ in collo expullulant, Galeno auctore 6. de simplicium medicamentorum facult. Vbi verò in abscessum angina vergat, iuuanda natura erit cum his quæ præcedenti cap. diximus, sic quoque confecto pure cum his, quæ disruptionem prori- tant, ac eo disrupto cum his, quæ detergendi vim habent, quæ omnia ibi conscripta reperias.

IN genere deprauatorum motuum tussis ipsa, quam Græci βῆξις appellant, continetur, vt 2. de caus. symp. testatur Galenus. At cum deprauati motus in triplici sint differentia, eodem auctore, in quorum numero ea reponenda sit inuestigabis: nam alij naturę quidem sunt opera, sed vi coactę a quapiam morbosa causa. Alij vero a morbo simul natura efficiuntur, reliqui morbosos duntaxat comitantur affectus, natura ad eorum generationem suppetias minimè ferente. Intelligit autem per naturam omnem facultatem, quę animal regit, siue illi a voluntatis nostrę imperio pendat, siue secus: quapropter in prædictis verbis totum hoc facultatum genus, cuius beneficio seruetur animal, ex aduerso opponit omni causę præternaturali, quę ipsum lædere, vel corrumpere possit. Prædictę itaque facultatis opera sunt, sternutamentum, singultus, ac tussis, vt ipse inquit: solius autē morbi palpitatio, & conuulsio, sicut amborum, morbi inquam ac facultatis coeuntium simul, sunt omnes motus torpidi, ac tremor. Tussis igitur a Galeno (vt liquet) in numero eorum motuum deprauatorum connumeratur, vt ex iam dictis constat, qui opera quidem facultatis sunt, coactę violenter mouere a morbosa quapiam causa: propterea in numero symptomatum (vt dicemus) & non naturalium operationum merito esse censetur: Nam quandiu animal naturę legibus gubernatur, nullus motus facultatū eius symptoma existit, sed tunc duntaxat, cum ab aliqua causa præternaturali ad exercendas functiones, quęuis earum fuerit irritata: quo fit, vt cum consistat in corpore aliquid a natura alienum, insurgatq; ad ipsum deiiciendum facultas aliqua expultrix, aliquando insensibiles omnino earum motus sunt, aliquando sensibiles euadunt. Verum cum prædicti deprauati motus non vnitantum corporis nostri particulę adscribantur, sed diuersis, prout eorum causę in diuersis quoque partibus consistunt, propterea tussim ipsam instrumentorum spiritus deprauatum motum esse, eumq; non insensibilem, sed sensibilem idem Galenus præcitato loco decretum reliquit: appello autem nunc spiritus instrumenta, pulmonem, asperam arteriam, ac thoracem, vt necesse sit aliquam, vel plures dictarum partium in tussi affectas esse: interim autem & fauces, vt quibusdam tussibus patebit: quanquam igitur harum partium motus sit tussis, nunquam tamen ad eum excitandum mouebitur animal, nisi a quopiam, quod præter naturam sit, spiritus partes irritante, fuerit impulsus: vt verò dilucidius percipiatur quę nam pars determinatè in tussi afficiatur, operæpretium erit ipsius tussis genera, seu differentias enarrare: ex his nanque nedum quę pars afficiatur, verum & qui præter naturam affectus tusses sint, ac insuper modus generationis earum, patebit. Quod autem duo sint prima tussium genera, ex Galeni sententia liquet, libro 2. de causis symptomatum; quorum vnum vehementem spiritus ad exteriora motionem nominant, illudque non immerito: nanque cum non possit pulmo tam vehementi motu concitari, vt id quod molestum ei est, exploderet, natura magna quadam solertia aliud remediū sibi adinuenit: quippe cum externus aer in asperam arteriam trahatur, quę & cartilaginea, & pura est, nec contrahi propterea possit circa id, quod in ipsis continetur, incitatum hūc cogitauit spiritus exitum, vehementer siquidem ipsum ad exteriora mouendo: qui motus per eadem sit instrumenta, per quę magnę, & vehementes spiritus expulsionones fiunt, quas efflationes nominamus, ita vt tussis hæc nihil aliud sit (eodem Galeno auctore, præcitato loco) quàm vehemensissima efflatio, qua plurimus spiritus celerrime foras erumpens impetu suo extrahit, exploditque excrementa meatus ipsius obstruentia: adeo vt si prima

Quot sint deprauati motus differentię.
Cap. 3. in fine.

Sub qua differētia tussis continetur.

Quarum partium tussis sit deprauatus motus.

Duo tussium genera.
Cap. 3. circa finem.

Vehemens seu magna tussis quid sit.

Generatiōis mo-
dus.

2. de caus. symp.
cap. 3. in fine.

5. de loc. affect.
cap. 3. in fine.

Com. 43.

5. de loc. affect.
cap. 3.

Cap. præternat-
uralis affectus
est.

ca. 8. cit. a pri-
or. Quem morbum
secedit.

Signa eiusdem

Pars affecta.

Causæ diuersæ.

Secundum ge-
nus tu istum.

efflatio non possit, ea quæ molesta sunt, excutere, non grauetur, & iterum, & tertio, in ipsa irruere. Efficiunt itaque hanc tussim musculi efflationem operantes, intercostales maximè, quamuis ipsa naturale quoddam symptoma sit, vt eodem 2. de caus. symp. & 5. de loc. aff. liquet, vt autem ipsum excitaretur, opus fuit vehementer admodum thoracem ipsum omni ex parte comprimi, quo robustius, id quod in vijs spiritus continetur, expellatur: motionis itaq; initium ex facultate mouente thoracem in tussientibus est: violenta vero contractio eius facit, vt spiritus feratur foras vehementer, huius autem vehementia refert secum materiem conditam in fistulis pulmo- nis, quæ quidem asperæ arteriæ sunt, Galeno auctore 2. prognost. cum itaque hoc modo id genus tussium gignatur, haudquaquam hæsitandum erit asse- re symptoma esse (cum à causa præternaturali irritata natura ad hunc mo- tum prorictetur) functionum, nõ siquidem naturalium, expultricis videlicet, velut nausea, & vomitus, sed facultatis motricis voluntariæ: neque enim fa- cultas expultrix, quæ ex naturalium numero vna est, hunc motum efficere po- test: & proinde Galenus facultatis, quæ à voluntatis imperio pendet, sym- ptoma esse fatetur eodem 2. lib. de caus. symp. quo motu perpetuò natura co- natur, quicquid spiritum interceperit, reijcere, siue humor fuerit à capite defluens, vt indetillationibus, siue aliquid collectum in asperis arterijs, aut in peripneumonia, & pleuritide. quare sectatur hoc symptoma morbum in- uia, quia obstructionem viarum spiritus: dignoscique facile potest tussis hæc, quoniam non exigua, sed valida erit, vehementes, ac violenta, nec suppri- mi, seu prohiberi potest omnino ne eueniat: vehementerq; in ea thorax con- primitur, vt multam eandemque, confertam efflationem exciter, etenim sine vehementi thoracis contractione, seu contractione vehementer tus- sire nemo potest, vt liquet 4. de loc. affe. inter tussendum semper aliquid ex- puunt, nisi valde aquosa, aut lenta sint essentia ea, quæ spiritus vias obstru- unt. Ceterum veluti vomitiones nausæ præcedere solent, ita tussim, quod græci *κατὰ*, dicitur: est autem id non tussis, sed exiguus quidem ad tussien- dum impetus. Præterea sicuti nonnulli nausæarunt, nec tamen vomuerunt, ita nonnullis symptoma modò dictum incidit, nec tamen tussis propter cau- sæ paruitatem est secuta, quippe interim ex parua faucium aspredine, inte- rim verò extenui aliquo, exiguoque prorsus humore contingit, in prædicta itaque tussi perpetuo viæ spiritus afficiuntur. At si spiritus interceptio, ab hu- more à capite defluente fiat, aspera ipsa arteria affecta erit: cuius autem na- turæ fuerit humor, vias spiritus obstruens, ex qualitate præcedentis destilla- tionis percipere poteris idq; studiosi petant cap. de catarrho, simul atque ex substantia, & diuersa qualitate eius, quod per tussim propellitur, inuestigandum erit. ad portionem autem eorum, quæ à capite defluunt, respondent ea, quæ inter bibendum, aut edendum in guttur, ac asperas arterias delabuntur: pate- bit autem id ex eius, qui taliter affectus est, aut astantium relatione. præter verò hæc contingit interdum quod in asperis arterijs, ac thoracis cavitare excrementum aliquod collectum sit, & proinde vehemens tussis excitetur; quemadmodum in pleuritide, thoracis vomica, peripneumonia, ac tæbe eue- nit: quæ omnia interstinguli possunt ex proprijs indicijs prædictarum affe- ctionum: quæ vero cum titillatione partium ab vtraque palati parte contin- gunt tusses, palam ostendunt (vt inquit Acrius cap. 54. libr. 8.) defluxum à ca- pite ad asperam arteriam deferri. atque ad pulmonem, quas tusses malignas, & contumaces appellabat Paulus cap. 28. 3. lib. Est insuper (eodem Galeno auctore prædicto loco) ex instrumentorum respirationi seruientium intem- perie ortum aliud tussis genus, in qua nihil inter tussendum ita affecti ex- puunt, neque violenta tussis est, neque coacta, sed adeò exigua, vt & sup-
primi

primi, & neueniat prohiberi possit, idq; vel in totum, vel magna ex parte: itemq; spiritus cohibitione non modo ea fieri prohibetur, sed etiam ea sanatur, modo admodum magna non sit, ut idem Galenus testatur: augetur nanque (vt ipse inquit) spiritus cohibitione in instrumentis spiritalibus calor, permeatq; spiritus violenter a pectore pressus, ac compulsus per omnes angustos meatus: quibus vtrisque peractis æquantur omnia, atque ad temperamenti æquabilitatem veniunt, potissimum si refrigeratis respirationis instrumentis orta sit. Verum quis affectus præter naturam sit tussis hæc, ac quatione fiat, quæ partes in ea afficiantur, ac a quibus causis oriri possit, patebit, eo prius dilucidato, cur uidelicet per inæquales intemperaturas instrumentorum spiritus, tussis excitetur: nanque ex æquali intemperie cum ea omnino sine dolore sit, haudquaquam gigni potest. Est nanque ea veluti acquisita quædam natura, ut Galenus inquit. Verum cum inæqualis oritur intemperies in quapiam parte sentiendi vi prædita, quanta fuerit intemperantiæ magnitudo, tanta erit molestia, quantoque eius causa, cum mordax sit nõ quiescat, sed moueatur, & citius moueatur, tanto quiescente, ac ea quæ tarde mouetu, & minime mordax est, molestior existit, ac citius sentitur. quo fit vt irritatæ partes ad expellendum id quod contristat, festinent, se se contra hentes, ac constringentes, velut in rigoribus, atque horroribus est videre, in quibus vniuersæ partes simul ad expellendum mouentur, atque eo tempore totum corpus concussionem, quassationemque vexatur, talis etiam motus, & thoracis musculis per inæquales intemperies deprehenditur: eamque ob rem tussis quædam leuis ei non ab similis affectui, quem græci *απρυξ* vocant, ijs superuenit, concutiuntur enim musculi, dum student ea, quæ contristant a carne sua (vt inquit Galenus) per pulmones, & arterias expellere. In ceteris autem tussibus vehementer eos pulmoni se iniicere, est monstratum, quo multam, eandemque confertam afflationem excitent. hæc itaque tussis, quæ ex spiritalium instrumentorum intemperie incidit, ex eodem est, cum concutientibus rigoribus horroribusque genere, eodem Galeno teste, præcitato 2. lib. de caus. symp. differt autem, eo quod celerior eius sit sensus: nam respirationis instrumenta nūquam quiescunt. Ex his itaq; constat respirationis quoque organa in hac tussi affecta esse, præsertim thoracis musculos, iuxta Gal. sententiã; eamq; symptoma esse functionum non animalium, vt vehementissima tussis, sed naturalium, atque inter eas, ipsius excreticis: nanque vt expellant ea, quæ ipsis molesta sunt, concutiuntur musculi, ac tussim excitant, & non vehementer pulmonibus incumbunt, quo multum simul, & celerem efflatum moueant. totusque fere motus hic, velut de rigore testatur Galenus; ad naturalem facultatem referendus est: & si quodammodo causa præter naturam irritans concurrat ipsa cogens, vt violenter moueatur. Talis igitur quoque est eiusdem generationis modus, vt diximus, ad inæqualemque intemperiem sequitur ipsorum organorum spiritus, & non ad viarum obstructionem, vt aliud tussis genus, nec aliis indiget signis pro eius cognitione, quàm eis, quæ supra narrauimus: siquidem in ea nihil expuitur, nec est omnino valida, ac violenta, sed adeo parua, ac sine vi, vt eam cohiberi, & generationem eius vel plurimum, vel omnino prohiberi liceat, vt retulimus. Cuius quidem tussis causa, licet 2. de caus. sympt. refrigeratio instrumentorum respirationis a Galeno dicatur esse, ab eodem tamen libr. 6. de morb. vulga. ab aliis quoque eorundem instrumentorum intemperantiis fieri posse non negatur: nanque cum de non malignis tussibus, quas Hippocrates aridas, ac parum, seu leuiter irritantes, tum eodem 8. de morb. vulga. tum apho. 54. 4. libr. appellat, sermonem faceret, eas aut ob faucium, arteriæ ve asperitatem, aut instrumentorum spirabilium intemperiem oriri asserit; quam

Modus generationis eius.

Cap. 4. colligitur.

Quæ partes in ea afficiantur.

Quis præter naturam affectus sit.

Quem insequatur morbum. Eiusdem signa.

Causæ.

2. de caus. symp.

cap. 4. circa fin.

collige.

6. de morb. unil.

Commentario

2. com. 23.

Loco citato.

Loco citato.

4. de loc. affec.
c. 8 in prin.
2. prog. com. 43
1. de morb. vul.
commentario, 1.
Cen. 12.
2. de caus. sym.
Cap. 4.

Prognostica.

intemperiem interim frigidam esse testatur ut pote in aquilonis constitutio-
nibus, in quibus Hippocrates aph. 5. lib. 3. tussis, ac fauces excitari asserbat,
non propter aliud (ut Galenus fatetur commento eiusdem aph.) nisi propter
instrumentorum respirationi obseruientium intemperiem, & propter fau-
cium asperitatem: aer nanque admodum frigidus inspiratus, interdum fau-
cium, asperæque arteriæ locos exasperat, atque refrigerat, nonnunquam &
toti pulmoni, pectorique intemperiem affert: sæpius vero & ambo hæc
contingunt: quapropter ex his arida, modicaque tussicula vexantur: quod
autem ita sit, signum est (ut inquit Galenus eodem 6. de morb. vulg.) ipsos,
cum spiritum attrahunt, ad tussim prouocari, potissimum cum multus subi-
to aer ipsis loquentibus, & oscitantibus, ac ore spiritum ducentibus intra-
uerit, sed cum per nares attrahunt, ac aerem extrinsecum quispiam in ædi-
bus ipsorum calefecerit, tunc autem omnino parum, aut nequaquam tuss-
fiunt. Quocirca & ob nares quidam panniculum ponentes ita inspirant,
exacerbari tussim experti; cum aer externus frigidus multus subito membris
prius refrigeratis, atque exasperatis, obuius fiat: nec minus ob vehementem
æstum, immodicamque ariditatem a circumfuso aere generatur tussis hæc, eo-
dem Gal. auctore, intemperatis siquidem instrumentis spiritus, ac iam di-
ctis partibus exasperatis, id quod sæpenumero in febribus accidit, ut Pau-
lus testatur: qui etiam Galenum sectatus, ex ambabus intemperantiis tussim
hanc excitari posse fatetur in hac vero tussi aerem frigidum respirare desi-
derant, eoque iuuantur, facieq; rubicunda apparet, ac siti molestantur ægri:
Trallianus vero nedum ex iam dictis duabus, verum etiam ex reliquis intem-
periebus tussim hanc excitari posse testatur, sicca videlicet, & humida. At nos
Galenum, & veritatem sectari ab humida intemperie nuda, tussim oriri pos-
se nequaquam admittimus, neque enim mordax est, adeo ut motum hunc
excitare possit, ac inæqualem intemperiem efficere: a sicca tamen oriri pos-
se non negamus: quanquam citra caliditatem, aut frigiditatem omnino id
fieri, aut cogitari forte minime possit. Non ab re igitur ex calida, frigidaue
intemperie, interim solis existentibus, interdum vero cum siccitate permi-
stis, exiguum hanc tussiculam proritari diximus: quomodo autem hæc inter-
stinguendæ sint ex his quæ capit. de catharro conscripsimus, studiosi petant:
hec iterum tussis arida, ac leuiter irritans, in qua nihil expuitur ex puluere,
fumo, alimentis, porionibusq; exasperantibus interim generatur, quandoque
(ut testatur Aerius) ex lumbricis stomachum infestantibus, & acri humore
ipsum perturbante, similiter & in his, qui stomachi morsum sentiunt, euenit:
nec minus & iocinore, ac liene, seu aliis quibusdam partibus primo affectis,
aridæ tussis quandoque proueniunt. Dignosces autem eas ex propriis indi-
ciis prædictarum partium primo affectarum. Galenus vero commento aph.
5. 4. libri quarti, trifariam oriri posse testatur tussim aridam leuiter irritantem,
nempe aut ab intemperie instrumentorum, quæ obseruiunt respirationi, aut
ex faucium aspredine, vel aliquo tenui, & paucio humore destillante. At si pro-
pterea quod crassi, lentiq; succi firmiter infixi bronchiis sint, vel quod humor
qui a capite ad asperas arterias defluit, non aliter atque aqua sit tenuis, ari-
da tussis fiat, non amplius exigua ac levis ea erit, immo valida, ac vehemētis-
sima, quemadmodum 4. de loc. affe. 2. prognost. 1. de morb. vulg. ac 2. de caus.
symp. & reliquis plerisq; locis decretum reliquit Galenus. Si quis autem velit
omnes enumeratas iam tussis in duas redigere differētiās, humidās videlicet,
& siccas non aberrabit Celsum imitatus, qui de tussi sic dicebat capit. 4. lib. 4.
Ac modo arida est, modo pituitam citat; nobis autem satis sit hæc annotasse
pro diuersarum tussium dignotione, & earum generatione diuersā, ac causa-
rum ex quibus fiunt, notitia: reliquum est de ipsarū prognostico differere, ac
curatione

curatione. Sit aut primū earūdem prognosticū, quod quæcūq; tusses ex destil-
lante humore à capite oriūtur, siue ex alicuius spirabiliū viscerum vlcere, aut
ex aliquo in iidē orto abscessu, siue ob ea, quæ vocantur empyemata, quæ ab
Hippoc. ferinæ appellantur li. 6. de mor. vulg. oēs malignæ sunt, vt Galeo. lo-
co testatur, maleficæ, ac contumaces, vt inquit Paulus. & propterea periculosæ
nec paruificiendæ sunt, reliquæ vero tusses, quæ malignæ nō sunt, ab his siqui-
dem diuersæ, ac exiguæ dictæ, periculū, quantū in ipsis est, nō, minātur suntq;
curatu faciles. Quod vero tusses in aquilonia constitutione ac hyeme genera-
ri magis aptæ sunt, decretum reliquit Hippo. aph. 5. & 23. li. 3. id quoq; nō præ-
tereundum erit, quod ad validas, vehementissimasq; tussē, vbi diu protelen-
tur propter vehementem thoracis morū, sputū sanguinis superuenire consue-
uit. Celsus aut tussim propter fauciu exulcerationem ferè molestam esse asse-
ruit: solent tamē (vt ipse inquit) interdum per se quoq; malè habere, & vix cū
vetus facta est, eliditur: quoniam verò neq; vnū duntaxat habēt tusses ipsæ ge-
nerationis modum, nec causam vnam, propterea pro causarum diuersitate ea-
rum quoque curationem variari contingit: quapropter ex peripneumonia,
pleuritide, empyemate, tabe, aut simili aliquo affectu in spiritalibus instrumē-
tis orto, veluti etiam dyspnœa, seu asthmate, tussis fiat, ex eorum affectuum
curatione, vt in sequentibus patebit, curabitur & ipsa. Si vero ex inæquali
duntaxat intemperie ortum ducat, frigida ea existente per calefacientia emē-
damus vt inquit Aetius: hæc inquam tussis (modo non valde magna fuerit)
ex spiritus cohibitione. iuxta Galeni sententia 1. de caus. sympt. curari pote-
rit quemadmodum superius dictum est. Caueant igitur taliter affecti frigi-
dam inspirationem, frigidum quoque cibum, ac potum, quinimò in calidis
locis versentur, calidis quoque cibus, ac potibus vtantur, eorumq; pectora ca-
lidis vnguentis vngantur, vt chamæmelino, anethino, amygdal. dulcium,
butyro, ac anseris, seu gallinæ pinguedine; & (vt summatim dicam) to-
tum studium sit, vt thoracis partes, à frigidis defendantur, ac calidæ seruentur.
At si ex calida intemperie, arida, ac exigua tussis proritetur, quemadmodum
in febribus euenire contingit, contraria tum victus, ratione, tum etiam me-
dicamentorum vti oportet, ita vt cuncta ad frigidum vergant. atque humi-
dum, si cum siccitate, ea permixta sit, quæ vero ab asperitate tusses fiunt, per
lenientia, & mordacitatem arcentia sanantur, Aetio teste, qualia sunt ex arte-
riacis compositionibus simpliciora: nonnullorum huiusmodi medicamen-
torum cap. de catarrho, à nobis mentio facta est, cum raucedinis curam præ-
cepimus. Reliquum est itaque, vt eius tussis, quæ ex destillante humore à ca-
pite originem ducit, curationem præcipiamus, qui si acris fuerit, ac tenuis,
proba victus ratione instituta, modo, quo cap. de catarrho conscripsimus
(quamuis speciatim in omni tussi utilis sit, ex Celsi auctoritate, peregrina-
tio, nauigatio longa, loca maritima, & nationes) per ea medicamenta quæ
vim refrigerandi, spissandi, acrimoniamq; obtundendi habeant, sanabitur,
aut (vt inquit Aetius) per cuiusdam pharmaci dolorem leuantis, vsum, & per
cibos boni succi: syrupo igitur violaceo, è papauere, de cannis, aut è succo
borraginis vtare: vel Recipe syrapi violacei vnc. j. de cannis vnc. 5. aquæ hor-
dei, & borraginis vnc. iiii. aut aquæ hordei vnc. iiii. v. vel vi. exhibeas cū pauco
saccharo quibus syrapi sæpius assumptis vnc. ij. vel iii. mellis roridi, siue ii. ca-
siæ fistulæ aut iii. sacchari violacei, seu syrapi ex pluribus infus. violarū cū in-
frascripto decocto exhibeas. Excipe hordei decorticati pug. j. florum violarum
& borraginis, ana 3. iiii. iuiubarum numero 4. vuarum passerarum mundatarum
vnc. s. glycyrrhizæ 3. i. & s in aqua fontana fiat decoctum secundum artem, in
quo mannam, casiam, fistulam, saccharum, aut syrupum violaceum, dissoluas.
Conuenit quoque in hunc vsum exhibere antidotū de papauere, diatraga an-

Com. 2.
Com. 21.

Cunatio tussis
ex inæquali in-
temperie frigi-
da ortæ.
cap. 4.

Si ex calida in-
temperie oria-
tur, curatio.

Tussis ex de-
stillatione ortæ,
curatio.
Si acris fuerit,
& tenuis destil-
lans.

Purgatio.

Quæ ori tenen-
dæ sunt,

Siccæ frigidas,
ac crassæ suc-
cis defluentibus
tussis fiat,
curatio.
Præparantia.

Purgatio.

Eclegmata.

Ad diuturnam
tussim,

thæ vel diapenidii sine speciebus, quæ sub lingua diu teneantur quo paulatim liquefcentibus, aspræ arteriæ summum id, quod in ipsum defluit, sensim suscipiat, renitaturq; ipsi oborienti tussi. Conducunt insuper, & bechicæ pilulæ, ac reliqua medicamenta arteriaca, quæ cap. de catarrho conscripsimus. Inter alia vero potissimum confert infrascriptum eclegma. Excipit autem sacchari violacei, ac è borragine, singulorū vnc. i. succi glycyrrhizæ 3. ii. diatragacanthæ frigide, & eclegmatis è papauere ana 3. i. & s. eius antidoti, quam electuariū regum nominant, sine tamen speciebus 3. ii. syrupi violacei, de papauere, ac de cannis singulorū vnc. i. omnibus simul permistis fiat eclegma. Nec parum etiam confert, si vnc. i. vel ii. recentis olei amygd. dulcium tepidi cum paucis saccharo, mane, vel vespere, longe à cibo tribuas, eodemque oleo, ac insuper violaceo, vel ambobus simul mistis thorax totus inungi poterit. Si vero crassus; & viscidus fuerit affligēs humor, qui causa existat, per ea quæ extenuant, ac discindūt medebimur ex Aetii sententia: qua de re similiter eodem victu vtentes, quæ cap. de catarrho ex frigida causa orto instituiamus, exhibenda egrotantibus erunt: inter simplicia glycyrrhizæ, caricarum pinguium, adianti, aut hyssopi decoctum in aqua fontana, cui parum mellis adijci poterit: aut si crassior pituita fuerit, marrubii, scabiosæ, radices iridis, seu enulæ campanæ decocto, similiter adiecto paucis melle vtare. At si compositis uti libeat, syrupum ex glycyrrhizæ, ex iuiubis, adianto, hyssopo, aut marrubio tribuas, mel etiam rosaceum, interim vero oxymel, cum simplex tum scyllinum. Quibus sæpius propinatis, ægrotantis corpus (si videbitur opus esse) per ea quæ crassos, ac lentos succos purgant euacuabis; inter quæ summopere confert agaricū, ex cuius 3. i. & s. seu ii. parato decocto, ac cum vnc. ii. casie compositum medicamentum exhibe, vel vnc. i. & s. prædictæ casie fistulæ excipe, ac 3. i. & s. trochiscati agarici, & bolum conficito: ex eodem item agarico, & puluere hieræ simplicis Galeni pilulæ, formari possunt, ac egrotantibus exhiberi: post quæ, aut mellis roridi vnc. i. & s. aut casie fistulæ tantundē; post aliquod spatium, cum infrascripto decocto præbebis. Rec. hyssopi, adianti ana 3. iii. caricarum. & iuiubarum numero iiii. radices glycyrrhizæ 3. ii. vuarū passarū detractis vinaceis vnc. i. fiat decoctum Si vero crassior ac tenacior fuerit pituitosus succus, radices iridis, ac elenii, singularum 3. i. & s. radices fœniculi 3. i. marrubii 3. ii. prædicto decocto adde re poteris: nec minus loco prædictarum pilularum, licebit pilulis ex agarico compositis mesuæ, sed mastichinis dictis, uti: post quas simili ratione præscriptam portionem tribues: nam qui ob pituitæ crassitudinem nihil educere possunt, ut inquit Aetius, ab humectantibus plus emolumenti sentiunt, maxime eo quod quodammodo, si simul extenuatoria participant facultate: prodest quoque iis ouum torbile assumere, paucis sulphure adiecto, Celso auctore. aut eclegima, quod officinis loch. nuncupatur, ore tenendum, sensimque deuorandum erit, sanum videlicet, & expertū, aut id, quod è pino nominatur, vel diapenidion cum speciebus, seu diatragacantha calida, aut diahyssopum Nicolai: quæ omnia cum saccharo in aqua adianti dissoluto, ad tabellæ formam redigi poterunt, quo ægrotis gratiora fiant, & maiorem cōtrahant in ore moram, vel Recipe diahyssopi Nicolai, diapenidion cum speciebus, & eclegmatis è pino ana 3. ii. pulueris glycyrrhizæ, amyli, gummi tragacanthæ ana. 3. i. syrupi ex adianto, & vna passa, ac de hyssopo singulorum vnc. i. omnia simul mista sæpius, paulatim & sensim deuoranda præbeas. aduersus diuturnā tussim si cus aride coquuntur cum hyssopo, & aqua & ex ea aqua tussientibus propinatur ex Plinio Secundo lib. i. de re medica. cap. 58. thorax præterea extrinsecus inungatur ex oleo amygd. dulciū, liliaceo, irino, seu chamæmelino, adiectis pinguedinibus anseris, seu gallino, ac butyro; vel in hunc modū vnguentum

tum conficias . Excipe butyri recentis, pinguedinis anseris ana. 3. ii. olei iri-
ni, 8. amygdulciū ana. vnc. ii. farinæ fœni græci, seminis lini, & altheę ana 3.
s. radicis altheę, helenii, & glycyrrhizę, singularum 3. i. cum cera fiat vnguen-
tum: nāq; per calefacientia (vt inquit Aetius) instrumentorum respirandi fri-
giditatem emendamus . illud tamen in cura tussis summopere inspiciendum
(vt inquit Paulus) num & alię patticulę condoleſcant, verbi gratia, an caput,
vel gurgulio deſtillent, aut aliis morbis conflētentur : nanque vbi his quam
fieri poteſt optime erit profeſtum, curationem molire . Aetius quoque re-
media quędam , quę tuſſes ſedant præſertim à frigida cauſa ortas conſcripſit
inter quę ſimplicia præcipua eſt ſtyrax, ſi nucis auellanę magnitudine fuerit
deuoratus: ficus quoque ſiccas pingues in vino dulci meraco madefactas vnā
cum vino deuorandas exhibet ad mitigandas tuſſes: amplius terebinthinam,
& mel coctum delingenda præbet, & vinum dilutum inſuper ad ſorbendum;
hoc nanque (vt ipſe aſſerit) attenuat, & educit. Ad eas autem tuſſes noctu mo-
leſtiam inferentes, tanquam valde vtile, menthę ramulos tres tritos aſuſo ace-
ti cochleari, ante ſomnum ad ſorbendum præbet : adiuuat enim concoctio-
nem, ſtomacho vtile eſt, & craſſitiem diſcindit, vt ipſe inquit: complura etiam
alia compoſita medicamenta, quę tuſſes ſedant, eodem loco conſcripſit,
cap. videlicet 54 libr. 8. quę ſtudioſis facile patere poterunt: vnum tamen
hic prætermittere nolui, tanquam magnopere conducens, ad mitigandas tuſ-
ſes potiſſimum inueteratas, & ex frigidis, craſſis, ac lentis ſuccis ortas. Excidit
autem nucum pinearum torrefactarum amyli, radicis dulcis, ſeminis vrticę
ſeminis lini cuiusque ſextantem, iridis, piperis, hyſſopi, ſeminis naſtur-
tii, amygd. amararum, ſingularum vnc. j. vt ipſe inquit: verum ego vnc. .s. acci-
perem. Excipe melle probe deſpumato, & præbe ex eo cochlearium medio-
cre. ex eiſdem auctoris ſententia. ſuffitus quoque ad eius ſententiam, admo-
dum tuſſibus conducens, tanquā per experientiam ab eo inuentus ex ſtyrace
terebinthina, ſandaraca, ac maſtiche æqualibus partibus parari, poterit, & vta-
re caſiorii inſuper ſuffimen in carbonibus excitatum, & per inſpirationem at-
tractum maxime iuuat frigidos & hūmidos pulmonis, thoracis, cerebrique
aff. ſus, Alexandro teſte: idem quoque teſtatur, ſpectaſſe virum quendam
longo tempore tuſſi valida vexatum, nec ab ea unquam liberari potuit, quo
vſque calculum exquiſite figuratum, non aſpertum, ſed valde leue durum &
renitentem expuiſſet. Ad tuſſim vero acerrimam puerorum ſic ſubuenimus,
inquit Trotula, accipe hyſſopum, ſerpillum, & in vino decoque, & da ad bibe-
ndum. vel grana iuniperi diſtemperamus cum vino, & damus ad bibendum: tu
vero poteris eiſdem in aqua, uel aqua mulſa decoctis tutius uti,

Ad tuſſim pue-
rorum.
Cap. 251

περὶ δύσπνοιας.

De difficultate ſpirandi Cap. 48.

Sæpenumero reſpirationi leſio quędam euenit, quę à Græciſ *δύσπνοια*
à latinis ſpirandi difficultas nuncupatur, id autem (vt teſtatur Galenus
libro primo de difficultate reſpirationis (nomen ipſum ſufficienter de-
monſtrat. Verum ex hac appellatione, leſionis eius differentias diſcere non
licet, quinimò Gal. ipſum de affectione hac diuerſis in locis varie loquutum
eſſe reperio: nanque prædicto libro primo de difficult. reſp. quamlibet re-
ſpirationis offeſam ſimplicem, aut compoſitam, ſiue exigua, ſiue magna
fuerit, ſeu imbecilla, aut deprauata reſpiratio ſit *δύσπνοια*, hoc eſt, difficulta-
tem ſpirandi appellauit. Idem quoque confirmauit lib. 4. de loc. aff. vbi *πνοια*
quaſi, non ſpirationem dixeris, duntaxat à quauis alia reſpirationis ob-
leſione ſeiunxit: hanc nanque dicebat, alium eſſe à dyſpnœa ſpirationis af-

Cap. 1. in prin.

Quot m. o. ſis ſu-
mitur ſpirandi.
difficultas.
Cap. 2. & ſequē-
tibus.

Cap. 7.

cap. 3. & 4.

3. de dif. resp.
c. ult.
6. de morb. uul.
commentario 3.
Tex. 9. collige.
commentario 4
com. 4.
com. 4. & alibi.
Conciliantur.
Gale. uerba de
dyspnœa.

Difficultatis spi-
randi differen-
tiæ tres.

In quibus cōue-
niant, & diffe-
rant.

Anhelatio quid
sit.
cap. 6. in princ.
3 de morb. uul.
com. 2. com. 4.

Anhelosi qui di-
cantur.
Act. lib. 8. c. 57.
Pau. loco citato
cap. 11.
Orthopnœa,
quid sit.
commento 54.

fectum: id vero non ab re, nam lib. de differ. sympt. demonstravit quamlibet functionem bifariam lēdi posse, nanque, aut ea non fit, aut malè fit: si non fit, est vnum genus lētionis, vocaturque ablata functio. At si malè fiat, adhuc bifariam esse poterit, quia vel ipsa facultas debiliter, vel deprauatè operatur quo fit, vt vna debilis, reliqua vero deprauata actio dicatur, quanquam ambæ sub vno (vt diximus) contineantur genere, eo scilicet, quod malè functio fiat: & proinde Galenus cunctas respirationis lēsiones propter quas imbecillior aut deprauata ipsa redditur sub nomine dyspnœæ, seu spirandi difficultatis, in prædictis locis comprehendere voluit, tantum apnœam, id est, non spirationem, à qualibet respirationis offensa seiungens. quem sectatus Paulus cap. 29. lib. 3. cum de quibusdam differentiis particularibus lētionis respirationis asthmate videlicet, & orthopnœa verba fecisset, in hæc prorupit verba *δυσπνοια*, hoc est, spirandi difficultas communiter & his, & alijs compluribus affectibus superuenit. verum ipsemet Galenus cum lib. 3. de difficult. re spirationis, tum etiam 6. de morb. vulg. simul cum Hipp. *δυσπνοια*, hoc est, difficilem respirationem, eam respirationis oblētionem nominant, in qua densus spiritus redditur. quapropter de vna quadam specie ipsius difficilis respirationis, in qua videlicet spiritus densatur, creberq; efficitur, licet non valde ipsam intelligi voluit, à reliquis seiunctam, asthmate videlicet, & orthopnœa. Poterunt autem ne in his tempus teramus, Galeni verba conciliari; si quis dixerit, in vno loco communiter hoc vocabulo dyspnœæ vsum fuisse, in reliquo verò propriè, prout vna quædam species est, generis nomen assumens; quam propriè, more Hippocratis densum spiritum nuncupare fas est, & prout se intendit lētio aliud, atque aliud nomen habet: omne tamen malum in difficultate spirandi consistit, vt lib. 4. cap. 4. Celsus testatur. sed hæc (vt ipse inquit) dum modica est, neque ex toto strangulat *δυσπνοια* appellatur. Cum vehementior, est vt spirare æger sine sonno, & anhelatione non possit, *ἀσπμα* cum accessit id quoque, ne nisi recta ceruice spiritus trahatur *ὀρθόπνοια*. Idem quoque confirmavit Galenus prædictis locis, dum dixit, densum spiritum difficilem significare respirationem; & si magis increbuerit, hæc difficilis anhelitus species *ἀσπμα*, si vero maximè, *ὀρθόπνοια* nuncupatur. De his itaque tribus lētionis respirationis differentiis pertractare intendimus: quas omnes sub dyspnœæ nomine cōtineri promptè asserimus, sub vno tamen lētionis modo secundum magis, & minus differentes, vt pote sub denso seu cerebro spiritu: nanque si is exiguè densus sit, nomine generis dyspnœæ appellari poterit, vt supra ad Galeni, & Cornelij mentem demonstrauimus: at si maior crebritas fuerit *ἀσπμα*, si maxima, ita vt iacentes ægri suffocentur, *ὀρθόπνοια* nuncupatur. Quapropter idem Galenus *ἀσπμα*, hoc est anhelationem densam, seu crebram quandam respirationem esse fatetur tum 7. de compositione medicamentorum secun. loc. tum commento aph. 26. lib. 3. citra febrem, qualis currentibus accidit, aut quouis alio modo ad vehementem ductis motionem à tali euentu nomen assumens, vt liquet. 3. de morb. vulg. Verum in his quidem fit, ob exercitium, quod multa indiget animali respiratione: vbi autem non adest exercitium ob angustiam earum, quæ sunt, in pulmone cauitatum. Eos vero, qui hac affectione laborant consueuerunt medici astmaticos, anhelosos, seu suspiriosos nominare, Aetio, & Paulo testibus. Hos autem esse (Galeno auctore 3. de difficultate respirationis) qui densum spiritum habent, & simul thoracem multum distendunt, planè constat. Orthopnœa verò, quæ recta spiratio à latinis dicitur, ab hoc symptomate iterum nomen assumens, difficultatis spirandi quædam species est, in qua iacentes suffocantur, & vix recto thorace sufficiunt, nihil dilatato dorso, vt liquet 2. prorrheticorum: nec ab re cum iacent, seu decumbunt laborantes suffocari videntur;

tunc

tunc nanq; totus thorax (vt idem Galenus inquit 4. de loc. aff.) supra spinam ipsam concidit: quo fit, vt arctior reddatur via spiritus: cum vero se erigunt extenso thorace, ac collo recte arteriam ipsam asperam dilatari contingit, principium quidem habens a gutture, & in pulmone diuisa: atque etiam quæ ex ea in pulmonem distribuuntur propagines omnes, atque interim regionem augeri eis internam, eos vero, qui hac affectione laborant, Galenus eodem 7. de compositione medicamentorum secund. loc. orthopnoicos vocat, similiter etiam Paulus, & Aetius: propterea quod ad thoracis proportionem omnino totum corpus rectum habere coguntur ob timorem suffocationis, quin & stratum circa supernas partes, ad quas thorax ipse reclinatur, sibi ipsis erectius faciunt, ne dormientes strangulentur: minus est enim quod inspirant, quam pro vsu respirationis, quamuis thorax plurimum ipsis dilatur, vt idem Galenus inquit; cuius causam infra assignabimus: cum vero citra sonum, & anhelationem similiter sine febre densus afficiatur spiritus, hæc inquam affectio dyspnœa proprie dicta appellari poterit, quæ nihil aliud erit quam crebra, seu densa quedam respiratio citra sonum, ac anhelationem, & febrem: in hoc nanque omnes prænominatæ species, seu differentiæ tres, communicant quòd videlicet febre careant, vt patet 3. de morb. vulg. & 6. eiusdem: nãque de his sermo noster erit, & non de eis, quæ cum febre sunt, ad alias videlicet affectiones, seu inflammationes spiritalium, seu reliquarum partium subsequentes. in quibus etiam non facultas ipsa respirationem efficiens, neque usus per se afficiuntur, sed instrumeta ipsa, & inter ea aspera ipsa arteria, quæ in collo, & thorace continentur, seu eius propagines, quæ in pulmones distribuuntur, id quod sæpius accidit, sunt etenim strictiores, & propterea promptius obstruuntur, ac constringuntur, seu angustiores redduntur, quemadmodum liquet 4. de loc. aff. 7. de compositione medicamentorum secund. loc. & commento prædicti aph. 26. lib. 3. Quod vero in huiusmodi affectionibus tribus aspera arteria afficiatur, ex eo patere poterit, quod quanquam thorax maxime dilatatur, & proinde magna fiat respiratio, quantitas tamen inspirati aeris, magnitudini distensionis haudquaquam proportionem respondet: parua siquidem est eius, qui inspiratur quantitas, vt proinde cogantur laborantes crebro, & celeriter spirare. Qua de re magnæ respirationis geminas esse differentias, ex Galeni sententia liquet 4. de loc. affe. ac 1. de diff. resp. quarum vna penes magnitudinem distensionis, seu dilatationis, a thorace procedentis attenditur: reliqua vero penes copiam eius substantiæ quæ inspiratur, aeris videlicet. Semper itaque quantitas spiritus distensionibus thoracis similis est, cum eiusdem spiritus organa secundum naturam habent: cum vero præter naturam fuerint affecta, vt in prædictis affectionibus, ac reliquis quibusdam possibile est, aliquando plurimum distendi thoracem, sed parum externi aeris inspirari, verum non ad omnium affectionem respirandi organorum proportionem, sed solum asperarum arteriarum inspirationes fiunt. vt Galenus inquit eodem libr. 1. de difficultate respirationis: id vero sensu aliquo dignoscere non licet, sed sufficit ipsum solum aerem inspicere quantus inspiratur, & quantus rursus expiratur. Sed quoniam quæpiam difficulter spirare, præsertim vbi in ea spiratione omnes thoracis muscoli moueantur, aut virium imbecillitate, aut uehementi in corde, & pulmone calore, aut viarum spiritus angustia euenire potest, eodem Galeno teste 4. de loc. affect. quamuis interdum duæ, aut tres, licet raro, ex iam dictis causis concurrere possint. Propterea quomodo id distinguere liceat, ipsemet Galenus eodem loco scriptum reliquit: nam si ob virium imbecillitatem duntaxat, id fiat, licet omnes thoracis muscoli, ac pherenes quoque moueantur, motum tamen sensim efficiunt, sed neque frequens, neque rara omnino erit eorum actio, thorax

Cap. 7.

Cap. 6.

Orthopnoici
qui dicantur.Dyspnœa proprie
dicta quid
sit.5. de morb. vulg.
commentario 2.
Com. 4.6. de morb. vulg.
commentario 4
com. 4. in prin.
Quæ pars in eis
dem affecta sit.4. de loc. affect.
cap. 7.4. de comp. me.
sec. loc.
cap. 6.

Signa.

Magnæ respira
tionis duæ dif
ferentiæ.4. de loc. affect.
c. 7. in medio.
1. de diff. resp.
c. 13. in prin.

cap. 13.

Quod quispiam
difficulter spi
ret, ex una triū
causarum pro
uenit.

Cap. 7.

Ex virium im
becillitate
signa.

Ex vehemēti
cordis, aut pul-
monis calore, si
gna.

Ex spiritalium
instrumētorum
angustia, signa.

Qui affectus p-
ter naturā sint.
Quibus signis.
una differentia
ab altera fecer-
natur.

4. de loc. af. c. 7.
7. de comp. me.
secun. loc. c. 6.

Quem morbum
fecerunt,
Cap. 7.
causæ.

Earū cognitio.

thoracisq; dilatatio haud quaquam magna erit: nulla ab ore efficitur exufflatio, & spiritus ex solis naribus emitti solet, & si per inspirationem, narium pinnæ manifeste contrahi videantur, id prostrati roboris efficax indicium erit. Aucto vero in corde, & pulmone calore omnibus quidem thoracis musculis agit animal, sed velox, frequens, & uehemens est eorum actio: & propterea ubi ob plurimum calorem spiratio difficilis est, præter magnitudinem frequentiam, & celeritatem hoc quoque accidit, quod calidus frequensque exufflando proceditur spiritus. At qui ob spiritalium instrumentorum angustiam difficulter spirat, totus quidem thorax magna ex parte cis, & celeriter, & frequenter dilatatur, sed exufflare omnino non consueuerunt, neque calidum spiritum emittere: id enim aucti caloris proprium est. Ex his itaque indiciis difficilem spirationem ob spiritalium instrumentorum angustiam a reliquis distinguere poteris, de qua præsens sermo habetur: & cum tres sint eius differentiæ (vt diximus) cunctæ inter symptomata dinumerantur, functionis voluntariæ respirationis inquam: est nanque ea in omnibus oblæsa, non ablata, vt in apnœa, sed debiliter seu, imbecille, aut quoque interim deprauate, vt in orthopnœa, licet raro: separatur autem vnâ, ab aliâ quibusdam propriis indiciis, nanque in ea, quam dyspnœam nomine generis appellari diximus spiritus duntaxat densus, isq; modice citra sonum, & anhelatio nem apparet. In asthma vero, seu anhelatione, præter spiritus & dēsitatem maiorem, æger sine sono, & anhelatione, vt inquit Celsus, spirare nō potest. At in orthopnœa nedum spiritus crebritas maior percipitur, sed ita affecti nō nisi recta ceruice spiritum trahere valent, & cum decumbunt, seu iacent, suffocari, seu strangulari videntur. Ceterum his id commune existit, quod asperæ arteriæ angustiam sequantur, vt 4. de loc. affect. & 7. de compositione medicamentorum secund. loc. patet: manifestum nanque est (inquit Galenus) intrinsecus ipsis angustiam, seu coarctationem locorum factâ esse præter naturam, quam etiam egri ipsi non obscuro sensu perceptant. Illud etiam approbavit prædicto commento aph. 26. li. 3. quamuis etiam suppuratis, ob coaceruatum inter thoracem, & pulmonem humorem seu pus fiat, locorum coarctatio, seu angustia, eodem Galeno teste prædictis locis, & commento apho. 34. lib. 4. de qua non est ad præsens sermo. Ad morbum ergo in uia succedunt symptomata hæc, quamuis interdum viæ ipsæ obstruantur, per quas aer inspiratur, interim cōstringantur, ac coarctentur pro causarum diuersitate, quæ (iuxta eiusdem Galeni doctrinam 4. de loc. affect.) plures esse possunt, licet à Paulo vna tantum assignetur causa, quæ quidem potissima existit. Potest nanque angustia hæc citra febrem excitari, aut a tuberculo quopiam iuxta asperam arteriam orto, eamque coarctante, aut a lētis, crassisve, seu multis succis in bronchijs ipsis existentibus, aut eiusdem ab alijs partibus ad eadem delatis, ipsamq; asperam arteriam obstruētibus. Quæ omnia (vt Galenus inquit) per præterita accidentia discernere licebit: nanque si quis per bonam valetudinem, cum solitas actiones facere potest sic difficulter spirare incœperit, augeaturq; symptoma, neque inter respirandum stertere videatur, ad hæc nihil expuir, crudi tuberculi ortum suspicari oportet quādoque vero iuxta leues pulmonis arterias ipsum oriri contingit, grauitatem sentientes hi, veluti Antipatro medico contigit, demum temporis diuturnitate asperas pulmonis arterias coarctans, spirandi difficultatem efficit. Si vero stertendo strepitum fecerit respiratio, lentorum, crassorumq; humorum pertinaciter impactorum multitudinem, pulmonis bronchia molestare indicium est, cum & ipsa spirandi instrumenta non raro (vt inquit Galenus commento aph. vltimi lib. 3.) proprium sui algoris principium habeant: & propterea in ipsis multæ, ac crassæ superfluitates generentur. Verum si illico ab angustię sensu quis

quis difficulter spirauerit, fluxionem, vel à cerebro, vel à vicinis sedibus in pulmonem irruentem portendit, idque sæpe ex manifesta causa repente accidit, proprijs destillationis signis existentibus: pingui etenim (vt inquit Theodorus Priscianus libro secundo ad Thimotheum cap. 12.) & frigido phlegmate pulmonibus adherente, cauernæ, vel meatus, quibus naturaliter spiritus redditur, & accipitur, concluduntur; & ex hoc impedimento suspirium, uel anhelitus molestissimus nascitur, ut sedendo magis, quàm iacendo respirent. Verum si prædictæ affectiones ex alijs quibusdam præter iam dictas causas, interdum oriuntur, utpote ex angina, peripneumonia, pleuritide, empyemate, aut ex tumore aliquo abscessui simili in pulmone genito, seu alijs huiusmodi, licet de his non sit præsens sermo, ex proprijs tamen prædictorum affectuum notis interstinguendæ sunt, potissimum autem, quod nõ citra febrem erunt. Nos vero de eis, quæ sine febre excitantur, nec quippiam purulentum in eis per sputum reieciunt ægri, verba facientes ad prognosticum, ac curationem accedemus: nanque eos propriè dyspnoicos, hoc est, ægrè spirantes vocare consueuerunt medici, vt testatur Galenus 7. de comp. medicamentorum secund. loc. quibus bronchia pulmonis, crassis & viscosis humoribus sunt obfarta: horum denique & nos, prognostica enunciabimus, ac curationem instituemus, & cum Celso asserimus quam primam diximus esse differentiam, posse diutius trahi, duæ uerò insequētes, astma, & orthopnoea videlicet acutæ esse consueuerunt: ob vehementissimas etenim accessiones ægros interim strangulare solent, id quod dyspnoea propriè dicta nequaquam efficere valeat, cum modica in ea consistat spirandi difficultas. De asthmato autem Galenus commento aphorismi 40. libri secundi scriptum reliquit; velut de quibusdam alijs morbis, qui ex frigidis humoribus ortum habent, si valde senibus exciteretur, quod eos comitatur ad mortem. At Hippocrates aph. 46. lib. dicebat, Quibus gibbi ex asthmate, aut tussi fiunt, ante pubertatem moriuntur. Cælius vero Aurelianus lib. 3. cap. 1. sic ait, Grauat autem atque premit hæc passio magis mulieribus viros, & iuuenibus senes, atq; pueros, & durioribus natura corporibus teneriora, hyberno, atque nocte magis, quàm die, vel æstate. Cæterum communis prædictarum affectionum curatio est per ea, quæ crassitudinem, & viscositatem humorum sectant, atque attenuant, verum hæc siue pharmaca fuerint, siue victus, humiditatem quandã habere oportet, Gale. auctore, eodem. 7. de compositione medicamentorum secund. loc. Aer igitur eligatur ad calidum, & siccum parum vergens, vitandusq; est frigidus, ac valde humidus. Somno utantur moderato præcipuè nocturno, caputq; in lecto sublime habeant, Celso auctore; vitentque diurnum. Idem Celsus, prædicto loco, iacere egrorantes altioribus stramentis, thorace, atque capite subleuato, loco lucido, atque calido iussit. Clysterijs quoque alius ducenda, præsertim vbi natura eadem humecta non sit: prodest quoque nihil magis (vt inquit Celsus) quàm ambulatio lenta penè vsque ad lassitudinem; frictio multa præcipuè inferiorum partium vel in sole, vel ad ignem & per se ipsum, & per alios vsque ad sudorem, exercitio autem utantur ante cibum. animi perturbationes immodicæ omnes fugiendæ sunt; cibis vero lenibus (vt idem Celsus asserit) & sorbitionibus vtendum est, interdumque vino tenui austero. carnibus quoque gallinarum, pullorum, phasianorum, perdicum, starnarum, caponum, parumque auricularum montanarum vti poterunt, assis, aut elixis, cum pauco hyssopo, horeoselino, thymo, calamintha, aut fœniculo, aut reliquis huiusmodi extenuantibus. Pisces vitent, fructus ac omnia, quæ crassos, & lentos humores procreare possunt, Vini potus (Galenore teste) eis conuenit, substantia tenuis, nec exiguus eis tribuendus potus erit, imo multus, vt ipsæ inquit, nam humectatione multa opus habent, quo facile

Cap. 6.

Prognostica.

Curatio.

Cap. 6.

Victus ratio.

Venz sectio.

Com. 1.

Medicamentorum ratio.

Cap. 6.
5. de symp. fac.
cap. 2.

Cap. 2.

facile efferatur per tussim, id quod in bronchiis continetur: Exhibenda quoque pro potu aqua mulsa erit, Celso auctore, cum aqua ubi parum hyssopi, seu prassij, vel contrita capparis radix, sit aut, quo suavior aqua mulsa fiat glycyrrhizæ radix decoquatur, eaq; largiter vtantur. Quod si necessitas vrgeat (vt inquit Paulus) nihilq; prohibeat (vt ait Celsus) ante omnia vena incidenda erit; auxilium nanque est in sanguinis detractione, & præsertim in orthopnoea sicca sine sputis, vel tussi, citra puris collectionem, vt Galeno visum est 4. de ratione victus in morb. acut. Verum Cælius Aurelianus dicebat, At si præfocatio coegerit, & vires permiserint ægrotantis, adhibenda phlebotomia est: & Theodorus Priscianus, contingit aliquando etiam mediis ætatibus, adhuc calidis hoc vitium afferebat, quos phlebotomo liberari necesse est; incidatur autem media, aut interna in cubito vena, nec multa sanguinis copia detrahatur, sed quantum vires patiuntur. At si necessitas non vrgeat venam secare, ea tribuenda medicamenta sunt, quæ vim habeant humorum crassitudinem, ac viscositatem attenuandi, atque incidendi, & detergendi. Sed quoniam eiusmodi pharmaca necessario quidam tusses mouent, vt 7. de comp. med. secun. loc. & 5. de simpl. med. facult. liquet: quanquam, & bechica quoque ea dicantur in calidis, & tenuium partium substantiis contenta quæ extenuandi vim habent, quo ab aliis bechicis discriminantur quæ tussim sedant, quorum natura incrassandi existit, & propterea in frigidis, & crassarum partium essentiis insunt: cum itaque necessario tusses moueant pharmaca, quæ eiusmodi affectiones exigunt, nec facile per sputum reiiciatur quod abstersum est ob crassitudinem, non immerito iuxta Galeni sententiam, humectatione multa opus habent quod facile efferantur horum excrementa, propterea non ipsis duntaxat per se vtendum quæ incidunt, & extenuant, vt idem Gal. præcipit 5. de simpl. medic. facult. sed mixtis mellicatis, ptyisanæ, oxymeliti, aut dulcium vinorum cuiuspiam. Ad hæc eadem pharmaca eligi debent, quæ citra vehementem calfactionem extenuent, atque incidant, Galeno, & Aetio testibus: crassi etenim, & tenaces humores a vehementi calore viscosiores redduntur, glutinosique, & vt difficulter auelli possint, & insuper quemadmodum cauendum est ab his quæ vehementer calfaciunt (propterea quod viscosi, & crassi humores non solum nihil ab his auxilii sentiunt, sed etiam offenduntur) eodem modo (vt inquit Galenus loco citato) etiam quæ valde refrigerant vitanda sunt: omnia enim crassefaciunt, & cogunt, ac coaugent humores, eosque ægre (eluibiles reddunt nec minus astringentibus pharmacis eodemmet Galeno teste) abstinendum erit: maxime enim contraria sunt eiusmodi affectionibus: & ob id maxime eos iuuat acetum scyllinum, & acetum mulsum ex eiusmodi aceto confectum, atque ipsa adeo scylla assa cum melle, trita, & delicta, ut eidem Galeni visum est. & post eum Paulo, & Aetio. syrupi item ex hyssopo, glycyrrhiza, & marrubio, rosaceum mel, ac ipsummet oxymel simplex censerunt, pro extenuandis, ac detergendis prædictis crassis, ac frigidis succis, ac ad euacuationem parandis. Quibus sæpius assumptis, ac humoribus præparatis, ea propinanda erunt medicamenta, quæ crassos, ac lentos humores uacuare valeant. atque inter ea quæ calidissima sunt quemadmodum Archigenis auctoritate, Aetius cap. 57. lib. 8. & Paulus cap. 29. lib. 3. testantur: quæ non semel tantum, sed frequenter adhibenda erunt, ut eisdem visum est. Exhiberem autem primo unc. i. & scissæ fistulæ diaphœnicon 3. ii. agarici trochiscati, & pulueris hieræ simplicis Galeni ana 3. ii. ex quibus paretur bolus: uel ex agarici trochiscati scrup. iiii. & eiusdem pulueris hieræ 3. i. cum oxymelite formentur catapotia, ægroq; tribuantur: post quæ per aliquod tempus unc. ii. mellis roridi, seu, unc. i. & scissæ fistulæ in aqua hordei dissolutas assument; aut si manis pilulas ex agarico & Mesue descriptas exhibe, per interval

autem (vbi vsus ex postulat) pilulas præbe ex 3. j. trochiscati agarici, & scrup. ij. pulueris hieræ ex oxymelite confectas, à quarum assumptione, post tamen perfectâ euacuationem, gallinæ, aut caponis cum ptisanæ cremore ius tribue. Alius præterea clysteribus validioribus non raro eluenda: interim quoque exhibenda medicamenta sunt quæ valde ægre spirantibus auxiliantur; quem admodum est aristolochiæ rotundæ decoctum, aut centaurii maioris radix, & minoris succus, item stœcadis triræ decoctum, radices, seu fructuum spondylii, chalamintæ, hyssopi, iridis, ac melanthii: quanquam prædictorum decoctum in aqua mulsa, magis quam aquam commendarem: eiusq; vnc. iiii. aut iiii. exhiberem: in quâvisum ex caricis, radice glycyrrhizæ, & fœno græco, vua passa, adiunto, ac hyssopo decoctum in aqua, seu aqua mulsa parare poteris, interim marrubium quoque addas: Vulpinus quoque pulmo si resiccatus bibatur, asthmaticos iuuat, Galeno teste vndecimo de simplicium medicamentorum facult. eundem item pulmonem quàm recentissimum assum, sed sine ferro coctum edendū præbet Celsus, qui & vulpinum quoque iecur vbi siccum, & aridum factum est, commendat: poterit autem prædicti iocinoris, seu pulmonis vulpini aridi 3. j. exhiberi cum aqua mulsa, aut ptinasa, quemadmodum & ipse vtor, non semel tantum, sed sæpius. Conducunt insuper ea medicamenta quæ ore tenentur, ac sensim, & paulatim deglutiuntur, vim habentia attenuandi, ac detergendi crassos, frigidos, ac lentos, succos, quorum præcedenti capite de tussi meminimus: priuatim autem hoc modo parare poteris. Excipe diapenidii, & dihyssopi Nicolai, singulorum 3. ij. diatreos Salamonis eiusdem Nicolai 3. j. diatragacanthi calidi 3. j. & s. syrupi ex glycyrrhiza, & iuiubini ana vnc. ij. & s. mellis rosacei vnc. j. misceantur omnia, & vtare licebit autem quandoque vno, vel duobus ex iam dictis antidotis, & non omnibus cum præ nominatis syrupis, aut aliis quibusdam ad eundem vsus facientibus vti. Confert item portio theriacæ antidoti, ex Celii Aureliani sententia, & aquarum naturalium vsus insuper confert, ex decreto Theodori Prisciani abrotani pulvis cum mellicrato, seu oxymelle, & castorii pulvis, vt ipse inquit, commodius operatur si similiter propinetur. Extrinsecus autem thoraci cataplasmata imponenda sunt, vt Paulo, & Aetio visum est, ex ficibus, & hordeacea farina, magis vero ex loliacea, habente resinam, mel, & ceram admista: infarciri etiam potest ei iris, & manna, aut ex hordei farina cum resina, cera, iride, & manna, ac aqua mulsa cataplasma fiat. Post quæ vnguenta etiam thoraci, superimponi possunt, quæ ex calfaciant, vt irinum, anethinum, & rutaceum, ex Pauli sententia, in quem vsus tale vnguentum confici poterit. Excipe seminis lini, fœni græci, & althææ ana 3. ii. radices iridis 3. j. & s. olei irini, chamæmelini, & rutacei ana vnc. i. butyri recentis, & adipidis anseris, seu gallinæ vtriusque 3. iiii. ceræ quod satis sit, fiat vnguētum: prius tamen quàm thorax, hoc vel alio vnguēto illinatur aspero linteo fricandus erit, quo reseratis meatibus, medicamentorum vis promptius ad profunda penetrare valeat: est namque pectus, vt eidem Theodoro Prisciano visum est, calidis vnguentis, & vaporibus defricandum. Caterum inueterato malo, & omni medicina frustra adhibita: ad vitionem confugiendum erit modo quo prædicto loco Aetius præcipit. Verum si contingat ex crudo tuberculo prædictarum aliquam affectionem oriri (modo curari valeat) eadem, & similia medicamenta propinanda sunt, ex Galeni doctrina 4. de loc. aff. qui non modo Antipatri medico similem iussit victus rationem, atque medicamenta adhiberi, verum etiam ei qui paruo grandinis grano frustum quoddam haud absimile excreuerat, medicamentum in potu dedit, quod asthmaticis auxiliatur, & si tandem, velut etiam & Antipater medicus, mortuus fuerit.

Que post purgationem medicamenta exhibenda sint.

Cap. de pulmone.

Topica.

Cap. 7.

περί αἱμάτων πύσεως:

De cruenta spuitione. Cap. 49.

Cap. 2. in prin.

Cruenta spuitio
quid sit,cap. 5.
Ex quibus par-
tibus preuenire
possit.
In quo differat
fluor a sputo san-
guinis.Quibus indicis
distinguantur par-
tes, ex quibus
cruenta spuitio
prouenit.
4. de loc. affect.
Loco citato,

Ex hirudine.

Loco citato.
Si ex stomacho
proueniat, si-
gnu.
Lib. 3. c. 59.

Quamuis quælibet sanguinis eruptio toto genere præter naturam esse censeatur, eo excepto sanguinis fluore, qui mulieribus ab utero defluit, cum videlicet modum in quantitate non excefferit, ut 3. de caus. sympt. testatur Galenus, tamen hæc sanguinis excretio quæ à Græcis αἱμὴν πύσις, ἢ αἱμὴν πύσις, ἢ αἱμὴν πύσις nuncupatur, à latinis verò sanguinis expuitio, seu reiectio, seu cruenta spuitio non modo inter alias sanguinis expulsionem, verum etiam inter alios præter naturam affectus difficilior existit: nam pessimorum, longorumque morborum magna ex parte causa redditur, Alexandro teste cap. r. lib. 7. Est autem affectus hic ex ore quælibet sanguinis excretio: cæterum cum per os à nonnullis corporis partibus sanguis excerni possit, quæ omnes proprijs indicijs interstinguuntur; ea propter modum quo singulæ dignoscantur, ac à reliquis secernantur, primum docere tentabimus à Galeno instructi. 4. de loc. aff. quem reliqui Græci quos vidi, Arabes, ac latini sectati sunt: inquit enim ipse quod conuenit inter medicos sanguinem, aut è gula, & ventriculo, aut ex spiritualibus partibus, thorace videlicet, pulmone, seu aspera arteria, aut ex faucibus, & gurgulione, vel ex ipso proprio ore, seu ex gingiuis expelli. Illud tamen animaduertendum, ut inquit Cælius Aurelianus cap. 9. lib. 2. quod differt fluor sanguinis à sputo, quod neque fluor sanguinis sputus dici potest, paruam etenim materiæ significationem sputus refert, fluor plurimæ, neque sputus sanguinis fluor, supradicta ratione: paruam etenim materiam sanguinis ex gingiuis, aut vna, aut faucibus emissam, sputum magis quàm fluorem rectè nuncupauimus. differt ergo fluor à sanguinis sputo ratione plurimæ, aut exiguæ quætitatis sanguinis ac partium diuersarum ex quibus profluit. Verum singulis iam dictis partibus proprius est reiectionis modus: nanque si ex gula, ventriculoque proueniat vomitione expellitur, ex spiritualibus partibus, tussi, ex faucibus, & gurgulione, screatu. Si vero ex aliquo loco oris, aut gingiuarum, simplici expuitione expuitur: quamuis ipsemet Galenus testatur sæpenumero conspexisse sanguinem à cerebro, & gurgulionis partibus internis ad fauces affatim descendente tussiendo educi, ut pote qui subito gutturi irruens tussim mouere poterat. Quare diligenter animaduertere oportet, ne aliquando huiusmodi sanguinem ex spiritualibus instrumentis ascendisse putemus, credamusque hanc sanguinis eruptionem esse quàm periculosissimam, tanquàm à pulmone vehementer affecto prouenientem. Verum ex dicendis patebit, qua via id interstingui valeat, quamuis nonnunquam etiam accadat, ut pluribus ex ordine diebus quispiam sanguinem excreat, & emungat, idque citra capitis vel dolorem, vel grauitatem præsentem, siue præteritam, neque aliquo præcedente ictu, propter deuoraram hirudinem, in ea oris parte adhærentem, qua ad nares foramen tendit. Quare hanc partem, & totum per nares meatum accuratè, & sæpius considerare oportet; præterita quoque semper interrogando: nanque ex his rei ipsius veritatem faciliè conijcies: eadem ratione ex ventriculo quoque epota hirudine cruor euomitur verum is siue ex ventriculo, siue naribus, siue ore feratur, tenuius erit, sanieique speciem refert, eodem Galeno teste. Atqui relicta hirudine, ad dignoscendas partes ex quibus ex alijs causis sanguis perfluit, accedamus: nam si è stomachoeductio fiat præter quam quod vomitione excernitur, ut diximus, non magna erit sanguinis eruptio; graciles etenim sunt stomachi venæ ut inquit Aetius; & cum

nausea

nausea quoque sanguis effertur, ac inde glutiendo mordacitas percipitur, maxime si astringentia, aut acia deglutiantur. Si vero ex ventriculo educatur, nauseę plurimę comitantur, & vomitus; & si a cibo sumptoeductio contingat, sanguis permixtus, aliquando etiam pituita, & bile efferetur. Aut si ex hepate, vel splene sanguis in ventrem deferatur, & ex eo demum uomitione expellatur, in alterutro viscere aderit tumor, ac dolor, ipseque sanguis grumofus, ac niger erit; & magis si a splene in ventrem delatus fuerit. Ex spiritalibus autem partibus licet tussi eiiciatur sanguis, inuestigandum erit, num ex thorace, pulmone, aut aspera arteria euictio fiat: nanque si thorax affectus erit, neque multus, neque ruber sanguis erit, sed nigricans, ac grumofus ac minus calens, ceu e longinquo veniens. Dolores insuper circa rem intensiores sunt, cum ad ipsum multi adueniant nerui, quibus facile dolores percipi possunt, musculis præterea, ossibusque thorax abundat, ut inquit Galenus: interim sanguis qui ex thorace effertur foetidum odorem de se præbet, & aliquando pure admixtus est. Si vero spumans, & subalbidus, floridus, feruens, confertim, multusque citra dolorem, aut eo multo remissiore existente cum tussi sanguis reijciatur, pulmonem affectum esse notum est, ex eiusdem Galeni sententia, tum 4. de loc. aff. tum 5. meth. med. est nanque pulmo laxus, & ab affectione tutus a sexta duntaxat neruorum cerebri coniugatione duos perquam tenue neruos per eius membranam dispersos excipiens, qui haudquaquam per visceris profunditatem extenduntur. At si paucus sit qui cum tussi sanguis effertur, ægrique doloris sensum iuxta aliquam arterię partem percipiant, sitque sanguis hic quodammodo pure permixtus, aderitque etiã paucitas sputi, ac tussis non valida, aspera arteria affecta erit. Sanguis vero qui ex faucibus, & gurgulione sreatu effertur, vel ipsis primario affectis, aut per consensum a cerebro sanguine descendente ad ipsas partes contingit. Verũ si a capite descendat, præter id quod nedum sreatu, sed tussi interim eiicitur, aderit ipsius palati titillatio, ac frequens excreatio, irritantur ægri ad tussim licet non valde tussijant, præsertim vbi quippiam subito gutturi irruat, aderitque capitis grauitas, aut dolor, aurium sonitus, faciei rubor, venę frontis emicant, vertiginesque accidunt, præcessitque nimirum capitis ictus, frigiditas, aut calor, seu ebrietas, interim consueta per nares sanguinis excretio cohibita. At si absque his cum sreatu sanguis educatur, faucesque seu gurgulionem sanguinolenta inspexeris, atque veluti exulcerata, eas partes per se affectas esse non dubitabis: veluti si simplici expuitione sanguis expellatur, ex ore, seu gingiuis profluit, vt diximus; nec minus sensus diiudicabit. Interim vero accidit vt a capite per gulam, seu stomachum sanguis in ventrem defluat, vomituque reijciatur, verum præter id quod cuncta iam dicta capitis symptomata præcedunt, sanguis hic levis, equalis, atque immixtus erit, nec adeo crassus, & colore nigro, & cum excretionem statim se in linguam infert rotundus, facillèque reijcitur per sputum, ita igitur, locos affectos in sanguinis reiectione internoscere licebit. Affectus vero ipse, quod symptoma sit, a quacunque parte, & quouis modo excernatur, in genere excretorum præter naturam tota substantia, seu toto genere a naturali habitu recedens, Galeno liquet lib. de diff. symp. quamuis interdum cum functionum noxa, interim vero citra noxam functionum expellitur, quemadmodum si ab aliqua parte in ventriculum fuerit deriuatus, isque demum uomitione reiectus fuerit: distingues vero id ex eo, quod expurgatur, nunquid tanquam molestum excernatur, seu in tempore, vel non, quemadmodum supra declarauimus cap. de profluuiis sanguinis narium. Euenit autem utrovis modorum reijciatur, aut referato aliquo vasis osculo, aut rupto, aut eroso vase, eodem Galeno teste tum lib. de diff. sympt. tum 4. de loc. aff. quamuis

Ex ventriculo.

Si ex hepate,
uel splene.
Si ex spiritali-
bus partibus si-
gna.

Citato loco.
Ex pulmone.

4. de loc. affect.
cap. 5.
5. meth. c. 8.
circa princip.
Ex aspera arte-
ria.
Ex faucibus &
gurgulione.

Ex ore, seu gin-
giuis.

Quis præter na-
turam affectus
sit exuenta spui-
tio.
Cap. ultimo.

Li. de diff. sym.
cap. ult.
4. de loc. affect.
cap. 5.

quinto

e. meth. c. 2.
De diapedesi
nota.

Quot modis na
e uasis sanguis
perfluat.

Si ex uasorum
ruptura fiat, si
gna.

Causæ.

Cap. 8.
Circu medium

Si ex uasorum
exesione fiat, si
gna, & causæ,
4. de loc. affect.
Cap. 8.

5. meth. c. 6.
4. de loc. affect.
cap. 5.

4. de loc. affect.
Cap. 5.

quinto meth. med. per diapedesin quoque sanguinem è vasis profluere posse-
testatur. At quia id fieri haud quaquam potest, nisi ob exiguarum venarum
reperationem, seu rarefactionem tunicarum, uel propter eiusdem sanguinis
tenuitatem seri speciem referentis: propterea (vt idem Galenus asserit, 3.
de caus. sympt.) vel ad vasorum reperationem, quam Græci ἀναστρέφωιν nun-
cupant, hic modus profluvii sanguinis reduci debet, vel in genere cruentæ
excretionis connumerari non debet, quippe cum seri speciem referat san-
guis qui profluit, qualis per iocinoris, renūque imbecillitatem subinde
euenire solet; quo fit, vt nec quartum genus à iam dictis tribus sanguinis, qui
per diapedesin transcolatus, seu sudoris modo transmissus, à vasis profluit,
dici debeat: profluit itaque ex vasis sanguis, aut eorum osculo aperto, aut ip-
sis ruptis, aut erosis; atque apertio osculorum instrumentalis morbus in via
est nimis patefacta; ruptio verum & erosio in soluta continuitate continen-
tur. Verum si ex vasorum ruptura fiat ex multi sanguinis fluxione, ac con-
fertim facta deprehendes, id quod vel ex externi, vel internis causis pro-
uenire potest, externis siquidem, vt cum aliquis ex alto, vel in ludo, vel cer-
tamine ceciderit, aut cum alter super alterum cadit, vel ex inanimatis cor-
poribus aliquod graue, vt lapis, vel lignum hominem offenderit; item si ira
cum exclamatione præcessit; cytharædis quoque, ac tragædis certantibus
acuta, vehementique voce vasa interdum dirumpuntur, vbi violenter clamare
conantur, non præmissa pulmonis lenitione per præcedentes exclamatio-
nes, vt Galenus inquit eodem 4. de loc. affect. Interim nullam ex prænarratis
manifesta extrinsecus adueniente causa, vas aliquod, tum in cæteris corpo-
ris particulis, tum in pulmone dirumpi potest; ob sanguinis abundantiam
vel, per se, vel vna cum crudo, & frigido, & flatuoso spiritu venas extendæ-
tum videlicet vas ipsum extensioni resistit, aut ob frigus à vicinis partibus
contractum, aut ob innatam intemperiem, quemadmodum, & ipsam aqua
frigida, Hippocratis auctoritate venas frangit 24. apho. libr. 5. & 6. de morb.
vulg. commentario. 3. Tex. 14. Verum non per se ruptiones facit sed quia
venarum tunicas frigiditate sua duras, & exendi contumaces reddit, & vt
rumpantur parationes efficit. Erit igitur eruptionis causa, aut externa, aut
quius vehemens motus, aut humorum abundantia, seu sanguinis copia, ut
diximus; vtrisque vero commune existit sanguis effusio repente, & coa-
ceruatim facta. Si vero exeso vase aliquo cruentum sputum eiiciatur, non
confertim, sed paulatim per modica interualla sanguis reicitur, præcedereq;
solent sanguinis expuitionem exigua sputa, vt inquit Galenus, atque acres in
pulmonem à capite fluxiones, si ab eo sanguis profluat, temporis vero diu-
turnitate, multi sanguinis inter tussendum eruptio fit, vt 5. metho. & 4. de
loc. aff. liquet, & potissimum si nulla præcesserit ex prænarratis externa cau-
sa quo circa diligenter considerare oportet num quippiam spumofum simul
educatur: id enim efficacissimum erit indicium, quod proprium pulmonis
parenchyma fuerit exulceratum, haud secus si bronchi pars quædam, aut
arteriæ, aut venæ tunica eiiciatur, eedē ipsius pulmonis partes exesæ erunt,
quemadmodum apho. 13. libri quinti, & prædicto 4. lib. de locis affectis scri-
ptum reliquit Galenus: præcessit quoque acrium, prauorumque ciborum vsus
vel inedia, Paulo auctore. At si nullum ex prædictis, præterquam plenitudo
interdum cruentum sputum præcesserit, vt inquit idem Paulus cap. 31. libri
tertii, Verum victus humidior, calidiórque; balnei immoderati vsus, calidi
nimis loci inhabitatio antecefferint, fueritque anni tempus eiusmodi, vt Gale-
nus asserit, & vt summatim dicam, si tales calidæ dispositiones præcesserint,
ex reperatione osculorum vasorum, & non ex ruptione, aut exesione pro-
ficisci cruentam expuitionem iudicabis. At ex qua prædictarum causarum
sanguinis

sanguinis reiectio fiat, qualiscunque fuerit vasorum affectus, partim ex se ipso, partim etiam ex egri, seu astantium relatione haud difficulter percipere poterit medicus, qui summa cura praedicti affectus curationem aggredietur propter imminens (vt inquit Paulus) ex immodica euacuatione periculum; siquidem copiose euacuatus sanguis quemadmodum in his qui iunguntur, mortem inter praesentaneam, si affectus remanet, in tabe transire minatur. Quod autem cruenta expuitio periculosa sit, decretum reliquit Hippocrates aph. 25. lib. 3. cum dixit, Sanguinem quidem supra ferri qualiscunque sit, malum; intelligens per supra ferri (vt Galenus exponit) eum sanguinem qui per os excernitur. Aph. vero 3. 7. lib. 7. sic scriptum reliquit, Quicunque euomunt sanguinem, si sine febre quidem, salutare: hoc est, vt inquit Galenus, curari possunt: subdit autem Hippocrates, si vero cum febre malum. At si cum tussi ex pulmone emittatur sanguis, & si quam maxime absque febre fuerit, periculum imminet ne curari possit; & si durarit, omnino postea febres succedant, Galeno teste in commento eiusdem aphorismi. Verum si mulier sanguinem euomuerit menstruis erupentibus (vt idem Hippocrates inquit) aphor. 32. lib. 5. solutio fiet. A sanguinis vero sputo, puris sputum malum esse, aph. 15. 7. lib. dicebat: nanque purulentum sputum (vt in commento ait Galenus) non omne sputum sanguinis sequitur, sed quod malignum existit; tale autem est omnino ex pulmone, ex quo proueniente sanguinis reiectione, ea quae intra tres dies non curatur, plegmone deinde adueniente, omnino incurabilis affectio erit, potissimum si ex erosione ortum ducat, eodem Galeno teste 5. meth. med. Nanque sanguinis euacuatio (Paulo teste) quae fit exesis vasorum tunicis, nunquam commodè cadit. facitque valetudini, etiam si ex pulmone non fiat; etenim grauissimè nocet, vt inquit Celsus: quare difficilis est iudicanda curatio eorum, quibus à pulmone sanguis profluit, ex Sorani sententia, & non impossibilis omnino: velut rursus cuilibet patere poterit, sanguinem ex ore, & gingiuis profluentem cetæris minimum periculosum esse, quemadmodum si ex faucibus, interioribusque partibus processit, & metus maior est, & cura maior adhibenda, eodem Celso auctore. At si ex thorace sanguis profluat, quod minoris sit periculi, quam si ex pulmone, Galenus 5. meth. med. & 4. de loc. affe. scriptum reliquit, quo fit (vt patet ex Celso) quod modò minus, modò plus periculi habet sanguinis expuitio: etenim ex capite veniens fluor, generaliter est curatione facillimus; ex stomacho, vel uentre, aut faucibus curabiles fluxores approbauimus: ulceratione facti difficiles curatione ab iis, qui eruptione fuerint effecti iudicantur: omnium verò difficilis, atque grauior curatione ex pulmone fluens sanguis accipitur, ob iuge spirationis officium, vt liquet apud Caelium Aurelium lib. 2. cap. 12. Quoniam vero non vnam requirunt cruentæ spuitiones victus rationem, ac curationem, sed quodammodo diuersam, propterea cruenti sputi ex disruptione, aut vasorum apertione orti ex quauis parte prius victus rationem instituemus: nanque aut si milem aut paucissimis discrepantem vasorum disruptio, ac reformatio rationem victus, simulatque curationem expostulant, diuersam vero ab his requirit erosio, de qua ultimo loco per tractabimus. Sit autem eis c uentis expuitionibus, quæ ex iam dictis duobus vasorum affectionibus oriuntur, communis, ac proba victus ratio hæc. Aer continens eligatur ad frigidum, & sicum parum vergens, à calido vero, ac humido abstineant: qua ratione austeri nos flatus vitent: Somno vtantur moderato, praesertim nocturno, fugiantque diurnum: caputque cubantis sublime sit, praesertim si ex spiritualibus perfluat sanguis, nec conclaue calidum, & inclusum existat, aut mobile. Alui excrementa quotidie natura, aut arte, clysteribus praesertim lenibus excernantur. Conuenit eisdem magnopere quies, escuritas, ac silentium, Celso, auctore

Prognosis.

cap. 3. 11. 13. & 14.

5. meth. c. 8.
4. de loc. affe.
cap. 5.

Curatio cruenti sputi exruptione, seu vasorum reformatione facti.

Victus ratio.

Cap. 8.

Lib. 5. c. 62.

Medicamentorum ratio.

Cap. 4.

re, vitent: ita que motum, ac exercitium, præsertim vbi ex spiritalibus partibus sanguis profluxerit; item & magnam, ac frequentem respirationem, immo sensim respirent, semperq; silentium agant, ac reliquam omnem quietem eligant, vt Galeno visum est 5. meth. med. Animi quoque affectus immodicos iram præsertim, omnino fugiant, pariterq; & venerem. Quo vero ad cibum potionemq; attinet, eligendi sunt qui emplasticam vim habent, & refrigerent, vt eodem loco testatur Galenus; atque valentior sit æger, omne ferè nutrimentum circuncidendum erit; sint aliter sorbitionis quo d satis est, exhibendum, potissimum vbi pulmonis vas fuerit disruptum. Quo fit (vt Trallianus asserit) omnem cibum, qui prædictis exhibetur, debere vim mediocrem obturandi, ac leuiter adstringendi habere, & neq; quippiam calidum offerre sed omnia potius sint temperata, & ad frigidius declinantia, etiam actu, licet non vehementer, vt inquit Aetius, neque nimiam humectationem inferre debeant: pauci itaque cibi mediocriter frigidi, ac potus, & naturæ quoque astringentis exhibeantur; velut ptisana, & eius cremor, alica, frumentaceum amyllum, similago valenter decocta, aut oryza: quæ omnia longe meliora sunt, si aliquod adstringens cum eis fuerit decoctum, aut eorundem succus adiectus sit, verbi gratia, cotoneum malum, pyrum ve, aut pomū aliud austerum, malique punici grana, aut si non libeat talia cum sorbitionibus decoquere, succum alicuius eorum semper adijcias, ne dum in prædictis sorbitionibus, sed in cunctis aliis eorum cibis, qui insuper in aqua pluuiæ decoquantur: in qua etiam micæ panis imbutæ pro cibo conueniunt. Ex oleribus assument egri lactucam decoctam: interim ipsam in poscam aquosam intingentes, similiter intybum, & portulacam, vel arnoglōssam, Tralliano, & Paulo testibus. At si vires requirant, ex carnibus conuenit assumere, gallinarum, pullorum, phasianorum, perdicum, columbarum, starnarum, capreolorū, turdorum, ac reliquarum montanarum auium, gallorum quoque testiculos, potissimum assatos anserumq; alas, non tamen veterum, nec non ventriculos, ouaq; ipsarum abiectis albuminibus, similiter gallinarum lutea summo opere commendauit Alexander: & vbi sanguis expui desierit (ex eiusdem sententia) pedes suum, & pisces saxatiles, aceto inter coquendum adiecto offerantur: vice quorum tum hœdi, seu etiā castrati (vt ita dixerim) pedibus vtare. Quod si febris adsit, lac quoque tribuas, caprillum præsertim, aut aliquod ex prædictis cibis cum eo decoquas, potissimum iis, qui etiam per sanitatem lac assumere consueuerunt. Ex fugacibus fructibus, exhibeantur qui modice astringant, vt mala præcipue decocta recenti mulso, vel torrida, pyra, sorbua, melpila, raro autem pinifructus, & vuas passas assumant; & si admodum siticulosi fuerint, pepones, cucumerum medulla, ac vua pensilis exhiberi potuerunt, eodem Tralliano teste: a ficibus autem, pistaceis, maximeque amygdalis abstineant. Si febris careant, eorum potus sit vinum aquosum, modicum) vt inquit Paulus) pluuiæ aqua dilutum: at si febris adsit, eadem pluuiæ aqua pro potu vrantur, aut ea, in qua chalybs ignitus extinctus fuerit, seu coriandrorum præparatorum semina decocta sint, eaque tosta, aut palmula, cydonia, pyra, vel reliqua astringentia poma, aut vitia pampini, portulacæ, seu arnoglōssæ folia. Vbi vero vires imbecilliores fuerint, si vinum rubrum, crassum, austerumque tribueris, ex aliqua prædictarum aquarum dilutum, nihil nocebis. Quo vero ad curandi rationem attinet, sanguinis reiectio, quæ ex apertione osculi alicuius vasis contingit, per ea quæ dilatatum os obturant, curari debet, Galeno auctore 7. de compositione medicamentorum secundū locos. obturant autem osculū dilatatum medicamēta, quæ vim habent astringēdi: eius vero, quæ ex vasis ruptura fit, curatio per eiusdem conglutinationem perfici: atqui conglutinetur ruptum per

per eadem medicamenta astringentia, & quæcunque ipsis in compositione
 misceantur citra mordacitatem resiccantia, & glutinosum quiddam habentia:
 quæ iccirco quod ex lenta, crassaq; substantia consistunt, meatus obstruunt
 & Græci *ὑπερτασίαν* vocant, vt 5. metho. med. & 4. & 5. de simpl. med. facult.
 liquet. Id vero in vtrisque prius animaduertendum, nunquid causa ruptio-
 nem efficiens desierit, vel adhuc maneat: nanque si desierit, primum sistere
 sanguinem expedit, post vero (vt inquit Galenus eodem 5. metho. meden.)
 ruptum vas, aut resecratum sanare, eo conglutinato, vel obstructo. Si autem
 permaneat adhuc efficiens causa, vt pote abundantia, ea quidem primo vacu-
 anda erit; etenim manente ea, vas etiam plus rumpitur, aut resecratur; ab hinc
 sanguis suppressendus, moxq; vlcus ipsum vasis, vel eius apertio curanda. De
 sinente itaque effeetrice causa, primum sistere sanguinem expedit, Galeni
 decreto; post vlcus sanare: obturato quidem quod perruptum est, auerso au-
 tem atque aliorum translato, quod per id ferebatur: quando si id eo, quo in
 res initia, impetu confluat, oculumque vasis pari modo pateat, citius plane
 moriatur animans, quod profluuium laborat, quam sanguis cesset effluere: si
 stitur porro qui è vasis profluit sanguis, aut propterea quod amplius non con-
 fluit, aut quod occlusa diuisio sit, seu conniueat id quod resecratum est, vel
 propter vtrunque, vt inquit Galenus eodem libro 5. metho. meden. id quod
 ipse dicit esse tutissimum. Hæ quidem sunt communes curandi indicatio-
 nes cuiusvis cruentæ exuptionis, ex diuisione, seu apertione vasorum cuius-
 libet partis. est insuper & aliud commune omnium internarum partium af-
 fectarum, vt idem Galenus 4. metho. meden. asserit, vt ea eligantur, quæ ani-
 malis naturæ maxime sint familiaria, siue ea cibi sint, siue medicamenta; fu-
 giantur respuanturq; huic contraria; verum quia quæ a partibus indicatio
 sumitur, ea communibus, quæ iam dictæ sunt curandi indicationibus, ve-
 luti auctarium in singulis affectibus accedit, iuxta quam rationem contin-
 git, & quodammodo curationem variare, ac interim cum prædictis con-
 traria medicamenta miscere, vt patebit: ea de re priuatim ex iam dictis cau-
 sis cuiuslibet sanguinis reiectionis a quauis parte prouenientis, curatio-
 nem instituere decreuimus: nam si ex gingiuis exit, portulacam manducasse
 satis est, Celso auctore. Si ex ore, continuisse eo merum vinum, si id parum
 proficit, acetum; si inter hæc quoque grauitur erumpit (quia consumere
 hominem potest) commodissimum est (vt ipse inquit) impetum eius admo-
 ta occipitio cucurbitula (sit vt cutis quoque incidatur) auertere. Si id mu-
 lieri, cui menstrua non feruntur euenit, eandem cucurbitulam, incisus in-
 guinibus eius admoere: conducit autem eisdem oris collutio ex plantagi-
 nis, polygoni, ac portulacæ decocto in aqua pluuiæ, pauco addito aceto,
 vel vino rubeo astringenti, aut succi eiusdē portulacæ, polygoni, aut arnoglos-
 se assumptis vnc. iij. cum rosacæ, seu myrtinæ aquæ libra vna; permisce, &
 vtare; addas (si lubet) aceti parum. Quod si adhibitis his adhuc grauitur erum-
 pat sanguis, quo is auertatur, sanguinem mittere expedit, loco cucurbitulæ
 humeralem, aut mediam incidens: aut si mulier sit; quæ laborat, cui menstrua
 non feruntur, in talo venam secare expedit, pari ratione, vt sanguis auerta-
 tur. Si vero ex locis circa fauces, aut gurgulionem sanguis feratur, aut per pa-
 latum, gargazirare oportet ex astringentibus, frontique & capiti admoenda
 sunt quæ ex naribus sanguinem fundentibus accommodantur, Paulo esse:
 quare sufficiunt astringentia per collutiones, aut gargarismata adhibita fri-
 gida; nam a calidis, & rarefacientibus, collutionibus plus sanguinis erumpit,
 vt inquit Aetius, vel ea, quæ modo scripsimus, vel ex his, quæ dicemus com-
 ponantur; aut ea quæ capite de angina scripsimus, & de gurgulionis inflam-
 matione huc transferas. Verum si à capite sanguis feratur: multusque sit,

5 metho. capit. 3.
 in princ.

4. de simpli. fa-
 cult. ca. 3. & lib.
 5. capit. 8. & 10.
 colligitur.

Quid primo
 animaduerten-
 dum sit pro cu-
 ratione.
 Cap. 3.

Cap. 3.

Quid 2. animad-
 uertendum.
 Cap. 7.

Curatio cruenti
 sputi, si ex gin-
 giuis proueniat

Sanguinis mis-
 cio.
 Si ex faucibus,
 aut gargulione
 proueniat cura-
 tio.
 Lib. 3. capi. 59.

Loco citato.
 Si ex capite p

ueniat curatio,

Si ob destilla-
tionem spiritus
cruenta fiat, cu-
ratio.

Paul. lib. 1. cap.

31

Aet. lib. 3. c. 60.

ca. 13. in prin.
Locis citatis.

Vomitus sangui-
nis curatio.

cap. 5

Lib. 3. c. 61

qui deferatur euacuatione opus erit, ex eiusdem Aetij sententia: quare citius (vt ipse ait) per nares, aut per venæ alicuius incisionem euacuare oportet, inferens ex eius verbis, aut ad propinqua deriuandum, aut ad longinquas partes diuertendum esse; ne per negligentiam consuetudo fiat sanguini in hos locos delabendi. Sin vero plurimus fuerit fluoris lapsus, acatia ex aceto frontis, atque temporum partes illiniendæ sunt, & perseuerante fluore, cucurbita quoque apponenda (subiecta flamma plurima) occipitio ex Cælij Aureliani sententia. At si ob distillationem, sanguinem reiecerint, ad quamcunque partem feratur, aut quocunque modo excernantur, his venam incidere protinus in principio debes, vt Paulo, & Aetio visum est: secato autem humeralem, aut mediam, nisi vehementer acris humor destillauerit: nanque huius curatio patebit, cum de erosione tractabimus; ac pro virium modo sanguis detrahatur: Acres quoque clysteres adhibeantur, frictionibus multis, manibus brachijs, ac cruribus vtantur; ac vinculis extremæ partes colligentur, postea raso capiti pharmacum ex stercore syluestrium columbarum impone, quemadmodum Romæ in splendida mulier peregrite Galenus, vt patet 5. meth. med. quem demum sectati Aetius, & Paulus, & ipsi quoque id scriptum reliquerunt: vel aliud simile. calidum medicamentum capiti imponas; vel candenti ferro inunctio in capite fiat, ex Tralliani decreto: & velut idem Galenus interpositis tribus horis in balneum demum mulierem duxit, ac lauit, deinde caput idoneo pilo contexit nutriuitq; eam sola sorbitione, fructusque quosdam austeros dedit; deinde cum dormitura esset recentem thyrascam, circiter quatuor menses ante confectam tribuit, ad fabæque magnitudinem vespere rursus eam dedit, quamvis pridie hoc longè amplius accipisset, & tertio die mane mel coctum copiosè exhibuit, ac reliqua probè ministravit, vt præcitato loco patet; pariter & tu similiter affectos curabis. Quod si malum in vetustatem incidit, cucurbitula quoque occipitio defigenda erit, iuxta Pauli sententiam, At si neque his malum cedat, reliqua, quæ ab eodem Gal. citato loco, ac Aetio, & Paulo conscribuntur, commodissime adhibeantur, quoad curatio perficiatur. His vero qui sanguinem euomunt (ex Archigenis sententia) vena quoque statim incidenda est, in cubito superior, humeralis appellata, etiam si ex hepate in ipsum ventrem deferatur. Si vero à splene sanguis feratur ad ventrem ipsum incidenda uena erit, quæ inter paruum & annularem digitum in sinistra manu est, sic nanque probè, ac propriè auxiliaberis. Cæterum tum cibos, tum potus quodammodo magis adstringentes, pariter & medicamenta his qui ex ventre sanguinem reieciunt, non tamen uehementer adstringentes, neque uehementer actu frigidos præbe. Quare ubi exiguum uas est, quod perruptum est, uel modicè reclusum, sic ut non multus sit, qui ex eo profluit sanguis, Galeni auctoritate, eodè 5. meth. med. ex uino nigro austero, utilia medicamenta sunt (præcedente tamen uenæ sectione non semel duntaxat, sed bis, aut ter si opus fuerit) aloë, manna thuris, pini cortex, lemnium sigillum, ac lapis hæmatites: quod si nec genus id uini præsto sit, coquenda in aqua sunt (ut ipse inquit) pluuiæ, addo ego, aut in qua chalybs ignitus fuerit extinctus, rubi germina, aut canirubi, myrthi, lentici, seu hederæ; fructus quoque, siue cortex, siue germen, maximè coto-
neorum, itemque myrtorum, mespilorum, ubi dequoquantur, & (ut summam dicam) omnium, quibus astringentia uis inest, idonea præsidia sunt. Sin autem perruptum uas magnum est, aut uehementer reclusum hiat, ut propterea multus profluat sanguis, utique astringentibus magis medicamentis est opus veluti balaustio, hypocistide, rhoe, omphacio, acatia, gallis immaturis & malcorio. Ex Aetij uero sententia eis, qui ob apertionem oris uenam, aut rupturam sanguinem reieciunt, ac non tussiunt, optimè conducunt acetum,

acetum, & portulaca comesta: efficacior quoque existit eiusdem portulacæ succus bibitus, aut plantaginis, vel sanguinariæ; poterunt vero cuiusque succi vnc. iiii. v. vel vi. exhiberi. Decoctū insuper radicis symphiti, atque ipsam quoque siccam tritam, potuique inspersam commendat Aetius; item centaurij radicis drac. ii. aut lapidis radicem drac. 3. aut radicis equiseti tantundem sum-
mopere approbat. Centaurij radicem cum aqua febricitantibus, cum vino febre carentibus exhibet, lapidem hæmatitem, cum succo mali punici; & (vt summatim dicam) curare eos oportet astringentibus, & refrigerantibus, prout decretum reliquit Hippocra. aphori. 37. lib. 7. At sanguine in ventriculo grumi instar concreto, iussit Paulus coagulum potandum esse maxime leporinum, aut thymum vel tymbram cum aceto vel etiam vacuari debent ex lacte scissili, aut ex aloe, vt ipse inquit; in quem vsum si poscām tepidam sorbeant, non parum conferet. Possunt quoque extrinsecus profluenti particulæ, uentriculo videlicet, iocinori, aut spleni admoueri tum adstringentia, tum citra adstrictionem frigida: uerum nec omnino, nec sine discrimine, nec omni tempore loca, quæ circa particulam, unde sanguis profluit, sunt posita, refrigeranda sunt, ex Galeni sententia, eodem quinto method. meden. imo posteaquam in alia prius loca auerteris, non semel tantum, sed secundo, & tertio, si opus fuerit, nec ad unam duntaxat partem, sed ad plures, nec uno auersionis modo sed compluribus usus fueris: sanguinis uidelicet missione, artuum frictione, de uinctioneque: tunc nanque circa afflictam partem tum astringentia, tum frigida admoueri possunt, alias manifestè læsos ægrotantes videbis, cum sanguinem ipsum intro compellant, ac venas, quæ in alto sunt, implere videantur, nec minus quo medicamentorum vis ad interna magis penetrare valeat, acetum cum eis permisceri debet. Quare ventriculi partes ab extra illinias ex rosaceo, & melino, aut myrteo cum aceti modico, aut vino austero: immutentur autem crebrius, ne si excalescant, rursus ab eis sanguinis commotio, ac irritatio quæpiam oriatur: poterunt insuper epithemata in hunc modum parari. Excipe succi plantaginis, & portulacæ, seu sanguinariæ, aut omphacii an. lib. i. aquæ plantaginis & rosarum vnc. viii. aceti vnc. ii. omnibus simul mixtis, fiant epithemata, quæ non minus conferunt, si supra iocinoris aut lienis partes admoueantur, ubi ex his sanguinis profluvium ortum ducat. Ex iocinore insuper si fiat, ne dum prædictis, sed solani quoque, aut lactucæ succo uti poteris; nam in his frigido est utendum, ut inquit Hippocrates aph. uigesimo tertio lib. quinti, unde fluit sanguis, aut fluxus est, non ad ipsas, sed circa ea, unde influit. Si vero ex refrigeratis spiritus instrumentis sanguinem reiecerint, his euestigio uenam secare conuenit, ac bis eodem die, & deinde rursus postridie bis Galeni decreto, quinto method. mede. si tamen, ætas aut uires non prohibeant, paulatim tamen euacuatio facienda erit, ut ad contrariū diuerso fiat: eius enim gratia uenæ sectio adhibetur, ut inquit Aetius: nec minus tempore intermedio. artuum, ac extremarum partium frictione ligatione utare iuxta eorundem sententiam; toti autem pectori ceratum, quod ex taphia, conficitur, post alteram sanguinis detractionem, secundo die imponendum mox uesperine supra modum calfaciat, id auferendum præcipiebat idē Galenus, ac rursus tertio die ad tres horas imponendum. Cum uero spiritui delegatæ partes innaturali temperamento essent, & totum corpus uacuatum diaspermaton ad uesperam exhibebat, non semel duntaxat, eo quod somnus conciliabat, sensum doloris leuabat, & siccandi uim habebat, postremo Tabias ægrum dimittebat: loco autem cerati ex taphia, ac medicamenti, quod diaspermaton appellatur, aliis utare similem uim habentibus calfaciendi, & exsiccandi, ac somnum conciliandi, non tamen supra modum, quo naturale temperamentum spiritus instrumenta sibi ipsis uendicent. mittas quoque &

Loco citato.

Si sanguis in uentriculo istar grumi concreuerit, curatio.

Cap. 6.

Si cruenta spiritus fiat refrigeratis instrumentis spiritus curatio. Cap. 13. Lib. 8. c. 61. Loco citato.

Si ex alijs cau-
sa eadē vasa rū-
pantur, aut rese-
rentur, curatio,
Cap. 8.

Lib. 8. cap. 62:

Loco citato.

4. meth. cap. 7.

Documentum
Galenī.

7. de comp. me-
dic. secun. loc.
cap. 4.

Cap. ultimo.

tu ægrum Tabias, in loca videlicet iuxta posita, si Neapoli, vel alijs in locis non valde remotis fuerit æger. At qui spiritus vasis disruptis, aut eorum oris patefactis, ex quavis alia causa sanguinem reiciunt, incidere iis statim venam conuenit, cubiti internam, vt Galenus præcipit eodem libr. quinti meth. meden. & post eum Paulus, & Aetius: a qua bis, terque postea sanguis est detrahendus, paulatim tamen gratia diuertendi: non enim euacuatione indigent tales, nimirum ab affectione ipsa euacuati, vt inquit Aetius. Quod si cubiti venæ in conspectum non venerint, etiam ex venis in talo sanguinem mittere expedit, immo multo magis proficere testatur Alexāder: nā ad longinquiores partes diuersio fit. Cuius etiam causa arctus omnes fricandi, vinciendique sunt postea vero quam hæc facta fuerint, primum posca, tum diluta, tum tepida potui est offerenda, quo si quis in viscere trombus, id est, cruor concretus latet, resolutus expuatur, atque hoc nihil vetat, bis, terue, ternis horis facere, vt idem Galenus asserit: poteris autem eiusdem poscæ vnc. iiii. vel iiii. aut saltem ii. qualibet vice exhibere, Ab iis vero aliquod eorum, quæ tum emplasticam vim habeant, tum astringant, medicamentum exhibendum; idque aut ex posca diluta primum, aut malorum, myrtorum ve, vel alicuius eiusmodi mox dictorum astringentium decocto: inter omnia vero puluis radices simphiti, althææ, vel equiseti, aut earum decoctum confert; similiter terra lemnia, bolus armenia, lapis hæmatites cum alicuius ex prædictis astringentibus decocto magnopere conducunt, Tralliano auctore: nec minus & cunctis prædictis astringentibus medicamentis commodè vti poteris: illud tamen perpetuo seruari debet ex Galeni decreto tum quarto metho. med. tum septimo de compositione medicamentorum secun. loc. quod congruenti mensura prædictis medicamentis, in his qui ex pulmone, aut thorace, aut aspera arteria sanguinem reieciunt, misceantur tum calida, tum tenuium partium existantia; quamuis vasorum rupturæ, ac resecutioni sint infestissima, gratia scilicet distributionis ipsorum medicamentorum: etiam astringentia, & viscosa, ac tenacia sibi ipsius vias præcludunt, quare opus habent facultate ipsis viam struente, ac præparante. Quapropter omnibus medicamentis, quæ thoracis, & pulmonum vlceribus sunt destinata, mel admiscendum erit: est nanque ipse veluti instrumentum quoddam digestionis eorum in corpus, ac celeris transitus, veluti vehiculum, vt patet eodem quarto libr. method. in hunc met. vsum post venæ sectionem, & poscæ assumptionem, puluerem ex rhabarbaro sine spica drac. i. vel scrup. iiii. assumentes, mumia gra. v. (si ea haberi poterit) vel vi. rubeæque tincturum gra. iiii. vel iiii. cum astringenti vino rubeo, aut plantaginis aqua exiguo aceto iniectione exhibemus: ex hoc nanque medicamento nedum concretus sanguis resoluitur, sed foras propellitur, atque expurgatur ruptumque vas, seu resecratum sanatur. Ex compositis medicamentis vti- mur trochiscis è spodio, aut terra lemnia seu è succino: similiter, & syrupis myrtino è portulaca, rosaceo, saccharoque rosaceo, rosaceoque melle, è quibus in commodiorem vsum compositum quoddam medicamentum parari poterit, vt Recipe syrupi myrtini, & è portulaca, singulorum vnc. ii. sacchari, mellisque rosacei ana vnc. i. tragacanthi, amyli, vtriusque drac. i. & s. pulueris radices symphiti, terræ lemnia, boli armenia & lapidis hæmatitis ana scrup. ii. fiat in modum eclegmatis, iubeasque sæpius id in ore contineri, paulatimque æger supinus cubans permittat in asperam arteriam defluere, quo modo (vt inquit Galenus) nedum vis, sed medicamenti substantia sensim, & paulatim per ipsam asperam arteriam influit, vt 4. & 5. metho. med. liquet. prædicto quoque medicamento addere poteris (si videbitur) drac. i. vel scrup. ii. alicuius ex prædictis trochiscis, vel si malit æger in forma solida potius medicamentum ore continere, hoc modo paretur. Excipe diacodii 3. ii. boli armenia, corallorum rubeo-
rum,

rum, lapidis hæmatitis ana scrup. i. pulueris radici symphiti, & terræ lemniæ
vtriufque scrup. s. & tragacanthi, amyli, & gummi arabici ana 3. fyrupi myrti-
ni, aut de portulacæ, & faccari rosacei ana 3. iij. cum faccharo diffoluto in aqua
rosacea, aut myrtillorum, quantum fatis fit, fiat medicamentum in tabellis.
Rursus licet prædictis infestissimum sit illud genus pharmachorum, quod in
tantum refrigerat vt affectio stupefiat, Galeno auctore. 7. de comp. med. secun.
loc. tamen etiam hæc quandoque admiscenrur medicamentis ad hæmoptoi-
cos conuenienter paratis, vt quæ altiore somnum, ac saporem inducant, &
commodissima sunt his, qui à tussi lancinantur, sistentia nimirum sanguinem,
qui ad effectum vas deferretur, atque hoc per suam frigiditatem, in quem vsum
scrup. ij. vel 3. i. hpilonij perfici, aut romani cum astringenti vino aut plantagi-
nis aqua exhibere ægris consueuimus, non semel duntaxat, sed bis, & ter, vbi
opus fuerit, Vrgente videlicet sanguinis profluuiio, nec prædictis medicamen-
tis cedente: viresque non imbecilliores fuerint. Forinsecus autem pectori irri-
gatio adhibenda erit ex vino astringente, cum oleo rosaceo, aut myrteo, ex Ae-
tiji sententia, aut supra id, quod dolet imponenda extrinsecus spongia est, ex te-
pente posca, vt inquit Paulus, & à septimo die irrigatio fiat cum rosaceo, vel
myrteo, vel lentiscino. cui interrim vinum austerum sit additum, interim acetū
potissimum vbi multa sanguinis fiat eruptio, & in æstate, robusto, & carnofo
existente ægro, nec tussis ad sit, præsertim valida; aut huiusmodi cataplasma ad-
moueatur, quod ex palmis, acatia, alumine, malicorio, symphito, hordei, & lean-
tium farina apparatur, vt Aetio visū est, vel iuxta Pauli auctoritatem, ex fari-
næ polline, & inanna thuris cum aceto accommedentur; vel alumen, acatiam
vel malicorium, vel gallam cum aceto, vel palmulas cum polentis, & malis cy-
donij in vino austero decoctis adhibeto: aut foliorum plantaginis, portulacæ,
& sanguinariæ m. i. contundito, additoque mannæ, thuris, aluminis, malicorij
ac radicis symphiti, singulorum draci. i. hordeaceæ farinæ drac. ii. palmularum,
& cydoniorum in vino austero decoctorum ana 3. iij. fiat cataplasma cum po-
sca, aut vino austero; aliquando autem acatiam, aloem, aut omphacium cum
his permiscere conuenit. At Galenus eodem libr. quinto method. medend. ex
melino, rosaceoue pectus madefieri (si æstas sit) vndique, si hyems, nardino
vnguento præcipit: datque ueniā, vt alijs quoque emplasticis medicamentis
vti possis, si placent: asseritque nonnullos ac affectione laborātes curasse, ad quos
statim vt malum senserunt, accessit, quo cruentum adhuc vulnus fuerit, prius-
quam phlegmonem exciter, nam si ea semel inuaserit, exigua spes est, vt ipse
inquit, eius postea glutinandi, in longius tamen trahere potest tempus potissi-
mum pulmonis vasis disruptis. Quod si reiectionem sanguinis vase exeso, ex
quibuscunque tandem partibus fieri contingat, per renutritionem erosorum
curabitur, Galeno teste 7. de compositione medicamentorum secundum loc.
renutriuntur autem corrosa (vt ipse inquit) per cibos boni succi, & pharma-
ca carnem gignentia (sarotica à Græcis appellata) ea de re (vt testatur Ale-
xander) non amplius medicamentis, aut cibis admodum attringentibus, aut
acidis, sed potius ijs, qui contemperare, mutare, & alterare humoris, qui ero-
sionem excitant, acrimoniam possunt, vti oportet nisi profusior hæ morrha-
gia fuerit: nam tunc ijs, quæ vehementissimè adstringunt, vtendum medica-
mentis est, quod vehemens eius impetus frangatur, vt testatur Galenus. v. me-
tho. med. Quapropter ptisana ægros alere conuenit, aut alica, seu reliquis ci-
bis, quibus nihil ad sit, aut falsum, aut acidum, immo nulla alia tenuis qualitas,
sed è contrario, quæ magis implentem, obturantemque ipsam reddere queāt,
ex mente Alexandri; velut est amyllum frumentaceum. Ex oleribus compe-
tunt intybum, cichorium, buglossum, lactuca: procedente vero tempore, vbi
vires infirmas habeant, citra salem offerre expedit carnes gallinarum, pullo-
rum,

Cap. 4.

Lib. 8, cap. 5.

Cap. 8.
Cruenti spiritus
vasorum exesio-
ne, curatio.

Cap. 4.

Vidus ratio.
Cap. 6.

Medicamento-
rum ratio.

Venefectio.

Cap. 13. & 14.

Cap. 13. & 14.

meth. cap. 14.

5 Acris destilla-
tionis curatio.

7 meth. cap. 15.

1. aph. 6.

rum, caponum, perdicum, phasianorum, starnarum, turdorum, ac reliqua-
rum montanarum auum. interim hœdorum, seu castratorum, vt ita dixerim,
aut suum pedes cum ptisana decoctos assumant; & (vt summatim dicam) cibis
vtantur boni succi, vt diximus, qui etiam humoris influentis acrimoniam
obtundere, & crassiore reddere possint, potissimum vbi ex acri destillatio-
ne, pulmoni, seu thoraci erosio fiat; ab acidis, falsis potissimum vetere caseo
abstinentes, licet molli, atque recenti caseo, præsertim caprillo, aut bubulo
(vt Alexander inquit) commodè vti possint, tanquam utili existente. Pro po-
tu aqua vtantur decocta cum semine coriandrorum præparatorum, pauco cin-
namomo, aut glycyrrhizæ radice; vino quoque (vbi assueti fuerint) eo vti aquo-
so, aut parum rubeo, subadstringenti, conuenit. Destillante autem acri humo-
re, præsertim ad pulmonem, aut pectus, toti corpori consulendum erit, quo
sistatur erosio, Galeni auctoritate, eodem quinto method. meden. & quamuis
Paulus, & Alexander percipiant cauere debere sanguinis missionem præser-
tim vbi admodum acris fuerit destillatio, nam magna ex parte corpus eodem,
qui ex erosione sanguinem reddunt, gracile, atque perficum est, tamen Gale-
ni auctoritate freti, præcitato libr. quinto metho. medend. vbi validi fuerint,
multiq; sanguinis, ijs statim à principio sanguis detrahendus erit, id quod nec
Alexander, nec Paulus negarunt. At si parum habere sanguinis videbuntur, ij
ad quendam succum probiorem, proba vi ctus ratione reduci debent, deinde
sanguinem detrahare poteris: & si res suaserit, denuo sanguinem mittere ex-
pedit, potissimum quibus veluti limus quidam vitiosus, & crassus totus fuerit
sanguis: hoc itaque seruandum in venæ sectione erit; vtriusque tamen id com-
mune existat, ne multa copia sanguinis semel extrahatur, potissimum ijs, qui
parum habere sanguinis videbuntur, eumque vitiosum. Sanguine vero detra-
cto tum reficiendi ægri sunt, tum purgandi, ac rursus post purgationem refi-
ciendi, & potissimum vbi ceu salislaginem sputum suum sentire se aiunt; quan-
uis longo tempore omnino opus sit, vt Galenus inquit, quo succi huiusmo-
di corrigatur vitium. At vbi congestus fuerit vitiosus eiusmodi, & si etiam
non sanguinem non reiiciant, vt ab eo præseruentur, quæ acres humores pur-
gare possunt, medicamenta propinanda sunt. prius tamen ipsis alteratis, ac
contemperatis quodammodo, ex syrapi, videlicet violacei, rosacei, ex nym-
phæa, seu papauere, myrtini, aut de cannis exhibitione cum hordei, buglos-
si, seu boraginis aqua; quorum medicamentorum copiam, tum capite de de-
stillatione, tum cap. de tussi conscripsimus. Illud autem perpetuò in eorum
exhibitione seruabis, vt quæ magis familiaria, ac leuia sunt eligas, vitēsque
acriora, calidiora, ac sicciora; quæ insuper non semel tantum præbeas, quin-
immò bis, & sæpius, vbi oporteat: nam longo tempore (vt diximus) ex Galeni
auctoritate, omnino opus est, vt succi corrigatur vitium, potissimum si ex eo
in pulmone erosio facta fuerit. Quapropter Galenus eos, qui planè deplora-
ti non sunt, omnes sanuari fatetur per hæc tria, per sanguinis videlicet mis-
sionem, & purgationem, ea, quæ caput roborant: non enim in huiusmodi af-
fectibus à paruis auxilijs incipiendum est, veluti Erasistrato visum fuit: nam
in morbis, in quibus periculum non imminet, à paruis incipiendum auxilijs
est: quod si nihil profecerint, aggredienda maiora sunt. At vbi periculum ma-
ximum impendit, à maximis quoque auxilijs exordiendum est; nam ad vlti-
mos morbos vltima prorsus remedia maximè valere Hippocrates decretum
reliquit: ea de re non immeritò statim circa initia venæ sectione (si nihil pro-
beat) ac purgatione vtendum: nec minus & capiti confestim prospicien-
dum, ne ex eo in pulmonem, aut pectus aliquid defluat, in quem vsum condu-
cit si 3. i. infra scripti pulueris sumatur. Excipit autem seminis hyosciami, &
papaueris albi, singulorum scrup. s. seminum coriandrorum præparatorum 3.

i. corticum

j. corticum thuris, gra. ij. mastiches gra. iij. pulueris hirundinis preparata 3.
 s. sacchari vñe. iij. tempus autem sumendi est post duas, vel tres horas a cena
 ante somnum, vel pilulas duas deuorent ex pilulis decynoglossa Nicolai, lo-
 co medicaminis, quod diaspermation appellatur. Ex cerati quoque usu, quod
 fit ex thapsia, capiti prouidebitur, vt testatur Galenus in acri hac destillatione,
 ne, vice cuius eo loco quo sagittalis futura coronali committitur, aut sinapif-
 mo, aut ignito cauterio vtare, vel si tutius eo vti volueris, quamuis minus
 quodammodo conferat, inter primam, & secundam ceruicis vertebra locū
 inuras. Atque hæc quidem Galeno auctore, eodem quinto metho. meden.
 in principio peragenda sunt: aduersus quem acerrimè Alexander infurget, af-
 ferens capiti adhibenda non esse acriora medicamenta, quæ ex thapsia, aut
 columbarum stercore, aut sinapi parantur, cum magis intemperatum caput
 reddant, & quæ ab eo in thoracem, aut pulmonem confluunt, acriora effi-
 ciunt: quæ ratione humectantibus potius, refrigerantibusq; caput ipsum statim
 inter initia vti debere præcipit, ac cauēda esse acria, siccantia, & calfacientia,
 vt quæ intemperiem capitis adaugeant, & erosionem magis intendunt, quam
 curent: fieri enim nequit (vt idem Trallianus asserit) vt tussis desinat, aut af-
 fectus particulæ non exedantur, nisi acris, tenuisque ex capite influxus cessa-
 uerit, id quod probe fiet, si quæ refrigerare, & humectare possunt, capiti admo-
 uerimus; propterea rosaceum & per se, & cum frigida aqua modica admo-
 uendum præcipit; ad balneumque ægros ducendos esse; & cum hoc fiat, ro-
 faceum, vel oxyrhodinum frigidum superinfundendum. At pace Tralliani di-
 xerim, Galen. mox. circa initia in acri destillatione, acria quoque medicamen-
 ta capiti adhibere, non quo ipsius intemperiem, quæ calida quoque est, cura-
 ret, verum vt excrementum, seu superflua humiditas, licet acris, quæ a ca-
 pite defluit, partim exsiccaretur, partim etiam ex intro foras traheretur, at-
 que per cutim vacuaretur: de eo nanque in principio valde sollicitum esse
 oportet, vt idemmet testis est Galen. præcitato libr. 5. method. medend. vt ne
 que tussiant ægri, neque ex capite aliquid in pulmonem defluat: nā si fluat &
 tussiant, necesse est & affectus partes magis extendantur, atque ita temporis
 spacio omnino insanabiles fieri, præsertim si pulmo affectus fuerit. Maius ita-
 que commodum comparatur ægro ex destillationis inhibitione, tum propter
 eius exsiccationem, tum etiam reuulsionem, quam incōmodum: ex eo quod
 calidam intemperiem prædicta medicamenta adaugeant, quæ postea alteran-
 tibus, contemperantibusque, ac lenientibus quibusdam medicamentis adhibi-
 tis curari poterit: cum prius quæ redundant superflua in quauis parte vacuan-
 da sint, & deinde partis intemperies corrigenda, vt apud omnes conuenit me-
 dicos, & non e contra, præsertim vbi ea ad partes confluant, in quibus nisi de-
 fluxus inhibeatur, omnino insanabiles affectus pariunt, veluti in hac, de qua
 loquimur fluxione, contingeret. Vbi vero hæc non impenderent pericula, in
 calida fluxione post redundantium humorū vacuationem, ea quæ infrigidant
 pro eius alteratione, capiti ad mouere hæsitaret nemo, & non calida, cum si
 caput ex calida intemperie male habet, talia medicamenta nocent: vt igitur
 eius temperatum melius reddamus, præstat ipsum rosaceo perungere, at-
 que æstatis tempore præstantius erit, eo quod ex crudo oleo quod omphaci-
 num vocant, componitur, vti: quemamodum idemmet Gal. præcepit 6. de sa-
 nitate tuēda, damnans medicamentū, quod ex thapsia, & sinapi componitur,
 cum ex calida capitis intemperie fluxio fiat, eosq; balneari iubet, frequēti bal-
 neo potabilis aquæ, quo & calidos vapores, qui in capite sunt, euocemus, & to-
 tum capitis temperamentum melius reddamus: nec minus balneum ipsum
 dictis lib. quinto meth. med. commendauit. prædicti quoque sunt (eodem Ga-
 leno teste) qui maxime lac requirūt, neglectoq; eo, omnium maxime sunt insa-
 nabi-

5. meth. cap. 14.

Cap. 14.
Alexandri ad-
uersus Galenū
rationes,

Gal. Jescensio,

Cap. 14.

Cap. 9, in fine,

Cap. 14.

Loco citato,

cap. 6.
Lib. 5. meth. ca.
12. & 7.
7. Methodi cap.
6. & alibi.
cap. ultimo.

Cap. 14.

nabiles præcipuè ubi ex capite aliquid in pulmonem defluit, de quo Alexander, Galenum in hoc sectatus talia protulit verba, Omnes autem lacte utatur, molli, recentique caseo, præsertim caprillo, aut bubulo, neque enim medicamentum, aut cibus, aut aliud quippiam adeo accommodum ipsis est, aut utile, atque lac. & qui per initia solo ipso constanter longiori tempore usi sunt, omnes in totum consanuerunt: assumant autem ipsum à balneo aque dulcis ad unguem temperatè calidè, utpote iucundissima cum sit, non modo acres contemperat humores, ut diximus, verum etià naturam ad explicandam se, atque ad dulcedinem, quam præstat, quoquo versus extendendam prouocat, contraria videlicet ratione ijs, quæ sunt iniucunda; ab ijs enim recedit, fugitque ad profundum: inducta itaque capra, in ipsam, in qua æger iacet, domum expedit, ut quam minimo tempore extractum ab uberibus lac in aere ambiète moretur: propterea quod (ut inquit Galenus septimo metho. meden.) celerimè mutari sit aptum, ita ut calens adhuc ex mamillis in ægri vètriculū quam ocysimè transferatur: erit insuper mellis tepidi pauxillum misciendum, ex eiusdè Galeni decreto potissimum si cui cogi in ventriculo solet: erit quoque & ipsum mel, velut instrumentum quoddam digestionis ipsius lactis, ac celeris transitus, velut vehiculum, cum eo, quod nec vlceri nocebit, ex eiusdè Gal. sententia quarto meth. meden. ut paulo ante dictum est. Sit autem lactis quantitas ab unc. iiii. usque ad vi. pro diuersa corporum natura, ætate, & consuetudine, ac reliquis: mellis autem, vel rosacei mellis, quo ipse potius utor, quarta pars, aut medietas uncie vnius. Si vero profusior ex erasione hæmorrhagia accidat, ijs, quæ vehementissimè astringunt (ut dicimus) utendū medicamenti est, quorum copiam etiam paulo ante conscripsimus, quoad uehementis eius impetus frangatur. reliquo vero tempore ijs, quæ celerimè erosionē lenire possunt, modicè siccantibus, & ad cicatricem ducentibus uti licet, ex Tralleani sententia, inter quæ principatum obtinet lapis hæmatites cum succo polygoni, aut etiam ex aqua sola tepida, paucò vino. aut lacte exhibeatur. Tribuas vero eiusdè lapidis hæmatitis in tenuissimum pollinem detriti scrup. i. aut. ii. paulo amplius, minus ve, non semel duntaxat, sed sepius. In eundem usum conferunt bolus armenia, aut terra lemnia, si simili modo præbeantur. Sunt quoque & alia medicamenta simplicia, & composita, quibus ij curiosè uti debent, quæ siccant, & acrem qualitatem substinent, ubi malum prædictis non cedat, & phlegmone superuenerit: quæ tam & si non adeò opitulari possint, ut prædicta, erosionem tamen adhuc latius serpere non permittunt, quæ porro exhibenda etiam ægris sunt, ut longiori tempore viuere possint: nanque ij saltem eiusmodi medicamenti id lucrifaciunt, ne (ut diximus) exulceratio ultra progrediatur, ac maior fiat, sed siccata, ac veluti callo durata, longiori vita frui hominem permittat, quanquam omnino insanabilis sit, ut ex eiusdè Gal. sententia liquet, præcitato libr. quinto method. medend. & nos dicemus sequenti capite de tabe.

περι πλευριτιδος.

De laterali dolore, seu morbo. Cap. 150.

Cap. 8.

INTER eos affectus præter naturam, quibus à læsa particula nomen est inditum, ut patet secundo meth. med. connumeratur is, qui à Græcis πλευριτις, à latinis uero lateralis morbus nuncupatur, quanuis, si verbum verbo reddatur, non minus lateris, quam costalis dolor, seu morbus appellari deberet: nam quod à Græci πλευρα dicitur, latinè ne dum latus, verum etiam costas significat. Qua ratione πλευριτις quoque non magis affectum lateralem,

lem, quam costalem significare poterit, verum quoniam improprie costalis diceretur, cum costæ ipsæ haudquaquam in hoc vitio afficiantur, ea de re potius a latinis lateralis, quam costalis morbus, seu dolor appellatur, etsi costæ ipsæ tam verè scilicet, quam nothæ eas partes, quas latini medici latera appellant, occupent. Quod vero has partes latini latera nūcupent, testis est Celsus cap. sexto lib. quarti, dum dixit, stomachus lateribus cingitur, intelligens per stomachum gulam ipsam, id quod etiam significauit cap. quinto, eiusdem quarti cum dixit, Fauibus subest stomachus: & capit. primo eiusdem dicebat, Stomachus interior ad ventriculum fertur. Latera itaque eas dūtaxat partes (Celfo auctore) appellare, debemus quæ costis ipsis circumscribuntur, & non eas quas Græci *λαρόνας, καὶ κενώνας, καὶ λαπαράς* velut quidam intelligi volunt: harum nanque partium latini nullum habent peculiare nomen, præter quàm si illa dicant, vulgo fianchi. Verum quoniam, non de quolibet laterum dolore hic pertractare intendimus, sed de eo duntaxat, qui acutus morbus est, ac proprie *πλευριτικός* a Græcis nominatur, vt inquit Celsus: propterea licebit hunc non dolorem, sed morbum lateralem appellare, quo, ab alijs laterum doloribus secernatur. Sunt nanque laterum complures partes, præter costas, & curim: nempe thoracis, & intercostales muscoli, cum interni, tum externi, nā duo sunt huiusmodi musculorū genera, vt Galenus inquit quinto de loc. affect. & præter has, ea existit membrana, quæ costas cingit, a Græcis *ἐμψυχωδὴς, καὶ περιωδὴς*, a Latinis, subcingens, seu circuncingens membrana dicta. Quare cum morbum lateralem dicimus, non omnes aut plures laterum partes affectas esse intelligi volumus, sed prædictam subcingentem costas membranam: quamuis vbi ipsa primario affectu infestatur, aliquando intercostalium musculorum, internorum præsertim partes ei consentiunt, quemadmodum & ipsis primo affectis cōtingit interdum membranā ipsam similiter eis consentire. Verum exquisita pleuritis, de qua modo sermonem facimus, erit, vbi cingens costas membrana primario affectu laborat, eodem Galeno auctore, præcitato quinto libr. de loc. affect. Hæc (inquam) cum laterum pars vna sit, non immerito a parte nomen sumpsit; quæ nihil aliud est, quàm inflammatio eiusdem subcingentis costas membranæ, vt lib. de const. art. med. secundo, & quinto de loc. affe. 4. de caus. puls. 2. de cris. & sexcentis alijs in locis testatur Galenus, quem etiam sectati sunt Paulus, Alexander, ac Aetius in proprijs capitibus. Cum autem inflammationem dicimus, non siccam, sed humidam intelligi volumus, nec vt ortam a sanguine optimo, ac mediocrē crassitudinem obtinente, aut bile duntaxat, sed ex quouis affluente sanguinē, siue optimus fuerit, siue biliosus, siue pituitosus, siue melancholicus: nanque inflammatio unaquæque ex alicuius humoris sit superabundantia Galeno teste commento aphor. 33. sexti libri. Appellat itaque Galenus interdum inflammationem, ex quouis redundante fiat humore, siue sanguis fuerit, siue alius quispian, quemadmodum eodem commento secundo, & 5. de loc. affect. libr. de constit. art. med. ac. 2. de diff. febr. & fere innumeris alijs in locis patet. Hoc itaque modo cum eodem Galeno, cum morbum laterale, inflammationem subcingentis membranæ dicimus esse, inflammationem ipsam significari volumus: ex quibus etiā liquet, quod pars illa lateris, quæ patitur in exquisito morbo laterali, est membrana modo dicta, quæ costis subtenditur, quemadmodum 2. libr. de cris. 5. de loc. affe. libr. de const. art. med. & plerisque alijs in locis scriptum reliquit Galenus: id quod etiam ex nonnullis indicijs patebit: nam cum eadem membrana, vnum sit ex spirandi instrumentis, necessario ea oblata, animal difficilem habebit respirationem. Item ex proprio symptomate, ipforum etiam istrumentorum spiritus, tussi videlicet, quæ confestim ea affecta excitatur, tanquam naturale quoddam accidens, nedum ipsius verum etiam, &

Lib. 4. cap. 6,

cap. 3. post principium.

Quid per morbum laterale intelligendum sit.

Lateralis morbus quid sit.

Citato cap. 3.

Lib. de const.

art. med. cap. 15.

2. de loc. affect.

ca. 9. circa principium.

5. de loc. affect.

Cap. 3.

4. de caus. puls.

Cap. 8.

2. de cris. cap. 10.

Paul. li. 3. c. 33.

Alex. li. 6. ca. 1.

Aet. lib. 8. c. 68.

2. de loc. affect.

Cap. 9.

5. de loc. affect.

Cap. 3.

Lib. de const.

art. med. ca. 15.

2. de diff. febr.

cap. 9.

Pars quæ in eo affecta est.

2. de cris. ca. 10.

5. de loc. affect.

Cap. 3.

Lib. de const.

art. med. cap. 15.

Signa.

reli-

cap. 5.

cap. 19.

Quis præter na-
turam affectus
sit.

Signa eiusdem.

Cap. 3.

5. de loc. affect.
cap. 3.

Lib. de consti.
art. med. c. 15.

Cap. 9.

Qualis sit spira-
tio in morbo la-
terali.

Cap. 151
Duo ab inflam-
matione insepa-
rabilia.

reliquarum partium respiratione seruientium. Insuper ex dolore cum pos-
tu eam affectam esse, manifestabitur: sed potissimum ex doloris specie; quo-
niam pungens erit; nanque hic dolor circa membranas potissimum consistit,
sentientes siquidem, ut patet secundo de loc. affect. Quapropter subcingens
membrana, quoniam nervosa est, & partis affectæ substantia firmatur ad co-
stam quoniam in hac situs est perpeffus locus, ut inquit Galen. libr. de const.
art. med. propterea dolorem inuehit necessatio puncturum, cum inflammata
ea sit, longeque extenditur, & latissime quoque diffunditur dolor ipse: quia
quæ paritur pars membrana est, ac ad plurimum spaciū extensa. Quoniam ve-
nonnulla alia subcingentis membranæ affectæ indicia sunt quæ simul & af-
fectum indicant: ea de re ipsius affectus dignotionem aggredientes, singulas
communes notas examinabimus, ac ipsius affectus quoque proprias, qui cum
phlegmone sit, ut diximus, morbusque in magnitudine, intemperie, ac soluta
continuitate: ea ratione ex necessitate symptomata habebit tumorem præ-
ter naturam, ruborem, ac dolorem: quorum duo, tumor uidelicet, & rubor
nunc sub sermonem non cadunt: relinquitur ergo dolor solus, qui ad costas
firmatur, pungensque fit, ut diximus. Verum dolet homo, quoniam affectus
phlegmone est. atqui species doloris punctoria existit, propter assignatas cau-
sas: pulsatorius autem dolor in laterali morbo euenire non potest, ut Galenus
inquit eodem secundo de locis affect. nanque is dolor per affectus inflamma-
torios fit, in corporibus sensibilibus, proprie & primario affectu existente in
ipsis arteriis, aut saltem per consensum affectis, eo quod vicinorum contactu
premuntur. Verum subcingentem costas tunicam haudquaquam attingunt ar-
teriæ, & si sensu prædita sit; neque ea inflammata per contactum eadem pre-
mi possunt, sed ubi costis vicina sit, necessario ea ab ipsis comprimitur: arte-
riæ vero, quæ per intercostalia vocata spacia, & per crassas, laxasque late-
rum partes extenduntur, ac in profundo magis delitescunt, premi ab inflam-
mata membrana haudquaquam possunt. Consequitur item inflammationem
hanc non modo difficultas respirationis in genere, sed in specie, frequens erit
& exigua, Galeno teste, tum quinto de loc. aff. tum libr. de consti. art. medic.
nam licet inflammationis ratione magna esse deberet, urgente usus prohibet
tamen dolor quominus respirationis instrumenta plurimum attollantur: quo
fit, ut respirationis actionem desinant, usu nondum completo: unde ad secun-
dam respirationem pergere cito coguntur: itaque spiritus fiat paruus, ac cre-
ber necesse est: non autem multo tardus etenim dolor non ita grauiter ue-
xat thoracem, ut ex Galen. liquet libr. primo de diff. resp. ob motus velocita-
tem sicut ob dilatationis magnitudinem. Velocitas enim (quamuis circa ip-
sam actionem sit dolorosa, tamen quia breui tempore omnem motum effi-
cit, minus thoracem offendit: nanque festinat ad quietem, eamque quam ce-
lerrime assequi cupit, tanquam quæ sola dolorem ex inflammatione lenire
possit. At dilatationis magnitudo penitus molesta est, tum propter violen-
tiam motus, tum quod comprimit, & distendit inflammata, & omnibus mo-
dis thoracem dolore affligit: ob id igitur plus de magnitudine, quam de ve-
lociter, respiratio adimit. Verum pro ipsa (ob, urgentem utilitatem) crebritas
generatur: erit igitur in morbo laterali spiratio frequens: parua, non ad-
modum tarda, sed quodammodo celer propter iam dictas causas. Comitatur
item lateralem morbum necessario febris, tum ob affectum, tum ob situm of-
fensæ particulæ: quippe quæ vicina sit cordi: quorum si absit alterum (ut Ga-
lenus asserit libr. de consti. art. meden.) non ex necessitate consequitur febris:
neque enim si phlegmone digitus doleat omnino febricitant: quoniam a cor-
de longè abest, nec cum subcingentem membranam scirrhus, vel œdema oc-
cupauerit. Omni itaque parti, quæ inflammata sit hæc necessario duo acci-
dunt

dunt calor immodicus, & tensio, eodem Galeno teste libr. 4 de caus. puls. Morbus nanque existit in quantitate primo, & secundo in intemperie ipsa inflammatio, quæ (ubi pars nobilis sit, seu cordi vicina, vel insigni prædita inflammatione) vniuerso corpori impartit ambo: calorem. s. immodicum, ac tensionem: atqui immodicus calor (ex sententia eiusdem Galeni) qui vniuersum corpus occupat, febris est. Non ab re igitur propter assignatas, causas, lateralem morbum necessario febris consequitur: itaque pleuriticis ipsis (eodem Gal. auctore) necessario accidit respirandi difficultas, & lateralis dolor, atque hic cum febre & tussi, neque possibile est pleuriticum esse, cui non omnia hæc ad sint, vt lib. 2. de diff. resp. liquet. At qui cum febris ad sit, vsus pulsus alterabit dilucide, & partis inflammatae tensio peruet etiam arterias, quo fit, vt pleuritici pulsum habeant celerem urgente vsu: & quia neruosa est pars ipsa affecta, insigniter durus erit, nedum ratione inflammationis, sed ipsius etiam partis affectæ: nanque neruose partes præter ceteras in inflammationibus tenduntur, vt quæ sint sua sponte etiam tensæ, & quia fortiores sunt vna secum partes vicinas intendunt, atque ipsas arterias: quo fit, vt propter tensionem duriores fiant, propter duritiem vero minor erit, quam febris conueniat pulsus: quare vt & creber fiat par est, quod magnos pulsus calor postulet, refragetur autem durities: quantum enim ab vsu absit magnitudo pulsus, refarcit crebras, id quod vsui deficit. Habent igitur recte omnes quos ex inflammatione febris corripuit pulsum durum: item & ob intemperiem arteriarum, inæqualem in vno occurſu. quæ si ambo coniuncta sint, existet dubio procul species illa pulsus, quæ veluti ferrat tactum. vt alia pars arteriæ attolli videatur, alia non: eam enim imaginem concipit, qui tangit, ubi inæqualiter instrumentum durum occurrat, quæ inæqualitatis pulsus species, morbi lateralis proprium signum est, Galeno auctore libro de puls. ad tyrones: & quarto de caus. pul. Quamuis omni inflammationi communis fuerit, huic autem non ratione inflammationis modo, sed pro loci affecti natura peculiaris magis existit, si quidem partes neruosiores, duriores edunt pulsus magisque ferrates, & minores, vt patet præcitatæ locis, atque hæc quoque pulsum differentia ex necessitate subcingentis membranæ phlegmonem consequuntur. Cæterum quamuis tassus ab affectu ipso separari non possit; creatio tamen post tussim inseparabilis quidem minime est, sed magna ex parte fit. Verum si excreent, colorabitur sputum necessario, licet non semper eodem colore inficietur, sed pro diuersa natura excrementi in inflammata parte contenti diuersus excreationis aderit color, vt dicemus in causarum dignotione. Nam cum in inflammata parte multa simul, ac renuis fuerit humiditas, & ipsa pars rara plurimum ex ea foras effluit, cum verò contra fluxus paucus crassusque, & spissum corpus fuerit, minime ad tussim irritat, & nihil spuunt, veluti & cum prouenit copiosissimus, tussunt plurimum, nec pauca expuunt, vt patet eodem lib. de const. art. medic. Quod vero dolor quandoque ad hypochondria, interim vero ad clauiculam perueniat, causa est tum lesæ natura particulæ, tum inflammatio, quæ dolorem efficit extensuum. Si nanque supernæ partes subcingentis membranæ phlegmone conflictentur, ad clauiculam perueniet dolor, vt ipsa trahi deorsum videantur; si infernæ, dolor in hypochondrium erumpit. Verum hæc inter assidentia morbi lateralis signa connumerantur; fieri (inquam) poterit admodum parua inflammatio ad medium costarum, vt neutram ad partem efferatur: quædoque vero magna, in qua ad vtranque perueniet, necessario tamen vnū quodpiam ex prædictis consequetur. Ad idem quoque genus assidentium attinet quod æger facilius, in latus patiens quam in alterum decumbat, nam euenit interuim, quod minus dolore afficiatur, si in non affectum latus decumbat interim

Cap. 7.

Cap. 8.

Qualis sit pleuriticorum pulsus

Lib. de pul. ad Tyro. cap. 11. 4. de caus. puls. cap. 8.

Cur dolor ad clauiculam perueniat, & interdum ad hypochondria,

Cur facilius in altero laterum decumbat, cap. 15. Lib. de const.

interim vero in vtrunque similiter dolor excitatur; licet vnum ipsorum necessario pleuriticis comiteretur, vt eodem lib. de const. art. med. Galenus fatentur. Nanque cum duplex sic subcingens membrana, si pars eius exterior circa ossa valentius phlegmone infestetur, facilius in oppositum declinantur ægri: opprimuntur enim si super affecta cubent parte. Quod si pars altera quæ intus est (id quod magna ex parte accidere consuevit) in oppositum magis decumbentes dolebunt: suspensa enim ipsius est pars phlegmone vitiata, sin in latus perpeffum, minus. Non enim in iad ossa comprimitur, nec pendet, sed ab horum utroq; libera euasit, ac super in offensa parte altera firmata est. At affectis ambabus subcingentis constas membranæ partibus, super latere vtroque similiter decumbunt. Non ab re igitur inter assidentia signa hæc à Galeno connumerantur, quorum natura est, non esse à morbo inseparabilia, sed aliquando simul inuadunt aliquando superueniunt, nonnunquam autem neque omnino veniunt, vt patet commento aph. 12. li. 1. & li. de const. art. med. quoniam ex his sunt, quæ sæpe morbis accidunt, vt idem Galenus inquit 3. de morb. vulg. Ex eisdem vero his omnibus magnitudo, seu paruitas prædicti morbi lateralis desumitur, magnitudo videlicet, seu paruitas in speciem sua potissimum: nam velut si ingens fuerit dolor, isque punctorius valde, maxima anhelitus difficultas, valida febris, ac ingens quoque tussis, ascenderitque simul dolor ad iugulum, ac ad hypocondrium pertineat, decumbantque laborantes super utroque latere difficulter; nihilque cum tussi expuant, maximam fore inflammationem indicant; sic si exigua prædicta fuerint, dolor videlicet, febris, anhelitus difficultas, ac tussis, cum aqua aliquid expuant coloratum: ac promptè statim, ad neutramq; partem dolor efferatur, ac non ægre sub vtroque latere decumbant, exiguam fore pleuritidem manifestabunt: nam species quidem morbi ex proprijs accidentibus dignoscitur, magnitudo verò ex eorundem quantitate, Galeno teste 3. de cris. Sunt præterea alij laterum cum febre dolores, per quos spirationem exiguam reddi necesse est, sed nullum redditur sputum, vt in ea re nihil à pleuritide sine sputo differe videantur: Verum hi facile (vt inquit Galenus. libro quinto de locis affectis) ab illis discerni possunt: nanque in his nulla omnino tussis est, aut fortè exigua valde, illi verò, qui sine sputo morbo laterali laborant, sicca tussi valde molestantur, præter hæc neque tensionem, neque duritiem vllam refert pulsus; item non æque acuta febre laborant, neque adeò difficulter spirant, pressoque nonnullis eorum extrinsecus inflammato loco dolere sese fatentur, atque hi per sputum non purgantur; quia ab initio nihil eius succi, qui inflammationem excitauit, ad thoracis spacium peruenire solet: verum concocta inflammatione (vt idem Galenus testatur) nisi pus prius discutatur ad cutem vsque attollitur, atque inciditur. Interim quoque laborantes pulsatorium sentiunt dolorem, vt patet secundo de locis affe. vocantque iuniores medici pleuritidem hanc non veram, cum in externis intercostalibus musculis, & non in subcingenti membrana, ac musculis internis illi continuis inflammatio fiat; quemadmodum etiam Aetij auctoritate cap. vltimo libr. 8. ex cruditatibus plurimis, cibisque crassis, ac pituitosis, velut sunt bulbi, ac fungi, & consimiles crudi humores, viscosique, & tenaces in corpore generantur, qui aliquando repente se in vacuum thoracis locum ingerunt, aut in ipsum etiam pulmones: qui sua multitudine subcingentem costas intrinsecus membranam distendentes, inferunt dolores, quin etiam viam spiritus intercipientes vehementem spirandi difficultatem inducunt, vt imaginatio genitæ inflammationis in expertis exhibeatur, quem etiam dolorem lateralem consueuerunt recentiores medici, non veram pleuritidem nuncupare; & velut prius dicta notha pleuritis dicitur, ratione patris affectæ:

Hæc

Lib. de cōst. art.
med. ca. 15. 3. de
morb. vulg. com
mētario. 3. Com.
34. in medio.

Ex quibus ma-
gnitudo, seu par-
uitas morbi late-
ralis arguitur.

cap. 4. colligitur.
Aliorum latera-
lium dolorum si-
gna.
Cap. 3.

Loco citato.

Cap. 3.

Hæc quoque ratione causæ non vera nuncupari posset, quæ quomodo dignoscenda erit, ac ab exquisita pleuritide interstinguenda, idem Aetius præcitato loco fusissime scriptum reliquit: nanque exquisitæ pleuritidis causa (Galeno auctore) libr. de const. art. med. 2. de cris. ac 2. de loc. affe. 1. de disse. febr. ac plerisque aliis in locis, affluens sanguis est, aut optimus, mediocremque crassitudinem habens, aut biliosus, aut pituitosus, aut melancholicus, quamuis sæpenumero magis biliosus sit: percipies autem horum quodlibet, potissimum si expuant ex diuerso spuitionis colore; nanque coloratur sputum pro humoris ratione, qui in parte inflammata continetur. Quapropter rubrum quidem sit; ubi sanguis in subcingentem membranam fluxerit; flauum, aut pallidum, si biliosus fuerit sanguis; spumans, & candidum, si pituitosus; nigrum, aut liuidum, si melancholicus. Ex corporis item temperatura, ætate, ac habitu, consuetudine, ac præcedente victus ratione, nec non anni tempore, regione, aerisq; constitutione, diuersis, haud ægre qualis fuerit redundans sanguis, qui morbum lateralem excitauerit, simul cum prædictis sputis percipere valebis. Cæterum fieri quoque potest, vt ob hepatis inflammationem in notharum costarum loco quispiam doleat, intentis videlicet internis vinculis, quibus nonnullorum iecur costis alligatur, vt Galenus asserit secundo de loc. affe. atque sic dolor ad subcingentem costas membranam perueniat; ita vt pleuriticus esse videretur. Verum nonnullis notis discernetur, eodem Galeno, ac Paulo testibus: Nam neque in iocinoris inflammatione punctorius aderit dolor, neque pulsus adeo durus, qui & serræ modo tractum secet, uelut in morbo laterali & si affectus qui propriè iecorarius nominatur, cum iocinoris inflammatione aderit, erunt alui sedimenta similia aquæ, in qua, nuper mactata caro fuerit abluta, id quod haudquaquam in pleuritide euenit ab exigua quoque tussi irritantur, qui hepatis inflammatione laborant, eaq; perpetuo sicca erit. At thorace affecto tussis increfcit, & eo tempore omnino apparent ea, quæ tussiendo expuuntur, Galeno teste 2. de loc. affe. nec non lingua, facies, & vniuersi corporis color alteratur, iecore affecto, ac pallidi fiunt, decoremq; amittunt, Paulo, & Tralliano testibus; aderitque dolor ad nothas costas in dextro laborantis latere, grauatius magis, vt interim egri iugulum ad infernas partes detrahi sentiant. Hisce notis iocinoris inflammationem a laterali morbo interstinguere valebis, quemadmodum Galenus a Glaucone philosopho ductus, ad Siculum medicum iocinoris inflammatione laborantem cognouit, quem prius, tanquam pleuriticum curauerant medici, velut 5. de loc. affe. scriptum reliquit. Reliquum est, vt ad prognostica deueniamus, quorum primum Hipp. aph. 8. 5. lib. scriptum reliquit, dum dixit. Quicumq; morbo laterali laborantes in quatuordecim diebus non repurgantur, ij ad suppurationem vertuntur: præfiniuit ergo tempus purgationis morbi lateralis in hoc aph. Hippocrates, in quo si non fiat, in suppurationem ait verti: & aph. 1. 2. lib. 1. dicebat, Si circa initia statim in morbo laterali sputum appareat, morbum breuia: si vero postea appareat, producit: intelligens per principium non stataneum, & citra latitudinem, nec prout est vnū de quatuor morbi temporibus, sed prout extenditur vsque ad tertium diem: triplici nanque modo iam dicto principium ipsum intelligi potest, ex Galeni sententia, tum commento prædicti aph. 2. lib. 1. tum 1. de cris. Quapropter crudissimum esse lateralem morbum in quo nihil omnino expuitur, Galenus asserit, quem incoctam pleuritidem nominant, ita vt vel celeriter hominem rapiat, vel longo temporis spacio finiat, vt 5. de loc. aff. liquet. Secundum ordinem obtinet ille morbus lateralis in quo sanies tenuis expuitur. Tertiū in quo crassior, & quartū, in quo perfectā habet cōcoctionē. Quod si apparuerit circa tertium, vel quartū diem, non contingit morbū transcendere septimum: in aliis

Exquisitæ pleuritidis causæ.

Lib. de constit. art. med. ca. 15.

2. de cris. c. 10.

2. de loc. affe. cap. 9.

2. de disse. febr. ca. 9. in medio.

Signa causarū.

Quibus indiciis discernatur lateralis morbus ab hepatis inflammatione.

cap. 9. ante mē.

Cap. 9.

Prognostica. e. 7. post med.

1. de cris. ca. 6 & 7.

1. aph. eom. 12.

5. de loc. affe. c. 3.

vero

Commentario
3. tex. 79

cap. 5.

Lib. de pulsibus
ad Tyrones c.
11. & 4. de cau.
pulsuum. c. 13.
2. prog. tex. 43.
& 44.
Lib. de consti.
art. med. c. 16.

cap. 16.

Morbi lateralis
curatio.

Lib. 6, cap. 1:

vero singulis necesse est, ut pro concoctionis modo mensura temporis consue-
quatur: quamuis magna ex parte (ut diximus) lateralis morbus terminū sue
iudicationis habeat quartum decimum; & si non hunc, saltem omnino vigesi-
mum, ut eodem commento aph. 12. lib. 1. patet: idque verificauit etiam in Ana-
xione, de quo Hip. 3. de mor. vulg. scriptum reliquit: quamuis ad trigessimum
quartum diem extentus fuerit morbus, quoniam ab initio non expuebat. sed
& octauo die adhuc tusses siccae subsequebantur; ut Hippocrates inquit eodē
loco. Ceterum si in pleuritide pulsus fuerit magnopere durus, paruus etiam,
atque creberrimus, indicium erit lethale, ita ut pleuriticus cum tali pulsu ne-
mo fuerit seruatus, ex Galen. decreto 4. de præsag. ex pulsi. Maximum quo-
que signum prognosticum ipsius pleuritidis præbet pulsus ferrinitas: nam si
ea remissa sit, mollem, & probe naturādam inflammationem indicat; si vero
magna, difficilem, & admodum crudam; quæ si cum imbecilli facultate con-
iuncta fuerit, periculum; si cum firma, aut tarde concoquetur, aut ad suppara-
tionē deflester, aut rabidus eam excipiet marcor, ex Gal. decreto lib. de puls.
ad tyrones, & 4. de caus. puls. Screationio vero sine dolore, circa, prompteq; facta
mitissimum quidem est pleur. signum, potissimum ubi permixta appareat cū
screatione admodū flaua bilis, Hipp. auctore 2. progno. At si quod expuitur
concoctum fuerit, adhuc magis mitissima erit, Gal. teste li. de const. art. med.
nihil vero expuere exitiale est, partim quod fluxum declaret a plegmone de-
vinctum, partim quod totus (propterea quoniam intus maneat) corrūpetur.
Ex diuerso item excreationis colore, prout diuersam indicat inflammatio-
nis causam, possumus indicia prognostica assumere: nam perniciosissimus est
melancholicus humor præpollens, id quod indicabit sputum nigrum, aut li-
uidum: tum quod & prædictus ipse sit morbus pessimus, & maxime erodat, cō-
coquaturq; ægre, nec facile expurgetur, ut Galenus inquit eodem lib. de cōst.
art. med. tum quod plurimæ sit caliditatis iudex, a qua affatus, genitus est. At
æquissimus omnium est sanguis per cruentum sputum, ac rubrum indicatus:
ut pote qui dulcissimus existat, & concoctu facilimus. Reliqui vero duo hu-
mores inter hos medii sunt, quo ad simplicitatem, malignitatemq; attinet,
Morbo vero lateri, si pulmonis inflammatio superueniat, malum est, ex di-
ctis Hippocratis aph. 12. lib. 7. causam reddit Galenus in commento; quo etiā
loco asserit, quod non admodum consequi solet morbus lateris ad inflam-
mationem pulmonis. Cæterum ex quacunque causa morbus lateralis ortus
fuerit, pro curatione talis instituatur victus ratio. Aer eligatur tempera-
tus, parum tamen ad calidum inclinans: nam frigidū neruosis partibus eisq;
affectis est inimicum, Hipp. auctore apho. 18. lib. 5. dolorem quoque insuppu-
rabilem facit. Somno utantur longiori, quam vigilia, a motu omnino absti-
neant, iniungendaq; quies erit. Aluus quoque assidue subducatur, leniori-
bus præsertim clysteribus, cauendum tamen ab acrioribus. Immodicas animi
perturbationes vident, iram potissimum, metum, ac mœstitiam. Cibus sit
quam maxime tenuis, & lenis, præcipueq; sorbitio, ut placuit Celso, eodem
cap. 6. lib. 4. Sorbitio autem ex ptisana potissimum, nihil vero detur (ut ipse
inquit) quod aut refrigeret corpus, aut fauces asperet: qua ratione acris, acida
falsa, & astringenda vitanda sunt. Verum Alexander ptisanæ cremorem lar-
giter decoctum, donec id quod flatuosum est, deposuerit, pro cibo commen-
dat: quod si humor egre ducatur, amygdala purgata, leuigataq; ptisanæ inco-
quenda commisceto, ut ipse inquit, quo humor magis educationi paretur. Cre-
mor item amygdalarum per se exhiberi poterit, eiusdem præcepto, paululum
ei mellis adiiciens præcipue si ex pituitoso sanguine pleuritidis ortum ducat;
commodius tamen erit, eiusdē Tralliani sentētia, mane ptisanæ cremorē vespē-
ri amygdalarum succum offerre. Nostri vero tēporibus expurgatis, ac con-
tus

tusis amygdalis cum eis, & aqua panem decoctum pro cibo exhibemus, aut cum eisdem amygdalis prisanam paramus: & si vires imbecilliores fuerint, in gallinarum iusculo panis micas decoctas pro cibo exhibemus, potissimum ubi alios cibos æger fastidiat; ex amygdalis quoque & saccharo panes quidam dulciarij efficiuntur, quos prædictis pro cibo offerimus. Olera vitanda sunt, nisi lingua scabra, siticulosaque, & febris ingens appareant: tunc enim absurdum non erit (vt idem Alexander inquit) aut malua, aut intybi decoctum exhibere: similiter cunctis pleuriticis dulcia mala decocta potissimum dari possunt, ea præsertim quæ apia nominamus. Potus sit aqua horde, vel radicem glycyrrhizæ, seu paucum cinnamomum in ea decoquas: ipsa quoque aqua tepida per se exhiberi poterit. Alex. auctore; interim & aqua malsa, potissimum ubi ex pituitoso sanguine ortum ducat pleuritis. Vbi verò paulum morbus se remisit, alimenta pleniora, & vini quoque aliud dari potest, ex Celsi sententia: sic etiam ubi vires admodum imbecillæ videantur instituta autem modo dicta victus ratione pleuriticis, differendum primo erit, nūquid pro eiusdem morbi lateralis curatione, perpetuo utendū sit insigni, seu notatu digna uacuatione, quæ, aut per uentrē, aut per venæ sectionē fiat? hæc nanq; in morbis acutis insignes erūt uacuationes, Gal. teste 1. de rat. vict. cui responsum volo, quod non perpetuò prædictis uacuationibus utendū erit pro cuiusvis pleuritis curatione: nā cum laborantis plegmone partis momentū omne cōsistat, ut Galenus inquit li. de const. art. med. & 13. met. med. in redundantis in ipsa sanguinis euacuatione: uacuatio aut in his affectibus excogitata est duplex, aut translato ad alias partes, qui in ægra continebatur, sanguine, aut foris à corpore expulso: at qui extra corpus educitur, aut sensibili effluxu, aut ratione tantum contemplabili perficitur. Si igitur fieri poterit, ut qui continetur in subcingentis membranæ plegmone sanguis per halitū digestus extra corpus educatur, & proinde pleuritis curētur, frustra quispiā tētabit ualidiora auxilia afferre, uenæ inquam sectionem, aut purgationem: cum absq; ijs curari ea possit. Probè aut id perficies, ubi exigua pleuritis fuerit, ac mitissima, & in toto corpore humorum non aderit redundantia, id quod magnus Hippocrates nos docuit li. 2. de rat. uict. in morb. acut. cum dixit, lateris dolorem, siue is per exordia fuerit, siue postea obortus sit, tentata calidis fomentis dissolvere, non ab re existit; nempe fomenta calida (ut Gal. in commento inquit) cum ipsam ad respirationē rariorem efficiunt, inflammationisque sanguinem, tum tenuare, tum per halitum digerere consueuerunt: quæ si facta fuerint, nō solum sanguinis aliud euacuabitur, uerum quoque & affectæ, quæ minus distendantur partes mitius ex inde, & mansuetius dolebunt: id autem proueniet semper; ubi non adsit in toto corpore humorum redūdantia, ac morbus lateralis mitis sit: qua curationis ratione ipsemet Galenus testatur quendam ægrotum citra uenæ sectionem curasse, alijs congruentibus remedijs utens, qui morbo laterali, eoq; miti laborabat, ut paret 6. de morb. uulg. similis sententiæ est Celsus, qui superuacuum esse auxilium sanguinis missionem testatur, si leuior fuerit pleuritis, quēadmodum serum, ubi uetusti or casus sit: Alexander quoq; hanc sententiam scriptā reliquit, cum dixit, Ne igitur temerè sanguinem dimittas, neq; purges, vt uulgo faciunt, nisi exquisitè didiceris humorem, qui inflammationē peperit copiosum esse, & in toto corpore superare. Relinquo Paulum qui (ubi uires nō patiantur) neutrum facere oportere iussit tanquam cuilibet medico notū, & Aetium, qui de notha pleuritide uerba faciens, sic afferebat, Quod si mediocris infestet dolor, & non pungitiuus, neq; ad sit tusis, neq; febris acuta, non opus est magna remedia adhibere. Verum citra controuersiam in uera pleuritide, uiribus ualentibus, cum Hip. Galeno, ac Tralliano firmiter concludimus (modò mitior sit pleuritis, citra humo

Loco citato.

Quod non perpetuo insigni uacuatione morbus lateralis curari debeat, commento 23. Lib. de constitutione artis med. c. 17. & 13. met. c. 9.

Text. i.

Commentario 3. commento ult.

Nunquid indifferenter in omni morbo laterali, nulla præcedente insigni vacuatione possumus calidis fomenti vti, Text. 1.

Cut. Anaxioni fuerit octava die secta vena, Com. 3. Text. 79.

Allucinatio quorundam in dictis Hippocratis.

Cap. 3. in me-
do.

rum in toto corpore redundantiam) nec venæ sectione, nec purgatione utendum esse, verum eam curari debere calidis fomentis, ac reliquis medicamentis, quæ digerendi per halitum, cutimq; rarefaciendi vim habeant: quomodo autem ea parari debeant, infra patebit. Sed mox quæret quispiam nunquid non habita adhuc notitia distincta, quod in toto corpore humorum redundantia non adsit, possumus indifferenter calidis fomentis rectè vti, nulla præcedente sanguinis missione, aut purgatione? Cui responsum sit, quod & calidis fomentis vti poteris; nam & ea maximè tibi copiam manifestabunt, ut inquit Alexander, utpote si fomentis dolor non mitigetur, ut idem Hippocrates simul cum Galeno eodem 2. de rat. vict. in morb. acutis scriptum reliquerunt: & proinde periculum faciendum esse iubent calfactionibus, fomentisq; calidis; deinde si ijs minimè fuerit solutus morbus, quinimò dolorem augeri cōtingat (propterea quod pars quæ calore afficitur, plus trahit, quàm euaporet) abstinere ab eis oportet: nam quæ calfaciunt suapte natura hæc, ut quod vicinis continetur partibus digerunt, sic, & quod redundat, ex propinquis trahunt. Quare non diutius calfaciendum erit, ubi fomenta dolorem non soluerint; quoniam in toto corpore humorum redundantiam adesse indicant: & propterea corpus totum insigni aliqua euacuatione præuacuabis, ut Gal. inquit, quemadmodum si fomentorum, & sacculorum usu (ut ait Alexander) dolor moderatior euadit, ut etiam eger manifesto recreationem sentiat, copiam non esse intelligito, ac cum fiducia fomentis utitor, & auxilia parti inducitor; discuties enim id quod offendit, quodque inflammatione excitat. Quapropter securissimum erit in omni pleuritide fomentum adhibere, tanquam omnino aliquam afferens utilitatem, vel ut causa sanitatis, & auxilium corpore non existente pleno, uel tanquam signum ad dignotionem (nec minus & eo tempore aliquod afferens mediocre leuamen) ex quo nos dispositionem comprehendentes, ad totius corporis vacuationem perueniemus, quemadmodum pro curatione doloris oculorum commento aph. 3. 1. 6. li. Gal. decretum reliquit. Cum itaq; anceps fueris, ac non dum exactè noueris, num lateralis morbus exiguus, seu mitis fuerit necne, ac nō omnino perceperis corpus totum plenum esse, aut in eo humorum redundantiam non adesse, tuto calidis fomentis primò utare: nam uel ipsum sanabis, aut ex eisdem ne dum dolor mitigabitur, sed augeri eum videbis, & tunc redundantiam humorum in toto corpore indicantibus corpus totum insigni aliqua vacuatione præuacuabis, ut diximus ex Gal. sententia: Hac quoq; curandi via usus fuit Hip. in Anaxione pleuritico cui adhibitis fortibus primò, cum dolor nihil remittebatur, & febris intenderetur, ac grauius in septimo se haberet, octaua die venam secuit, ut patet eodem 3. de morb. vulg. lateris igitur dolorē, siue is per exo dia fuerit, siue postea obortus sit, tentare calidis fomentis dissoluere, nō ab re existit inquit Hipp. in qua Hipp. sententia nonnulli allucinantur, opinantes eum talia adhibere medicamenta, non ut eiusdem pleuritidis curetur si totum corpus humorum redundantia vacabit, sed ut dignoscatur duntaxat, ac manifesta affectio sit: verum qui talia effutiunt, non animaduertunt ignorantie notam: Hip. tribuere, qui non nouisset exactè morbum lateralem, priusquam fomenta calida adhibuisset, id quod de tanto viro haud quaquam asserendum erit: simulatq; patefaciunt eorum inscitiam in curandis inflammationibus; in quibus momentū omne (ut dictū est ex Galeni mēte) consistit in vacuatione sanguinis, qui in ipsa inflammata parte cōtinetur: atqui vnū, ac precipuū vacuantium auxiliorum genus, per iam dicta fomenta calida perficitur, quæ extra corpus educūt sanguinē tenuatā, ac per halitū digerentia: tentat itaq; Hipp. prædictis calidis fomentis dolorē dissolvere primò. ut qui non ignorauerit hac via inflammationes curari posse, ac debe-
re. id quod Gal. confirmauit li. de inæquali intēperie dum dixit, verū digestio optanda

optanda maximè curatio est: de inflammatione loquens. Verùm ubi ex humorum in toto corpore redundantia hic curationis modus impeditus fuerit, utpote si ex ijs dolorem augeri contingat, immutandus tunc erit curationis modus, ex eiusdem Hipp. ac Galeni sententia, id auferens primo, quod talem curationem interpellat, aliquo insigni auxilio, venæ in quam sectione, aut purgatione, vel utrisque: deinde iterum ad calida fomenta rediens, siquid in inflammationis relictum sit, eisdem curabis: nam vehementes dolores à corporis vacuatione leniendos esse, præcepit Paulus prædictis fortibus, ac sacculis calidis cum videlicet exactè noueris in toto corpore humorum a deesse redundantiam. At si id non exactè cognoueris, statim à principio eis vtare, ex Hipp. Galeni, ac Alexandri monumentis, simul atq; & rationibus prius dictis instructus. Cæterum, ubi in toto corpore aderit humorum redundantia, vt insigni aliqua ipsum totum corpus euacuatione indigeat, cum bifariam ea fieri possit, venæ in quam sectione, aut purgatione, diuinissimus Hippocrates utpote qui pro vacuatione, per conferentia loca facienda, humorum propensionem, partisque affectæ naturam semper conspexerit, vt aph. 2. l. 1. & 9. 4. lib. liquet, cum dolor ad clauiculam pertingerit, internam cubiti venam secari iussit. Si uero eas, quæ sub septo transuerso sunt partes, dolor infestauerit, nullumque ad clauiculam signum fecerit, inflammatis videlicet thoracis inferioribus partibus, prope septum transuersum, per inferiorem ventrem purgare præcipit, quemadmodum 2. de rat. vict. ab eo decretum est, & 4. eiusdem scriptum reperitur, Hanc quoque sententiam post Hippocratem sectati sunt Paulus, Aetius, & Alexander, idq; perpetuo seruandum esse censerem duobus duntaxat prius consideratis; quorum primum est eiusdem Hippocr. lib. de med. purg. quod laborantes videlicet validissimis febribus correpti non fuerint: nam ijs medicamenta purgatoria dare non oportet, donec remiserit febris, vt ipse inquit. Qua ratione in acutis morbis raro, & in principijs purgantibus medicamentis vtendum est, eodem Hippoc. auctore, aph. 2. 4. lib. 1. Secundum, quod magnopere animaduertere oportet, est ipsius laborantis natura, quæ nisi exactè cognita fuerit, eamq; expertus fueris, quomodo in medicamentis purgantibus se gerat, metus erit, ne eo exhibitio plus iusto vacues, vel nullo pacto vacuationem moueas, aut si moueris, non tamen sufficienter vacues: quæ omnia (vt inquit Galenus eodem 2. de lib. de rat. vict. in morb. acut.) magnas in morbis acutis pariunt offensas, præsertim si cum febre fuerint, neque facillè emendantur. Cum itaque febris in pleuritide vehemens non fuerit, hominisque naturam noueris, atque expertus fueris si dolor inferiores thoracis partes prope septum transuersum infestauerit, ad hypocondriumque se extenderit, ad medicamenti purgantis potum te conferes, iuxta Hip. atque Galeni decreta. Verum quoniam sæpius, imo sæpissimè pleuritide febris vehementissima comitatur, etiam si dolor ad inferiores partes finiatur, laborantiumque natura magna ex parte incognita est, qualis nam sit, quinimò adamussim ipsam nouisse non liceat, vt lib. de cur. ration. per ven. sect. liquet. Nam si cuiusque priuatim naturam explorare ad unguem scirem (vt Galenus asserit 3. metho. med.) utique qualem fuisse Aesculapium mente concipio, talem me esse putarem: ea propter etiam si ad hypocondrium dolor peruenerit, tutius multò existit per venæ sectionem, quam purgationem vacuare; & si minus auxilium sequatur, nullum nanque ex eo quod per venæ sectionem fit, periculum impendet, eo discrimen maximum subeunte, quod per purgationem tentatur, potissimum si vt (diximus) laborantis naturam expertus non fueris. nanque alij difficulter natura purgantur, alij modico assumpto medicamento purgantur copiosè, ex eiusdem Galeni sententia, eodem 2. lib. de rat. vict. in morb. acut. nec propterea ipsum ab

Nam existente humorum redundantia in toto, semper exordida sit curatio a veng sectione.

2. de ratio. vict. tex. 10. & 11. 4. de rat. vict. Tex. 73. 74. 75. & 76.

Quod seruanda sit Hipp. sen. in cura morbi lateralis.

Com. 11.

cap. 14. i medio. 3. meth. cap. 7. Quod tutus sit semper venam secare ex Gale. decreto.

Quod Gale. in

hoc non contra-
dicit Hippo.
Cens. 11.

1. de morb. vul.
commentario. 2.
Tex. 50.
Gal. 2. de ratio-
ne vict. com. 11.
Cap. 13.

Ex qua vena
sanguis mitten-
dus sit.

Lib. de cur. rat.
per venæ sect.
per totum, præ-
cipue cap. 19.
9. meth. cap. 11.
Primum, suppo-
situm.

cap. 11.

Cap. 3.
Secundum sup-
positum.

cap. 11.
Tertium suppo-
situm.

Hippocr. sententia recessisse opinandum erit, ut quidam temere autumati sunt, nempe idem Hippocr. 1. de morb. vulg. dicebat, Te ad hoc exerceto, morbis ut pro sis, aut nequid noceas. At proderit pleuritico cuilibet (si humorum adsit redundantia in toto) venam secare, idque securius multo existit, Gale. teste, si febris vehementissima fuerit, incognitaque, ac inexperta laborantis natura, nullumque per venæ sectionem, veluti per purgationem, periculum impendet. Igitur venam audacter secabis, dolore etiam ad inferna descendente; quamvis ex ea minus consequatur auxilium, sic nanque tuto curabis: nam ut tuto cures tria propria sunt, quibus intentus sis, oportet, Gal. auctore 14. meth. med. quorum vnum, primumque est, ut omnino absolutio nem operis consequaris: alterum, ut sicubi non consequaris, saltem cubantem non ledas: tertium, ut vitium non facile reuertatur: præcipit nanque Hippocrates in ea duntaxat pleuritide, in qua dolor ad iugulum usque pervenerit venam secare; in ea vero in qua ad imas partes dolor se extendit, purgationem, dummodo febris vehementissima non sit, aliis sibi ipsi pugnet, ut qui in præcitis locis contrarium asseruit. At qui nec ipse negasset (ut pote cum periculosum sit eisdem purgans medicamentum) cognitam prius, atque experram debere esse ægrotantis naturam, ut Gale. inquit: Verum ubi hæc non adsint, cum tutius per venæ sectionem curare poteris, ea differenter uti, si virtus, aut ætas, ac reliqua non prohibeant, neque ipse inficiaretur, potissimum cum morbis prodesse, aut saltem nequid nocere nos exercendos esse doceat, ut diximus, id quod nec Celsus negasse videtur, cum dixit Remedium vero est magni, & recentis doloris sanguis missus. At cum decretum si tutius esse semper venam secare in his, qui euacuatione totius corporis egent, quam purgante medicamento uti, mox venit in dubium, ex qua vena sanguis mittendus erit, idque non ab re, nam in hoc nedum Arabes cum Græcis, ac ipsi met Græci auctores inter se, verum etiam iuniores medici, etiam hi, qui Galeni doctrinam profitentur, magnopere digladiantur. Verum nos quibusdā prius prælibatis, id, quod cum Hippocrate, & Galeno sentiendum sit de hac re breviter enuntiabit, quorum primum, ac præcipuum est, iuxta Galeni sententiam, cum lib. de cur. rat. per ven. sect. tum nono meth. med. quod venæ sectio interim sanguinis vucuandi causa adhibetur, seu vacuantium præsidio rum vna; probe autem hanc administrari convenit; cum sanguis ipse fiat nature inutilis; atqui bifariam contingit eum nature inutilem fieri, vel cum propriam qualitatem ad vnguem non servat, ut nec amplius nutrire possit, sicut prius cum utilis erat, vel cum ita multitudine creverit ut aut vires premar, plethoram quo ad vires generans, aut tum venas, tum arterias vel distendiat, vel findat, vel obstruat, quoad vasa eo tempore plethora genita. interim vero seu reuulsorium auxilium sit, ea utimur, ut humorum vehementiorem impetum ad diuersam partem reuocet, vel per propinqua deriuat. Nam non contemnenda venæ sectio est, tanquam non sit auxilium reuulsorium, ut Gal. inquit eodem lib. de cur. rat. per ven. sect. cum per eam auertatur sanguis, atque ad alia membra conuertatur; idque bifariam fieri poterit, vel ad proxima deriuatus, vel ad contraria reuulsus, ut diximus, illud *παροχὴ τοῦ αἵματος* hoc *ἀντίσπασιν* Græci vocant, ut idem met lib. 5. meth. med. testatur Gal. verum perpetuò memoriæ tenendum, ex eiusdem Gal. decreto, quod siue ut vna vacuantium præsidiorum venæ sectione utaris, siue pro reuulsorio auxilio, semper postulat valentes vires, quæ modo vacuationis eius respondeant: ad hæc nanque respicientes sanguinem detrahimus, alias semel, alias bis, vel tera, vel sæpius, ipse inquit eodem nono meth. meden. Accedit ad hæc quod licet deriuatio semper ad vicina loca fiat, reuulsio tamen ad contraria efficitur, non vno duntaxat modo sed humoribus sursum fluentibus, deorsum reuulsio molienda

molienda erit; deorsum vero, si sursum: sin ad dextram inclinent, ad sinistram; vero abeuntibus, in aduersam partem; intro autem vergentibus, foras; ac rursus foras ruentibus, intro: sic quæ retrosum fluxiones sunt reuocabis antrosum: quæ vero antrosum, contra retrosum, quemadmodum capit. de reuuls. Galenus scriptum reliquit 5. meth. med. & aphor. 68. libr. 5. fit itaque ad contraria auersio, vel secundum longitudinem, secundum latitudinem aut secundum profundum, in qua duæ continentur differentiæ, tum ea quæ est ante, & retro, tum ea, quæ est intus extra: & propterea libr. meth. med. eius meminit, quæ intus extra, & è contra habetur, & cōmento præcitati aph. eius duntaxat, quæ est ante, & retro, & e contra. Cum in vniuersum, secundum tres dimensiones ad contrario auersio fieri possit. Ea vero quæ fit secundum profundum, sub diuersa ratione bifariam considerari valeat: & nequis temere pro sanguis auersione, indiscriminatim diuersiōe, aut deriuatione vtatur, idem Galenus (Hippocr. auctoritate) nam & hæc quoque Hippocr. inuenta sunt, tum libro. de cur. rat. per ven. sect. tum 4. method. medend. & 2. de arte cur. ad Glauconem docuit nos eisdem vtiliter vti: nam incipientibus fluxionibus, ac toto tempore, quo etiam num fluxio valenter irruit ad contraria reuellere studendum erit: in inueteratis autem, ac vbi fluxio fere iam resistit, expedit magis per vicina deriuare; Neque illud satis admodum esse putes pro reuulsione, aut deriuatione perficienda, nisi & hoc potissimum animaduertas, quod eisdem geminam ob causam vti poteris, aut pro auersione duntaxat, ac inhibitione impetus fluentium humorum, ipsum ad diuersam partem reuocando, vel per propinqua deriuando, quo casu id, quod influit, aut fluxurum est, tantum reuulsione, aut deriuatione prohibemus, nominabimusque eas diuersiones simpliciter, si ad longinqua, atque contraria, & simpliciter deriuationes, si ad proxima sanguis, seu fluxionis impetus per eas conuertatur; de qua simpliciter diuersione, ac deriuatione, meminit Galenus præcitato lib. nono meth. medend. quo loco cum tractasset de venę sectione tanquam vna vacuantium præsidiorum, confestim de ea mentionem fecit, qua vtimur pro reuulsione duntaxat, aut deriuatione fluentium humorum; de eisdem quoque 5. meth. meden. verba fecit, cum dixit, eas esse omnis immodicæ euacuationis communia remedia, ac propterea ab Hippo. inuenta: & lib. de curandi rat. per ven. sect. in immodicis sanguinis eruptionibus, reuulsionis causa venam secare iussit: nam citissime ex ea conspicuam videbis vtilitatem, si in directum adhibeatur; & 3. prorrheticorum dicebat. Nempe & nos sæpius auxilium experti sumus, venæ inquam sectionem, per spicue per eam immoderatam sanguinis lationem sistentes: neque enim per eam (vt ipse inquit) vacuationis, sed reuulsionis gratia sectionem facimus. Quapropter & recto tramite eam fieri præcipit, quod ab Hippo. κατ' ἔξιν, dictum est: id insuper exequendum iussit in inflammationibus ipsis, præsertim circa initia, vbi totum corpus plenum sanguine appareat 2. de art. cur. ad Glauconem dum asseruit, Semper enim fluxionis motum ad contrarium trahere expedit, & 13. meth. med. indicationem curationis phlegmonarum quæ adhuc in generatione sunt, priorem vacuatione esse inhibitionem confluentis ad affectum locum sanguinis assererat: nam quæ phlegmone adhuc in generationem sunt, earum causas prius abcindere oportet, vt eodem loco patet; & paulo post dicebat præceptum in contrarium auersionis esse in omnibus talibus commune, potissimum, si totum corpus male affectum: namque in his ad partes, quæ maxime longinquæ sunt, semper auersionem facies, siquidem longissime a tentata fluxione parte auellere, nequaquam ad eam trahere conuenit. hoc idem confirmauit lib. art. med. inquit. Si igitur vniuersum corpus plus æquo plenum fuerit, per patientem locum minime vacan-

5. metho cap 3.

cap. citato.

Quantum sup.
positum.Lib. de curat.
rat. per venę
sect. cap. 19.

4. meth. ca. 6.

post medium.

2. ad glauc. c. 2.

post prin.

Quintum sup.
positum.

Cap. 11.

Cap. 3.

Cap. 15.

Com. 53.

2. ad glauc. c. 2.

13. meth. c. 6.

cap 95. circa
prin.

dum, neque elaborandum, ut quod influxit retrocedat, cum corpus plenum non admittat, sed prius totum corpus euacuare oportet, aut omnino ad cōtra-
ria loca retrahere, quod patienti particulæ influit: quo perfecto opere à par-
te prius repellendum, mox dispergendum. Poteris insuper & secundo reuul-
sione, seu deriuatione uti non simpliciter, & exquisitè, pro scopo habens auer-
sionem duntaxat fluentium humorum, aut eorum, qui fluxuri sunt, seu immo-
dicæ euacuationis curationem, sed eum qui in parte affecta continetur, qui in
simul cum diuersione, aut deriuatione euacuatur: sed quoniam in huiusmodi
diuersione, seu deriuatione duo perficiuntur, euacuatio videlicet humoris in
parte affecta continenti (& cum is non per eandem partem euacuetur, verum
per remotas, aut propinquas prædictæ parti affectæ) insimul cum iam dicta
euacuatione, reuulsio quoque seu deriuatio fit; unde cum mixtum quoddam
opus sit, ex vacuatione, & auersione interim Galenus reuulsiones cum eua-
cuatione, aut vacuationes cum reuulsione nominant; & iam ex mēte Hipp. &
ut patet commento apho. 69. lib. 5. cum ait, Non solum studet Hippocrates
ubi opus sit, euacuare, sed etiam reuulsoriè euacuare, seu cum reuulsione; sic
quoque lib. de cur. rat. per ven. sect. asserbat, incipientes phlegmonas reuul-
soriè euacuare oportere: & paulò infra inquit; Quippe reuulsiones cum eua-
cuatione adhiberi magis debent influxionibus incipientibus: & lib. 2. de rat.
in vict. morb. acut. Cum igitur (dicebat) superiorum condolentia signum fece-
rit, venam in cubito secare eam oportet, quæ sanguinem ab affecta parte, &
magis, & velocius, tum reuellere, tum vacuare possit: 13. quoque meth. med.
Cap. 11. de curatione iussu inflammati iocinoris verba faciens, hæc protulit verba. Ergo
pariter tum reuellendus, tum educendus, qui ad iecur fluit sanguis est, in-
terna in dextro cubito secta vena: interim verò euacuationes, eas dun-
taxat appellat, aut reuulsiones, aut deriuationes; iuxta etiam Hippo-
cratis sententiam, quamuis improprie sic dicantur, quemadmodum liquet
2. de art. curat. ad Glauconem, cum dixit, At ex positu indicatio neque ipsa
negligenda est: nam per quæ euacuare oporteat, atque quomodo ipsa præ-
cipue demonstrat: fluentium igitur humorum retractio (sic enim Hipp. no-
minat) eorum autem qui iam membrum obsederunt, deriuatio medela est:
& demum subdit; vtrumque autem euacuationis genus per communes venas
fieri præcipit: nam proximarum (ut ipsemet Galenus inquit lib. de const.
art. med.) communiumque affectæ particulæ venarum euacuatio optima est,
atque facillima. Neque id mirum videri debet: nam cum mixtum quoddam
opus ex huiusmodi reuulsionibus, ac deriuationibus fiat, quod quidem pro-
prio nomine carere videatur: iccirco alias alia Galenus cum Hipp. utitur ap-
pellatione, quemadmodum cum morbos fientes curamus, quæ curatio mista
est ex præseruatione, & curatione proprio carentes nomine, interim præ-
seruationem, nonnunquam verò curationem, quandoque vero curationem
cum præseruatione nuncupamus, ut commento aph. 22. lib. 2. liquet, & 11.
& 13. meth. med. Cum igitur non per patientem particulam ipsam, humorem
qui in ea continetur, euacuent prædictæ reuulsiones, ac deriuationes, sed per
alias partes ipsi coniunctas, ac per proximas, seu communes venas, possent
haud obscure ab uacuationes appellari, græcè verò non κενώσεις, sed ἀποκε-
νώσεις dici: quo etiam vocabulo utitur Gal. li. art. med. de cura. inflammatio-
nis loquens, vniuerso præsertim corpore plus æquo pleno existente: quam-
uis repellentia quoque medicamenta ex numero eorum sint, quæ per patien-
tem locum minimè euacuant, sed per translationem ad alias partes: nam
quamuis momentum omne laborantis phlegmone partis (ut prius diximus,
ex Galeni sententia 13. meth. med.) in redundantis in ipsa sanguinis vacua-
tione consistat, vacuatio tamen hæc duplex excogita est, ut ipse eodem
loco

cap. 19.

Com. 10. i. pr. n.

Cap. 11.

Cap. 2.

cap. 17. post
medium,

11. meth. c. 2.

23. meth. c. 1.

C. 95. circa priu.

Cap. 9.

loco inquit, aut translato ad alias partes, qui in ægra continebatur, sanguine, aut foras à corpore expulso; gemina autem est dictarum uacuationū vtraque: quo fit, vt quadruplex in vniuersum oriatur vacuantium auxiliorum genus: nam translationis ad alias partes sanguinis, alterum genus est, vbi ipsa pars, quæ phlegmonē laborat, sanguinem abigit, id quod ex astringentium, ac infrigidantium medicamentorum appositione perficitur. Alterum genus est cum hæ, quæ integræ sunt, ad se trahunt, ipsis tamen prius exinanitis, aut quomodolibet aliter, eisdem ad se trahentibus: eius tamen quæ extra corpus educit, alterum sensibile effluxu, alterum vero ratione tantum contemplabili perficitur. Hisce itaque duobus modis tam reuulsione, quàm deriuatione iuxta Hippocratis, & Galeni sententiam, commodè vti poteris. Verum id neutiquam prætereūdum est, ex eorundem decreto, quod velut natura sanguinis eruptione crissim efficiens rectitudinem quandam seruat, talisq; eruptio summum commodum laborantibus affert, quibus vero contra euenit, nihil iuuat, aut etiam interdum nocet, quod vires scilicet citra morbi leuamē deiiciat, atque exoluat. Non enim (vt Galenus inquit lib. de curand. rat. per uen. sectio) in liene turgente, ex dextra nare erupens sanguis, nec in iecore ex sinistra, vllam fert vtilitatem, sed si recto fiat tramite: hoc nanque unū est ex his, quæ requiruntur in perfecta, & indeficiente iudicatione, vt patet commento aphor. vigesimi lib. 1. Sic inquam nos in diuersionibus, ac deriuationibus seruare debemus, velut Hippocrates diligenter obseruatus, memorix prodidit, scilicet κατ' ἐξιν hoc est, in rectum, seu secundum rectitudinem ipsas efficientes: nam reuulsio quibus in directum adhibetur, euidentem vtilitatem celeriter ostendit, quibus contra haud etiam: à membris igitur, quæ è directo sunt, affectis partibus, propterea quod viciniore venæ sunt, atque magnis è directo, ac plus inter sese communicant, vena secanda erit, id enim per κατ' ἐξιν 2. de art. cur. ad Glauc. Gal. intelligi voluit, redditque rationem 14. de usu partium ex Hippo. sententia: quoniam partes, quæ secundum rectitudinem sunt sitæ, necessario plus inter sese communicant, ac fruantur. Quapropter proximarum; communiumq; affectæ particulæ venarum euacuationem optimam esse, atque facillimam idem Galenus assererebat. lib. de const. art. med. vt paulò ante diximus: & lib. de palpit. trem. rig. & conuuls. scriptum ab eo est, semper à communibus uenis sectionem faciendam esse, cum si alias secueris, neque sanabis affectum, perpetuo verò quòd est sanum lædes: id autem porissimum seruandum erit in reuulsionibus, quæ pro compescendis immodicis sanguinis eruptionibus adhibentur, quemadmodum lib. de cur. rat. per uen. sect. liquet: nec minus & in diuersionibus, seu deriuationibus cum euacuatione cum diuersione, aut deriuatione, vt pater eodem lib. de curat. rat. per uen. sect. 13. meth & 2. de art. cur. ad Glauc. quo loco tam de diuersione, quàm de deriuatione cum euacuatione loquitur; ait enim. Vtrūquæ autem euacuationis genus per communens venas fieri præcipit Hipp. ueluti in locis mulieribus in contrarium trahes, si eas, quæ in cubito sunt, secueris venas, aut mamillis cucurbitas apposueris, vel manus concalefeceris, & fricueris, atque alligaueris. Deriuabis autem, si eas, quæ ingenibus, aut talis, venas diuersis, & cucurbitas coxis applicueris, & crura calefeceris, ac perfricueris, atque alligaueris: & si quidem in parte dextra locorum passio fuerit, à dextra manu, aut crure detraxeris sanguinem: si uero in sinistra, à membris, quæ illi è directo sunt. hoc ipsum neque est, quod ab Hippo. κατ' ἐξιν dicitur, perpetuo in omnibus, quæ phlegmonē afficiuntur partibus obseruandum, tam pro euacuatione reuulsoria, quàm cum deriuatiue, prout idem Gal. præcitato lib. 13. meth. med. decretum reliquit. In his denique diuersionibus, ac deriuationibus, nedum κατ' ἐξιν, id est rectitudinem seruandam esse censemus

Sextum suppositum.

Cap. 15.

de arte cur. ad gla. 2.
14 de usu part. cap. 7.

lib. de constit. art. med. 17. lib. de palp. 5.

lib. de curat. rat. per uen. sect. c. 15. 16. & 19.
13. Meth. c. 11.
& 2. ad glauc. ca.

Septimum sup-
positum.

Cap. 6.

5. metho. cap. 3.
13. meth. cap. 5.

Cap. 2.

2 de nat. hum.
tex. 9.
De ossium nat.
Paulo ante me-
dum.

verum & maiorem rectitudinem, hoc est, venarum maiorem communionem ac propinquitatem, propter iam dictas causas: In reliquis vero reuulsionibus, quæ pro inhibitione duntaxat fluentium humorum adhibentur, sat erit rectitudinem seruare, adeo, ut obliquitas vitetur: appello autem obliquitatem, eam, quæ secundum duas differentias, aut plures iam dictas, affectæ parti opponeretur: ut si iocinore inflammato, ex sinistro crure sanguinem detraheris: liene vero, ex dextro: aut si dexter oculus inflammatus esset, ex sinistra manu, aut crure: & si sinister, in dextra manu, aut crure. Nam cum venarum distributio oblique non fiat, sed recte magna ex parte, aut ægrè confluentis ad affectum locum sanguinis fieret inhibitio, aut fortè nequaquam fieret. Qua propter cum opus fuerit, huiusmodi reuulsione uti pro inhibitione duntaxat confluentis succi, ea seruanda rectitudo erit, quæ è regione, seu diametro parti affectæ sit, non secundum duas, aut plures reuulsionis differentias, sed secundum vnam tantum, ut puta ex sursum, deorsum, vel è contra, aut à dextris ad sinistra, contraq; ex sinistris ad dextra: sic quoque in reliquis seruandum erit reuulsionis differentijs, quæ scilicet sunt foris intro, ac retrorsum ad antrorsum: & è contra: non enim per has reuulsiones, sanguinem in inflammata parte contentum euacuare intendimus, nec immodicum sanguinis profluvium cohibere, sed tantum fluxionis impetum coercere, ac ad contrarias, longissimasq; partes auertere, in quod in inflammationibus, quæ in generatione adhuc sunt, ex Gale. decreto 13. meth. med. prius exequendum erit: præsertim vbi ex toto corpore, aut alijs quibusdam partibus superfluum alicui particulæ transmittatur, ut in ea phlegmone excitetur, quo fit, ut per quamlibet vnam reuulsionis speciem, ex iam dictis, seruata etiam rectitudine, fieri possit; aliàs superfluè à Galeno proprio capite de reuulsione lib. 5. meth. med. & commento aph. 68. lib. 5. conscriptæ fuissent. Idem quoque eodem 13. meth. med. corpore existente pleno, in cura phlegmones, quæ ad vlcera consequitur, mane laborante, ex cruribus sanguinem mittere præcipit, & altero crurum malè habente, ex reliquo sanguinem mittere: quo loco tum de ea, quæ secundum longitudinem, tum etiam de ea, quæ secundum latitudinem fit diuersione (ut liquet) mentionem fecit. Nec quicquam valet, si dixeris, in membris extremis id duntaxat veritatem habere, ut quidam sentiunt; nam hoc eidem Galeno pugnat, qui 2. de art. cur. ad Glauc. decretum reliquit, Patientibus membris extremis, de phlegmone loquens, à coniunctis euacuationem faciendam esse, siue retrahere velis, siue deriuare, quemadmodum paulo supra de inflammato iocinore, & liene similiter concluderat. Hoc insuper confirmauit Hipp. lib. 2. de nat. hum. ac lib. de ossium nat. cum dixit, Operam dare oportet, ut quàm longissime à locis, vbi dolores fieri solent, sanguisque colligi sanguinem mittamus, idque pro reuulsione duntaxat perficienda, ut ex eius verbis liquet. Nec obstat, si dixeris Hipp. dicta veritatem habere in ea præseruatione, cum scilicet periculum imminet ne in futurum inflammatio procreetur, & non in ea, quæ iam orta est, ac in generatione existit: nam pari ratione qua per reuulsionem prohibetur phlegmones generatio in his corporibus in quibus non dum oriri coeperit inflammatio, ea præseruando à futura inflammatione: similiter, & in his in quibus in generatione adhuc est, nec dum absolutionem nacta sit, per reuulsionem duntaxat, ne augeatur prohibetur: idq; medicinæ artis parti similiter, quæ futurum morbum præcauet, subiicitur, velut in prædictis, atque similiter prophylactice dicitur: quamuis ea pure, sincereque prophylactice dicatur, cum non dum sensibiliter morbus ex causâ gignatur, sed futurus est: in hac uero cum sensibiliter generetur, licet nondum absolutionem nactus sit, prophylactice dici poterit, quamuis non pure, ac sincere: Nam quod gene-

generatum ex ea est, id medicinæ artis partis, quæ morbos, currat, subijcitur, quod vero in generatione adhuc est, parti, quæ futurum morbum præcauet, vt liquet apud Gal. eodem. 11. & 13. metho. meden. Vnica igitur indicatio in vtriusque est: assimilis quoque est scopus, nempe initio sanguinis, ne ad locum, qui affici consuevit, aut afficitur, confluat, prophylactice quoque vtraque est, & propterea rectitudine seruata quoad possit, vt diximus, quarumuis vna ex modo dictis reuulsionis differentijs, pro ea perficienda vti poteris, estimata tamen tum phlegmonis magnitudine, tum corporis totius statu positioneque partis affectæ, cum qua societas quoque comprehenditur quam cum alijs partibus habet, vt patet lib. de const. art. med. Ex his itaque constat quid intelligendum sit pro eo quod ab Hipp. ^{xx. 7. 15. 19} dicitur hoc est, secundum rectitudinem: nanque partium è directo positionem, propter quæ & necessario plus communicant inter sese per eorum vasa, ac propinquiores sunt inflammatis partibus, quam hæ, quæ non è directo sunt positæ, & nõ intelligendum esse rectitudinem fibrarum, quæ in venis sunt prout quibusdā visum fuit: id quod nec ad Hipp. nec ad Galeni sententiam veritatem habere potest, cum eam indicationem, quæ à partium positionem sumitur earumq;figuratione, laborantes partes, non qua similes sunt, sed qua instrumentales indicent, vt 13. meth. med. ac nonnullis alijs in locis testatur Galenus: & propterea de instrumentalium partium positione verificatur rectitudo, & non fibrarum, quæ in venis existunt: nam auersiois in contrarium, quæ ab Hipp. antispasis dicitur, non à substantia, sed à curandi membri positu inuentio præstat, vt idem Galenus inquit. 14. meth. med. Ad hæc cum prædicti auctores nouerint fibras in venis contineri, cum non earum rectitudinem seruandā esse in venæ sectione pro diuersione, aut deriuatione statuerint, potissimū Gale. lib. de cura. rat. per ven. sect. & 2. de art. curat. ad Glauc. ac reliquis in locis, in quibus hoc Hippocratis verbum declarat, de insufficiencia proculdubio notari possent. Amplius cum cunctis medicis liqueat, sanguinis vacationem secta vena, eiusq; attractionem consecutione ad vacuum fieri, nullum propterea præstabant vsum rectæ venarum fibræ, pro eius vacatione (potissimum cum consueuerint, qui venas incidunt, iuxta incisionem, partem ipsam, in qua vena secanda est, dolorosis vinculis alligare, multisque frictionibus) interim etiam balneis aquæ calidæ, quo maior fiat attractio ad sectam venam, vti, vt propterea minimè opus sit venarum fibræ, etiam rectis, in hunc vsum, quinimo nec etiam transuersis, quanquam vsum præstent venarū fibræ pro sanguinis per vniuersum corpus distributione, quo promptius singulæ partes nutririvaleant: sunt etenim communia totius corporis instrumenta, vt liquet 17. de vfu part. His denique iactis fundamentis firmis pro venæ sectione adhibenda ad propalandam nostram opinionem, ac veritatem, quam de venæ sectione in pleuritide efficienda sentimus, accedere tempestiuum est. Pro qua audacter, ac citra controuersia cū Hippocrate lib. 2. de rat. vict. simul atque Galeno tum eodem loco, tum 4. eiusdem, & lib. de cur. ratio. per venæ sect. In pleuritide venam cubiti internam secandam esse censemus recto à latere dolente tramite. Quod & si ab Hipp. aperte præcitato lib. 2. de rat. vict. non dicatur, subintelligendum, erit nedum ad Galeni sed omnium medicorum sententiam idque manifesto scriptum reperitur libro quarto de rat. vict. modo Hippocratis fuerit. Expedit enim iam dictam venam secare, quoniam, vt inquit Galenus partem eam, quæ phlegmone obsidetur, tum celeritè, tum quam ceteras partes magis in acutis præsertim morbis vacuare contendimus At sectio prædictæ venæ (vt idemmet testis est) sanguinem ab affecta parte, & magis, & velocius, tum reuellere, tum vacuare potest. Vt igitur optima sit, atque facillima inflammatae partis euacuatio, à proximis, atque communibus venis ea perficienda

11. meth. cap. 2.

13. meth. cap. 2.

Cap. 16.

Quid per
telligendum sit.

cap. 7.

Cap. 8.

Lib. de cur. rat.
per venæ sect.
cap. 15.
2. ad glau. 6. 2.

cap. 1. in principi.

De secanda vena
quid sentien-
dum.

2. de ratione vict. tex. 10.

4. de ratione vict. 73.

Lib. de cur. ra.
per venæ sectio
cap. 16.

2. de rat. victus tex. 10.

4. de rat. victus tex. 73.

com. 10.
Quando e die
do laborantis
lateris facienda
sit.

Terminus eu-
acuationis a quo
iudicabitur.
2. de rat. nictus
com. citato.
Lib. de cur. rat.
per uenæ sectio.

Cap. 14.

Cap. 16.

com. 10.

Cap. 14.
Nō sen per ex
eodem latere fa-
cienda sit uenæ
sectio.

Lib. de cur. rat.
per uenæ sect.
c. 14.
4. de rat. nictus.
com. 19.
1. ad glauc. c. 14.

Cap. 13.

perficienda erit; atqui prædicta interna cubiti vana è directo laborantis late-
ris, & maiorem communitatem, atque propinquitatem cum affecta parte ha-
bet, quàm reliquæ, per quas posset sanguis ab affecta parte tum reuelli, tum
vacari. Non ab re igitur si cum reuulsione sanguinem, qui in inflammata
parte continetur, vacuare contendimus, eam incidas venam oportet: eritque
sanguinis vacuandi terminus coloris mutatio, vt ex eodem Hip scriptum est,
asserente, Neque vt copiosè sanguis detractatur est cunctandum, sed consue-
auferendus, donec rubidior multò, vel pro puro, rubidior; liuidus fluxeris: red-
ditque Galenus rationem dictorum Hip. tum eodem secundo de rat. vict. tum
lib. de cur. rat. per ven. sect. nam alius est qui in phlegmone continetur san-
guis, quàm qui secundum naturam, vtpote plus excalet. Quapropter si
ante crudior erat, rubrior modo, & flauior efficitur: sin eiusmodi prius fue-
rat, liuidior erit, aut ad atredinem vergit pro maiori, minorive assatione,
seu adustione. Coloris igitur mutatio sanguinis, ex particula inflammata tran-
slatione sufficienter commonstrat: & propterea hic erit modus euacuationis,
atque mensura, quæ affectui peculiaris existit si quidem signum consistit Hip-
pocra. assumpti in sectam venam ex phlegmone sanguinis mutationem in
eo apparere; quem sectatus Galenus, pari ratione pro reuulsione simul cum va-
cuatione perficienda in pleuritide lib. de cur. rat. per ven. sect. dicebat. Quin
& pleuriticis, quæ è directo laborantis laceris adhibita fuit sanguinis missio,
clarissimam sepe vtilitatem attulit; quæ verò ex brachio opposito, aut om-
nino obscuram, aut certè post temporis interuallum. Nemo itaque vereat-
ur vbi simul vnica uenæ sectione, tum reuellere, tum vacuare velit: ac possit,
in morbo laterali venam cubiti internam secare, quæ è directo laborantis la-
teris sita est: ea vero non apparente, eiusdem cubiti mediam: quod si nec ea
apparuerit, humeralis incidatur, prout Galeno visum est, eodem 2. lib. de rat.
vict. in morb. acut. eritque huius uenæ sectionis vacandi sanguinis terminus,
eiusdem (vt diximus) coloris mutatio. Cæterum quoniam non omni ex par-
te coloris sanguinis mutatio expectanda est, secta vena in pleuritide, vt Ga-
le. inquit, eodem lib. de cur. rat. per ven. sect. immò verum est, vbi antequam exi-
stat, cessare conueniat, idque duplici nomine, vt ipse asserit, ob infirmas videli-
cet vires, quæ tantam copiam vacuare prohibent, aut ob phlegmones prauit-
atem; nanque interdum nihil ab ea emittitur, sed inibi sanguis fortiter con-
strictus est, per quam uenæ sectionem reuulsio duntaxat, & non reuulsio &
euacuatio simul fieret. Propterea non ab re in dubium venit num perpetuo
seruandum erit in cura pleuritidis, quod ea incidatur interna, cubiti vena,
quæ è directo laborantis lateris sita est? vel liceat interdum à reliquis parti-
bus sanguinem mittere, etiam pro reuulsione duntaxat perficienda? Pro quo
animaduertendum, quod præter iam dictas duas præcipuas causas de pleuri-
tide traditas, nonnulla alia sunt quæ multam simul copiam sanguinis eua-
cuari prohibent, etiam si affectus id indicabit, velut scriptum reperitur apud
Gal. tum lib. de cur. rat. per ven. sect. tum 2. de rat. vict. in morb. acut. 1. de art.
cur. ad Glauco. & reliquis plerisque locis. Ea sunt, laborantis temperies cum
calida scilicet. & humida fuerit; nam suapte natura corpora hæc prompte dif-
flantur, qua etiam ratione, & pueris ipsis cum videlicet pubertatem attige-
rint, quoad ætates attinet, minus detrahimus, quàm plenitudo, seu affectus
commento: dixi autem non inconsulto, cum pubertatem attigerint, ne quis
opinetur admississe Galenum veris pueris uenæ sectionem vsque ad 14. an-
num: interdicit enim eis vbique locorum eam: & proinde cum dicit libro de
cur. rat. per ven. sect. Quod minus detrahimus, quoad ætates quidem attinet
in pueris, de eis intelligendum erit qui pubertatem attigerint. sic nanque &
eodem lib. parum ante præscripta verba eos nominauerat: etiam post deci-
mum

mum quartum annum. Quod vero ad corporis habitus, in candidis, & quibus mollis, teneraq; est caro, minus etiam detrahimus: Similiter in regionibus, anni temporibus, ac aeris constitutionibus, immodicè calidis, aut frigidis largam uacuationem fugimus, licet cuncta hæc sub virium imbecillitate ferè contineantur. Cum itaque tot sint, quæ exquisitam uenæ sectionem fieri impediunt; audacter asserimus eandem internam cubiti venam è directo laborantis lateris incidi debere, eaq; non bis duntaxat, sed ter, & sæpius, ubi opus fuerit, etiam reuulsionis tantum gratia, cum aliquod ex prædictis vsque ad coloris mutationem fieri prohibeat: quamuis ex ea (vt Galenus inquit) par ti, quæ phlegmone obsessa est, minus futurum sit auxilium, modò fluxio non valenter irruat, velut consuevit in primis morbi diebus, aut corpus totum nõ sit ex æquo plenum. Verum ubi ea vehementer irruat, aut in corpore toto humorum adsit redundantia, cum debilitate virium nullo pacto, pro reuulsione duntaxat eiusdem lateris venam primò in cubito secandam esse putamus sed ad partes, quæ maximè longinquæ sunt diuertere prius oportet, atque magis in aduersum trahere, seruata tamen perpetuo Hippocratis rectitudine, quæ in repulsione duntaxat efficienda seruari potest, ac debet; vtpote quæ non secundum duas, vel plures, sed vnam tantum reuulsionis, seu oppositi- nis differentiam fiat. Nam quamuis ex ea minus sequatur auxilium laboran- ti particulæ, multo tamen securius existit; cum non ad ipsam per hanc venæ sectionem fluxio magis proritetur, ac trahatur, quemadmodum si ex eodem latere venæ sectio fieret; imò ipsa per eam inhibetur, cum ad partes, quæ ma- ximè longinquæ sunt attractio fiat. Id nanque perpetuo seruari oportere in cunctis venæ sectionibus, quæ tantum pro reuulsione adhibentur, ac fluxio- num inhibitione, ex paulo supra conscriptis autoritatibus Hipp. ac Galen. constat: & Aetius lib. 5. cap. 100. illud confirmauit, cum de doloris curatione verba fecit, inquit. Siquidem igitur multitudo fuerit, quæ distendit, viri- bus fortibus existentibus, vena secetur, & ex magna vena inflammata, aut do- lenti parti propinqua sanguis auferatur: Si vero debiles fuerint vires, reuulsio fiat, & deriuatio sursum, aut deorsum, aut vtrinque, aut per frictiones. Nec vti que Galenus illud negauit in morbo laterali, cum lib. de cur. rat. per uen. sect: dixit, Quin & pleuriticis, quæ è directo laborantis lateris adhibita fuit sangui- nis missio, clarissimam sæpe vtilitatem attulit, quæ verò ex brachio opposito, aut omnino oscurâ, aut certè post temporis interuallû. Nunquid aliud uoluit per hæc verba significare? nisi quod clarissimam vtilitatem affert venæ sectio è directo laborantis lateris adhibita? nanque per eam celeriter clarissima vtili- tas ægrotanti affertur. Sed quoniam nouerat iam id obseruari perpetuò haudquaquam posse propter eas, quas prius tradiderat causas, quas etiam modò narrauimus, sæpe id dixit obseruari debere, & non semper, vsus verbo *πολλὰκις*, & non *ἀεί*; subditq; demû cum id obseruari nõ potuerit perpetuò quod licet non tantam afferebat vtilitatem, nec ita celerem, tamen ex brachio opposito fieri debet, cum dixit, Quæ vero ex brachio opposito, aut omnino obscuram, aut certè post temporis interuallum: frustra nanque apposuiſſet verba hæc, nisi quandoque ea vti deberemus: præsertim cum prius secta vena ex eodem latere, sæpe, & non semper clarissimam vtilitatem attulisse dixisset. Accedit ad hæc, quòd & conferre confiteretur venæ sectionem ex opposito brachio, quamuis obscura sit conferentia, aut post temporis interuallum; idq; non præter rationem. Nam cum per hanc venæ sectionem reuulsio tantum fiat confluentis succi ad affectam partem, & non euacuetur sanguis, qui in ea continetur, nec propterea dolor confestim sedetur: ea de re rectè Gal. inquit per hanc venæ incisionem obscuram fieri, aut post temporis interuallum ægrotantibus vtilitatem, relatione ad eam, quæ è directo laborantis lateris

2. de rat. uictus,
com. 10.

Quod non per-
petuo è directo
laborantis late-
ris uenæ sectio,

Loco citato

effici-

efficitur, pro reuulsione simul, ac euacuatione. Hoc idem confirmavit Aetius, qui lib. 3. cap. 12. ex Gal. sententia pro reuulsione, simul ac euacuatione perficienda, venam è directo affectu lateris secundam præcipit; li. verò 8. cap. 68. (ex Archigenis monumentis) venam incidere oportet, inquit, vt dictum est, in brachio, non eo quod recta ab inflâmato latere procedit, sed opposito. Sanguinis autem multitudo nō vsque ad animi deliquium extrahatur, sed modicum extrahere oportet, & post sufficientem temporis intercapedinem, rursus repetita incisione modicum auferre: quo loco venę sectionem adhibendam esse pro reuulsione duntaxat perficienda, putandum est, cum non liceat tantum virum sibimet pugnancia conscripsisse, vt quidam voluit: quamuis in vtrisque locis secundum mentem aliorum loquutus fuerit, Galeni scilicet in vno, Archigenis in alio. Ex opposito itaque brachio venam interdum secandam esse reuulsioni tantum gratia in morbo laterali, cum in generatione adhuc sit, fluxio, valenter irruat, aut corpus totum humoribus plenum fuerit, ex Galeni, ac Aetii sententia liquet; cum videlicet laborantes vnicam venę sectionem, quę vsque ad coloris sanguinis mutationem fieret, pro reuulsione simul, ac euacuatione propter aliquam ex prædictis causis ferre non valeant: nanque in his inflammationibus, quę in generatione adhuc sunt, prior vacuatione inhibito facienda, est confluentis ad affectū locum sanguinis. Quapropter longissime à tentata fluxione parte auellere, & nequaquam ad eam trahere conuenit. id autem potissimum seruari debet, vbi à toto, vel reliquis eiusdem partibus, superflua affectæ parti transmittantur: Semper etenim fluxionis motum ad contrarium trahere expedit, dicebat idem Galenus 2. de art. cur ad Glauc. Si vero fluxionis causa ex ipsa parte, quam phlegmone vexat oriatur, ut pote quę calidior sit facta, aut dolore urgetur, quippe satis constat eiusdem Galeni præcepto 13. meth. me. affectum illum principio tibi esse sanandum, & mox quicquid iā phlegmones factum est: nam semper quę phlegmones ad huc in generatione sunt earum causas prius abscindere oportet, ut eodem libro patet. Quapropter totum ut inquiunt cœlo (ut mea tert opinio) errarunt, qui iuxta Galeni doctrinam uoluerunt perpetuo pro cura pleuriditidis eiusdem lateris uenam incidendā esse freti ex paulo ante dicta auctoritate ipsius, in qua (ut cuilibet pateret poterit) à Galeno perpetuo id seruandum esse non præcipitur: quamuis sæpius dixerit, utilitatem clarissimam eam afferre; immo, propterea quod sæpius dixit, id semper obseruari noluit, ac si dixisset, quandoque ex ea utilitatem non prouenire, immo potius laboranti incommodum, ueluti si fieret, redundantia in toto corpore existente, circa morbi initia, fluxioneq; ualida irruente, & uires, aut quopiam aliud ex prædictis usque ad coloris mutationem eam fieri prohiberent. quo casu, satius, immo tutius erit iuxta eiusdē Galeni, decreta ex opposito brachio sanguinem mittere reuulsioni tantum gratia, quamuis ex ea inflammate parti minus futurum sit auxilium, quę ad contrarium iuxta latitudinem fieret, ut si iuxta tali uenas, è directo tamen laborantis lateris uenam incidas, per quam reuulsio duntaxat fiat secundum longitudinis oppositionem, iis potissimum, quibus hæmorrhoides, aut mense detenti fuerint, à qua confestim eadem die, si uires permiserint, aut sequenti eam incidas uenam in cubito, quę è directo est laborantis lateris, etiam si per eam reuulsio tantum fiat: nam quanto maiorem innumerum particulares auxeris detractiones, tanto reuulsionem efficaciorē effeceris, ut Galenus inquit eodem lib. de cur. rat. per uen. sect. Et propterea facta prima uenę sectione ex opposito cubito, aut eiusdem lateris crure, statim ad secandam (ut diximus) eisdem affectu lateris in cubito uenam deuenias, eamque non semel incidas, imo, bis, ter, ac sæpius, ubi opus fuerit, repetas, siquid non prohibeat;

Cap. 2.

Cap. 6.

Quorundam
Galenicorum
allucinatio.
Loso citato.

Cap. 12.

hibeat; quoad sanguis qui in obfessa phlegmone parte cōtinebatur, per eam vacuetur; id quod dignosces præcipue, ex eiusdem sanguinis coloris mutatione, ac doloris sedatione. At mox non deerit, qui nostram hanc opinionem impugnabit, asserens, quod si sectio venæ e directo laborantis lateris pro reuulsione duntaxat interdum adhibeatur, & ea ab affecta parte reuellit, vt palam constat, cum ipsa a nobis non prohibeatur, etiam existente in toto corpore plenitudine, ac valenter fluentibus succis ad effectam partem, præcedente tamen oppositi cubiti, aut eiusdem lateris circa talum sanguinis missione cur pari ratione etiam a principio nulla facta in reliquis partibus remotioribus venæ sectione, pro eadem duntaxat reuulsione perficienda ipsa non incidenda erit? Cui responsum volo, quod licet per sectionem venæ in cubito e directo laborantis lateris interdum reuulsio tantum perficiatur, vt prius dictum est, tamen si tempore, quo fluxio valēter irruit, seu corpus multis humoribus refertum sit, vt sæpe contingit, pro reuulsione duntaxat ea incidatur, maius affert egrotanti incommodum, quàm commodum: nam inanitis per venæ sectionem venis brachij eiusdem lateris, cum viciniore sint affectę parti, quàm reliquæ, quę in opposito brachio, aut eiusdem lateris crure existunt: irritatur liquidem per eam ad affectam partem humorum defluxu consecutione ad vacuum ipsi attrahentibus: Nec quicquam valet, si dixeris eas potius, a parte phlegmone obfessa trahere, quàm reliquis partibus: nam præter reliqua, quæ dici possent, illud tantum satis esse puto, quod apud Galenum legitur 3. de natur. facult. quod in successione ad id, quod vacuatur, quod leuissimum, tenuissimumque, prius ei quod vacuatur succedit quàm id quod grauius est, & crassius. Atqui crassior est qui in parte phlegmone obfessa sanguis continetur, imbique fortiter costrictus, nec leuiter in eiusdem spatijs inanibus impactus, ac ex vasis ad eadem effusus: & proinde ægrius quàm a cæteris corporis partibus ab inanitis venis trahitur: quod si velis saltem a naturali facultate vasorum eum sanguinem trahi, quid stultus, cum id quod familiare est, & non alienum (velut sanguis, qui in inflammata parte consistit) ab attrahente facultate promptius trahatur. Potius itaque attrahit venæ sectio hæc ad inflammata partem, quàm reuellit, si in principio nulla facta a iam dictis remotoribus partibus venæ sectione adhibeatur: & propterea magnopere vitanda erit, nisi pro reuulsione simul, ac euacuatione adhibeatur, aut pro reuulsione duntaxat vbi corpus totum plenum nõ fuerit seu post primos morbi dies, cum fluxio non vehementer irruat, quemadmodum ex his, quæ supra diximus liquet: tunc etenim nec fluxio irritabatur, & promptius sanguis in affectu phlegmone parte contentus, per eadem vasa, per quæ erat effusus remeabit, si eum quoque euacuare tentabis cum reuulsione per iteratam venę sectionem, modo nullum eorum quæ diximus, eum euacuari prohibeat. Verum vbi corpus totum vitiosis quoque scateat succis, accrementis plenum appareat, & circa imas potissimum thoracis partes dolor excruciet, nec dolor per venę sectionem adhuc conquieuerit, a venę sectione, aliud nedum clysterijs, verum etiam purgantibus medicamentis subducenda erit, ex Tralliani sententia cap. 1. lib. 6. modo vires valeant: nam si imbecilliores fuerint, nedum leuibus clysterijs, verum etiam acribus vtendum, Paulo auctore: Et si paulo antecum Gal. medicamenta purgantia nulla prædedente venę sectione quodammodo propter traditas causas, vitauimus: nam tutius esse fatemur semper in morbo laterali, qui euacuatione totius corporis indiget, venę sectione primo vti, non negauimus tamen post venę sectionem, interdum purgans medicamentum posse conferre, cum scilicet adsint ea, quæ modo diximus. Verum ea eligenda sunt, ex quibus prænarrata a Galeno pericula non impendant: & non ea pharmaca quæ fortiter sol-
uunt,

Dabium.

Responsio.

Ca. 15. in prin.

Purgatio.

Tex. 21.

uunt, de quibus Aetius lib. 8. cap. 68. sic scriptum reliquit, Alius autem assidue subducatur, in maximis praesertim doloribus, sed tamen cauendum ne fortiora solutiua exhibeantur. Hæc inquam purgantia medicamenta tempore quo Galenus dixit, vsui erant, quæ cane peius, & angue fugienda sunt procura morbi lateralis, propter causas superius assignatas. Verum eis potissimum utendum erit, quæ leniendo purgant, aut per tussim repurgationi opitulatur, aut saltem non aduersentur. Ea sunt hoc nostro quo, casia fistula, manna, saccharum violaceum, aut syrupus ex pluribus infusionibus violarum. Diaprunum non laxatiuum Nicolai: quibus etiam interdum pro ratione redundantis succi admiscere poterit, aut diacatholicon, aut rhabarbarum, vel agaricum: quantitas autem istorum, lenientium iam dictorum ratione, exigua sic oportet. Nec Gal. illud negasse videtur, quamuis ante venæ sectionem cum prædicta non concurrant, purgans medicamentum vitauerit; simul etenim cum Hipp. 4. de rat. vict. in morb. acut. uenam primo secandam esse, & deinde purgans medicamentum exhibendum in internis inflammationibus, & non e contrario decretum reliquit, idque secure, & mediocriter porrigendum inquit Hipp. ubi utroque indigeant auxilio. Redundante itaque bile, ex casia fistulæ vnc. i. & s. & diapruni lenitiui vnc. s. bolus confici poterit; post cuius assumptionem vnc. ij. vel vnc. ij. & s. mannæ dissolutæ in infra scripto decocto tribuere poteris, quod recepit hordei mundi 3. iij. florum borraginis, & violarum, singulorum 3. ij. radicis glycyrrhizæ 3. j. vuarum passerarum mandatarum 3. iij. adiantum 3. i. & s. iuiubarum, num. 4. bulliant secundum artem in aqua fontana: deinde vnc. ij. vel. iij. eiusdem decocti assume in quibus iam dictam mannâ dissoluas. Si autem æger (ut plerique solent) casiam fistulam assumere abhorreat, cum eadem manna diapruni lenitiui vnc. s. ac rhabarbari optimi vigorati infusi in parte prædicti decocti ac per lineum linteum transfusi 3. i. misceantur. At si pituitosus fuerit redundans, in vicem diapruni lenitiui cum cas. fist. vnc. s. diacatholicon, & agar. trochiscati 3. i. addas, sicque bolum conficias: aut si potionem potius assumere eligat, prædicto decocto ficus aridas ac palmulas ii. vel. iii. & hyssopi 3. ii. addicias: in cuius decocti quantitate, quæ satis sit, agar. trochisc. 3. i. vel scrup. iij. leuiter decoquantur, in quo iure vnc. i. & s. casia fistulæ, aut ii. mellis roridi dissoluantur, cum vnc. s. diacath. Pari ratione si atra bilis redundabit, decocto addendum erit seneg. & epythimi, vtriusque 3. ii. in quo de mum dissoluas 3. i. & s. aut. ij. casia fistulæ cum vnc. s. aut 3. vii. diacath. aut loco casia fistulæ, manna vtare, potissimum si eam abhorreant laborantes. Nec minus loco mannæ, præsertim pauperibus aut in locis ubi ea desit, saccharo violaceo, aut syrupo ex pluribus infus. viol. uti poteris: quemadmodum in robustioribus etiam corporibus, vice diapruni lenitiui, etiam laxatiuo vtare & vice diacath. confectio de dact. potissimum pituita redundante, id tamen perpetuo seruandum erit, ut ex eis, quæ fortiter purgant, etiam robustis corporibus multa quantitas non tribuatur, semperque mixta sint, cum multo maiori copia prædictorum lenientium medicamentorum ita ut eorum quantitas 3. ii. non excedat. Interim autem medici exhibere non negligant ea medicamenta, quæ ad facilem excreationem, ac thoracis expugnationem conducunt, diuersa tamen, prout diuersitas humoris gignentis inflammationem requirit: nam si sanguis, aut bilis fuerit, violaceum syrupum, aut e cannis, seu vua passa; vel ex adianto tribuas, interdum vero iuiubinum simplicem: compositum vero, aut eum qui ex glycyrrhiza, se hyssopo conficitur, seu etiam e marrubio exhibere poteris, si morbus lateralis ex crassioribus succis fuerit ortus. Quod si æger maluerit aquis permixtos potius absorbere eos aquam borraginis, aut hordei, seu adianti permisceas, vel aquam in qua glycyrrhizæ radix fuerit decocta. Nonnulla item ecligmata hypoglottidaeque

in

in hunc vsum parari possunt, quæ studiosi iuuenes requirant, cap. tum de catarrah. tum de tussi. sed quoniam Hippocrates præcipiebat à principio lateris dolores tentare calidis fortibus dissoluere, tempestiuum videtur ad eos describendos deuenire: eos nanque conscribere distulimus vsque in hunc locum, ne interceptus fuisset sermo de ven. sect. ac purg. adhibenda. Erit itaque (eodem Hipp. teste secundo de rat. vict. in morb. acut.) inter omnia fomenta calida probatissimum (nam à frigidis nemo veretur abstinendum esse) id quod ex aqua calida in vtre, vel vesica, aut alio vasculo posita fit: quamuis vtilis etiam sit, vt ipse inquit, & spongiæ mollis, magnæq; atque ex aqua calida expressæ applicatio: verum fomentum linteo vestiendum erit, propter eas quas ipse præcitato loco reddit causas: hi siquidem humidi foci inflammationibus, quæ à bilioso succo factæ sunt, opitulantur, ex Gal. sententia eodem. 2. lib. de rat. vict. in morb. acut. velut sicci ijs, quæ à tenui, aquosoque sanguine exorta sunt, cum perpetuo contraria contrariorum sint remedia. loco autem prædicti focus in eundem vsum parari possent, si prius in aqua radicem, & folia althææ, flores chamemeli, fœnum græcum, fertulam campanam, ac semen lini decoquas, ac demum aliquo prædictorum modorum focus applices: ex eisdem quoque saccelli parati possent, qui etiam calidi, veluti focus, extrinsecus adhibeantur. Si vero ab aquoso, tenuiq; sanguine exorta fuerit inflammatio, tertio focuum genere ab Hipp. conscripto vtare. Est autem fomentum ipsum siccum ex sale, milioq; frictis, torrefactis, atque in sacculis conclusis paratum: beneuolum siquidem, leue, atque iucundum est milium, vt ipse inquit Hippocrates. Poteris insuper & in hunc eundem vsum, ex chamæmeli floribus, furfure, ac milio saccellos componere: vel ex milio, sale, semine lini, ac fœno græco, modo sicci semper applicentur. At si suspitio fuerit, crassos, viscososque humores, in ea, quæ phlegmone obsidetur parte, collectos esse secundo ab Hipp. focus genere conscripto, vtare. constat autem ex hordeo, ac eruo, prius tamen eis concisis, comminutisque, & demum ex aceto, & aqua excoctis: ita diluto aceto ex aqua, vt paulo acidius sit, quam vt quis bibere possit. Hæc itaque semina madefacta, perfusaque, & feruifacta in sacculos coniecta lateri dolenti apponantur: in hunc etiam vsum confert furfur appositum, eodem Hip. teste. & in hunc quoque vsum saccellis vtare ex hordeo conciso, ac furfure, addito hyssopo, ac pulegio, similiter madefactis ex diluto aceto: nempe hoc pacto tum blandior, tum efficacior erit focus; Trallianus vero (vbi melancholicus abundat humor) fomentum potius, ex furfuribus in iure chamemeli decoctis commendat, tanquam excellentissimum, & prope ad omnem dolorem conueniens: perpetuo tamen consulo, vt ab eo incipias focu, qui periculo omni vacat. Is autem est qui minime mordet, humidusq; existit: sic nanque & Hippocrates coepit. Nempe (vt inquit Galenus) tamen si nihil aduersus malum fecerit, non tamen magnum, & insignæ affert detrimentum, ueluti hi qui ex aceto, vel orobo, aut sale fiunt: qui nisi propitiam, conuenientemq; consequantur affectionem non solum non salutare erunt, verum quoque & malum augebunt. Propterea ab eis te inchoare non oportet, nisi exactam habueris notitiam eius, qui in inflammata parte euincit, humoris. Hanc vero dignotionem, cum scientificam habere nequeas, sed coniecturalem: propterea (vt diximus) tutius erit, ab his inchoare fomentis, quæ quam cætera magis auxilio esse tibi videbuntur: Quod si nihil præsidij tuleris, ad alia etiam te transferre conueniet: quin etiam post focus vtiliter admoueri possunt vnguenta eiusdem rationis calfacientia vt R. olei amygd. dulc. vnc. i. butyri recentis vnc. s. vel loco olei amygd. dulc. chamemelino, aut anethino vtare; & in vicem butyri, anseris, seu gallinæ pinguedo accipiatur; potissimum vbi ex frigidiori succo inflammatio orta fuerit: in quem etiam vsum, hordei, fœni

2. de rat. victus

Tex. 1.

Focus.

Tex. 2.

Eodem l. tex. 4.

Si inflammatio.

nis causa sit bi-

liosus sanguis.

Commento 2.

Si aquosus san-

guis.

Eodem l. tex. 6

Si crassior ac vi-

scosior fuerit sa-

guis.

Li. citato.

Tex. 5.

Lib. citato com-

men. 2.

Vnguenta.

Lib. 8. c. 68.
cucurbitula.

Li. 4. c. 6.

Li. 6. c. 1.

Tex. 52.

ſœni græci, & ſeminis lini farinam addere poteris, vel æſypum, & dialthæam compositam Nicolai, aut eiufdem ſimplicem, aut ex foliis, & radicibus maluarum, & althææ contuſis, arque in aqua decoctis; adiectisque olei anethini, vel chamæmelini, & amygd. dulc. vtriuſque vnc. j. ſeminis lini ſœni, græci, ac hordei farina, fiat cataplaſma. At curandum ſummopere eſt, ſi cataplaſma imponatur, vt calidum permaneat: permanebit autem, ſi oleo calido veſicam ſemiplenam frequenter cataplaſmati admoueas, ex Aetij præcepto. Poſt ſeptimum autem diem (vt idem inquit Aetius) ſi eodem modo dolor perſiſtat, cucurbita lateri affigenda eſt, & cutis ſcarificanda: maniſeſtiſſima enim in pleuriticis (vt ipſe refert) vtilitas ex cucurbitulæ appoſitione apparet, Celſus vero (vbi lenior, ſiue vetuſtior fuerit lateris dolor) ad cucurbitulas conſugiendum eſſe (ante ſumma cute incifa) præcipit. Verum ne in errorem incidas in cucurbitularum adhibitione, ſeruanda erit Alexandri ſententia; qui dixit, commodius, & totius eſſe hac vti curatione in quibus parua copia eſt vacuandum. Nam per eam quod in affecta parte continetur, ex alto extrahitur, atque hoc factum mirari licet, quomodo inde etiam dolor, qualiſcunque fuerit, licet vehementiſſimus conquieuerit, vt neque fomento, neque alio præſidio indiguerit. At ſi inflammatio membranæ coſtas ſubcingentis etiam dictis diſcuti non valeat, ſed in ſuppurationem permutetur, hanc permutationem coadiuuare oportet: cum quibus vero fiat, ſequenti capite de ſuppuratione patebit: quicumque enim dolor (inquit Hipp. 2. prognost.) in his affligit ſedibus, hoc eſt, thorace, & pulmone non deſinens, neq; ſcreationis purgatione, neq; ventris ſubductione, neq; venæ ſectione, ac medicamento, & victus ratione, in ſuppurationem verti ſciendum eſt.

περί τῆς πνευμονίας.

De Pneumonia. Cap. 51.

Cap. 2.
Peripneumonia
quid ſit,

1. de loc. af. c. 9.
4. de loc. af. c. 8.
Lib. de pulſ. ad
Tir. c. 11.
4. de cauſ. pulſ.
c. 12.
2. de loc. af. c. 9.

Dubium,
cap. 12.

Loco citato.

ET hic quoque affectus, quem, *περί πνευμονίας*, ſeu *πνευμονίαν*, vel (vt Celſo viſum eſt capitu. 7. libr. 4.) *περί πνευμόνιον* Græci vocant, latini vero & *περί πνευμονίαν* quoque, interim vero pulmoniam appellant: inter eos morbos cõnumeratur a Gale. 2 meth. med. quibus a laxa partícula nomen fuit inditum. Eſt nanque (vt Celſus inquit) vehemens, & acutus pulmonis morbus. Paulus vero cap. 30. libr. 3. peripneumonia, pulmonis inflammationem eſſe teſtatur. At Aetius cap. 6. libr. 8. eandem dixit pulmonis eſſe inflammationem cum febre acuta. Cuncti vero, licet ſub diuerſis verbis in eandemmet videntur fere coincidere ſententiam, quod ſcilicet peripneumonia pulmonis inflammatio ſit, quam etiam ſententiã ſcriptam reliquit Galenus 2. & 4. de loc. affe. libr. de pulſ. ad tyrones, & 4. de cauſ. pulſ. Nec alio modo per inflammationem hic intelligendum erit, quàm præcedenti cap. de pleuritide intelleximus: poterit nanque inflammatio hæc (vt in ſequentibus diſferemus) nedum ex ſanguine optimo, ac laudabili, medio-crem q; craſſitudinem habente initium ſumere, verum etiam & ex eodem pituitoſo, aut bilioſo, aut melancholico exiſtente, ut patet apud eundem Gale. præcit. libr. 2. de loc. affe. & commento aph. 33. libr. 6. cum dicebat, pulmonem aptum natura eſſe, cum raræ, ac laxæ ſubſtantię particeps ſit, ad omnes humores ſuſcipiendos. Sed mox aduerſus ea, quæ diximus, non ab re inſtabit quiſpiam aſſerens Galenum 4. de cauſ. pulſ. cum de peripneumonicorum pulſibus petraſtat, fateri pulmonem, cum laxus ſit, & mollis, fiſtuliſque inanibus, vndique infinitis cauus, a pituitoſiore, atque craſſiori ſanguine inflammari, cum ſubtilis, bilioſuſq; fluat fere, nec cum viſcere vlla ratione co- hæreſcere poteſt: Cui reſponſum ſit, Galenum præcitato loco, tum etiam 2. de loc. affect. propter viſceris laxitatem, ac mollitiem, & raritatem aſſeruiſſe pulmonem

pulmonem promptius ex pituitoso sanguine inflammari, ac etiam, magis quē admodum & subcingentem membranā ex bilioso magis, non tamen negasse vtrasque partes ab vtrisque etiam inflammari posse, cum 4. de caus. puls. sic dicebat. Siquidem biliosioris munus est cogere, siccare, tendere, indurare; quæ quando minus sæpe pulmonē infestat, sane erit rara quoque pulsus duri ies: & 2. de loc. affect. dicebat, Quin etiam in laterali morbo sæpenumero magis biliosum, in peripneumonia vero magis pituitosum sequi consuevit. Non itaque negauit Galenus omnino pulmonem inflammari posse ex biliosiori sanguine: sed id raro contingere: sæpius vero, ac magis a pituitosiore sanguine inflammationem in ipso oriri propter iam dictas causas, vbique confirmauit. Afficitur autē in hoc affectu pulmo ex quouis humore originē ducat, vt ex eius descriptione liquet, insuper ex spirandi difficultate, quæ necessario comitatur eo quod affecta particula spiritus est instrumentum, sic etiam ex tussi, quæ necessario eis accidit. Quare ex spirandi difficultate, ac tussi ipsum affectum esse conicere poterimus: sed quoniam maxima pars ignorum huius affectionis, communis est tum parti ipsi affectæ, tum etiam affectui: propterea ne eadem bis reperamus, cūcta narrabimus, quæ affectum ipsum ac partem affectam indicant, pro comperto habentes, quod cum vitium hoc sit inflammatio, morbus vtiq̃ue erit in quantitate primo, & 2. in intemp. indicat autem inflammationem pulmonem immodica spirandi difficultas, atque angustia, adeo vt suffocari laborantes videantur, ac recti sedere conentur: nam hoc pacto facilius sentiunt totum thoracem dilatari, quippe qui decumbentibus in se se cōcidit; eo quod pectoris partes ad spinā declinant, qua erecta thorax etiam simul fertur non amplius se ipsum grauans, vt patet 2. & 4. de loc. affe. quin etiam calidam sentiunt eandem respirationem, maxime si erysipelatis particeps fuerit inflammatio. Quocirca (vbi plurimum efflant) iuuari videntur; ac multū aerem frigidum attrahere concupiscunt. Insuper grauitatis cuiusdam thoraci incumbētis sensum sæpenumero percipiunt, ac dolorē ex immo ad ipsum peruenire, & ad spinam: ubi enim & membranæ ipsum ambientes suspenduntur. Vehemēti autem dolore pulmo nunquam cruciatur, verum propter iam dictas membranas, & grauitatis sensum, & aliquando extēsiōem quādam vel ad pectus, vel ad spinam percipere potest, vt iam diximus ex Gal. sententia 4. de loc. affe. præterea acuta quoque febris incidit, pulmone inflammato: at si intolerabile fuerit incidendū vt Galenus inquit eodem 4. de loc. aff. angustię vero, grauitatisque sensus minor, erysipelas ipsum vexare cēsendum est. Quibus hic definitis si erysipelas phlegmonodes, aut phlegmone erysipelatodes sit, haud difficulter deprehendetur: si vero inter tussiedum sputum expuīt, id veluti in pleuritide, modo hoc, alias, alio colore infectum videbitur, pro ratione diuersi humoris inflammationem excitantis. Proprium item in peripneumonici signū est, Gal. teste 1. de loc. aff. quod maxillæ rubræ appareāt, pulsus vero magnus, languidus, mollisque atque inæqualis, & vndosus est, interim quoque dicrotus: & cum acute omnes febricitent peripneumonici, non nihilque comitis habeant, vtrum horū excellat, maximeratione crebritatis pulsus inuenitur: nam vbi ardētior febris fuerit, pulsus abunde creber erit. Si vero comatosior, sit minus creber. vt patet lib. de puls. ad tyrones, & 4. de caus. puls. quo loco studiosi requirant causas, propter quas prædictæ pulsuum differentię in peripneumonici fiunt: nonnulla quoque alia symptomata peripneumoniam comitantur, vt anxietas, impotentia, iactatio, lingua flaua, licet temporis progressu nigrescat, Hip. lib. 3. de morb. & lib. de dieb. iud. auctore: interdum etiam delitium, oculi intumescunt, inquit Paulus, nasus in summa fit simus, & venæ temporum eleuātur, vt Aetio visum est, ac prostratus est appetitus. Simili autem via ex quo humore ortum duxerit, indagabis, quam de pleuritide docimus: nam

Q licet

Citato c. 1. 2.

Citato c. 9.

Pars affecta.

Quis præter naturam affectus sit.

Signa.

2. de loc. affect. c. 9. circa prin. 4. de loc. affect. c. 7. 8.

cap. 8.

Citato cap. 8.

cap. 5.

Lib. de puls. ad Tyr. c. 11. 4. de caus. puls. c. 12. 3. de morb. uer. sus med. De diebus indicat. in fine. Pau. li. 3. c. 10. Causæ. Aet. li. 8. c. 66.

Causarū signa.

1. de loc. affect.
cap. 9.2. progno. com.
47.Cels. lib. 4. c. 7.
Prognostica.
2. de morb. i me.
dio.3. de morb. loco
citato.De affect. in
prim.Hippo. 2. prog.
tex. 50.Gal. 3. prorrh.
com. 4.10. meth. ca. 5. in
fine.

Loco citato.

Paulo post mor.

Curatio.

Loco citato.

licet saepenumero ex pituitosiori sanguine gignatur, ex aliis quoque humori-
bus fieri poterit, ut prius dictum est; idque potissimum percipies, si cum ex-
putant quicquam, ex eiusdem sputi colore diuerso: namque si rubrum fuerit, san-
guinem; si flauum, aut rufum, seu pallidum, biliosum sanguinem; si spumosum
& candidum, pituitosum; si vero nigrum, aut liuidum apparuerit, melancholi-
cum sanguinem inflammationis causam esse significabit, quemadmodum 2. de
loc. affect. & 2. prognosticorum a Galeno scriptum reperitur. At si nihil ex-
puant, ex aliis id coniectari licebit, ex maiori scilicet, vel minori calore, seu
incendio, quod in thorace percipitur, ex maiori, minorive angustia, respiratio-
nis difficultate, ac grauitatis sensu, temperamento, ætate, habituque diuerso,
regione, aeris constitutione, anni que tempore, ac precedente victus ratione.
Verum ex quouis redundante fiat succo pulmonis inflammatio, ea affectus
origo est: id vero genus morbi (ut inquit Celsus) plus periculi, quam doloris ha-
bet. Iudicatur autem (Hippoc. auctore 2. & 3. libr. de morb. ac libr. de affect.)
breuissimus quidem in diebus septem, aut quatuordecim: longissimus vero in
duobus de viginti; pauci autem hunc morbum effugiunt: verum postquam vi-
gesimum diem transgressus fuerit, non amplius moritur, sed pus sputit, pectus
dolet, & tussis: nam ex hoc morbo fiunt etiam pectore suppurati, si non in iu-
dicatoriis diebus pulmo fuerit purgatus. At si creatio flaua non multo permi-
sta sanguine inter initia excernatur, salutaris, admodum pulmonis inflamma-
tio est, si 7. die pigriusve, minus secunda est, eodem Hippoc. auct. 2. prognostic.
Quæ vero peripneumonia cum virtutis imbecillitate sit, perniciofa est, Gale-
teste 3. prorrheticorum, & 10. method. medend. namque vna salus tum pleuri-
ticis (ut ipse refert) tum peripneumoniciis, adde etiam & synanchicis, ipsum vi-
rium robur: Harum etenim partium inflammationes, veluti etiam ventriculi,
& iocinoris, non modo iis, qui tam imbecillis sunt viribus, sed etiam iis, qui
valentiores ipsis sunt, mortiferæ esse solent; si vero quid per tussim effertur
in peripneumonia spumosum, ac biliosum est, & aliquando cruentum, & flori-
dum vehementer; ut Aetio placuit, quod etiam pessimæ significationis exi-
stât: & si mortale quidem malum fuerit, vigilie amplius aderunt, aut somni bre-
ues, stuporem, ac delirium inducentes, & imaginatione mentem vicissim per-
turbante, non sentiunt valde præsentia mala; extremitates frigide, vngues
liuidi incuruantur; quarta, aut ad summum septima die hi moriuntur. Verum
si ad salutem permutetur morbus (ut idem fatetur Aetius) sanguinis eruptio
ex naribus abundanter sequitur, aut alui exturbatio, multis exeuntibus bilio-
sis, & spumosis humoribus: aliquando autem inflammatione in pus commuta-
ta, per ventrem, aut vrinam pus excernitur, statimque ab omni molestia libe-
rantur: at si in pulmonem irruerit acervatim, aut suffocat, aut cum grauib.
accessionibus in tabem permutatur. A pulmonis autem inflammatione phre-
nitis, malum est, ut inquit Hippocrates aphorif. 12. lib. 7. & in Coacis præno-
tionibus legitur, quod peripneumoniæ ex pleuritide transmutatæ securiores
sunt his, quæ ab initio fiunt, licet si superuenerint, sint male, ut patet 11. apho-
rif. eiusdem lib. 7. Quantum vero ad victus rationem attinet, pro eius curatio-
ne, eadem fere, quæ pleuriticis instituta fuit, vtantur nisi quod magis extenua-
toria opus habent: Dicebat etenim Aetius, cibus sit extenuatorius: verum
quoad ipsum attinet cibum (ut testatur Celsus) neque salsis opus erit, neque
acribus, neque amaris, neque aluum astringentibus, sed paulo leuioribus.
Quare primis diebus danda erit sorbitio ptisanæ, aut etiam ipsa prisna cum
melle: recte quoque sumeretur, & recens butyrum (ut Paulus inquit) vel ipsū
etiam cum ptisana, cum qua iterum recens adeps coqui potest, ex Celsi au-
thoritate, ea vero sit gallinarum, aut anserum. Nam primis diebus sorbitio-
nes dulciores esse oportet, iuxta Hippoc. sententiam libr. 3. de morb. sic enim

(ut

(vt ipse inquit) id quod confedit, ac compactum est, potissimum elueris, ac commoueris: quarta autem die, & quinta, & sexta non amplius dulces, sed pingues, nam ad sputum sursum excreandum conducunt. Poteris insuper in ptisana decoquere (iuxta Aetii sententiam) parum hyssopi, aut origani, potissimum ubi a frigidioribus succis inflammatio fuerit orta. & post quartum, quintum, aut sextum diem, cum pingua admittat Hippocr. prædictam ptisanam cum pullorum, aut gallinarum iure pingui pararem: vel macerato in iam dicto iure pane, in quo parum etiam aut hyssopi, aut origani fuisset decoctum vtare, tribuendaque sunt sorbilia oua, vt refert Celsus; panis ex aqua mulsa, & nuclei pinei ex melle, aut (si libeat) etiam ex saccharo. Potus autem quoad quantitatem attinet, sit exiguus; humiditas enim noxia pulmoni existit, vt Aetius inquit: quare primis diebus vinum dare conuenit dulce, album, aquosum, paulatim frequenter bibendum, vt Hippocrati visum est, libro secundo de morb. coque præsertim vtendum, ubi inflammatio ex frigidiori sanguine ortum habeat, ac laborantes admodum elegantes, deliciosiq; fuerint: reliquis vero pro potu aqua hordei (præcipue non decorticati) tribuenda erit, vel aqua, in qua glycyrrhizæ radix fuerit decocta, aut vua passa vinaceis detractis, vel aqua mulsa, in qua etiam parum hyssopi decoctum sit: propinari item poterit pro potu ficuum cum paucis hyssopo decoctum, ex Pauli sententia. At virtutis tuendæ gratia (vt ipse inquit) crebrius potui assumetur aqua mulsa per se, aut cum nucleis pineis: reliqua, quæ ad victus rationem attinent, præcedenti cap. studiosi requirant. Oportet autem (si satis validæ vires sunt,) sanguinem mittere, ex Celsi sententia: quam etiam confirmauit Aetius cum dixit, Itaque (si nihil obstiterit) statim vena secanda erit in cubito, ex quacunque causa, ac quouis modo genita sit peripneumonia: quamuis Paulus velit in iis, qui ex aliis morbis in hunc decidunt sanguinis detractionem vitandam esse, maxime si qui hoc in statu fuerint: vel si per initia sanguinem miserint. Sin autem peripneumonia statim ab initio inuaserit (vt ipse fatetur) sanguinem mittere, si vires id permittant, ex usu est. Quibus verbis pugnare videtur Paulus Aetii, ac Celsi sententiæ: quamuis nedum non pugnât verba eius prædictorum sententiæ, sed ipsam confirmant: non enim propterea quod morbus diuturnus fuerit, vel quod per initia sanguis missus fuerit, his, qui ex aliis morbis in hunc decidunt, proprie sanguinem mittere prohibet Paulus, sed quod vires consonum sit hoc auxilium eisdem prohibere, vt pote imbecilliores existentes: quo casu nec Celsus, nec Aetius venæ sectionem admitterent: nanque Celsus dicebat, si satis valide vires sunt: & Aetius, si nihil obstiterit. Secare itaque venam oportet statim circa initia, in quauis peripneumonia si validæ vires fuerint, ac nihil aliud obstiterit: & in cubito internam, ac ex utroque brachio sanguis extrahendus, si substinuerint vires, primum quidem modicus, & non vsque ad animi defectionem; vt videlicet adseruetur ad repetendam detractionem, ex Aetii sententia. At si quid venæ sectionem prohibuerit, cucurbitulas thoraci adiuuere oportet, ac lateribus defigere, quibus tantum elicitur sanguinis, quantum vires ferunt, ut Paulus refert; uel acri clystre aluum subluere oportet. At si neque iis morbus cedat, præsertim in primis quatuor, aut quinque diebus, purgante medicamento aluum subducere licebit, & hoc paulo amplius, quo & febres obrusiores sint, & dolores leuiore, quemadmodum Hippoc. scriptum reliquit lib. 3. de morb. Eligantur autem ea, quæ leniendo purgant: cuius generis sunt nostris temporibus, manna, casia fistula, ac antidotus diacatholicon, seu diaprunum non laxatiuum, quorum decentem quantitatem assumens cum aliquo ex decoctis præcedenti cap. de pleuritide descriptis dissoluas, ac potui donato. oportet autem internam aluum (ut præcitato loco inquit Hippocra.) neque ualde suppressam esse, ut febres non sint acutæ

Citato loco.

Venæ sectio.

Cucurbitula.

Purgatio.

Loco citato

neque valde egere, quo salua sursum educi possit, & æger viribus valeat. Confert itaque peripneumonici purgatio, iuxta Hippoc. sententiam præsertim si prædicto modo ea vtare, ac modo dictis medicamentis purgantibus: nec parum conferunt diutissimæ frictions, si bis quotidie fiant in scapulis: proxime ab his in brachijs, & pedibus, & cruribus, leuiter contra pulmonem, vt testatur Celsus. Interim uero, ut prompte ac celerrime pulmo expurgetur, curandum erit: in quem usum conferunt syrupi ex adianto, glycyrrhiza, uua passa: aut, si crebro assumantur: pariter nonnulla ecligmata, aut hipoglortida, seu bechicæ pilulæ tribui possunt; quæ omnia cap. de catarrho, ac de tussi requiras: & post uniuersales euacuationes, portiones quasdam dare conuenit; inter quas à Celso, & Paulo hyssopi decoctum, cui ficus arida sit incocta, præstat; aut aqua mulsa, in qua uel hyssopum, uel ruta decocta sit, aut iris sicca trita, instar duû cochlearium aquæ mulsæ inspergenda, uel ipsamet mulsa, in qua iris sit cocta præbeatur. Quibus etiam pro ratione redundantis succi adicere poteris hordeum uuam passam, adiantum, glycyrrhizæ radicem, iuiubas, marrubium, aut origanum, seu helenii radicem: ualentioribus nanque hic morbus medicamentis indiget, maiorique extenuandi facultate præditis, quàm pleuritis. Cæterum ab extra profunt aduersus dolores imposita calida fomenta, quæ digerendi uim habeant, ac discutiendi, quorum mentio præcedenti cap. facta est: post quæ thoracis partes illinantur ex oleo amygdalarum dulcium & amararum, aut anetino, seu chamæmelino, irino, aut rutaceo; addasque (si libeat) prædictis oleis gallinarum, seu anserum pinguedinem, ac butyrum insulsum, uel esypum liquidam. Quod si mauis, ceratum conficias ex butyri recentis, adipis anferis, utriusque 3. i. olei rutacei, ac utriusque amygdalæ aua unc. s. pulueris iridis, & hyssopi siccæ singulorum scrup. ii. æsypi liquidæ drac. iii. ceræ quod satis sit, fiat ceratum. Cataplasma item paretur hoc modo. Recipe radicem & foliorum althææ, & maluarum ana m. s. contendantur, & adde cremoris seminis lini, althææ, & fœni greci ana drac. ii. iridis, & hyssopi. quæ tenuissimæ sint trita, singulorum 3. i. butyri, & æsypi liquidæ ana 3. i. & s. olei chamæmelini, & rutacei ana unc. i. cum aqua mulsa, aut cum resina terebinthina cataplasma cōficiatur; quo tum pectus, tum latera contegantur. optimum etiam erit eidem cataplasmati inspergere seminis lini, ac fœni greci tenuissimum pollinem. Aetius uero, ac Paulus ualde commendant medicamentorum compositū ex cera resina terebinthina, medulla ceruina, butyro, æsypo liquida, iride sicca tenuissime trita, & etiam nardino unguento, ut inquit Paulus: sint autem, horum partes æquales, ut ait Aetius.

Topica,

περί ἐμπύματος.

De empyemate, seu suppuratione. Cap. 52.

Quot modis dicatur suppuratio.

Vide 1. progno. com. 40. & 2. progno. com. 60.
2. progno. com. 60.

MORBVS qui à Græcis ἐμπύημα, à Latinis suppuratio, seu purulentia dicitur: & propterea qui hoc morbo laborant ἰμπυρτικοὶ καὶ ἐμπυροὶ Græce, latine uero suppurati, & purulenti appellantur, non vno duntaxat modo in Hippo. & Galeni, doctrina intelligi consuevit. Nanque interdum omnem transmutationem, quæ fit ad pus, in quacunque parte fiat, per suppurationem intelligunt, vt patet aphorif. 8. 5. & 45. 7. libr. & libr. prognost. præsertim primo, & secundo; interim uero solos eos, qui in thorace, ac pulmone uniuersum pus contentum habent prius tamen prædictis partibus inflammatione affectis purulentos nominant: vt dicatur suppuratio hoc modo transmutatio, seu alteratio prædictorum inflammationum ad pus, vt liquet, cum

tum commento citati aphorismi octauo, quinti libri, tum etiam secundo prognostic. Tertio modo per suppurationem propriè, ac præcipuè intelligunt, non siquidem conuersionem inflammationis lateris, seu pulmonis ad pus, sed collectionem, seu effusionem puris in spatio thoracis, atque pulmonis intermedio, post prædictæ suppurationis disruptionem. Sic quoque præcipuè suppuratos nuncupante eos, quibus inter thoracem, atque pulmonem acervatum pus est, vt commento aphor. 45. 6. & 27. & 8. & 15. 5. libr. patet, ac etiam secundo prognost. Cum itaque hisce tribus modis suppuratio, seu purulentia in Hippocrat. & Gal. doctrina intelligi possit, de ea, quæ primo modo sumitur, nequaquam pertractare proposuimus: cum de thoracis, ac pulmonis affectibus, & non de his, qui indifferenter in singulis corporis partibus prouenire possunt, hic verba facimus. Et cum magna ex parte, ac præcipuè suppuratos nominent Hippoc. & Galenus eos, qui pus habent in spatio inter thoracem atque pulmonem, vt præcitatis locis liquet: propterea de hac suppuratione potissimum pertractare intendimus, quamuis affinitate sermonis nonnulla quoque dicemus de conuersione, seu transmutatione inflammationis lateris, seu pulmonis in pus, quod quidem adhuc in parte inflammatione affecta vniuersum continetur; & si hic affectus nõ præcipuè suppuratio, aut purulentia dici possit, vt dictum est. Afficitur vero perpetuò in verè purulentis thorax, præsertim secundum eius cavitatem, hoc est, intermediam regionem, quæ inter thoracem atque pulmonem est: quapropter angustiam sentiunt laborantes loci illius pure repleta intermedia ea regione: acciditque eis anhelitus difficultas ac tussis, & in imo thoracis grauitas quædam sentitur. Verùm si nondum spūs in idem spatium effusus sit, sed vniuersum consistit, erit in parte prius inflammatione affecta, pulmonem, aut subcingentem membranam affectam esse dignoscet, ex præcedente peripneumonia, aut pleuritide, quæ haudquaquam adhibitis subsidijs discusse fuerunt. Præter hæc, si in pulmone pus contineatur, & in vtraque parte potius, quàm in altera, dextra scilicet, & sinistra pus colligitur, in vtrisque incidens, veluti quoddam onus præsentiscit æger, & æque calidiores ambæ partes sentiuntur, neque ægrius, aut promptius in vno latere, quàm in alio cubabit. Si vero suppuratio in altero latere tantummodo fuerit, in altera quoque parte thoracis, dextra scilicet, aut sinistra, potius quàm in vtraque pus collectum erit, neque in dextra parte existens, in sinistram neque è contrario in sinistra, transmeare in dextram potest. Cæterum pars affecta cognoscitur, quia calidior est, quàm reliqua, & in eodem quoque duntaxat dolorem, seu grauitatem sentiet æger: & eo in incolume latus cubante, veluti onus de super aliquod illi pendere videtur, ut apud Hippocrat. atque Galen. legitur 2. prognost. Suppuratio itaque præcipuè dicta, quæ nihil aliud est, quàm collectio puris inter thoracem, & pulmonem, vt prius diximus morbus est in numero tote genere præter naturam, ac in excessu, vt lib. de diff. morb. patet. At ea suppuratio, quæ transmutatio est, seu conuersione inflammationis lateris, aut pulmonis ad pus, cum eodem tempore fiat, abcessus dictarum partium, morbus posset dici in magnitudine, velut quoduis aliud genus abcessuum, ex Gal. sententia 14. method. med. Vtrunque tamè morborum genera in numero scilicet, & magnitudine, sub vno prædicamentorum genere continentur, ut pote sub quantitate, velut patet eodem libr. de differen. morb. Verùm vt clarius fiat prædictarum suppurationum dignotio, eas separatim distinguere voluimus, ac pro earum distincta notitia, primò indicia trademus ipsius suppurationis, quàm abcessum nuncupauimus. secundo disruptionis ipsius abcessus, & tertio effusionis, seu collectionis puris inter thoracem, atque pulmonem, quæ propriè ac præcipuè suppuratio dicitur. Dignoscet autem inflammationis transmutationem ad pus, cum adhibitis op

De qua suppuratione tractabitur.

2. prognost.
Leco citato.

Para affecta

Tex. & cõ. 59.
Suppuratio proprie dicta, quid sit.

De diff. morb. c. 8. in princ.

Quis affectus præter naturam est.

14. met. c. 12. colligitur.

Libr. differ. morb. cap. 8.

Signa inflammationis cum in abcessum vertitur.

portunis subsidijs, ac proba instituta victus ratione in præcedenti inflammatione dolor non desinat, adhuc rigor laborantem præhendit propter puris acrimoniam, ac mordacitatem, quod quidem adiuncta corpora erodit, talemque rigorem febris comitabitur vehementior admodum, quam ea, quæ præcesserat; euenietque ægrotis ponderis cuiusdam (in loco quo dolore afficiebantur) sensus. Ex pondere itaque, rigore, ac febre multo vehementius affligente, quam anterior, suppurationis initium percipitur, ut liquet apud Hippocrat. & Galen. 2. prognost. & apud Alexandrum cap. de purulentis: nam dum pus conficitur, dolores, ac febres accidunt magis, quam iam confecto, ex eiusdem Hippoc. sententia apho. 47. libr. 2. aderitque grauitas pectoris, tussis valida, & sicca cum dolore aliquando etiam cum humiditate, ob quam releuari quoque videntur, ut inquit Paulus. Verum licet confecto pure, & dolor, & febris mitiores fiant, tamen instante tempore disruptionis ipsius, vehementius cum horrore quodam iterum febricitabunt, ac in sermonis proprietate conturbantur, offendunturque spiritu, adeo ut difficilius, quam antea spirent, ex eiusdem Pauli testimonio. Rupto autem abcessu, ac effuso pure inter thoracem; ac pulmonem, vehementes febres quiescunt, & magna ex parte dolor quoque, licet indefinenter febricitent habituli quadam febre: grauitatis autem sensus remanet intus in profundo thoracis: simulque transfluere aliquid apparet iuxta multiplices reclinationis permutationes, & maximè cum ab vno latere in alterum decumbunt, tunc sanè multitudo puris manifestatur, & fluctuationis cuiusdam sonitus sæpe sensibilibiter in reclinationibus ipsorum auditur, prout legitur apud Galenum libr. quart. de loc. affect. & apud Aetium libr. octauo cap. 65 totusque thorax ipsdem attollitur; etsi neque calidus sit ipsorum spiritus, neque etiam exufflando emittatur, nisi adures fortasse febris accesserit, ut idem testatur Galenus, potissimum ubi magna puris quantitas collecta sit. Educitur quoque eisdem pus nunc purum, nunc sæculentum, ut inquit Paulus: ex pulsu item poteris diuersa suppurationis tempora interstinguere: nam initio suppurationis statim suppurati pulsum habebunt, qualem habere solent in uigore inflammationis; nam hoc tempore initium est suppurationum: erit itaque pulsus durior, quam antea, & vibratus magis, sed minor, quam dudum, non tamen languidior, quin etiam crebrior, ac celer: nonnunquam etiam erit inæqualis, & inordinatus; verum omnibus erit hæcticus; quoniam perpetuo est illa in motu arteriarum agitatio, donec fiat eruptio: licet cum pus propè maturum sit, æqualior sit pulsus, cum vero eruptio fiat, languidior, latior, tardior & rarior pulsus redditur, ut libr. de puls. ad tyr. & 4. de caus. puls. scriptum est. Hippocrates vero eodem 2. libr. prognost. omnes purulentos dignosci his indicijs fateatur, nam principio febris non dimittet, sed interdum tenuior, noctu vero vehementior est. Copia sudoris elicitur, ac tussendi cupiditas adest. quamuis nec quicquam commendatione dignum expuant. Oculi caui redduntur, genæ rubent, ungues curantur. digiti vero potissimum summi calescunt, atque in pedibus tumores consistunt, procedente videlicet tempore, neque cibum appetunt ac pustulæ circa corpus erumpunt: quorum omnium Galen. eodem loco causam reddit. At quoniam suppuratio non ex vna duntaxat causa oriri potest, eas propterea inuestigare conabimur: interim nanque ex inflammatione in pus versa, & demum disrupta, siue subcingentis, aut alterius thoracis membrana, siue pulmonis fieri poterit: velut ex iam dictis liquet, ac etiam Paulus, & Aetius testantur. Quandoque vero propter sanguinis eruptionem, vlcere ad cicatricem non perducto oriri poterit, ut idem Paulus inquit. Ex agnina quoque cum ab ea ægri liberantur, & ad pulmonem vertitur, si non in septem diebus pareant, sed eos effugerint, suppuratio fit, quemadmodum aphor. decimo libr. 5. ab Hippoc. & Gale. scriptum est. Quæcunque vero prædictarum causarum

Tex. & com. 38
Alex. lib. 7. c. 2.

Paul. libr. 3. 32.
Signa disruptionis.
abcessus.
Loco citato.
Suppurationis.
proptie dictæ signa.

4. de loc. affect.
c. 8. circa princ.

4. de loc. affect.
cap. 7.
Quales sunt suppuratorum pulsus.

Lib. de puls. de
Tyr. cae. 11.
4. de caus. puls.
cap. 9.
2. prog. tex 60.

Causæ suppurationis.

rum suppurationem excitauerit, haud ægre dignosci poterit, ex propriis eorū dem affectuum signis, vt si pleuritis, aut peripneumonia, aut sanguinis eruptio, seu angina præcesserit. Ex confluxu etiam è capite ad thoracem manante (vt Paulus asserit) ortum ducit quandoque suppuratio, seu (vt inquit Aetius) seroso, aut pituitoso humore, ex reliquo corpore in vacuum thoracis delapso, isthicque putrefactio id quod confirmari videtur ab Hippocr. simul atque Galeno aph. 38.7. libr. cum dixit Hippocr. Destillationes in ventrem superiorem suppurantur intra viginti dies: & lib. 1. de morb. ab eodem Hippoc. dum asseruit suppuratos interim fieri, cum pituita de capite copiosa, & acruatim in superiorem ventrem fluxerit, putrescit, & in pus vertitur: Nec minus & huius causæ notitiam habebis, si præcedentem destillationem considerabis, ac eiusdem signa pernotabis. Verum qui fiat, vt ex destillatione, seu ex delapsu pituitosi præsertim, serosi humoris ex reliquo corpore, in vacuum thoracis suppuratio gignatur, non ab re dubitabit quispiam, Cum suppuratio (vt superius definitum est) aut mutatio sit inflammationis ad pus, aut effusio quædam, seu collectio puris in thoracem, & pulmonem: quod vero pus generationem habeat, aut vbi contusa caro fuerit, aut ex humore, qui phlegmonem produxit, apud Galenum legitur quinto de simplic. medicament. facul. in super (vt idemmet Galenus testatur 1. de diff. febr.) pus generationem habet per inflammationes, & phymatosos tumores omnes, superante quidem natura quemadmodum in humoribus intra vasa putrescētibus, id quod subsidet in vrina, proportionē puri correspondet. Qua de re quocunque modo suppuratione sumpta, cum semper pus contineat, siue collectum in parte prius inflammata, siue effusum inter pulmonem, & thoracem oriri nequaquam poterit, propter confluxum humorum a capite, aut ex reliquo corpore ad thoracis partes manantem, vt Paulus, & Aetius asserunt, seu ex destillatione, vt inquit Hippoc. & Galenus præcitato aphor. 38.7. libr. cum necessum sit ipsum fieri, aut ex carne contusa (id quod in suppuratione iam dicta minime contingit) vel ex præcedenti phlegmone non discussa, seu tuberculo, ad pus transmutatis: non igitur generari poterit ex destillatione, seu delapsu humorum ex reliquo corpore in vacuum thoracis suppuratio. Verum si quis Hippocratis, ac reliquorum iam dictorum verba sane intelligere velit, ipsos prompte a calumnia liberabit: nam destillationes in vētrem superiorem intra viginti dies suppurari, hoc est, concoqui, superari, & euinci, ac similes puri reddi, & non vere in pus verti docuit Hippoc. id quod Galenus disertissime declarauit, commento apho. 30. eiusdem 7 libr. cum dicebat, loquens de his, quibus fiunt a capite ad pulmonē fluxiones manifestæ. Verum hi neque spumosa per sedem excernunt, neque cum tussi expuunt, & tamen sæpius manifeste quæ sunt in viscere, hoc est, pulmone, asperæ arteriæ sunt eo oppletæ, quod defluxit a capite, quod iam concoctum est puri simile, sed spumosum minime: concoctæ itaque destillationes in superiori ventre, hoc est thorace, puri similes fiunt, vt inquit Galenus, & non veræ suppurantur. Quare ex eis similitudinariæ quædam, & non veræ suppurationes interdum gignuntur, ex Galeni sententia: cum verum pus ex eisdē progigni nequeat. Quomodo etiam interpretari possunt & Pauli verba, vel intelligas ex confluxu a capite manante ad thoracis partes, phlegmonē prius generari posse, & ex ea suppurationem per eiusdem phlegmonis transmutationem ad pus. Erit itaque non immediata, sed mediata causa suppurationis destillatio, si hoc modo interpretentur Pauli verba. Quod vero Aetius suppuratos non vere fieri ex seroso, aut pituitoso humore in vacuum thoracis delapso, isthicque putrefacto intellexerit, sed æquiuoce, ac similitudinariè ex eiusdem verbis liquet, cum dixit. Nouimus autem quosdam citra febrem suppuratos, ex iam dicta causa, & cætera. Paulo enim supra retulerat

1. de morb. uer-
sas medium.

Dubium.

5. de simpl. fac.
cap. 6.
1. de diff. febr.
cap. 6.

Responsio.

Loco citato.

Prognostica.

2. prog. tex. 63.

Tex. 69.

6. de loc. aff. ca.
3. colligitur.4. de loc. aff. ca.
7. de ante mediū5. de loc. affect.
cap. 3.

Loco citato.

suppuratos indefinenter febricitare febre hectica. Qua de re sibi ipsi pugna-
ret, si post pauca verba eisdem citra febrem nouisse asseruisset; nisi per eos
citra febrem suppuratos non verè suppuratos intellexisset; vel dicas fieri sup-
puratos, si pituita ex capite destillet ad pulmonem, ex qua temporis progres-
su exasperatur pulmo, & intus exulceratur a pituita inhærente, ac putrescen-
te, ut visum fuit Hippocrati libr. de morb. 1. & si tabidi potius quàm suppara-
ti, hi nuncupari possint. Verum de causis suppurationis satis sit hæc dixisse: sed
ad eiusdem prognostica deueniamus asserentes quod suppuratorum hi potissi-
mum supersunt (inquit Hippocr. 2. prognost.) quos febris eodem dimiserit
dic post eruptionem, ac cibum citius appetunt, & siti liberati sunt, & venter
exigua, ac consistentia deiecit, & pus album, leue, concolorque est, ac vacans,
pituita, & absque labore, ac valida tussi expurgatur. Itaque optime quidem
sic, ac celerrimè iudicantur, si minus, quibus ad hæc proximè accedunt: mo-
riuntur vero ii, quos febris non deserit, aut cum videatur deferere, denuo re-
calescens innotescit: & sitiunt, nec cibum appetunt: aluus humida est, pus vi-
ride, liuidumque spuunt, vel pituitosum, spumosumque: pereunt ergo, si hæc
omnia adsint. At horum quibus alia adueniunt, alia non, ii partim intereunt,
partim in multo tempore incolumes euadunt: verum ex indiciis omnibus,
quæ in iis existunt, de cæteris quoque vniuersis coniectandum. De iis vero
suppuratis, ac purulentis, qui ex pulmonia fiunt, eodem 2. prognost. Hippo-
crates sic scriptum reliquit: Quod si maiores natu fuerint, potius intereunt.
per alias vero suppurationes, minores natu potius moriuntur. Etenim (ut in-
quit Gale. in commento) in purulentis ex pulmonia, quia propter excrecio-
nem sanari debent, viribus propterea egent validioribus, & ob id potius mi-
nores natu, quàm maiores seruantur. In cæteris vero suppurationibus, mino-
res natu antea moriuntur propter uehementiores dolores, ac febres, quæ ma-
gis dum suppurationes fiunt, illis accidunt: quò fit, ut propter magnitudinem
febrium, ac doloris, morte præoccupentur. De iis vero qui ex morbo laterali
suppurantur, talem protulit sententiam aph. 15. lib. 5. quod si in quadraginta
diebus purgantur, a die, a qua fit eruptio, liberantur, si vero non, ad tabem
transferunt. Conuersa autem inflammatione lateris, aut pulmonis in suppara-
tionem, rumpitur nonnunquam sursum versus, quâdo etiam periculosior est,
Aetio, & Paulo testibus: aliquando vero deorsum. Verum si sursum erumpi-
tur, si non quàm citissimè pus per sputum reiiciatur, tabidi fiunt, ut inquit
Aetius, & (ut Paulus asserit) illud idem confirmans, nisi eisdem summa ad-
hibeatur diligentia, protinus purulenta illa collectio tabem accersit, pulmo-
ne exulcerationem contrahente. Quæ vero suppurationes inferius tendunt,
ac rumpuntur: non adeo periculosiores existunt, cum in aluum, & intestina,
aut in vesicam transfundantur per vasa quædam transmissione ad ea mēbra
facta; quem puris expurgationis modum, pulmonis, aut thoracis vomica disru-
pta, disertissime Galen. 6. de loc. affect. & commento aphor. 30. lib. 7. docuit;
in his itaque locis illum studiosi requirant: ii vero suppurati, quibus propter
magnam puris copiam inter thoracem, & pulmonem collectam totus thorax
in respiratione attollitur, celerrime suffocantur, ex Gal. testimonio quarto de
loc. affect. tum ob affectum ipsum, ut ipse refert, tum quod vires omnibus sup-
puratis defessæ, siquidem propter pugnam ex necessitate imbecilliores red-
duntur. Verum quinto de loc. affect. de suppuratis aduersus Erasistratū sic di-
cebat, quod velut nō paucos perire, ita & alios complures seruari viderat: quo-
rum si quis per singulos dies reiecti puris quantitatem collegerit, interdum
sex, aut octo heminas, interim, quindecim atque interdum plures totam sum-
mam æquare inueniet. Quis autem sit suppuratorum per expuitiones purga-
tionis modus, habetur a Gale. eodem 5. de loc. affe. nanque expirationis tem-
pore

pore vniuerso thorace vehementer constricto per validam tussim (sine qua fieri nequit) pus, quod inter ipsum & pulmonem continetur comprimendo cogit, atque ad pulmonem ipsum impellit concedente pulmonis membranae eiusdem puris, ac similiter cuius vis alterius excrementi penetrationem: etenim thorax vehementer admodum hoc tempore pulmonem omni ex parte comprimit; & demum, cum & maiores sint in earum extremitate asperæ arteriæ partes, quam venæ, & arteriæ lenes, ac multo ampliora habeant ora, nec ita concidunt, neque omnifariam concludantur, propterea quod cartilagineæ sint, in asperas ipsius pulmonis arterias recipitur, & non in lenes, ac venas, ac deinceps expuitur. Qui autem suppuratione laborant aerem inhabitent siccum, in calido, & frigido temperatum, vel paulo ad calidum vergentem, ac in quiete diligenter custodiendi sunt. A motu, seu exercitio cauentes: somno quoque temperato vtantur, & si rupturæ tempus instauerit, super sanum latus decumbant, Paulo auctore singulis diebus alui excrementa excernant, si non sponte, saltem clysteribus, præsertim lenibus: nanque exonerata natura ab eiusmodi excrementis, promptius suppurationi vacabit, ipsam maturando, aut rumpendo, aut expurgando. Immodice animo affectiones vitandæ erunt, præsertim metus, & mœstitia: nutriendi vero sunt ex ptisanæ succo, & aqua mulsa, vt inquit Aetius: nam mulsa quouis tempore exhibitæ, nihil ægrum offendit, Tralliano teste: quamuis nec ipsa vniuersim, sed paulatim exhiberi debeat: nam omnis potus modicus esse debet, in ijs qui alibi abscessum habent, vt Galen. testatur septimo de compo. med. secund. loc. Verum (vbi infirmæ vires fuerint) maior cura ipsarum habenda est: & propterea cibus boni succi, & concoctu facilibus vti debent, ptisanæ cremore parantes, aut ipsammet totam ptisanam decoquentes in gallinarum, seu pullo- rum gallinaceorum, phasianorum, aut perdicum, seu columbarum iure: quorum etiam carnes edant, veluti etiam & turdos, aliasque aues montanas, ac gallorum testes, Et quia iura (vt inquit Alexander) vlcerà magis detergant, ventremque humidiores efficiunt: propterea modo dictarum carniū iure vtantur, thymo, hyssopo, oreoselino, aut fœniculo adiecto: brassica, aut asparago, vel malua, vbi biliosum corpus fuerit, aut falsum quid expuant, & febris valida. Interim vero vti poterunt pistaceis, amygdalis; vua passa, ac nucleis pineis, verum non copiosius ex eis assumant, & si abstergere possint: nam egre concoquuntur, & propter oleosam ipsorum partem alios cibos in ventriculo interim corrumpunt, vt apud eundem Alexandrum legitur. Potus vero (vt diximus) sit, aqua mulsa, aut aqua hordei, vel vinum tenuis substantiæ, vt Galenus præcipit, eodem lib. septimo de compo. medic. secund. loc. sit autem vinum (vbi eo egri indigeant) paucum, ad dulcedinem declinans, vt inquit Aetius: poterit quoque & aqua probe cocta offerri, iuxta eiusdem sententiam: ab aceto autem, & omni alio vinoso genere, & ab aqua quoque frigida abstineant, vt ipse præcipit. Cum autem suppuratio fieri incipit, puris confectio, seu concoctio iuuanda erit, vt Paulus refert: nanque vnum ex naturalibus operibus, quod quidem concoctio, quædam existit, est ea quæ in pus sit conuersio, vt apud Galen. legitur quinto de simpl. med. facul. & primo de diff. febr. Quæ de re quod ad mouendum pus adhibetur medicamentum, tale esse debet, qualis est in naturis temperatis calor natiuus, modice siquidem humectans, & ex- calfaciens, vt neque excellat, neque inferius sit temperatura corporis ipsam immutantis, sed quoad fieri possit simillimum, quemadmodum eodem quinto lib. de simplic. med. facult. liquet. iridem quod emplasticum sit oportet, quo tenaciter corporis poris, siue meatibus illitum inhæreat, vt idem patet. Primum itaque cum suppuratio sit, fomentis per spongas natura adiuuanda erit, vt Paulus asserit. nec illud citra rationem fieri iussit: nam inter omnia, quæ

curatio.

Vidus ratio.

Cap. 6.

c. 6. in princ.

Medicamento-
rum ratio.5. de simpl. fac.
cap. 6.1. de diff. febr.
Cap. 61Quæ medicamē-
ta puris genera-
tioni opulētur.
Cap. 6.

ad

*Quæ competant
pure genito,*

In medio.

*Quæ competant
medicamenta
suppurationi
proprie dictæ,*

ad puris generationem conferunt, aptissima est perfusio aquæ temperate calidæ, aut cui additum sit oleum, quod hydreleon Græci vocant; & ex iis, quæ irrigantur, oleum temperatum, iuxta eiusdem Galeni decreta, præcitato li. quinto de simplic. medic. facul. Farina quoque triticea pura, aut panis purus modice coctus cum hydrelæo confert: insuper & adeps suillus, vitulinus, gallinaceus, seu anserum cum maluæ, seu althææ radice permistus: vel cataplasma fiat, præsertim tardantibus suppurationibus ex caricis decoctis, hordeacea farina, althææ radice, columbino stercore, & modica resina terebintina, ex Pauli, & Aetii sententia. Ceratum quoque conficere poteris ex butyro, ruta, iride, baccis lauri, ut Aetius inquit, cui radicem maluæ, aut althææ, adipem ex prædictis, farinam hordeaceam, aut triticeam, oleum commune, amygdalarum dulcium, aut chamæmelinum simulatque ceram addere poteris. Quo ite tempore ius ex confusis carnibus gallinarum, aut gallinaceorum pullorum, perdicum, phasianorum, aut starnarum paratum, etiam cum ptisana permistum assumere ægri poterunt, præsertim ubi imbecilliores vires fuerint, cum non parum eis conducatur pro puris generatione. Pure autem genito, quæ abscessum rumpunt adhibenda erunt velut est mulsæ sorbitio interposito tempore, & ptisanæ cremoris cum melle: & si valētiores ægri fuerint. (ut Paulus refert) decoctum hyssopi, & thymi cum melle: item salforum esum commendat, & catapotia ex hiera diacolocynthide, à quibus abstinere consulo, nisi valde robusta sint corpora, quibus hæc tribuantur: potius vero syrupum ex hyssopo, aut è marrubio crebrius ad hunc usum præberem. Conducit quoque non parum ad abscessus rupturam, super sanum latus decubitus: legitur etiam apud Hippocratem libro de locis in homine, quod purulentis, cum excreationem facere oportet pluribus cibis, & salis, ac pinguibus utendum est, & vino austero, & cum sic habet tussis inducenda. Ab extra vero utale est (ut Aetius inquit) cataplasma ex solo stercore caprino, præsertim ubi ruptura tardauerit: verum rupto abscessu adiuuare oportet puris excreationem, quocunque repere cognoscatur, ex decreto eiusdem Aetij. Nam si ad aluum proreptet, magis emollientia offerenda sunt, si ad vesicam serpat, ea, quæ urinam magis cient adhibenda: si vero per tussim puris repurgatio fiat, nihil conuenientius, aut familiarius exhiberi poterit, quam ptisana optimo melle permista: item dari poterit (ut Paulo visum est) hyssopi, iridis, aut dulcis radice decoctum in mulsâ diluta; cui quoque sententiæ assipulatur Aetius: item & radice dulcis succus commanducatus confert: Et si pus, quod expuitur, foedi odoris, ac sordidum fuerit, fœni græci cremorem cum palmulis pinguibus decoctum dare confert, horum inopia, ficus quoque siccas modicas incoquere. Præstat etiam, si mellis paulum admisceas, ubi cremorem exhibiturus es, ut Alexander scriptum reliquit: per aliquod tamen tempus ante cibum, potius ipsum dato: Benefaciunt quoque (eodem auctore) hyssopum, thymum, aut iris confusa, seu pulegium, seorsum assumpta, aut cum melle mixta: nam generose (ut ipse inquit) repurgant: Idem quoque medicamentum commendat, quod recipit nucem pineam quæ copiosam resinam peculiarem sibi circumdatam habeat, cum marrubio recenti decoctam, deinde mellis modicum decocto misceto, & rursus hoc usque ad mellem crassitiem incoquito, & utitor; in quem etiam usum conducunt, mel rosaceum, syrupus ex adianto, è glycyrrhiza, de hyssopo, & marrubio: Vtilis quoque ad puris repurgationem existit aliorum præcipue coctorum comestio, robustis præsertim, ut Aetius fatetur. Interea ex hyssopi puluere, vel abrotani, mixtis feminibus, in decoctione pinguium caricarum medicamentum paratu. Similiter etiam terebinthina munda in mensura vnus cochlearis, ieiunis quàm maxime, & viribus reparatis datur, ex Theodori Prisciani sententia lib.

lib. 2. ad Thimoth. par. 2. cap. 10. Cæterum vndecunque puris excretio contingat, eodem Aetio teste, ea quæ vrinam cient, cibis commodè admiscuntur: quâvis hoc pugnare videtur Galeni verbis lib. 5. de simpl. med. facult. cum asseruit medicamenta vrinam cientia acriora esse, & valde excalfacientia, quæ omnia aduersa sunt puris ex thorace expuitioni: Quippe cum natura eorum sit, tum excalfactoria, exciccatoriaque, tum etiam secretoria, & coactoria. Quod vero coactum est atque exciccatum haud etiam facilè expuitur, proinde huiusmodi medicamenta, quæ expuitioni ex thorace puris opitulantur, incidendi, atque extenuandi, & detergendi vim habeant oportet, sed non tamen insigniter calidam, ne videlicet validè desiccet, veluti ea, quæ vrinam valenter ciunt. Atqui nodus hic bifariam solui poterit, primò quòd Galen. acriora medicamenta dixit plurimam mouere vrinam (cum nonnulla alia eam ciere possint, quæ acriora non sunt) quæ insuper puris ex thorace expuitioni aduersa esse fatetur: cum simul cum caliditate valenter desiccant: & propterea ab eo peculiariter hæc dicuntur vretica, siue vrinam mouentia, non quia hæc solum vrinam moueant (quoniam & alia quoque medicamenta, quæ non adeò calidiora sunt, neque desiccant, vrinam prouocant) sed quia iam dicta medicamenta solas vrinam mouent, propterea peculiariter vretica nuncupantur, à quibus abstinendum esse pro puris ex thorace expurgatione, eodem loco præcipit, & non ab his, quæ non adeò calida, & sicca, seu acria sunt, & ab Aetio commendantur. At si quis velit, cuncta quæ vrinam ciunt ab eodem Aetio cõmendari, dicimus nos quod eisdem etiam vti possumus, modo quo præcipit Aetius, ea scilicet cibis admiscentes, quæ suapte natura humidiora sint, vtpote ptisanæ, aut cuiuspiam iuri ex prænominatis; id quod neque Gal. ipse negauit, cum præcitato lib. 5. de simpl. med. facult. dixerit eadem medicamenta, vretica, acria, plurimum mouentia vrinam commoditatis gratia, pro expurgando ex thorace pure, cum sorbitum culis, potionibusque humectantibus exhiberi posse. obrunditur etenim prædictorum medicamentorum caliditas, ac siccitas immodica ex admistione sorbitionum, ac aliorum ciborum, seu potionum humectantium. Quod sit diuturnior affectus fuerit, imbecillæ vires, ac febris calor moderatior euaserit, neque thorax multum puris contineat, lac (vt inquit Alexander] dari debet, asininum præcipue, vbi sordidum ac fædi odoris pus ex purgatione indigens existat, hoc enim omnibus alijs antecellit, vt ipse inquit: post ipsum equinum propinandum erit, quod asinino ad omnia sit persimile. At si horum animantium ægri lac nolint assumere, dabitur ipsis secundo loco bubulum, aut caprillum: nam & si non adeo purgantem vim obtineat horum lac, nutriendo tamen amplius quiddam alijs præstare potest: & si timor absit, ne ægri ventriculum lactis corrumpat potio, satius erit ipsum incoquere: nã decoctio bonam serosi partem auferret, vt etiam ipsum effica exuadet ad ventrem retinendum. Commodius quoque adhuc, & vtile efficias, si calculos fluuiales candentes, excussosque iniicias, aut ferramenta eodem modo ignita. Vfus denique lactis vlcus purgare, carne obducere, & totum corpus, pulsquam vniuersa nutrire poterit, vt idem Alexander inquit: verum de hoc in sequenti capite fusius pertractabimus.

Cap. 13.
Dubium.

Responsio.

Cap. 13.

περί τῆς φθίσεως

de tabes

Cap. 53

QUAMVIS diutius, sæpe & periculosius tabes eos male habeat quos inuasit, vt legitur apud Celsum cap. 22. lib. 3. tamen plures sunt eius species, vt ipse inquit; quarum vna est, qua corpus nõ alicur, & naturaliter semper aliquib. decedentibus, nullis vero in eodem loco subeuntibus summa macies oritur, & nisi occurrat, tollit: hanc tabis speciem

Tabis species
tres.

ἡ Τροφία
Græci

Tabes quę phti-
fis appellatur
tribus etiam
modis dicitur.

1. de morb. vul.
commentario, 1.
com. 18.

Com. 1.
com. 18.
De qua tabe
hic tractetur.

Quid sit.
2. de morb. pau-
lo post medium.
De internis af-
fect. circa princ.
Quod hæc e. i. i. m.
tabes bifariam
dicatur,
De definitioni-
bus medicis in
medio,

Cap. 11

Græci vocant: Altera species est, quam Græci καχεξία appellat, ubi malus corporis habitus est, ideoque omnia alimenta corrumpuntur. Tertia est, longeque periculosissima species quam Græci (ut ipse inquit) φθίσις nominauerunt, quemadmodum Hippo. nonnullis in locis, præsertim apho. 16. 7. lib. nominauit: licet hanc etiam Græci potissimum Athenienses (ut Galenus in commento refert) φθόν, appellant. De hac itaque tertia specie, quam Græci φθίσις, aut φθόν, nuncupare consueuerunt, latini tabem, reliquis duabus posthabitis, pertrahere intendimus: quamuis & hæc quoque φθίσις, seu tabes non vno modo in Galen. doctrina intelligatur: nam tabidos interim nominat eos omnes, quomodocunque extrema macie confectos quocunque extenuentur modo. Interdum vero illos solum, quibus pulmo est exulceratus: quandoque autem eos, qui natura proni, seu apti sunt ad hunc morbum, veluti videre licet commento aph. 10. & 13. 3. lib. & 8. 4. ac primo de morb. vulg. & sexcentis alijs in locis. Nos verò per tabidos audiri volumus, non eos, qui extremè emaciati sunt quomodocunque, nec eos qui parati sunt ad hunc morbum, utpote angusto, & restricto thorace existentes, ut à tergo in morem alarum promineant operta scoptula, quos propriè Græci περιπυώδες, quasi alatos vocant, & quibus à capite ad pulmonem fluxio defertur: nanque hi quoque facile tabescunt, cum caput faciliè impleatur, spiritusq; organis multas destillationes demittat: Gal. teste eodem. 1. lib. de mor. vulg. Verum eos duntaxat, quibus pulmo exulceratus est, veluti per tabem intelligi volumus vlcerosam dispositionem in pulmone existentem, quam idem Galenus describens commento præcitati aph. 16. 7. lib. totius corporis extenuationem esse dixit, cum febre tenui, seu exigua consequentem ad insanabilia pulmonis vlcera. Voluit quoque Hipp. lib. 2. de morb. ac lib. de internis affectionibus tres item esse tabis species, quarum prima à pituita fit, è capite ad pulmonem confluente, secunda à labore; tertia à spinali, seu dorsali medulla, quę maximè corripit recentes sponfos, & veneri deditos. Nos vero (ut diximus) reliquis omnibus posthabitis tabis speciebus, seu differentijs, de ea verba faciemus, quæ totius corporis extenuatio est, cum febre lenta, consequens ad insanabilia pulmonis vlcera, Galenum sectari; aut si quis vellet breuiorem asserre definitionem, eam nominabit tabem, de qua sermo habendus erit, quæ vlcerosa pulmonis dispositio est, quemadmodum Galenus eam nuncupauit aphor. 11. lib. 5. & 10. libr. 3. & post eum Aetius cap. 67. lib. 8. & Paulus cap. 32. libr. 3. quamuis auctor libri de definitionibus medicis, per tabem propriè dictam, ne dum pulmonis vlcerationem verum etiam thoracis, vel faucium subintelligi voluit, quam & tussicula, & debiles comitantur febres, atque in eis corpus conficitur. Exquisita itaque tabes (ex Hip. & Galeni monumentis) erit corporis consumptio, seu colliquatio cum febre lenta, ex pulmonis vlcere: quamuis impropriè, ac non exquisitè tabes nuncupari possit ea quoque totius corporis demolito, seu extenuatio, quæ thoracis, aut faucium, seu asperę arteriæ vlcera comitatur, præsertim ubi non exactum adeo sermonem occasio requirat: licet re vera, qui hoc modo laborant tabidi non sint, eandem tamen curationem exigunt: tabescit siquidem, & in his temporis progressu corpus totum veluti impropriè dictis tabidis, præsertim si in thorace, aut aspera arteria exulceratio fiat: propterea quod cor ipsum similiter eisdem sicari oporteat: absque enim principis membri passione fieri non potest, ut animal in toto afficiatur, ut libr. de marasmo decretum reliquit Galenus, quamuis non æqualiter singulę corporis partes tabescant: Verum cor, & iecur minus quàm partes aliæ attenuantur in tabidis: cor siquidem, quoniam facultate trahendi vehementi pollet, quapropter sanguinem valentissime attrahit, & non priusquam vltima sit membris omnibus inopia, ipsum alimentum caret: iecur vero, quod sanguis totum inde initium habuerit, ut apud Galenum

lenum legitur pœcitate lib. de marafmo. Id vero quod in singulis partibus, & præcipuè in corde (vt diximus) per tabem primò demolitur, humor est in eisdem infusus, ac per loca media partium simularium dispersus, ex quo membra primum aluntur, verum quousque in corpore cordis aliquid ipsius seruetur, licet proprius, verani tabem accedant, tabidi re uera appellandi non sunt. Cum vero ad carnosū genus consumptio pertransit, aut ad fibrosam seu mēbranofam substantiam omnimoda facta consumptione ob ebullitionem iam dicti humoris infusi, exquisitus tunc marcor existit, vt legitur apud Galenum 7. & 10. method. medend. ac primò de diff. febr. Nos verò qui adeò exacto sermone de extenuatione loqui non intendimus, & si de ea loquamur, quæ vlcera pulmonis, asperæ arteriæ, aut thoracis consequitur, quoniam excitato humore duntaxat, disperso per loca media partiū simularium, cordis præcipuè, ac totius corporis eiusdem corporis exsiccatio quædam, ac extenuatio fit, adhuc tabem eam esse dicimus: nam licet perpetuò exulceratio præcedat, non tamen ex ea confestim carnosarum partiū, aut fibrosarum, seu membranofarum consumptio sequitur sed prius nuper dictus humor consumitur. Ex tussi autem, ac anhelitus difficultate aliquam prædictarum partium affectam esse conijcere poteris: quæ autem earum sit, ex alijs quibusdam signis comprehendas: nam pulmo si fuerit, plurimum erit quod per sputum reijcitur. Dolor nō aderit, siquidem pulmonis vlcera dolor non comitatur, Galen. teste quarto de loc. affect. Et si in eius parenchymate exulceratio sit, ex eiusdem pulmonis essentię proprietate percipies, cum ipsius pulmonis caruncula per tussim reijciatur; haud secus si bronchij pars quædam tussiendo reijciatur, secundum à speram arteriam pulmonem exulceratum esse existimamus: quin potius totum bronchion reijci necesse est. Similiter si arteriæ quæpiam, aut vena in eo exulcerata fuerit, ipsarum quoque portionem aliquam, præsertim vbi frustum vasis haud paruum fuerit, tussiendo expui oportet. orte uerò in aspera arteria vlcere, præter, hoc, quòd sputum purulentum apparet, dolorem quoque in loco affecto laborans sentire consuevit: ipsum verò per ea, quæ screantur, quia exigua sunt, ab vlcere, quod in pulmone natum est, discerni potest: quippe ab vlceribus pulmonis plurimum reijcitur. Ita quoque videmus interdū per vlcerationem excreari ex gutture corpusculum aliquod à ligula (Græci ἐπιλονπιδον vocant) cum pars ipsa efficitur: id vero non solum hoc indicio deprehenditur, verum etiam ex eo, quod in vlcerato loco doloris sensu laborans infestatur, veluti de aspera arteria dictum iam est. At si nullus in prædictis partibus dolor sentiat, nec aliquod iam dictorum signorum adsit, verum cum purulento sputo in thoracis parte aliqua manifeste sensus doloris adsit, thoracem affectum esse consueto. Affectus hic cum exulceratio sit, morbus planè erit in soluta continuitate. Dignoscitur autem ex frequenti tussi, per quam pus excreatur, interdum cruentum aliquid, vt inquit Celsus quod si in ignem impositum sit mali odoris erit. Comitatur autem necessariò affectum hunc totius corporis extenuatio, ac carniū consumptio, & febris quædam lenta, seu exigua, vt patet commento aphorif. decimi sexti, 7. lib. potissimum vbi pulmo exulceratus fuerit. Vt verò Celso visum est, febricula leuis fit, quæ etiam cum quieuit, tamen & repetit: verum proprium vlcerationis indicium est, (vt ipse Galen. inquit primò, & 6. de loc. affect.) vocatum ramentum, seu crustula quædam eius particule, à qua excernitur, græcè ephelcis dicta; spiritalium instrumentorum, si tussiendo excernatur: proprietas verò essentię eiusdem affectę partis proprium indicium est. Discernunt præterea pluri purulentum liquorem, vt ex Celio Auraliano liquet libr. 2. cap. 14. phlegmata carbonibus imponentes, quò exusta probentur. nam tetri odoris esse necesse est, omne quod natura fuerit mutatum, velut ea defluxione carnis

peniens:

cap. 5.

7. meth. ca. 6. circa finem.

10. meth. c. ult.

1. de diff. febr.

6. 9. post. princ.

Partis affectę signa.

Pulmonis exulcerati signa.

cap. 8. post medium.

Asperæ arteriæ exulceratę signa.

Signa exulcerati thoracis.

Quis affectus præter naturam sit.

Signa.

1. de loc. affect. cap. 15.

6. de loc. affect. ca. 3. colligitur.

saph. 11, & 12.

Causæ.
Cap. 11.Commentario.
1. com. 17.

Prognostica.

4. de loc. affect.
c. 5. in medie.
5. met. cap. 8.
5. met. cap. 11.
Cur pulmonis
ulcera sint sana
tu difficillima.
cap. 11.cap. 5.
cap. 12.5. meth. c. 14.
4. de loc. affect. c. 5.
cur non omni-
ne curationi re-
sistant thoracis
ulcera.

veniens : item in aquam mittunt ægotantium sputamia etenim naturalia facile solvuntur, vitata verò, atque mutata perseverant, quadam tenuitate coacta, & subsidunt, si quidem sint graua, & contra naturam ex defluxione carnis venientia : verum cum confirmata tabes fuerit, præter carnum consumptionem, gæne liuescunt, vngues curuantur, ex albidis, vel pallidis apparent : & malo iam vincente, capilli de capite defluunt; aluique profluvium superuenit Hippocr. auctore: præcordia sursum conuellantur, sitis ipsos magis conficit, cibi que fastidium vrget; & id quod sursum vergit, ac per sputum reijcitur, vehementer foedi odoris est vt inquit Paulus. At tabidorum pulsus languidus est, ac paruus propter facultatis imbecillitatem; non nimium celer, vt plerique febricitantes habent, quod non detineantur vrente febre. Habent item tabidi pulsus hecticum, hoc est, vndeque similem quoniam & febrem habent hecticam : sic enim à febre, quæ vniuersum corporis habitum occupauit, appellatur pulsus, vt libr. 4. de caus. pulsuum scriptum reliquit Galenus. Oritur ferè à capite tabes, inde in pulmonem destillat huicque exulceratio accedit, ex Celsi decreto etenim quæ capitis destillationes, tussim primò concitant hominibus & raucedinem, neque tandem consistunt, tabem generant. Galen. teste primò de morb. vulg. cuius duæ sunt maximæ differentiæ, vt ipse refert; vna ex illis, quos caput demittit, fluxibus constat; altera, quæ ab ipsius pulmonis malis proficiscitur: omninoque postquam expuit sanguis, potissimum vase rupto: sæpenumero etiam fluxione impleto viscere hoc; alia de causa ex partibus alijs, non ex capite. Aetius verò pulmonis exulcerationem ad sanguinis spuitiones præcitato loco consequi fatetur: cum videlicet sanguinis eruptione suppressa, vlcus non fuerit conglutinatum, neque cicatrix inducta: consequitur etiam iu suppuratis, & peripneumonicijs, item aliquando in affectionibus pleuriticis. Quo autem modo interstinguendæ sunt prædictæ labis causæ, facile patere poterit, si quis eas, quæ præcesserunt destillationes sanguinis reiectiones, suppurationes, peripneumonias, ac pleuritides, ex his, quæ in proprijs earum affectionum capitibus retulimus, considerauerit: reliquum est, vt prognostica aggrediamur. Sit autem primum, quod licet vlcera creberrimè in pulmone fieri possint, curationem tamen (vt quibusdam visum fuit) nequaquà admittunt: aut (vt aliqui putant) difficulter admodum sanantur, quemadmodum liquet, cum 4. de loc. affect. cum 5. method. medend. Ipse verò Galenus difficillima sanatu esse pulmonis vlcera fatetur, vt quæ ne citra tussim expurgari possint: & si tussim exciter, laceraueris: itaque quasi per mutuas operas, malum ijs in orbem reddit: tum etiam quod ea, quæ idonea vlcibus medicamenta sunt, contingere vlcus, sicuti in ventriculo, nō possunt: vt quod per medium interuallum, ferè vim suam amittunt. Et præterea, quod præter id, quod tussiendo lacerantur, respirando etiam mouentur: & proinde concludebat eodem 5. method. medend. quod cum in pulmone ruptum vas est, scire apertè licet (nisi protinus antequam phlegmone excitetur, glutinatum sit id) postea insanabile fore. Quod si aliquando curetur, relinquatur tamen in ipso res quædam callosa, fistulosaque, quæ tractu temporis à leui occasione expelli solet, vt 4. de loc. affect. liquet: quamuis si ex anthemata quædam in pulmone sint orta propter vlcum siccitatem, sanari possint, præferim vbi aspera, & scabiosa fuerint, vt idem Gal. testatur libr. 5. metho. medend. quemadmodum omnino insanabiles sunt, qui ex succi vitiosi erosionem vlcus in pulmone habent, cum longo tempore omnino opus sit, vt succi corrigatur vitium. At quæ in thorace vlcera sunt, non omnino veluti iam dicta, curationi resistunt: etiam si diuturna fuerint, ut eodem quarto de loc. affect. liquet: etenim quæ ex pectore educuntur, triplex compendium præ ijs, quæ ex pulmone vacuantur, habent: nam & vasa ipsa multo sunt minora, & sanies in spatium

spatium interius effluit, & in summa magis carnosum est pectus, quam pulmo, vt patet eodem quinto method. medend. Cæterum vlcera, quæ in asperæ arteriæ interiore sunt tunica, & potissimum, quæ summæ eius parti, quam *ad-pyræ* vocant, sunt vicina, aut etiam in ipsa, hæc & curationem recipiunt, & nos non paucos (vt Galenus præcitato loco inquit) eorum, qui ita sunt afflicti, sanauimus, quorundam autem eorum historiam ibidem conscripsit, potissimū vbi interna eiusdem asperæ arteriæ tunica exulcerata fuerit: nanque ea sanatu est facilima, ac omnis, qui in ea ortus fuerit affectus, facile sedatur, nisi forte aliquando à putredine aliqua magna ipsius portio quædam corrola cartilagineum nudam penitus destituerit. Verum si ipsius cartilagine exulceratæ sint, aut insanabiles, aut sanatu difficillimæ erunt: nanque cartilaginum affectus (vt Galenus testis est, lib. septimo de vsu par.) omnino insanabiles sunt, aut sanatu quàm difficillimi. Qua de re priusquam malum ad cartilagineum persuaferit, asperæ arteriæ exulceratio, potius etiam vt sanetur, laborandum erit. In tabem vero incidunt, maximè iuvene, Hippocrate auctore aphorif. vigesimo nono tertij lib. in eam tamen potissimum (vt Galen. in commen. inquit) quæ ad sputum sanguinis consequitur: Illum verò non ob ætatis imbecilitatem, sed ob incontinentiam, seu intemperatum victum. Hoc idem confirmauit Hippocra. aphorif. 9. quinti libr. cum dixit, tabes fiunt præcipuè ætatibus à decimo octauo vsq; ad trigessimū quintum annum, & Celsus morbum hunc ætate firmissima maximè oriri censuit, id est, ab anno duodecimo ad annum quintum, & trigessimū. At qui tabe molestantur, si sputum quod extusiunt, grauè oleat iniectum carbonibus, & capilli à capite defluunt, lethale: quibuscunque etiam tabe laborantibus, capilli à capite defluunt: ijs alui profluuium superueniente moriuntur. Tabes item laboranti profluuium alui superueniens, lethale, vt aphorismo vndecimo. duodecimo, & quartodecimo, quinti libri patet. Verum idem Hippocrates de tabidis sic scriptum reliquit, aphorif. sexto decimo 7. libr. à puris sputo phthisis, & fluxus: cum verò sputum retinetur, moriuntur. modum siquidem ostendens in hisce verba, vt Galen. in commen. refert, illorum qui ex tabe moriuntur; eousque enim extenuati viuunt, donec per ea quæ expuunt, possunt pulmonem expugnare: cum verò intus manet, obseruantur quidem viæ spiritus, patientes vero strangulantur. Quod autem autumnus tabidis malus sit, aphorif. 10. tertij libr. patet: similiter quod nec per superiora, sed per inferiora medicandi sunt, propter instrumentorum, quæ respirationi obseruiunt, imbecilitatem, liquet aphorif. octa. quar. lib. Cæterum idem Hippoc. lib. secundo prædictionum, hæc de tabidis scripta reliquit. oportet enim eum, qui probè liberari volet, facile sputum, per tussim reijcere; & id est album, & æquale, & eiusdem coloris, ac ab inflammatione alienum: quod vero à capite defluit, ad nares conuerti febrem autem non inuadere, vt ne à coenis prohibeatur, neque sitiat: venter autem egerat quotidie; & id quod egerit sit durum: copia pro ratione ciborum ingestorum. Hominem vero quam minimè tenuem esse oportet. pectos autem laudare conuenit quadrangulum & hirsutum, & os ipsius paruum sit, & robustè carnosum, quinque enim hæc omnia habuerit, maximè superstes erit; qui vero nihil horum habet, interitui proximus est. Huic malo inter initia protinus occurrere necesse est, ex Celsi decreto: neque enim (vt ipse inquit) facile is morbus cum inueterauerit euincitur. Atqui nos cum de sputo sanguinis verba fecimus, cruentorum adhuc vulnerum, tum pulmonis, tum aliorum instrumentorum respirationi deseruientium, curandi modum instituiamus. Reliquum erit, vt reliquorum vlcera in eiusdem partibus ortorum curationem conscribamus, & si ea, quæ in pulmone hæserunt, vel difficiliora ad curandum sint, vel eorum curatio perfici omnino nequeat, propter

Cap. 5.
Cap. 8.

5. meth. cap. 12.

Cap. 7.

Non multo post
principium,

Curatio.

Vicus ratio.

Ga. 12, ante me.

cap. 6, post med.

cap. 6.

Lib. de maraf-
mo c. ult.De cib. boni &
mali succi. c. 4.

6. meth. c. 12.

7. meth. cap. 6.

3. de alim. facu.
c. 15.Lib. de cib. boni
& mali succi.

cap. 4.

pter iam dictas causas; ne tamen tanquam deplorati destituantur, quomodo hi tractandi erunt, ac reliqui, qui, in alijs partibus iam dictis ab ulcere oblæsi, sunt curandi, docebimus: id tamen prius commune facientes, quod & si non nullæ traditæ sint pulmonis, thoracis, seu asperæ arteriæ ulcerum causæ, de ipsis haudquaquam sermo faciendus erit, cum in præcedentibus singularum causarum curationem præscripserimus. Quare si qua earum adhuc permanse- rit, ex iam dictis curationem petas: modo autem de tabe duntaxat, quatenus ulcera pulmonis, thoracis, seu asperæ arteriæ consequitur, deque ipsis ulceri- bus agemus. Initio itaque aer eligendus ad liccum parum vergens; in calore vero, & frigore temperatus, quemadmodum Galeni tempore in Labiis habebatur; locus siquidem inter Surrentum, & Neapolim, mediocris altitudi- nis, velut ipse 5. method. medend. describit, & nos propriis oculis non semel duntaxat vidimus. Sol item & frigus propterea vitandi sunt: verum (vbi vires pariantur) opus est longa navigatione, cœli mutatione, sic ut densius, quàm id est, ex quo discedit æger, petatur, ideoque aptissime Alexandriam ex Italia itur, ut ait Celsus, potissimum vbi a destillatione tabidi fiant: somno indulgē- dum; nocturno tamen, ac moderato vtantur. Exercitia immodica vitent, aut modica exercitatione, seu ambulatione potius, præsertim vbi remiserit febris vtantur; vel lenibus frictionibus ante cibum. Alius lenis, licet conferat, non tamen immodicè cienda erit. Abstineant ab ira, tristitia, aliisque immodicis animi affectibus, tum a negotiis, omnibuque rebus, quæ sollicitare animum possunt, nec non a venere: cruditatēque omnino vitent. Cibi eorum sint sorbitiones ex ptisana, alica, amylo, vel oryza, lacte adiectio, ut inquit idem Celsus: vel parentur huiusmodi sorbitiones cum lacte amygdalarum, gallina- rum; seu pullorum iure; caponum, perdicum, seu phasianorum: aut simul cum pedibus vitulorum, hædorum, aut castratorum decoquantur: Exhibeantur item prædictæ carnes contrusæ, aut earum succus, quem consumatum ius ap- pellant: adiecta ptisana, aut eius cremore exiguo. Aetius vero amygdalas amaras cum ptisana decoquere bonum esse dixit. Conferunt item cancri flu- uiatiles, crudi, triti, cum lacte potati, aut cocti in cibo sumpti, assidue iure eo- rum insuper absorpto, ut idem inquit Aetius: hædi quoque lactantis, capreo- lorum, seu vitulorum carnes interdum gustare poterunt: turdorum quoque, ac aliarum paruarum auium. Verum licet, qui ita se habent, non paucos indi- geant nutrimento: quoniam vero tum inualidæ partes ad attrahendum sunt, tum etiam ad concoquendum, ut nequeant propterea, quod mediocre est, concoquere: ea de re paulatim hos, & sæpius cibare oportet, ita ut semel, aut bis eos cibasse satis non sit; qua de re ter eos cibare conuenit, quemadmodum in refectoria vocata victus ratione, quoad gracillima corpora sint, obseruari iussit Galenus 7. method. meden. Sitque alimentum in vniuersum quod sine negotio & trahatur, ac promptius alendis partibus assimiletur: nam non aliud est, quod nutrimentum desiderat, & aliud quod ipsum conficit; sed quod nutri- endum est, ipsum sibi & nutrimentum attrahit, & mutat, & cōcoquit, & adiun- git, & assimilat, ut eodem 7. metho. medend. liquet. Cuius rei gratia non ab re nihil lacte præstantius esse videtur, quemadmodum Galenus libro de ma- rasmo, de cibis boni, & mali succi, & 5. & 7. metho. medend. & sexcentis alijs in locis scriptum reliquit: & ante ipsum Hippocrates aphorif. 64. §. lib. & post eum vno ore medici omnes: eo quod omnium fere, quæ mandimus, lac opti- mum, optimi est succi, ac multi alimēti, ut 3. de alimen. facul. patet, ac medico- rum omnium auctoritate lib. de cib. boni, & mali succi confirmavit Galenus, promptēque concoquitur, ac distribuitur. Erit autem optimum, vbi nullam externam qualitatem, odore, gustuue præferat, sed esto quàm dulcissimum, & sibi ipsi continuum; & prout lacti conuenit, splēdes: super omnia quoad eius fieri

feri potest, similes habeto partes. Quo vero tale fiat lac ea seruanda sunt, quæ Gal. docuit 7. meth. med. idem quoque optimum lac, nedum, ut alimentum, verum etiam ut medicamentum summopere conducit: nanque thoracis ac pulmonis partibus lac omne est vtile: nec non & ijs, qui quauis ex causa tabe laborant, aut vlcus habent in pulmone, vt 3. de aliment. facult. apud Gal. legitur: detergit etenim, ac vlcera repurgat serosa eius substantia, & consolidat caseosa, febrique aduersatur. Qua propter nonnulli (vt idem auctor testatur lib. de cib. boni, & mali succi) pulmonis vlceribus affectos potionem tantum lactis curari putant: antea scilicet, quam ea ipsa vlcera amplientur, callosaque fiant: sed præ cæteris lac muliebre, tanquam naturæ eiusdem, nobisq; cognatum, ac accomodatum ab alijs medicis præcipueque ab Herodoto, Eryphone, & Prodicto celebratur. Vbera quidem more infantium, illorum iudicio ab ita affectis sugenda sunt: quemadmodum eodem lib. de cib. boni. & mali succi, 7. met. med. & lib. de marasmo scriptum reliquit Gale. verum cum hoc plurimis non placeat, melius est calens adhuc ex mamillis id in ægri ventriculum quam ocysimè transferri, propterea quod celerrimè mutari sit aptum: & proinde astante animali statim mulctū ipsum bibant oportet. Quod si muliebre lac sibi exhiberi recusent, asininum ipsis dare conueniet: id enim reliquis omnibus vtilius est, quippe cum tenuissimum sit, ac serosum valde, & minimè coaguletur, & quoquo uersus ocysimè in corpus digeritur: quod, etiam si nō ad sit, (licet omnium conuenientissimum phthisicis sit) bubulum aut caprillum exhibendum erit, Aetio auctore: nam caprinum inter cætera lactis genera moderatè se habet; cum non admodum pingue, crassum ve sit, ob idque medium quoque esse censetur, quod in corporibus nostris præstat. igitur lac ipsum per se est his dandum, tum etiam mellis tepidi pauxillum immiscendum, si cui cogi in ventriculo solet, aut sacchari, seu rosacei mellis, prout ego vtor, potissimum vbi caprinum sit lac: nam id sine melle suptum periculosum est, vt constat præcitato lib. de cib. boni, & mali succi. Quantitas vero eius, quod assumitur, moderata sit, ita vt nō excedat, potissimum circa initia vnc. iij. vel. iijj. procedente veto tempore (si opus fuerit) quantitatem adaugeas, inspecta tamen natura, ætate, ac ægrotantis consuetudine, si lacte delectatur. Post cuius assumptionem & quiescant ægri, nec dormiant, aut aliū cibum, potissimum vinum sumant, ne ipsum in ventriculo corrumpatur, aut ad caput vaporet: cauendus tamen lactis vsus erit, vbi valida tabidi febre corripuntur; Cum eis duntaxat dare conueniat, qui non valde multum febricitant, ex Hipp. sententia apho. 64. 5. lib. quo casu ptisana, eiusque cremore vtare, modo prius dicto paratis. Inter fructus conducunt vix passæ, ficus, nuces, pineæ, & amygdala, ac palmulæ. Eorum vero potus sit aqua cœlestis, vt inquit Paulus; aut mulsæ inde confectæ: ipsam quoque aquam mulsam per se, & cum amylo, aut iride, & radice dulci in ea decoctis commendat Aetius. Vice cuius aqua hordei ex hordeo non decorticato, ac tosto, sola, aut glycyrrhizæ radice etiam decocta vti poterunt: poterisque in ea caneros quoque fluuiales decoquere, aut saltem eos cum ptisana decoctos, aut lacte (vt diximus) tribuas. Vino quoque interdum pro potu vtantur leni, & austero, vt Celso uisum est, mediocri tamen valde mensura, vt ait Aetius, vbi præsertim vires indicabunt, & febris remissa fuerit. At cum mel calidis marasmissis, ac hecticæ febri aduersissimum, sit vt lib. de marasmo, & 10. metho. medend. liquet, quippe cum protinus vertatur in bilem, & ficciores, acrioresque caloris febres reddat: non ab re hæsitabit quispiam in Aetium, & Paulum, propter quod tabidis aquam mulsam bibendam admittant? Atqui dices non absolutum mel, id quod auersatur Galenus eosdem admittere, sed aquam mulsam, in qua mellis caliditas permixtione aquæ obtunditur, præsertim

R ubi

Cap. 6.

Cap. 15. & 16

Cap. 4.

Lib. de cib. boni
succo cap. 4.
7. meth. cap. 6.
Lib. de marasmo
cap. vlt.

Dubium,
Lib. de marasmo
cap. 9.
10. metho. c. 11.
Responsio prima.
Impugnatio.

Responſo vera.

vbi dilutior fiat. Verum niſi Galenus, eodem 10. method. meden. nedum mel, ſed etiam aquam muſſam in heſticis febribus vitaffet, ex iam dictis forte liberari à calumnia poſſent Aetius, & Paulus: ſed cum ab ea etiam quo ad fieri poſſit abſtinendum eſſe iuſſerit, nullius momenti nuper data reſponſio eſſe videtur, ſed aliter, & rectius dicendum erit. Quod heſticæ febrī, ſeu maraſmo exurenti duntaxat aduerſiſſima eſt aqua muſſa potiſſimū quæ non admodum diluta eſt propter traditas à Galeno cauſas; quo caſu neque eam prædicti auctores tribuerent: verum tabidis ipſam commendarunt, vtpote quibus præcipuus morbus vlcus eſt, licet, & febris heſtica, & marcor ipſum ſequantur. Mel autem non modo quia detergendivim habet vlceri non nocebit, verum digeſtionis aliorum medicamentorum in corpus inſtrumentum erit, ac celeris tranſitus, veluti vehiculum: qua de re omnibus medicamentis, quæ thoracis, & pulmonis vlceribus ſunt deſtinata, ipſum admiſcendum eſſe præcepit Galenus quarto method. meden. Maius itaque ex uſu aquæ muſſæ commodum conſequitur ipſis tabidis ex abſterſione, (cum princeps eorum morbus vlcus ſit) quàm in commodum; propterea quod marcori, & heſticæ febrī, qui ſecundarij eorum affectus ſunt, vt pote vlcus ipſum conſequentes, aduerſetur, præſertim vbi dilutior fuerit, vt diximus.

Cap. 7.

Et quoniam Paulus tanquam optimum auxilium boli armenię potionem cōmendauit, propterea ipſa cum eadem aqua muſſa exhibita conducet, aut inſperſum in ptifana, ſeu eius cremore, quantitate ſcrup. i. aut 3. s. pro qualibet vice. Aetius vero eiſdem boli armonię 3. i. ex vino tenui albo tanquam efficaciſſimum medicamentum commendat: Nec minus conſert ſaccharum roſaceum ſæpius exhibitum per ſe, aut cum ptifanæ cremore: interdum etiam & herbam ſanguinalem ex aceto, vel plantaginem eſſe, vtile eſt, vt apud Celſum legitur: item plantaginis ſuccus per ſe, vel marrubium ex melle coctum: ita vt illius cyathus ſorbeatur, huius cochleare plenum paulatim delingatur: vel inter ſe mixta, & cocta reſinæ terebinthinę pars dimidia, butyri, & mellis pars altera, ab eodem auctore commendatur. Et vt ſummatim dicam, medicari pulmonis vlceribus oportet (vt Aetius refert) eo apparatus, quo facile ſurſum efferantur humores, cura ſimul adhibita, ne alij congregentur: excogitata autem à medicis proinde ſunt, vbi expurgandum ex pectore, & pulmone puſ eſt, fortiſſima, vt inquit Galenus 5. meth. med. (quæque maximè diſſecant) pharmaca: in quem uſum, ſummopere conducit, præter iam dicta aqua muſſa per ſe, & cum amylo, aut iride, & radice dulci in ea decoctis, vel hyſſopo, ſeu marrubio, aut roſtum hordeum non decorticatum, ſi in ea coquatur. ſimiliter ſyrupus è glycyrrhiza, ex adianto, de hyſſopo, aut marrubio, quibus mellis roſacei pauillum miſcere poteris, interim & myrtinum ſyrupum: & (ſi febris obſtituerit) aquam hordei prædictis ſyrupis permiſceas. Poterit inſuper & tale parari medicamentum inſtar ecligmatis, de quo paulatim delingatur modo, quo docuimus cap. de ſpu. ſang. cum tuſſi id autem excipit ecligmatis è pulmone vulpis, & è pino, amborum 3. i. ſyrupi myrtini, de hyſſopo, mellis roſacei, ac ſyrupi è glycyrrhiza ana vnc. j. s. boli armenię, terræ leminæ, & lapidis hæmatitis ana ſcrup. j. radicis ſymphyti 3. ij. diatragacantæ 3. iij. miſceantur, & formetur ecligma: & vbi medicamentum è pulmone vulpis haberi non poterit, tantundem eiſdem pulmonis vulpis arte præparati, adicijas aut ex adianto, glycyrrhiza, & eodem pulmone vulpis, ſemine fœniculi, amylo, ac tragacantho puluis paretur, de quo quotidie 3. i. cum ſaccharo roſaceo aut ſyrupo ex adianto, ſeu marrubio, ptifana, vel aqua muſſa, tribuatur. Quod ſi vnc. ij. carniū gallinarum, vel caponum aſſumas, amyli, & tragacanthę, ſingulorum ſcrup. i. diapedon, vel confectionis regum ſine ſpeciebus 3. ii. margaritarum 3. i. ſemina

cap. 11.

am

num melonum 3. iiii. & cum saccaro diluto in aqua rosarum morsulos formare iusseris, non parum adiumenti afferes, præsertim si cum præsana, aut aqua mulsa quotidie, mane, vnum, vel duos ipsorum dabis. Pro vlceris autem exsiccatione, quæ quidem eorum communis finis est, valida non existente fere, proderit tabidis per interualla exhibita Mithridatis antidotus, aut Theriaca, Aetius, & Pauli decreto: nec non Ambrosia, & Athanasia, quibus omnibus pro forti pulmonis exsiccatione, vsus fuit Galenus, vbi patet 4 de loc. aff. qua via tabidi id saltem lucrifaciunt, vt vlcus nec vltra progrediatur, nec maius fiat, sed siccatum, ac ceu callo duratum longiori vita frui eos sinat, si omnia præsidia fuerint rite administrata, vt ea de cruenta spuitione dictum est. Extrinsecus vero per initia, vbi conquieuerit malum, cataplasmata applicentur, ex althææ folijs tritis, semine lini, ac tenuissimo polline, quæ cum decoctione fœni græci, & althææ, vel maluæ, oleo, ac melle admisceantur, ex Pauli, & Aetij sententia. Deinde post temporis intercapedinem (vt ipsimet inquirunt) ad cærata transeundum, ex butyro, oleo laurino, ac cera apparatus: at tempore repurgationis pithemate vtendum est, vt ait Aetius, ex terebinthina, & oleo cyprino, butyro, & medulla ceruina, adipe taurino, iridisque farina, & æsypo, equalibus omnibus partibus cômistis, loco autem cyprini olei, irinum, laurinum, aut rutaceum assumas. Tempore autem quo cicatrix obducitur, oleum myrtinum, aut rosaceum, extrinsecus thoraci inungendum, interim adiectis alumine, acatia, malicorio, hypocistide, galla, & rhoe obsoniorum: addendo etiam (vbi opus fuerit) ammoniacum viscum quercinum, picem, ac ceram, apijque semen, ex eiusdem Aetij sententia. Quod si tussis molesta grauius affligat, thymus tritus, & hyssopum cum succo radicis dulcis, ac melle cocto excepta, formataque sub lingua tenenda dentur vt iidem auctores sentiunt. Verum tum medicamentum hoc, tum & quod vis aliud humidum, quod ad eiusmodi curanda vlcera faceret, egro spino cubanti exhiberi debent, iubentes id in ore continere, paulatimque permittere in asperam arteriam defluere ex Galeni decreto (vt diximus) 4. & 5. method. medend. Qua ratione nedum pulmonis vlcera, sed & thoracis, asperæ arteriæ, ac gutturis curari debent: influit enim sic sensim, & paulatim de medicamento aliquid sensibilibiter, & manifeste in ipsam asperam arteriam, & per eam ad pulmonem, ac pectus. Cauterium vero nec ex his, quæ actu, neque ex his, quæ potentia inurendi vim habent, talidorum capiti vllum adhiberi debet, pro tabis curatione, nisi malum a fluxu acrium humorum ex capite factum sit, ac fiat, aut nõ dum tabidi sint, sed morbo tabifico oportuni, ut pote quibus caput facile impletur, ac ipsum spiritus organis multas destillationes dimittat: hi nanque ex cauterio capiti adhibito præsertim qua parte sagittalis sutura coronali committitur, aut occipitio inter primam, & secundam vertebam, quo loco tutius fiet, non exiguum commodum suscipiunt: quemadmodum Gal. docuit 5 meth. mede. in eisdem obseruari: licet nec de his, quæ igne sunt cauteriis, nec de determinata capitis parte loquatur. Reliquis vero maximum affert incommodum, cum altera causa sit extenuationis eorum, nec quicquam eis auxilietur, ex quacunque alia causa tabidi facti fuerint: & proinde cum neque unus reperiatur auctor artis medicæ, qui ipsum commendaret, abstinendū propterea ab eo erit.

Curatio tabidorum cum exicantibus.

Cap. 3. post medium.

Topies.

4 meth. cap. 7.
5. meth. cap. 12.

Cauterium.

Cap. 14.

αίρινα μὲ καρδίας.

De palpitatione. Cap. 54.

EVeniunt quoque non raro & ipsi cordi (quod velut innati caloris fons est) siue ipso primarie affecto, siue ceteris quibusdam partibus consentiente, affectus præter naturam quidam non pauci, inter quos is existit, quia Græcis *παλμὸς καρδίας*, latine cordis palpitatio dicitur a sym-

R 2 ptomate.

2. de Hippo. &
Plat. decret. ca. 8.

Palpitatio quid
sit.

2. de caus. symp.
c. 2. post med.
Lib. de palpit.
cap. 5.

Quarum partium
sit affectio, pal-
pitatio.

2. de caus. symp.
cap. 2.
Lib. de palpit.
cap. 5.

Palpitationis
cuiusque causa
immediata.
cap. citato.

ptomate, & parte affecta simul nomen assumens; Quamvis interim quidam non cordis palpitationem, sed tremorem appellant; licet perperam, ut dicemus: quidam alij recentiores medici cardiacam, sed temerè nuncupant: cum tam καρδιακή, quam καρδιαγγεϊκή quam etiam καρδιασμός non ipsius visceris, quod in thorace continetur, cordis (inquam) affectiones sint, sed ipsius oris ventriculi, quod mos erat Græcis, veluti & iam dictum viscus καρδια, hoc est cor appellare, ut 2. de Hippo. & Plat. decretis, aph. 17 & 65. 4. lib. notavit Galen. ac nonnullis alijs in locis. Verum de his paulo post, cum de ventriculi vitiis loquemur, verba faciemus. Nunc autem satis sit monstrasse, haud rectè recentiores medicos cordis palpitationem cardiacam nominare: cum cordis palpitatio, ipsius principis visceris quod in media thoracis sede collocatum est, affectio sit; cardica vero non huius visceris affectus est, sed oris ventriculi, ut insequentibus patebit. Ut verò pateat, quid sit cordis palpitatio, ac quomodo cordis tremor appellari haudquaquam, possit differendum primo erit, quid sit palpitatio, & secundo quibus discriminentur à tremore. Quod palpitatio dilatatio quædam præter naturam in particula sit, significavit Gal. 2. de caus. symp. quod verum eadem partium eleuatio quædam præter naturam sit, atque depressio idem Galenus docuit lib. de palpit. trem. rig. & conuuls. quo fit, ut omnibus corporibus, quæ dilatari possunt, affectio hæc incidat: sūt porrò ea omnia, quæ naturaliter sunt mollia, ita ut tum dilatationem sui tollerare, tum rursus in se fidere possint: & propterea in cute sæpe incidit: nonnunquam in subiectis musculis, nō in postremis autē ventriculo, vesica, vtero, intestinis, iocinore, liene, septo transuerso, corde, ac arterijs: & proinde affectio hæc neque voluntariæ virtutis propria est, nec instrumentorum ad hanc spectantium, sed in differenter cunctarum partium, quæ distendi, dilatariq; possunt: quæ etiam ratione fit, ut neque os, neque membrana, cartilago-ve unquam palpitent; neque neruus, quod cauo vacent, & propterea dilatari non possunt, ut, eodem lib. 2. de caus. sympt. & lib. de palpit. trem. rig. & c. Galenus decretum reliquit. Verum cum partes ipsas, quæ palpitant, ex se ipsis non dilatari liqueat, quia neque vis aliqua naturalis eis inest, quæ id efficiat: nam semper ijs inesset, & cum sanæ essent præcipuè, modo autem cū neq; semper, neque bene habentibus inest; constat talem dilatationem, seu distensionem, eleuationem, ac depressionem, in palpitatione præter naturam esse, vtrium, & non fabrorum folium ritu: impletæ nanque partes dilatantur, & non cum dilatantur sese implent, veluti arteriæ. Est itaque motus hic palpitationis non sponte factus elatis palpitantium, atque delatis partibus: verum quæ in palpitationibus membris eleuationes corporum cernuntur, & depressus, ab implentibus quasi extensiones sunt, & elationes: è contrario inanitorum sunt depressiones. Quapropter dilatationes tales, cum præter naturam sint, opus est (ut Galenus inquit præcitato libr. 2. de caus. sympto.) ab aliqua, quæ in ipsas influat substantia fiant, & hanc vnam è duabus esse credibile est, vel succum quempiam, vel aeream aliquam naturam. At quo minus succus sit, repugnat palpitationis tum motus, tum solutionis celeritas, ut quæ illico fiat, & statim desinat. Succus autem nullus, aut ita celeriter influit, aut refluit: itaque necesse est, causam vnde palpitatio exoritur, aeream esse substantiam: verum si hæc tum exigua, tum subtilium esset partium, facile per corpus transflueret. Non alienum igitur à ratione est substantiam quandam crassarum partium halituosamque esse tum quantitate, relatione ad locum in quo consistit, semper satis magnam: dilatatur ergo, ut verisimile est, attolliturque, ac inflat partem, quoad trusa, & compulsa ad sui generis perspiret substantiam: & si corpus cavitatem habuerit, hanc implet, & quæ completa est, extollit, ac distendit: si autem non,

non, inter corpora duo congesta, sibi ventrem acquisiticiū molitur, & vnum ab altero distans reddit. Quapropter rationabiliter ijs, quibus perfrigerata est aliqua particula, palpitationes accidunt, vt apud eundem Gale. legitur eodem libr. secundo. de caus. sympt. quippe quod ab ea sub naturali ipsius statu attenuatum, omninoque per naturalem animalis calorem concoctum effinxit, id nunc vbi eadem propter frigus reddita est imbecilla, & halituosius, & crassarum partium efficitur: ita vt neque facile sicut prius perspirat: interim angustia quoque viuarum accedente quoniam autem nebulosus spiritus, & ater, flatuosus ve, vt diximus est palpitationis causa, iccirco totus motus præter naturam est, à causa præter naturali duntaxat ortus, vt eodem libr. secundo de caus. sympt. liquet. Et propter iam dictas causas generationis eius, frigidiores ætates natura corporis frigidior, regio frigida, tempus anni frigidum, otiosa vita, satietas, & temulentia, cibi frigidi, atque flatuosi: & ad summum quotquot corpora infrigidant palpitationes facile generant. Horum autem contraria illas ilico extinguunt: quæ enim calfaciunt, spiritus tenuant, corpora transpirabilia, laxaque efficiunt: desant è contrario frigida, cogunt, & corporum meatus arctiores reddunt, spiritus crassiores, & glutinosos, atque atros faciunt, vt facile propria crassitie & ambientium corporum angustia transitu carentes detineantur. Palpitationum itaque ortus ex frigore est: & proinde veteres medici remedia palpitationibus, quæ calfacere, & tenuare possint, repperunt, quemadmodum ab eodem Gal. scriptum est libr. de palpit. trem. rig. & conuuls. Is vero affectus, qui à Græcis τρεμος à Latinis tremor dicitur, inuoluntarius sursum, & deorsum motus est, motarum partium ab inuicem, vt patet apud Gal. præcitato loco: quo fit, vt a palpitatione discrepet, quoniam non idem est sursum ferri, & eleuari, neque deorsum ferri, & deprimi. Nam quæ sursum ferunt, & deorsum, cum alio priorem locum mutant, vt in tremore videre licet: eleuata autem, & depræssa seruan in antiquam sedem (vt in palpitationibus inspicitur) ambientis nunc aliquid assumunt, nunc deperdunt: moueri itaque non sponte, sed inuoluntarie, & præter naturam vtriusque commune. Verum palpitationibus proprium est, maiorem, & minorem locum, non relicto primo occupare; tremoribus autem adeo loca commutare, ne in eadem sede maneant: qui licet præter naturam motus sit, non tamen totus ex causa præternaturali fit, sicuti in palpitatione, & conuulsione, sed mixtus quodammodo est ex causa, quæ præter naturam sit, & animalis virtute: etenim tremit, qui non decreuerit mouere membra, nemo ex Galen. decreto libr. de palp. trem. rig. & c. est itaque tremoris motus compositus, qualis est arteriarum pulsus, & præsertim formicantis pulsus non ab similibus. Nam tanquam in hoc pulsu arteriæ motus in minima spatij intercapedine agitur, sic in tremore animalis particula, quecunque ab imbecilla virtute mouetur: vicissitudo autem motus non ab vna perficitur natura, sicut in arterijs, sed ex pugna virtutis, & ponderis corporis: & si non omnino huius symptomatis generatio cum conatu sit mouendi, est tamen cum virtutis infirmitate. Quare inuicem vincente, victaque potentia, mutuoque semper contrarijs succedentibus motibus tremor efficitur: licebitque liquido cerni eorum pugnam, nec virtute membrum decidere sinente, veluti in paralyti, nec pondere permittente virtutem id sublatum seruare, ita vt cum valens erat, sed ineunte motione vna, alteram huic aduersam, quasi adiunctam dici etiam reperiatis, vt quæ sursum versus latius fit, quæ ad inferius excipiat, ab ea subinde præpedita, imperfecta semper vtrunque remanente: quo sæpius affecto, & sursum versus delationem, ea quæ fit deorsum insequente, & huic quæ sursum versus fiat, iterum adiuncta, vt diximus, partibus locum continue mutantibus, motus duplex fit, & compositus, quæ affectio tremor

Citato loco.

Quis motus præter naturam sit palpitatione.
Cap. citato.
Reliquæ remotione palpitationis causæ.

Cap. 5.
Tremor quid sit.
tremoris & palpitationis conuenientia, & differentia.

Quis motus præter naturam sit tremor.
Cap. 4. in prin.

Modus generationis tremoris.

Cuius facultatis
fit affectus tre-
mor.

Lib. de palpitatione.
cap. 4.

3. de morbo. vulg.
commentario 1.
commento 2.

Lib. de palpitatione.
cap. 5.

2. de caus. sym-
cap. 2.

3. de morbo. vulg.
commentario 1.
com. 2. & 4.

Quibus differat
palpitatio a tre-
more, concludi-
tur.

Error eorum qui
non nouerunt
prædicta.

2. de caus. sym-
cap. 3.

Lib. de palpitatione.
c. 3. & 5.

4. de usu part. c.
13.

5. de usu part. ca.
18.

14. de usu part. c.
17.

cap. 8.

Quid sit cordis
palpitatio.

Quo differat
cordis palpitatio
a pulsu.

cap. 9.

nuncupatur, motu deorsum grauitate facto, & viribus sursum versus itidem mouentibus. Ex quibus clara luce patet, quàm dissimilis sit affectio hæc à palpitatione, ac quo pacto prædicta symptomata ab inuicem differant: neque insuper idem, qui afficitur locus in tremoribus, ac palpitantibus existit: nam tremor inualide virtutis actio est: & propterea mouentis virtutis affectus, & non instrumentorum, vt patet eodem lib. de palpitatione. trem. rig. & c. & 3. de morbo. vulg. impediri nanque solent operationes non ab instrumentis solis, sed à viribus. In ipsa verò palpitatione facultas haudquaquam læditur, sed instrumenta, seu partes ipsæ, quęcunque præter naturam dilatari possunt, vt prius dictum est: & propterea partibus alioquin penitus immotis accidit Tremor vero semper inualidi, atque impotentis, est symptoma, cum imbecillitas sit virtutis motiue corporis, neque vna causæ species, quæ tremores efficiat, reperitur, veluti palpitationum; quarum ortus ex frigore semper est, ac nebuloso, crasso, uaporeoque spiritu, vt paulo ante demonstrauimus. Neque remediorum vnum genus tremoribus: vt palpitationibus existit. quemadmodum eodem lib. de palpitatione. trem. & rig. scriptum reliquit Gal. quo item loco, ac lib. 2. de caus. sympt. & 3. de morbo. vulg. diuersas tremoris causas conscriptas discere poteris. Differt itaque palpitatio à tremore ex Gal. sententia; tum quia non idem affectus præter naturam est vterque, neque accidentiam eadem; nec qui afficitur locus idem existit, neque causa etiam, si quæ diximus diligenter atendas. Errarunt propterea toto (vt inquit) cœlo, qui cordis palpitationem cum tremore confuderunt, cum neque in vno palpitatio cum tremore conueniat, vt ex superius relatis liquet. Accedit ad hæc, quod & si quodammodo conuenire possent, adhuc falso assererent tremorem posse in corde excitari cum affectio hæc perpetuo consequatur facultatis motricis voluntariæ imbecillitatem: nec tremor fieri potest nullum aggredienti motum voluntarium: agit etenim in tremoribus voluntas semper, ab eisque inseparabilis, est quemadmodum à Gal. scriptum est, cum lib. 2. de caus. sympt. tum lib. de palpitatione. trem. rig. & conuul. in corde vero talis facultas haudquaquam reperitur: neque enim, nervi ad ipsum pertingunt, vt delatores prædictæ facultatis, sed quodammodo sensus duntaxat (vt pote vt dignosceret ea, quæ sibi laborem afferent) quemadmodum natura etiam distribuit hepati, lieni, ac renibus: nam eadem omnino insertionis horum neruorum est ratio, quemadmodum 4. 5. 6. & 14. de usu part. liquet, ne scilicet sensu omni carerent, ne ve plantę penitus essent. Quapropter neque ad ipsum proprie, veluti ad sensus instrumenta nervi perueniunt, nec etiam velut ad motus voluntarii instrumenta. nam quamuis cor caro sit dura, & ægre patibilis, ex fibris multiplicibus conflata; & propterea quodammodo musculis videri possit perfimile discrepat tamen ab ipsis perspicuè, non vna duntaxat ratione, ut ab eodem Gal. scriptum est præcitato lib. 6. de usu part. & exinde etiam factum est, vt quod actionis animalis instrumentum non esset, nullam actionem animalem habens, sed naturalem, vt paucissimis etiam ei opus fuerit nervis tremere itaque cor propter iam dictas causas haudquaquam, potest; licet sæpenumero palpitare compertum sit. Verum affectionem hæc neutiquam tremorem appellare poteris, sed palpitationem, quæ nihil aliud est, quam ipsius cordis eleuatio quædam præter naturam, atque depressio, vel ipsiusmet cordis dilatatio quædam præter naturam: neque enim ex se ipso cor in palpitationibus dilatatur, velut in pulsu, licet motiui, quæ ex palpitatione fit, ex corde etiam fiat, non tamen secundum naturam; & propterea motus cordis qui in pulsibus fit est operatio, qui vero in palpitationibus, est affectio, vt à Galen. decretum est lib. 6. de Hippo. & Plat. decret. verum affectio appellatur in 2. significato, secundum quod affectionem intelligebat motum contra

trā naturam, oppositum ei, qui secundum naturam erat, atque operatio dicebatur. est namque symptomata in genere deprauati motus toto genere, præter naturam, ita vt totus motus præter naturam sit. Paucus simul, tardusque & rarus, Gal. teste 2. de caus. sympt. Dignoscitur autem facile cordis palpitatio ex ægri relatione: namque cor ipsum præter pulsū palpitare sentiūt, tāquam diuersam existentem motionem à pulsu, quem proprium cordis motum appellamus: insuper & medici ipsi manu adhibita cum supra thoracem, loco quo cor ipsum situm est, tum tangendo arterias ipsas, sentient liquido in vtrifque locis hunc palpitationis motum longè diuersū ab eo qui secundum naturam est, ac pulsus appellatur: eritque spiratio eorum exigua, & rara, nec minus & vniuersas ferè ipsius pulsus inæqualitatis differentias, ex eo quod cor ipsum affectum sit percipient: atque id commune signum, tum partis affectæ, hoc est ipsius cordis tum affectus erit. At quoniam palpitationum ortus ex frigore est, vt diximus, non ab re intemperiem frigidam ipsius cordis palpitacionem sectari, fatendum erit: & quoniam si cavitatem habet pars, quæ palpitacione afficitur, extollitur ea, ac distenditur à causa faciente eam; si autem non, inter duo corpora congesta ventrem acquisitionum sibi molitur, vnumque ab altero distantem reddit, vt patet lib. de palp. trem. rig. & conuuls. propterea ad vnitatis quodammodo solutionem etiam cōsequi palpitacionem asserere non erit absolum. Cuius affectionis causa in vniuersum vnicam esse, asseritur à Galeno tum præcitato loco, tum etiam 2. de caus. sympt. Ea autem est crassus, nebulosus aer, flatuosus ve spiritus vel quomodocunque aliter ipsum appelles: & iccirco (vt ipse asserit) frigidiores corporis naturæ, ætates, regiones, anni tempora, ociosa vita, satietas; & temulentia, cibi frigidi, ac flatuosi, & quotquot corpora infrigidant, à palpitacionibus facile præhenduntur, & horum contraria illas illico extinguunt. Verum hæc affectio (vt idem Galen. inquit l. 5. de loc. affe.) aut per se euenit ipsi cordi, aut cum suspitione quadam quod in humore cor ipsum moueatur: neque enim mirum videri debet tantam humoris multitudinem cumulari aliquando in abiente cor tunica, περιάρθια dicta, vt ipsum, ne attollatur, impediri possit. Ex aliquo item tumore præter naturam in eadem ambiente cor tunica, duro siquidem, aut humorem in se continente, qualem postulat, quas Græci hidatidas vocant, emittere solent, oriri poterit cordis palpitatio; que admodum experientia comprobauit in gallo, ac simia, quæ emaciari in dies videbatur, Galenus. Pluribus etiam integra valetudine degentibus, tum adolescentibus, tum adultis subito, sine alio manifesto symptomate, palpitatio visceris huius euenire visa est: cunctis tamen siue per se, corde ipso affecto, siue per consensum à frigidis causis provenire putandum est; cum ex frigore palpitacionum sit ortus, vt diximus ex eiusdem Galen. sententia; calfacientibusque, ac tenuantibus remediis curentur, prout veteres medici in nuerūt; ac attenuante victu, vt dicemus. quo fit, vt nedum Arabes, verum & iuniores medici quidam, etiam qui Galeni doctrinam profitentur, longè ab eius sententia aberrant, dum asserunt, ex calida cordis intemperie eius palpitacionem oriri posse; quod omnino eiusdem Galeni doctrinæ pugnare videtur, quemadmodum clara luce patet in præcitat. locis, lib. videlicet 2. de caus. sympt. & lib. de palp. trem. rig. & c. Nec minus temere audent frigidis medicamentis cordis palpitacionem curare, cum perpetuo calidis (vt dicemus) curanda sit: quod si pro eorundem opinionis confirmatione putent esse Galen. verba in commento aph. 65. 4. lib. quo loco asserere videtur ex maximo incendio vitalis facultatis quæ in corde consistit, palpitacionem oriri posse, non minus quàm in prædictis cœcutiunt. Nam ibi Galenus ponderans verbum περιάρθια ab Hipp. in apho. positum. dicebat ipsum bifariam intelligi posse, vno modo, ut idem significet quod περιάρθια

Quis præter naturam affectus sit palpitatio. Signa.

Cap. 2.

Quem cordis morbum sectetur.

Cap. 5.

causa.
Lib. de palp. Cap. 5.
2. de caus. sympt. cap. 21

Cap. 2.

Vide Aui. li. 7. fœn. 11. tract. 2. cap. 1. Rhazē in 9. ad Mansorem ca. proprio & alios Arabes Arabum. & iuniorum Galenicorum error notatur. 2. de caus. sympt. cap. 2. Lib. de palp. cap. 5.

secundo modo, ut nonnullis visum est, motum quendam cordis, palpitationi similem per καρδιασμόν intelligentes, hoc est crebrum, & velocem cordis motum, & præcipuè similem palpitationi. Hic nanque affectus extremum malum portendit, vim scilicet vitalem, ut Gale. inquit maximo incendio laborare significans oriri itaque potest, ut ex Gal. verbis liquet affectus καρδιασμός dictus, ex immodico cordis incendio, in quo crebro, & velociter ipsum cor moveri necesse est, attamen nequaquam mutus hic palpitatione recte nuncupabitur, licet ei similis existat: etenim à facultate ipsa motio huiusmodi fieri, licet fuerit immodica, irritata facultas ipsa, & non omnino à causa præternaturali, crasso videlicet, ac nebulofo spiritu, ut palpitatione. Verum forte dicent saltem ex Pauli sententia, illud verum esse, quod scilicet ex calida cordis intemperie palpitatione excitari possit. nam cap. 34. lib. 3. dicebat, itidem valentes cordis palpitationes sæpe ex sanguinis in eo concepti copia, aut feruore contrahuntur. At qui dicimus nos de forti cordis palpitatione Paulum verba facere, per quam non aliud intelligere voluisse putandum est, quàm crebrum & velocem cordis motum; similem palpitationi existentem, quemadmodum per καρδιασμόν Gale. intellexit, & non de vera palpitatione; quæ est partium præter naturam quædam dilatatio: nam hæc cum non nisi à flatuoso spiritu oriri possit, ut Gale. inquit, à cordis feruore haudquaquam gigni potest, ut luce clarius patet ex his, quæ diximus. Quantum vero ad eius prognosticum attinet, non negligenda circa initia eius curatio erit: nam si augeatur aut diutius perdurauerit, ad syncopem permutabitur, & demum ad mortem, eamque repentinam, ob consequentem virtutis videlicet vitalis imbecillitatem; veluti ille cuius meminit Gale. aph. 41. 2. lib. cui dum exolueretur, cor fortiter palpitabat, derepente mortuus est, non aliter quam illi, qui acutissimis cordis affectibus, quos syncopas vocant, arrepti subito intereunt. Quinto autem lib. de loc. affect. asseruit Gale. cordis palpitationem, licet tum adolescentibus, tum adultis euenire ea possit, magna tamen ex parte ijs accidit, qui ætatem agunt quinquaginta quidem annis inferiorem, sed quæ quadraginta annos excedat. Cæterum quamuis nonnulli ab hoc symptomate planè liberati sint per venæ sectionem, victumque extenuantem, ac medicamenta similia, ut ipse inquit, nihilominus omnes ante senectutem morte præuenti sunt. Verum alij quidem per acutas febres, alij vero cum sani degerent, affatim syncope intercepti interierunt, quamuis vnus, vel duo citra syncopam alia quadam mortis specie perierint. Cæterum pro palpitationis curatione, aer eligatur ad caliditatem, & siccitatem declinans, sitque grauis odoris expers quinimò ut suauiter oleat, arte paretur: sunt nanque odorata omnia cordi familiaria, somnus sit moderatus: vitentque vigilias, immodicas præsertim: motu etiam, & exercitio temperato vtantur: alius feruetur lenis. & si id natura non fiat, arte suppleatur, clysteribus scilicet, aut balanis. Immodicos etiam animi affectus vitare debent, præcipue mæsticiam, & metum, atque etiam læticiam immodicam. Et quia vniuersa victus ratio (Gal. teste. 5. de loc. affect.) attenuatoria esse debet, Propterea tales eligantur cibi immodicæ humiditatis, at flatus expertes: sintque boni nutrimenti, ac facilis concoctionis: quapropter carnes pullo- rum, gallinaceorum, gallinarum, starnarum, phasianorum, perdicum, merularum, turdorum, ac aliarum paruorum auium montanarum eligantur: nec non interdum hædorum, vitulorum, leporum, ac capreolorum: eis autem vtantur assis, interim elixis, hyssopo, fœniculo, serpyllo, aut saturea, vel mellisso- phyllo, sampsucco, seu pulegio, interim etiã borragine, seu pimpinella: nec minus in prædictarum carniū iure piper, cinnamomum, macer, aut gariophylli in puluerem prius redacti iniiciantur. Potus sit vinum dulce, substantia tenui, colore flauum, seu fuluum, vetus potius quàm nouellum, vel mediæ æta-
tis

Prognostica,

Cap. 2.

Curatio,

Victus ratio.

Cuius cap. 2.

tis, dilutum aqua, in qua borrago, mellissophyllon, vel pimpinella fuerit decocta. Et quoniam omnes palpitatio affectos sanguinis detrectio iuuat, vt testis est Galen. eodem lib. 5. loc. affe. propterea statim circa initia (si virtus, aut atas, seu aliud quippiam non prohibeat) vena secunda erit, interna dextri cubiti, si totius corporis plenitudo ad sit, aut sinistri, ea non existente. Est nanque morbus hic magnus, saltem ratione partis affecte, quapropter & si intemperatum ad frigidum in hoc affectu sit cor quia tamen princeps viscus est, aut saltem reuulsionis gratia venæ sectio confert, prohibens ne ad ipsum excrementa confluant, tum quod imbecilium sit, tum etiam ne propter hunc præter naturam palpitationis motum excrementa quoque trahat. Quæ ratione Galenus non curare eos venæ sectionem dixit, sed iuuare, eos vero liberatos esse, qui post sanguinis missionem tenuante victu, medicamentisq; similibus vsi sunt: hæc (inquam sunt) quæ palpitacionem curant, victus scilicet extenuans, ac extenuantia medicamenta, quamuis ipsa venæ sectio iuuet. Nec mirum id est, nam ea reuellit: victus autem, & medicamenta cum extenuent, dissipent, atque discutiant; palpitacionis causam, quæ spiritus flatuosus, & crassus est, omnino adimunt, intemperantiamque ipsius cordis frigidam corrigunt, simulatque ipsum corroborant. Quæ de re neque multa sanguinis copia per venæ sectionem vacuanda est; sed potius (si opus fuerit) iteranda ea erit: nam quantò maiorem in numerum particulares, auxeris detractiones, tanto reuulsionem efficaciorẽ effeceris, vt à Galeno decretum est, lib. de cur. rat. per ven. sect. & nos in præcedentibus annotauimus. A venæ sectione, quæ extenuant medicamenta, ac calfaciunt, tribuenda sunt: in quem vsu conducunt, diambra, diamoschus cum dulcis, tum amarus; confectio de cinamomo, de xyloaloe, diacalamentum, dianisum, aromaticum rosaceum, theriaca, aut mithridatum, qualibet vice 3. i. exhibens cum vnc. ij. prædicti vini, aut vnc. ij. aquæ mellissophylli, borraginis, aut florum citrangulorum. Poterunt insuper prædicta in morsulis formari, excipiens diambra, vel diamoschu. 3. i. similiter confectio de oxylaloe, aut de cinamomo: adijcias autem seminum melonum vnc. s & cum saccharo diluto in aqua rosacea, aut mellissophylli, morsuli formentur: sit autem quilibet ponderis vnc. j. quorum vnum pro qualibet vice dato, ex syrupo item de pomis, corticibus citri, ac rosaceo simul mixtis, aliquo ex prædictis antidotis addito, liquidum medicamentum fieri poterit, ex quo paulatim sæpius assumat eger, Ex Plinio Secundo libr. de re medica habetur cap. 14. quod si costum ad cordis pulsum, panacem, & fœnum græcum æquis ponderibus in puluerem rediges, & cum melle attico repones commixtum, & (cum opus fuerit) cochlear plenum ieiunus cum aqua calida bibas, per triduum confert: aristolochiam item rotundam in puluerem rediges, vt idem inquit; & ex eo denarios tres, & vino per triduum bibes: Item rhaponticum ex vino veteri tritum, ieiuno potui dabis: Exteriùs insuper epithemata imponantur, quæ in hunc modum fiant. R. aquæ mellissophylli, florum citrangulorum ana lib. s. aquæ rosaceæ, & borraginis, cuiuslibet vnc. iij. maceris, gariophyllorum, cinnamomi ana 3. j. ligni aloes, corticum citri seminis ozimi ana 3. iij. ambræ, moschu, ana gra. s. croci gra. iij. vini odoriferi vnc. iij. commixtis omnibus fiant cordi epithemata. Ex oleo quoque costino, ac nardino, amygdalino, & rosaceo, puluere ligni aloes cinnamomi ac maceris, exiguoq; croco, & gallia moschata, ceræ quod satis sit, ac paucò vino albo odorifero, fiat vnguentum, quo vtare. Sacculorum etiam vsus nō minus conducit, qui sic parentur. R. florum borraginis, rorismarini, citrangulorum, sampfuci, mellissophylli, & serpilli ana 3. ij. ligni aloes corticū citri, maceris ana 3. j. cinnamomi, gariophyllorum, ac seminis ozimi, ana scrup. ij. rosarum rubearum 3. iij. croci scrup. s. ofsis de corde

Loco citato,

Venæ sectio.

Medicamentorum ra,

Cap. 122

Topica,

Si pituitosus re-
dūdarit humor
præparatio, ac
purgatio.

Si melancholi-
chus redundarit
humor præpara-
tio, & purgatio.

Excusatio,

corde cerui nu. j. contusis omnibus fiat sacculus ex serico, cordiq; imponatur. At si cum frigida cordis intemperie, frigidorum quoq; ad sit humorum redun-
dantia, priusquam prædicta medicamenta adhibeantur, à venę sectione ea que
iam dictos succos concoquendi, præparandiq; vim habent, tribuenda sunt: &
dein quæ purgant, quivis fuerit redundans succus, siue pituitosus, siue melan-
cholicus: pituitoso autem existente mel rosaceum, oxymel simplex, compositū
aut scyllinum cum syrupo è corticibus citri, aut de hyssopo, & aqua, in qua be-
tonicæ, samplici, pulegi, origani, aut mellissophylli folia fuerint decocta, tri-
bue: quibus sæpius assumptis, ac parato proinde, & cōcocto redūdare pituitoso
succo, purgetur, vt infra. R. agarici trochiscati. 3. j. vel scrup. iij. corticum myro-
balanorum chebularum. 3. ij. florum borraginis, & lupulorum, singulorum.
3. iij. fiat decoctum in aqua fontana, secundum artem in quo 3. vj. diacathol. aut
iij. confectiois de dactylis cum vnc. iij. vel iiii. syrupi ex pluribus infus. ros. rub.
aut vnc. ii. syrupi ex tribus infus. ros. pers. potui dato: vel catapotia formato ex
3. i. pulueris hieræ simplicis, & altera 3. seu scrup. iiii. trochiscati agarici, cum
oxymelite, & præbeantur. Post quæ per aliquod tempus duas scilicet, vel tres
horas vnc. iij. vel iiii. syrupi ex pluribus infus. ros. rub. aut D. Augustini tribue.
A purgatione verò (prout vsus requirer) supradictis medicamentis vtare. Si
verò melancholicus redundarit succus, vt sæpius contingit, similiter præpa-
randus, ac concoquendus primò erit, ex syrupo de pomis, è corticibus citri, de
succo borraginis, seu fumarie, lupulorum, aut de epithymo cum mellissophylli,
borraginis, aut lupulorum aqua: quo deinde cocto, ac præparato, purgans me-
dicamentum exhibendum erit, vt R. senæ epithymiana 3. ii. corticum myro-
balanorum indarum 3. iij. florum borraginis, fumarie, lupulorum, singulorum
3. i. fiat decoctum in aqua fontana, in quo dissolue dialenæ 3. iij. aut diacathol.
3. vij. & aerei mellis vnc. ij. & s. aut syrupi D. Agust. vnc. iij. seu syrupi ex plurib.
infus. ros. rub. tantundem. At si magis expediet catapotia exhibere, ea ex 3. j.
pilularum de lapide lazulli, aut de lapide armenio, & scrup. ii. agarici trochis-
cati, aut 3. i. pulueris hieræ simplicis formato. Post quorū assumptionem modo
quo supra diximus vnc. ii. sacchari borraginati, aut tantundem mannæ electæ
cum aqua borraginis, aut lupulorum præbeto. & deinde (prout vrgeat vsus)
prædictis alterantibus medicamentis vtare. Id tamen prætereundum nō erit,
quod dum purgante medicamēto redundantem succum vacuas, perpetuò ea,
quæ cor ipsum roborant, permiscenda erunt. Quomodo autem dignoscas pi-
tuitosum, aut melancholicum redundantem succum, cum sæpius in præceden-
tibus dictum sit, frustra putauimus hoc loco iterum repetere: nam præter sym-
ptomata diuersa, diuersa quoque victus ratio præcessit, temperamentum, ha-
bitus, ætas, tempus anni, regio, aeris constitutio, ac reliqua.

περί συγκοπῆς.

De syncope. Cap. 55.

ACVTISSIMVS cordis affectus, quem Græci συγκοπήν vocant, vt
patet commento aph. 41. 2. lib. Latini verò (cum proprio careant
nomine) syncopem etiam appellant: quamvis magna ex parte cum ea
affectione, quæ λεπθυρία dicitur, latinè animi defectus, communicet,
tamen non omnino idem significare videtur, sed ab ea discrepat, quinimo &
res ipsa diuersa est: Nam λεπθυρία nomen compositum à verbo græco
λείπω, quod latinè sonat, linquo, seu deficio, & θυμός, latinè animus, deliquum
seu defectionem animi significat: qua ratione quidam putarunt aliud esse
λεπθυρία, à λεπνοφυχία, cum λεπθυρία, animi defectum λεπνοφυχία autem
non animi, sed animæ defectionem significet: compositum etenim nomen
est à

est a verbo *ἀνέσθω*, & *ψυχή*, quæ non animus, sed anima latine dicitur. Verum quamuis nominum significata inspicienti dissentire videantur, reperitur tamen apud Hippo. interdum vno, quoque altero vsum fuisse, volens in re idem intelligere, vt patet aph. 13. primi, & 8. 7. lib. Nec minus & in Gal. doctrina confundi pro confesso habetur, tum præcitatæ locis, tum etiam primo de art. cur. ad Glauco. & 12. meth. meden. nam in primo præcitato loco verbo *λεποθυμία* vtitur: libr. autem 12. meth. meden. *λεποθυμία* idem per vtranque intelligens, qua propter audacter dicimus re ipsa prædicta nomina haudquaquam dissentire, sed confundi inuicem ex Hippoc. & Gale. sententia: nam eadem est pars quæ afficitur in vtrisque, idem symptoma, ac ad easdem dispositiones, seu causas consequuntur: quamuis etiam sunt, qui velint, neque ipsam *λεποθυμίαν* ab eo affectu, quem Græci *ἐκλυσι* nuncupant, latini exolutionem, dissentire, autoritate quadam freti ipsius Galeni præcitato lib. primo de art. cur. ad Glauco. & si eo loco aliorum medicorum autoritate loquatur. Nam quod inter se discrepent, ab Hippoc. decretum est eodem aph. 8. 7. lib. cum dixit, *Ἐπὶ φύματος εἶσω ἡνξίος ἐκλυσις, ἔμετος, καὶ λεποθυμία γίνεται*; Similiter a Paulo capitulo 34. libro tertio qui inter syncopes indicia cum exolutionem, tum animi defectum connumerauit. Verum quicquid sit de eclipsi, hoc est, exolutione, satis sit nunc demonstrasse *λεποθυμίαν*, & *λεποθυμία* re ipsa non differre, ita vt quicquid de vno dicitur, de reliquo quoque dictum putetur. Nam nihil aliud per ea significare volumus, quam animi defectum, per animum intelligentes, animam ipsam animosam, quæ ex Gal. decreto sedem in corde habet: cum itaque deficit animositas, tenor, ac promptitudo hæc animæ, ex quacunque causa ortum habeat, *λεποθυμία*, aut *λεποθυμία* appellatur. At quod a Græcis *συγκοπή* nominatur, a verbo *συγκόπτω*, Latine ferio, seu verbero, seu concido deriuatum est, ita vt etiam animi concisionem latine significare possit; licet affectus quodammodo similis sit animi deliquio, ab eo tamen discrepat. Nam (vt Galenus inquit) defectus animi præcedere consuevit syncopem ipsam, vt patet eodem primo de art. cur. ad Glauco. & idemmet prædicto lib. 12. meth. meden. inter lipopsychiam, & syncopem differentiam tradit, cum maiorem causam syncope requirat, quam lipopsychia, & si eadem possit vtriusque esse, tamen prout maior, aut minor existit, vnam, vel alteram affectionem efficit. Hoc idem confirmauit Aetius lib. 5. cap. 96. quamuis cap. 101. eiusdem lib. sub nomine *λεποθυμίας* communiter sumptæ; quod comprehendere possit & syncope, testetur, proprie tamen, quod inter se differant, ostendit: nam animi deliquium (vt ipse inquit) de repente incidit, sensu, & motu hominem priuans, & omnino non sudant: syncope vero & vigilantes, & dormientes inuadit, & omnino cum sudoribus qui *συγκοπτικοί* appellari solent. Ex his itaque constat, qua ratione syncope ab animi defectu differat; nanque non idem significat, nec idem est defectus animi, & concisio; maiorem etenim læsionem, ac virium calamitatem portendit concisio, quam defectus, licet ex eadem causa fieri possint, & non alia ratione curentur: quapropter de syncope verba facientes, patebit quoque & de defectus animi curatio. Est denique syncope, Gale. teste 12. meth. med. præceps virium lapsus: quem sectatus Paulus cap. 34. lib. 3. eam dixit esse confertum, seu simul totum virium collapsum. Dixit autem non ab re confertum, & Gal. præcipitem: nam si sensim, paulatimque fieret virium collapsus, non utiq; syncope diceretur: uerum cum essentia virium, quibus regitur corpus, tum in spiritu, tum in solidorum corporum temperamento consistat; & propterea hæc integra seruari debent, vt qualitate, tum quantitate, quoad fieri licet, naturaliter se habeant, vt liquet eodem 12. meth. med. consonum erit, vt cum vires labuntur, aut spiritus, vel solida corpora non naturaliter se habeant, qualitate,

Primo a
co, c. 14.

λεποθυμία.
λεποθυμία.

ἐκλυσι.

cap. 14.

Syncope quid
gauscit.

Primo ad glau.
c. 14.

11. meth. c. 5.

Quibus syncope a lipothymia seu lipopsychia differat.

cap 5. in princ
Syncope quid
sit.

5. de loc. affect.
cap. 1.

5. meth. c. 10.
6. de platonis, &
Hippo. decretis
cap. 4. & lib. 6.
cap. 1. & sequen-
tibus.

Quarum utrum
lapsus sit synco-
pi.

Cap. 1.

Cap. 2. & 3.

5. de loc. affect.
c. 6. & 1.

12. meth. c. 2. 3.

Cap. 1.
Quæ pars in
syncope affici-
tur.

qualitate, vel quantitate ipsorum immutata, potissimum ipsa corpora solida, in quibus utiq; vel maxime consistere virium substantia videtur: nam ad robur virtutis conseruandum, & ad syncopalem accessionem, quamuis derepente incidat cauendam, singularem præsidium est temperamenti custodia. Ante omnia quidem trium principiorum, mox verò reliquarum partium, quæcunque in consortium affectus principia secum ex facili trahunt, cuiusmodi est ventriculi os, propter exquisitum eius sensum. Si itaque in syncope vires collabuntur; spiritus, aut solida corpora offendi opus erit, cum in his vires consistent, ut diximus. Verum cum vires, quæ animal gubernant tres diuersi inter se generis sint, ut legitur apud Galen. 5. de loc. affect. 9. meth. med. 5. & 6. de Hippo. & Plat. decret. & sexcentis aliis in locis, Cum syncopem dixerimus præcipitem esse virium lapsum, quarum virium intelligendum sit, non ab re quispiam, nunquid videlicet naturalium, aut animalium, aut vitalium? Et quoniam sensu, & motu priuatur homo cum syncope afficitur, non absque ratione animales vires offensas esse diceret quispiam: verum quamuis animales functiones sint sensus, & motus, offendanturq; ipsæ in syncope; non propterea facultatem animale duntaxat, ac primo ob læsam in ea esse fatendum erit, quinimo omnes offensas esse asserimus, sed primo vitalem, & si non perpetuo in syncopes generatione facultas ipsa, aut cor ipsum primo lædantur; dicimus tamen syncopem haudquaquam gigni posse, nisi facultas ipsa vitalis, seu cor ipsum afficiatur: quo affenso, & reliquas vires seu principes partes in quibus consistunt, necessario offendi oportet. Simul enim cum ipso omnes vitiantur partes, nedum principes ipsæ, ut inquit Gal 5. de loc. affe. cum & ipsæ peculiari cordis temperie actiones suas perficiant, hac denique pereunte actione quoq; ipsarum perire necesse est, simulatque cerebri, & iecoris. Horum vero temperie deperdita, non oportet cordis simul actionem perire: seruatur etenim caloris symmetria in singulis partibus ab ipso corde, tanquam innati caloris fonte, ac principio, mediis arteriis, quamuis per venas etiam, & alia vniuersa confluat a corde calor, longe tamen minor quam per arterias, Galenus asserit libr. de usu puls. cumque illi a nullo calor confluat, sed aliis ab illo, consentaneum erit, ut cum a naturali statu recesserit, ac non amplius in peculiari, ac propria temperie persistat: quod reliquæ partes omnes detrimentum patiantur, ac actiones earum pereant priuatæ siquidem eo, qui prius confluebat calore quo seruata in proprio temperamento actiones perficiebant: propterea igitur syncope præceptus est omnium virium lapsus: nam in ea cor ipsum afficitur, ad cuius oblaxionem, nedum crebri, & iecoris, tanquam principum partium functiones, atque vires offenduntur, sed reliquarum omnium. Nec propterea negamus interdum syncopem oriri posse corde ipso non primario affecto, sed reliquis quibusdam partibus consentiente; quinimo (ueluti cæteræ corporis partes) cor ipsum primario affectu laborare potest, interim vero cæteris partibus consentiens, quemadmodum in stomachica syncope, de qua Gale. mentionem fecit, tū 5. de loc. aff. 12. meth. med. liquido uidere licet: Asserimus tamen, quod si cor afficiatur, quomocumq; affectum sit, progigni syncope haudquaquam possit: quamuis cerebrum, iecur, seu ventriculus, aut queuis alia corporis pars etiam uehementer, uel diutius affecta sit: Cum ex nullo prædictarum partium affectu possint, derepente, affatim seu simul totæ vires collabi; quemadmodum neque animal omnino perire poterit, nisi cor afficiatur, cum semper mors ad immodicas sequatur cordis intemperantias, Gale. teste eodem 5. de loc. affect. Ex quo uirum præcipiti collapsu patebit liquido cor ipsum in syncope affectum esse, neque, ipsum strenue munus suum obire potest, cum oblaxum sit: quapropter, & pulsum paruitas, ac imbecil-

becillitas, frigidaque extrema consequuntur. Affectus ipse symptoma est in genere noxę functionum omnium primo tamen vitalium: læduntur autem vires non modo diminutę; vt in *λεπθυμία*, sed magis, & quasi ablatę interdum, saltem quoad sensum. Eius vero signa sunt (vt inquit Paulus) resolutio ac animi defectus, pulsus paruitas, extrema frigida, & in sudorem prorumpentia: Apparet autem sudor præsertim circa caput, vultum, ac ceruicem, ex Hippo. ac Gale. auctoritate, lib. primo prognost. qui sudores syncoptici appellari solent; quę omnia innati calidi suffocationem, aut extinctionem portent. utroque enim modo pro ratione diuersarum causarum in syncope innatum calidum offendi solet; propter quid autem in syncope sudores, & hi quidem frigidi appareant, in lipothymia autem non, adhuc non liquet: Dicimus autem nos propterea id euenire; quia cum syncope vires magnopere oblæsę sunt, confugiatque calor innatus ad cor, tanquam ad propriam arcem, derelinquensque partes externas: id quod in eis præsertim in partibus solidis continetur, humidum retineri neutiquam valet, quinimo tanquam destitutum ab innato calido, facultateque retinere haudquaquam eum continere potente, ad externas cutis partes confluit, ac sudor propterea gignitur, non siquidem ex excrementitia duntaxat humiditate, sed propria etiam solidarum partium. Frigidi vero sunt tales sudores, quoniam ea, quę solida corpora regit natura, quę secundum Hipp. est calor naturalis, vel omnino extinguitur, vel proxima est extinctioni; qua de re in frigidatis partibus solidius propter iam dictam causam, quicquid ex eis profluit, quod frigidum sit oportet. Et propterea qui profluunt sudores in syncope necessario frigidi sunt: quoniam (vt dictum est) in syncope innatum calidum aut extinguit, aut extinctioni proximum est: & non ab re syncoptici nuncupantur; quia cum syncope proueniunt, non autem cum lipothymia: quoniam in ea non adeo vires labuntur; nec ad hoc deuenit calidum innatum (licet afficiatur) vt ferè extinguatur, aut extinctioni proximum sit, neque solidę partes in lipothymia, velut in syncope à natura, quę eas regit, ita destituuntur, cum minori sit cordis affectio in lipothymia, quam in syncope: & propterea neque sudores, neque frigidi in lipothymia apparent, immò qui ita affecti sunt, omnino non sudant, vt inquit Aetius. Cæterum quoniam cor in syncope interdum proprio affectu, interim vero per consensum laborare solet, dignosces quando ipsum cæteris partibus consentit ex proprijs indicijs earum partium primò affectarum, ac symptomaticis quibusdam, quę quidem syncopem antecedunt; quemadmodum si affecto ore ventriculi syncope consequatur, quę stomatica dicitur, vomitus, nausea, aut dolor eiusdem partis, seu morsus quidam præcessit: sic quoque affectis primo reliquis partibus, corde vero consentiente, dicendum erit; Verum si nullum præcesserit signum alicuius partis affectę, & syncope oriatur, nullusque alius affectus ipsam antecesserit, præterquam si immodica fuerit aliqua animi excalescencia, seu affectio, cor primario affectum esse iudicabis: vtcunque autem fiat syncope, aut fortem duntaxat consequitur cordis intemperiem, vel cum vitioso, seu venenoso humore, nonnunquam vero erysipelas, aut inflammationem, aut alium quempiam præter naturam tumorem ipsius sectatur. Verum si ob inflammationem, vel erysipelas excitetur syncope, antequam augeantur huiusmodi affectus animal corrumpitur: non sic autem si ob simplicem cordis intemperiem syncope excitetur, siue æqualis siue inæqualis ea fuerit, vt patet lib. 5. de loc. aff. Ex hoc itaque distinguere poteris, cum syncope genita sit per proprias familiarum partium intemperies: nam ea subitam mortem non inducit; quemadmodum ea, quę ad instrumentales partes pertinet, quę subito enecare potest, prius ramen præcedentibus quandoque signis quibusdam quorum :

Quis affectus præter naturam sit.
Lib. 3, cap. 34.

Propter quid in syncope sudores frigidi eueniunt, & in lipothymia nequaquam.

Lib. 5. c. 107.
Quibus discernatur indicium, si per essentiam aut per consensum in syncope cor afficiatur.

Ad quos cordis affectus consequatur syncope.

cap. 2.

**Syncope cau-
sa.**

**Quæ in uniuersum
sint synco-
pes causæ.**
cap. 5.

**Ex quibus spiri-
tus alterentur.**

**Ex quibus cau-
sis spiritus cor-
rumpantur.**

**Ex quibus cau-
sis digeratur so-
lidorum corpo-
rum substantia.**
Ex quibus alte-
retur.

**Si syncope cau-
sa fuerit crudi-
tatis humorum.**
maxima copia,
signa.

12. meth. cap. 3.
Signa synco-
pes ortæ ex fla-
ua bile os ven-
triculi infestante.

quorum vnum scriptum est Hippo. præcitato aph. 4 r. 2. lib. cum dixit, Quod sæpe, & multum exoluuntur sine causa manifesta, ij repente moriuntur. Syn-
copes vero causæ quamuis nonnullæ esse possint, cunctæ tamen, aut cordis
spiritus, vel solidum eius corpus offendunt, vtræque vero substantia bifariam
lædi potest, quantitate scilicet, vel qualitate mutata (nam nedum eorum sub-
stantia certa esse quantitate desiderat, verum etiam & qualitate.) Quæcunq;
itaque causa syncopem excitat, aut prædictorum corporum solidorum, aut
spirituum essentiam corrumpit, vel saltem eorum temperiem mutat; quem-
admodum apud Gal. legitur 12. meth. med. nanque in his duabus substantijs
virium essentia consistit; quæ insuper sic custodiendæ sunt, vt tum qualitate,
tum quantitate (quoad fieri licet) naturaliter se habeant. Alterantur autem
spiritus, tum ex vitiosis redundantibus succis, tum ambientis malitia, qui
aliàs alia de causa in hanc est mutatus, vtpote ex metallis, caminis, aut bara-
tris; aut ex leguminum putredine, olerum, vel animalium, aut si halitum ex
stagnis, vel paludibus, vel fluminibus recipiat: item ex venenatis facultati-
bus, aut animalium, quæ virus reiectant, venenis. Nec mirum si spiritus ex
ambientis malitia, ac vitiosis succis alterantur: nanque ex tenuiori, ac purio-
ri sanguine, simulq; ex ære, qui optima temperie sit, atque ab omni inquina-
mento purissimus, per inspirationem attracto nutriuntur. At ipsius spiritus
corruptio, tum ex ingenti dolore, ac crebris motibus, cuius generis & vigi-
liæ sunt, tum ex immodica eius tenuitate, & continente eum corporis raritu-
dine provenire potest, tum vero ante hæc omnia ex ipso respiratu prohibito,
& nutrimenti defectu. Item ex animi affectibus, veluti est timor subitus, & ve-
hemens, & quæ contraria huic timori est, voluptas maxima, hoc est, gaudij
excessu: tristitia etiam, anxietas, ira, & cura eo genere sunt noxiæ, quo fre-
quentes vigiliæ, spiritusq; corrumendo vires resoluunt. Ex his itaque causis
aliàs spiritus alterantur, vt diximus; aliàs corrumpuntur: aliquando ex parte
digeruntur; non raro autem hæc vtræque perpetiuntur. Virium vero lapsus
qui ad solidorum corporum digestam substantiam succedit, causam habere po-
terit longissimos præcedentes morbos, extenuato ægro ex atrophia, id est, nu-
trimenti defectu; præterea ex febribus acutis, quæ corpus liquant, excitari con-
tingit. Eorum vero corporum temperies mutata provenire potest, vel ex immo-
dico calore, vel frigore, vel humiditate, vel siccitate, aut horum aliquibus co-
pularis: succedunt autem & syncope immodicæ ventris inanitioni, vel prin-
cipiorum intemperiei, aut in his, qui aliena loquuntur, etiam propter motum
& (vt summatim interum dicam) quæcunque spiritus, aut corpora solida mu-
tant, aut corrumpere possunt, syncopem genere valent. Quarum causarum
cognitio magna ex parte ex astantium sermone patebit, quasdam vero ex te-
ipso cognoscere poteris. Nos verò earum, quæ non ita facile patere possunt,
signa conscribemus, vtpote si ex magna crudorum humorum copia, ex crudi-
tatibus, vel alia quapiam occasione congesta syncope excitetur, vna cum
oris ventris (quod stomachum vocant) offensione: his nanque, & præcordia
inflata, & totum corpus ampliori mole quàm pro naturæ modo, cerni-
tur: tum color aliis ad albidius, quàm pro naturali habitu, & aqua intercute
laborantium magis simile est mutatus: nonnullis etiam ad nigrius, aut liui-
dius, quos medici plumbei palloris appellant. Omnibus vero pulsus minores
sunt, quàm pro caloris ratione, si febricitauerint; præterea obscuro, omninoq;
inæquales, sæpe ea inæqualitate, quam sistematicam Græci vocant: semper
verò ea quæ in vno est ictu, vt legitur apud Gal. 12. meth. meden. & Actium
cap. 96. lib. 5. ac Paulum cap. 36. lib. 2. Eos vero, quibus ex flava bile, quæ os
ventriculi infestet syncope incidit, cum ex reliquis, tum etiam ex assidua oris
ventriculi mordicatione, anxietate, vellicatione, ac dolore cognosces. At
siquis

fiquis adeo prætenues succos, ac spiritus habeat, ut ocyssimè exhalent; adeoque imbecillam habeat per vniuersam corporis molem retentricem facultatem, expultricem autem immoderatus concitatam, ut propterea in syncopem incidat, in eiusmodi affectibus, mortifera illa species in facie celeriter apparet: nasus videlicet acutus oculi caui, astricta tempora, & reliqua, quæ deinceps ab Hippoc. primò prognost. sunt conscripta: quamuis alius non multum excreuerit, neque vigilauerint, aut tristes fuerint, aut fame affecti ægri ipsi; ex his nanque minus malum est, quàm si absque his emaciati fuerint, eodem Hipp. auctore: & Gal. cum primo prognost. tum 12. meth. med. quem sectati sunt Aetius cap. 98. lib. 5. & Paulus cap. 37. lib. 2. Verùm si syncope valida fuerit, medicinæ locus non est, ut idem inquit Paulus cap. 34. lib. 3. At si vires adhuc tantillum constant, aliquando ad sanitatem recursus est, ut ipse refert. Cæterum ubi cor proprio affectu laborauerit in syncope, valido existente animæ robore; ex quibusvis animi affectibus ipsa excitetur, nunquam æger succumbet, Galen. teste. 5. de loc. aff. Si vero propter eius intemperiem syncope eueniat, perniciosior erit, quàm ex cerebri intemperie; quemadmodum hæc periculosior est, quàm si iecur primo affectum fuerit, ut testatur Paulus cap. 38. lib. 2. & Aetius cap. 99. lib. 5. quamuis non ita subito syncopes necare possint, quæ ex cordis intemperie oriuntur, quàm illæ, quæ instrumentales eius morbos sectantur, ut patet eodem lib. 5. de loc. aff. Pestifera autem est syncope illa, quæ ab extenuato spiritu, ac sanguine originem trahit, potissimum ubi imbecillitas adsit retentricis facultatis totius corporis, ac expultrix immoderatus concitata fuerit. Prorsus autem exitiosa syncope erit, si corpore crudis succis referto generetur, aut ex redundante flaua bile os ventriculi infestante siue ex extenuatis succis, ubi iecur, vel ventriculum plegmone obsederit: quemadmodum scriptum reliquit Gal. eodem 12. metho. med. Verum si citra phlegmonem stomachicæ syncopes fiant ventriculi ore affecto primo, ac consentiente corde, curationem magna ex parte admittunt: nam minus periculosæ sunt, quàm si excitatæ fuerint ex aliquo trium principiorum, quemadmodum colligi potest ex Gal. verbis, præcitato lib. 12. metho. med. Quoniã vero quæ habentur indicationes, ex symptomatibus, & morbis, non simpliciter, sed secundum causam, à qua singulæ fiunt considerare oportet, ut liquet primo de art. cur. ad Glau. propterea non vnus modus curationis, cuiusvis syncopes erit, sed singulæ earum propriam curam desiderant pro diuersitate causarum; ex quibus excitantur: in vno tamen omnes communicant; quod si deprehensus syncope cubans est, omnis sollicitudo medentis ad symptoma vertitur; si nedum ea præmitur, vtriusque curam habebit, & ut symptoma non incidat, & ut morbus paulatim discutatur, ut patet apud Galenum eodem lib. 12. metho. med. Nec minus & in alio quoque conueniunt, quod siue per essentiam fuerit orta syncope, siue per consensum affecto corde, semper ipsi prospiciendum erit, cum & principalissimum viscus sit, saltem quod vitam: & propterea robur eius perpetuo seruandum erit: nec syncope aliqua gigni potest (ut prius diximus) nisi & ipsum cor afficiatur. Si itaque ex ambientis malitia syncope fiat, prospiciendum erit, ut is ad optimam temperiem mutetur, atque arte odoratus fiat. Si vero ex venenatis facultatibus, aut ex animalium, quæ virus reieciunt, venenis excitata fuerit syncope, eis vtendum erit, quæ ἀντιφάρμακα Græci nuncupant, vtriusque proprijs, ex ingenti dolore, curanda causa doloris erit. Ex crebris, & inordinatis motibus, quies iniungenda, ex respiratione prohibita, respiratio procuranda, sublata causa quæ ipsam prohibebat, ex animi affectus, statim ab eo affectu reuocandi: postmodum vero conueniens passioni cura est afferenda. Si vero ex aliqua trium principiorum intemperie fuerit excitata; per contrariam intemperiem, moderatè

Si ex fuscorum tenuitate, & corporis raritate fiat, signa.

Textu 6. & 7. 1. prog. text. & com. 8.

12. meth. c. 6. Prognostica.

Cap. 1.

Cap. 2.

Cap. 6.

12. meth. c. 3. Curatio, 1. ad glauconem, cap. 14.

In quibus conueniant omnes syncopes pro eadem curatione, cap. 6. }

moderatè tamen vindictam, syncope curabitur. Sic si ob inflammationis magnitudinem, aut vehementis febris magnitudinem, syncopes generentur, propriis curationibus, inflammationis scilicet, aut febris, curandæ sunt tempore, quo syncope deprehensi cubantes non sunt. Verum quoniam sæpius accidit, ut ex immodica quapiam euacuatione, nedum animi defectus, sed syncope eueniat, & similiter ferè succurrendum erit cuilibet repente syncope ingruentis, velut huic: propterea curationis eius, cum iam inuaserit, mentionem primo faciemus, relicta eius curatione, si ea egri non laborent. quoniam pro diuersitate affectuum, ad quos sequitur immodica euacuatio, curari eo tempore debet, quemadmodum & reliquæ omnes ex quibusuis causis fuerint ortæ: occurrendum est igitur, cum repente eius accessio ingruat, frigida faciem aspergendo, & nares apprehendendo: Conuenit etiam, os ventriculi perfricare, ac iubere, ut euomant, stomachum irritando, digiti, vel penæ immiffione. Conducit item manus, vel pedes alligare: verum oportet nexus fieri plures, ac fortiores circa manus, quando per inferiores partes fiunt euacuationes, quemadmodum quando per hæmorrhoidas sanguis profluit, aut ventris profluvia adsunt, vel per vterum exeunt in mulieribus menses. Contra autè fit in fluxibus sanguinis factis per nares, atq; vomitibus, in quibus crura sunt vehementius alliganda: in vniuersum autem (ut Galenus inquit. i. de art. cur. ad Glauc.) aut ad communia membris patientibus in aduersum trahere oportet, aut ad ea in quibus est euacuationis origo. Atque ideo quæ ex vteris fiunt immodicæ euacuationis, cucurbitulæ mamillis appositæ statim sedant; quæ vero ex naribus, hepatis, ac spleni secundum nares patientem. At si ex vtriusque naribus multus sanguis effluat, vtriusq; visceri sunt adijciendæ. talibus etiam auxiliatur vinum aquosum, vetus frigida dilutum, & præsertim quando ad ventriculum fluunt humores, nisi aliquid vini exhibitionem prohibeat eorum, quæ à Gal. primo de art. cur. ad Glauc. conscribuntur. Ex varijs quoque odoramentis eos reuocare conuenit. nam humida, & potus, nec non odorata, præsertim ad recuperandas vires citissimè optima sunt, Hipp. auct. lib. de aliment. & aph. xj. 2. lib. simul. cum Galeno. In vini autem exhibitione num frigidum, vel calidum exhibendum sit, ægrotantis natura, consuetudo, ætas, & ambientis aeris temperatura consideranda sunt: atque hæc respiciens distinguere oportet, num calidum, vel frigidum exhibendum sit: ipsis verò locis, ex quibus profluuit prouenit, imponere oportet ea quæ corroborandi vim habeant. Verum si ob sudoris multitudinem animi defectus, vel syncope excitetur, eis, quæ adstringunt, ac cutem refrigerant, vtendum erit. Vinum præterea frigida dilutum, velut dictum est, etiam his commodum existit: nihil autem omnino calidum offerre conuenit, neque crura, nec manus ligare oportet, neque cogere ad vomitum, aut villo modo mouere. Aerem quoque domus alterare opus est, eis, quæ frigida; atque astringenti qualitate, participiant; ut myrtorum folijs, rosas, ac pampinis vitis, pauimentum consternentes, frigidosq; ventorum flatus ventilabris etiam inducentes. Verum nihil horum, vbi ad ventrem fluxiores fiant, confert: nam quo magis cutem densaueris, tanto ipse magis augentur: eis vero balneæ aptissimæ sunt, confert etiam immodico sudore sudantibus partibus illinire myrtinum, rosaceum, aut coroneorum oleum: que omnia à Gal. primo de art. cur. ad Glauc. & ab Aetio cap. i. 2. lib. 5. scripta reperies. Quomodo autem vindicandi sint egri à quauis particulari ingruenti syncope, seu animi defectu, apud eosdem auctores præcitatis locis studiosi requirant: quamuis ab vtriusque animi defectu verba fiant: idem tamen de syncope intelligendum erit, si ab eisdem causis excitetur: neque enim alio discrepant, quàm maioris minoris ue ratione, ut diximus. Nos vero eius syncopes curam aggrediemur, quæ ob magnam crudorum

Ingruentis syncope, curatio.

cap. 14.

Loco citato.

Lib. de aliment. in fine.

1. ad glauconem cap. 14.

Curatio synco.

crudorum succorum copiam vna cum oris ventris offensione excitatur, & primo eorum curam præcipientur, qui nondum ea præmuntur, vtriusque curam habentes, vt & ipsa non incidant, & vt morbus paulatim discutiarur: quâuis celerius hunc discuteremus, si nullus symptomatis subesset metus. Nanq; qui multitudine crudi succi grauatur, hunc (si modo iustam semel vacuationem ferre possit, nec metus aliquis syncopes impenderet) semel abitor, vacuatum à morbo explicaremus, vt 12. met. med. Gal. inquit. Quapropter licet vacuationem desiderent, nulli tamen sanguis mitti sine maximo dispendio solet: quo fit, vt ne sanguinis missionem, nec purgationem sustineant, vt pote quod sine his syncope subito adoritur. Degant itaque tales in domo puræ lucis, nec madente. aer eligatur calidus media temperiæ: quapropter reclinandi in domo sunt; æstate quidem, quæ frigeat, hyeme, quæ caleat; cum aduersissimus eis sit aer ambiens, quoties vel nimium calidus est, vel nimium frigidus. Ex calido etenim crudi humores diffunduntur, & per totum corpus fluunt, vt liquati propterea metuendum sit, ne ad pulmones, & cor ferantur, aliquando etiam, ne ad cerebrum subeant: cum longe præstet, vt circa iecur, & primas venas subsistant. Qua ratione iterum aduersissima his balnea sunt: ab aere vero, & in domibus immodice frigidis, succi, qui crudi sunt & inepti ad concoquendum manent, & obturationes hepatis augent, si parua fuerint: Si vero non fuerint, generant propter crassitiem detenti, & impacti. Somno vtantur, atque vigiliis moderatis, nãque vberior somnus neque his est salutaris cum nec crudos succos digeri sinat, & viscera grauiora reddat, sed si quis alius affectus est (vt Galenus testatur) qui somnum & vigilias modicas desideret, hic profecto in his est, quippe somnus concoquit, vigilæ digerunt: Pari ratione motus vitandus erit, quies vero præcipienda: seruandumque inuiolabiter est; ne vel cibum, vel surbitionem, vel aquam exhibeas, vel omnino liberaliter bibere sinas, nisi mulsa tribus primis diebus duntaxat vtantur, in qua hyssopum coctum fuerit: & si nullum occurrat incommodum, eadem aqua mulsa duntaxat, in qua incoctum hyssopum sit, vsque ad septimum vtare; siquidem longissimam (vt Galen. asserit) qui ita sunt affecti, cibis abstinentiam ferunt, corpore scilicet ex crudis ipsis, quos continet succis, concoquendis, alito: quare nec eadem aqua mulsa copiose semel exhibenda erit. Si tamẽ vehemẽter non febricitent, his & aquosum vinum idoneum ab initio statim est; & in eo diluto panem quoque exhibere conuenit, modo in aliquo viscere phlegmone non adsit: & si non solum crudi succi sint, sed etiam eo corruptionis peruenit, vt concoqui ad perfectionem non queant si forte horum desperata salus non sit, ægro mulsam fastidiente, vel aluo fluente. ad ptisanæ cremorem est transeundum: & sic vbi crudos affatim succos esse animaduertis, oximel pro mulsa exhibere assiduẽ debetis. Quod si huius assiduus vsus tædio esse ceperit, transire insimul ad mulsam, & ptisanam conueniet: dein rursus ad oximel reuerri: & si ætas sit, atque æger frigide potioni assuetus, frigidum huic oxymel dabis; sit hyems sit, omnibus calidum: tum his, qui calide, tum his, qui frigide insueuerunt, offeres; equẽ, vt si immodicus æstatis tempore æstus sit, etiam qui calide assueti sunt, frigidum, si nullum sit his viscus ad iniuriam opportunum. At quoniam hi cum vacuari postulent, vacuantia præsidia non fuerunt: ea de re nulla alia idonea vacuatio inuenta est, à Galen. præsertim, eodem duodecimo method. medend ab Aetio confirmata cap. nonagesimo sexto lib. quinti, & Paulo cap. 36. lib. secundi, præteream, quæ ex frictionem paratur. Incipere vero in principio statim morbi oportet frictiones, linteis non admodum mollibus, sed asperinis medio cre quid habentibus, ac primum à cruribus supernè deorsum, de hinc tota brachia ab humeris vsque supernè deorsum simili modo sunt fricanda: postulat

S

enim

pes ex crudorũ
succorum copia
ortæ.

cap. 6.

Vicius ratione.

12. met. cap. 3.

Loco citato.

Medicamento-
rum ratio.
12. meth. c. 3.

enim ægrotus simul per eas frictiones, & calefieri, & aliquid digeri: licet con-
ducant etiam vberiores frictiones ad somnum alliciendum. At vbi artus om-
nes abunde calere videantur, & metus est, ne quis ex multitudine frictio-
nis contusa iam carne, lassitudinis sensus superueniat, oleo relaxante vten-
dum est, quale est, quod dulcissimum est: & si hyems fuerit, nihilo deterius
erit ad digerentium aliquod oleum transire, quale est chamæmelinum, aut
anethinum, quo oleo ungere artus, & fricare quàm plurimum debebis, po-
stea oleum detergere, atque ad spinam dorsi transire, hancque totam frica-
re primum sicca frictione, postea oleo. Ab hac rursus ad crura te conferes,
ab his ad brachia, exinde denuo ad spinam, ita torum agens diem: conside-
rare item oportet in his, quæ ad aluum spectant; & si sua sponte commodè
non deiciant. pulsus vero robore mediocri sit, ac magnitudine, & æqualis,
præterea minimè intercisis, audacter per inferius aliquid infundes. Cata-
plasmatis autem, & perfusionibus minimè vtendum est, priusquàm superua-
cua magna ex parte partim vacuata sint, partim concocta: nanque hi, qui as-
sidue prædictis medicamentis præcordia vexant, potius in eiusmodi affecti-
bus phlegmones excitant: licebit vero eis vti, tempore quo diximus, non ta-
men duntaxat relaxantibus, sed eos plurimum fouere oportet oleo, in quo ab-
synthia ebullierit: vel emplastrum adhibere ipsi ventriculo, quod sit ex pal-
mulis, vino, farina hordei, croco, aloe, & mastiche, ac madefacere etiam
mastichino, seu nardino; postea vero hyssopum in mellicrato decoctum, aut
diatronpipereon, aut diaspoliticon medicamentum exhibere, non inconuenit:
& ad eundem modum medicamenta quæcunque offerenda sunt extenuantia,
calefacientiaque saltem ea, quæ sumere febricitans homo poterit, si febrici-
tauerit. Qua ratione, & propter eam etiam quam supra assignauimus, ni-
mium calida medicamenta vitanda sunt: si qui laborant, senes sint, post-
quamque cibationem aquosum vinum præbendum erit, magisque etiam si in-
terposita quietis spatia mediocria sint: Qui sane ex eiusmodi succis laborant,
hos quotidie accessiones exercent, præcipueque ad vespèram, & noctu, non
mane, nec vsque ad meridiem. Si vero ad hos (cum syncope eos iam præ-
mit) sis accitus; si ea, quæ retulimus loca phlegmone vacent, panem exhi-
bebis non multum, vino fuluo madefactum quod celerem in corpus dige-
stionem adiuuet, statimque ad frictiones venies; quas etiam pro tradito iam
modo administrabis: ac si quidem æstas sit, aut regio naturaliter calens, &
æstans, vel status cœli vehementer calidus, cum frigida vinum dabis, si ni-
hil eiusmodi sit, iam calida; quæ tamen secundo, & tertio dabitur potio, om-
nino calidam exhibendam curabis, quippe ad vniuersam eam curationem
(cuius grãtia frictiones adhibitæ sunt) calor præstat, utpote crudorum succo-
rum concoctionem adiuuans, Galeno, & Aetio testibus, in præcitatís locis.
Nec parum conducit si prædictis diamoschu dulcis, aut confectiois diam-
bræ parum cum paucò vino exhibeas: odoramentis quoque animum reuoca-
re conuenit; parentur autem hoc modo. Recipe aquæ rosatum, florum citran-
gulorum, & mellissoph. ana vnc. ij. corticum citri, ligni aloes, singulorum
drac. i. moschu, & ambar vtriusque gran. iij. aceti vnc. i. Interim autem neque
cor ipsum negligendum erit, ne ei succuratur ab extra adhibitis medicamen-
tis, epithematibus scilicet, vel sacculis, vt infra. Recipe aquæ mellissoph.
florum citrangulorum, & roris marini ana libr. s. aquæ rosaceæ vnc. iiii. ligni
aloes, corticum citri, singulorum drac. ii. cinnamomi, garyophyllorum, v-
triusque drac. s. croci gra. v. ovis de corde cerui nu. ii. moschu, & ambar singu-
lorum gra. iiii. vini fului odoriferi, veteris vnc. iiii. misceantur, & supra cor
epithemata fiant. Item ex floribus mellissop. roris marini, & citrangulorum,
sampsuci, & serpilli cum cinnamomo, croco, gariophyllis, corticibus citri,
rosæ

Curatio prædi-
ctæ syncope in
gruentis.

rosis siccis, ac ligno aloë simul mixtis, & contulis, additis gran. iiii. muschu, & totidem ambar, cum serico sacculi fiant. Qui vero ex vitiosis calidis succis redundantibus, seu flaua bile, quæ os ventriculi infestet, syncope vexantur, tempore, quo ea non premuntur, contraria quam prædicti curatione curandi sunt. Nam in aere ad frigidum vergente degere debent; somno longiori uti, accubis, & potius frigidioribus, ut pristinæ cremorem, aut panem non multo, sed modico, huncque ex vino aquoso frigida diluto, tribuas: confestimque tentandum erit, ut bilis ipsa expurgetur, quæ sua acrimonia, ac mordicatione os ventriculi infestat, per vomitum si fieri poterit, quem digitos aut pennas demittendo iritate oportet, aut aquæ, calidæ, seu hydrelæi potu, vel tantillum aceti aquæ calidæ imponans, aut syrupi acetosi simplicis. Quod si neque sic euomere possunt, aliud cienda erit, ex tamarindorum decocto, ac manna; quandoque etiam rhabarbari parum adiciendo: illud tamen animaduertas, quod neque hi immodice semel vacuandi sunt, cum exquisitas euacuationes non ferant. Ad hunc etiam usum clysteriis, eisque lenibus uti conuenit; postea vero cum maior pars redundantis succi fuerit expurgata, omnibus modis membra ipsa, ventriculum, præsertim, corroborare oportet, oxyssacharum, syrupumque granatorum acidorum, aut ex acetositate citri, à pomis, aut de corticibus citri, cum iam dictis permixtum, ante, & post purgationem indefinenter tribuas. A purgatione vero absynthii decoctum præbere conuenit. At si in syncope prædicti inciderint, his exhibendus est frigidus potus: si tamen tunc, vinum quod & calidum natura sit, ut deductionem in corpus promoueat: id vero seruandum erit omnibus, quos syncope malè habet: distribui nanque per corpus nutrimentum, quod sumptum est non in ventre manere volumus: propterea ex vinis ea deligenda sunt, quæ & flauo sint colore: & substantia tenui, & ætate vetera, ac boni odoris; licet talia (ut Galenus refert) & boni odoris continuo sint: igitur commodissima his vina erunt, quæ cum naturaliter austera sint, sensilem iam adstringendi uim propter vetustatem non exhibent, calorem tamen admodum habent. Quandoquidem hæc omnia, quæ requirimus in iis, quorum stomachus amara bile uexatur, efficient, cum & iucundè sumantur, & tum concoctionem tum digestionem in corpus promoueant, & succi vitium mitigent, & corporis habitum excalfaciant, & stomachum ipsum firment: in prædicti vero vini penuria; aut ubi caput fuerit imbecillum, vel oblesum, uina deligenda sunt aquosa, & antiqua: talia nanque, tametsi non ualenter excalfaciant, tamen facile in omne corpus deducuntur, caputque minime tentant, uelut fulua: omnia autem austera, uina, tum noua, itemque crassa fugere oportet, ut idem Galenus præcipit eodem duodecimo Method. medend. Nam etiam inconuenit, si eisdem diamargarith. frigidi exiguum quippiam cum paucio uino, uel syrupo de pomis, seu oxyssacharo tribuas: odoramentumque naribus adhibeas; quod recipit aquæ rosaceo, myrtillorum, ac nymphææ ana unci. iiii. santalorum, ac corallorum rubeorum, cuiuslibet drac. i. & ss. corticum citri scrup. i. ambar, seu moschu gran. ii. aceti albi unci. i. omnibus simul mixtis fiat odoramentum. Cordi item epithemata imponere conuenit, quæ sic parentur: Recipe aquæ borraginis, acetosellæ rosacæ, & mellissoph. ana unc. iiii. santalorum omnium, & corallorum rubeorum singulorum drac. ii. corticum citri ligni aloes cuiuslibet drac. ss. croci gran. iiii. moschu gran. ii. ossis de corde ceruinum. i. uini fului odoriferi unci. ii. misceantur, & fiant epithemata. Sucellos item componas ex floribus borraginis uiolarum nymphææ mellissoph. ac rosis quibus parum croci ligni aloes ac corticum citri & ambar quodque gran. ii. addas nec non santalorum & corallorum rubeorum ana drac. iiii.

Synopes ex flaua bile curatio.

Vitæ ratio,

Medicamentorum ratio.

Eiusdem synopes imprimendis curatio.

12. met. c. 4.

Cap. 4.

Synopes ex te

S. 2 & cum

noībui humori-
bus curatio.

Cap. 6.

Loco citato

& cum serico fiant sacculi. Qui vero ob prætenues succos syncope opprimantur, sic ut ocysimè exhalent, accedente quoque corporis ratitudine diuersa ratione curandi sunt, quàm illi, qui ob crudorum humorum copiam syncope laborant, cum eos paulatim, & assidue vacuare iussimus propterea quod simul multam euacuationem ferre non poterant: hos vero paulatim, & assidue nutrire oportet, ex omnium medicorum sententia: quamuis si à principio viribus adhuc valentibus curandos susceperimus; nec paulatim eos cibabimus: possunt nanque hi, vel quod liberius semel datum est. nutrimentum superare: nutrire itaque hos oportet, sicut etiam corporis summa densare, non secus quàm priorum rarefacere; cum etenim maximè hi affectus dissideant, etiam præsidiorum speciem diuersissimam requirunt; frigidum ergo his aerem, astringentemque comprobauimus, rosas, aut myrti folijs, seu vitium pampinis in domo substratis: vnguenti quoque sunt astringentibus vnguentis, omphacino videlicet, aut rosaceo, melino, aut myrtino: & si exurantur, miscere oportet aliquid ex refrigerantibus, veluti portulacæ, solani, aut vuæ acerbæ succum; præcordijs vero, & stomaco cataplasma adinouebitur ex palmulis, rosas, œnante, acatia, hypocistide, & alumine; capiti autem, atque fronti omphacinum, vel rosaceum imponatur per se, aut cum gummi. Cibi his dandi sunt, qui nō admodum promptè diffuant, quemadmodum Galenus, Paulus, & Aetius sentiunt, ut panis, & sorbitio ex alica, fructus austeri, qui non faciliè corrumpantur, tum ipsi per se. tum vero & cum pane; velut sunt cydonia, mala punica, acida, & austera, amarenæ, pyra quædam, & hi, quos vulgus azarolas vocat. Dabis etiam aliquando & oua præcipueque & horum vitellos: album nanque eorum ægrè concoquitur, ut patet duodecimo methodi medend. præterea gallinaceorum qui, lacte sint aliti testes, itemque suillum cerebrum, probe tamen assum tribuendum ut ipse inquit, vel in albo iure legitimè elixum; porro, & anetho iniectis. Vinum autem his aquosum necessarium inter initia est, sumptum post cibum, Denique omni ratione agendum, ut & succorum materiam crassiore reddas & cutim densas, & exhalationem inhibeas, quod si ex sententia omnia nobis responderint, etiam carnei his aliquid nutrimenti post alia dabimus, potissimū post quartum diem, Galeni dereco, eodem duodecimo methodi medend. Ex his itaque constat qualiter syncope succurrendum erit: paucae etenim sunt, vel forte neque vna, quæ ex his quæ hic conscripsimus, curari non valeat, modo curari possit.

De lactis defectu. Cap. 56.

ca. 22. in fine.
Cur homini mā
mæ pectori inhæ
reant.
Eodem c. 22. in
prin.

QUAMVIS affectio hæc infantibus magis, quàm mulieribus grauis sit, ex Aetii testimonio cap. 33. lib. decimi sexti, & propterea conuenientis fuisset alio loco de ea pertractare; tamen quia hic de affectibus in spiritus instrumentis ortis sermo nobis institutus est, in quibus certè thorax, & cor existit; ob id quoque & māmillarum affectum non ab re quoque meminimus; ut quæ incumbant thoraci, & cor contegant, Galen. teste. 7. de vsu partium, postquam de reliquis instrumentorum spiritus ac cordis affectionibus verba facimus. Merito autem pectori homini māmæ inherant: nam aptissimus omnium hic ipsis locus est, tum propter alios vsus, quos Gale. eodem. 7. de vsu part. connumerauit, tum etiam quod in eo loco in mulieribus copiosissimum benigni alimenti superfluum colligi potest, lac videlicet, cuius causa

causa extiterunt: nam hanc primam, ac maximam animalibus (vt ipse inquit) præbent vtilitatem: quod quidem cum vtilis alimenti superfluum sit, cibus exacte confectus, in eo potissimum loco constituere eas conueniebat, vbi facile simul, & citissime elaborati lactis copia perfecte consistere poterat. Nam cum tenera adhuc sunt, atque imbecilla recens nata animalia, edulia solida nõ dum possunt conficere: & ob eam certe causam natura, perinde ac si vtero adhuc gererentur, alimentum ex matre ipsis comparauit pro conceptus nutritione, vt decimo quarto de vsu partium decretum reliquit Galen. Hoc siquidem alimentum nihil aliud est, quàm quædam veluti superfluitas nutrimenti partis ipsum generantis, similis quidem naturæ ipsius existēs: Qua de re cum quidam in mammis adenes existant, vim habentes, id quod ad eos influat alimentum alterandi, ac sibi ipsis assimilandi, quoniam exangues, & albi hi sunt proprium efficiunt humorem talem, qualis est lac, & plus talis efficiunt, quando plus alimenti defertur ad ipsos, Galeni sententia commento aphorif. 39. 5 lib. cum itaque humor hic, qui veluti superfluitas alimenti est ipsarum mammillarum generantium ipsum quo conceptus ex eo nutriatur, vt retulimus, vel admodum exiguus existat, vel omnino deficiat, lactis defectum appellamus. Quod vero in hac affectione mamillæ afficiantur, ex his, quæ diximus liquet, cum principem ipsæ vsum, qui gratia generationis lactis existit, vt paulo ante dictum est, non præstent, potissimum tempore, quo præstare debent, de quo modo loquimur. Est autem id a partu, quando iam fœtus natus fuerit totoq; lactationis tempore: etenim mirabili quadam arte natura fecit, vt mamme maximum habeant cum matricibus consensum. Nanque cum partes vtrasque ad vnum opus obeundum comparasset, ipsas per vasa coniunxit, modo quo Gal. declarauit libr. septimo, & 14. de vsu partium, ac libr. de ven. dissect. partim quidem ex partibus, quæ sunt supra phrenas ad inferna deducendo, partim ex inferioribus sursum: Necessè nanque erat has particulas per vasa coniungi vt quando in matricibus fœtus augeretur, ac conformaretur, illi soli venæ communes ex vtriusque alimentum affundant: quando vero natus fuerit, mammis rursum alimentum totum affluat. Quo fit, vt lac menstruo germanum esse inquit Hippoc. & quod eodem tempore menstrua belle procedere nequeant, & fœmina lactare, vt Galen. asserit: Ad hæc lib. quinto de simplic. medicamēt. facultat. dicebat. Proinde quibus menses mediocriter feruntur, iis lac in mamillis non colligitur; quibus vero hoc large suppetit, iis plane menses supprimuntur. Hoc itaque tempore, ac reliquo toto quo mulier lactauerit, si lac deficiat, mamillas affectas esse non ab re fatemur, siue per essentiam, siue per consensum affectæ sint. Earum vero affectus symptoma est in genere retentorum immodice: nam (vt inquit Gal.) commento præd. aph. 39. 5 lib. hoc commune est omnibus animalis partibus, quæ aptæ sunt humores aliquos vtilis generare, aut partibus alij, aut generis propagationem; aut conceptus nutritionem, esse humorem illum, quandam veluti superfluitatem alimenti partis ipsum generantis. Nam quantum alimenti ab ipsa parte alterati fuerit nutrito corpori exquisite assimilatum, illi apponitur parti, ac nutrit eam: superfluum uero derelictum similis quidem naturæ partis humor existit; uerum eiusdem partis ueluti excrementum est: cum autem hoc excrementum deficit, non ab re dicimus affectionem hanc contineri in genere excrementorum contentorum immodice. At quoniam lactis materia sanguis est in venis contentus, quantitate, ac qualitate contemperatus, tum ab aliis partibus transmissus, tum etiam a mammis ipsis attractatus, ut 5. de simpl. med. facult. est uidere: propterea non ab re ipsum sanguinem contemplari, eodem loco præcipit Gal. quo prompte inueniatur causa paucitatis, aut omnino defectus lactis. Nanque inuenies quod aut paucior est, quàm conueniat, aut deterior,

Quid sit lac.

cap. 8. in prin.

Quid intelligendum sit per lactis defectum. Quæ pars afficiatur.

Li 7. de usu par. c. 22.
14. de usu part. c. 5.
De uenarū dissect. c. 5, & 8.

c. 22. post prin.

Quis affectus præter naturam sit defectus lactis.

Qua uia inuestiganda sit causa defectus lactis.
c. 22.
Eodem lib. 5, c. 20.

Signa si ex sanguinis defectu
proveniat.

Cap. 21.

Si vitiosus sanguis causa fuerit, signa.

Curatio, si ex defectu sanguinis proveniat.
Cap. 22.

Loco citato,

Lactis temperamentum.
Loco citato,

Cap. 17.

ut ipse inquit: paucior autem esse poterit, vel quod in toto corpore exiguus affuerit sanguis; vel quod licet exiguus in toto non fuerit, parcius à mamillis attrahitur: id autem interstinguere poteris ex totius corporis temperamento, ac habitu sicciore existente. Ex immodicis item sanguinis, aut aliorum humorum euacuationibus precedentibus, vehementibus exercitijs, laboribus, vigilijs, fame, mœrore, vel solitudine, aut arida, æstuanteque febris, vel id genus alijs: quæcunque plusquam expediat, corpus desiccauerint, ac calcecerint: hæc enim sunt, quæ inter alia lac lædunt, ipsumque provenire prohibent, ut legitur apud Galen. eodem libr. quinto de simplic. medicament. facult. nedum sanguinem ipsum minorem reddentia, sed partim etiam qualitatem ipsius vitiantia: quam suis & immodicè refrigerantia huiusmodi quoque nature sint. Si vero hæc non adsint, inspexeris autem aridas, macilentas, ac graciles mamillas ipsas, ob propriam earum imbellicitatem, ac aridam intemperiem provenire lactis defectum conicere poteris, utpote quæ non valeant tantam, quanta indigent pro lactis generatione, sanguinis copiam attrahere. At si propterea quod sanguis deterior, seu vitiosus fuerit, lac ipsum deficiat, utpote biliosus, aut pituitosus, vel melancholicus existens, id tum ex lactis colore, tum substantia, & sapore potissimum interstinguere poteris, præsertim si non omnino defecerit, non tamen posthabita cognitione temperamenti, habitusque totius corporis, & ætatis. Nanque si biliosus fuerit; præter eius tenuitatem, ac flauitiam, amati quodammodo saporis lac erit, aderitque temperamentum biliosum, habitus gracilis, ac ætas florens. Si vero pituitosus sanguis fuerit, crassioris substantiæ, albi aut pallidi coloris, acidi saporis, odorisque lac existit; lactantisque temperies, habitus, ac ætas pituitosi quoque erunt, quem admodum si vehementioris fuerit spissitudinis, ac paucitatis, obscuriorisque ac quodammodo nigri coloris lac ipsum, & reliqua, quæ diximus melancholica fuerint melancholicum quoque sanguinem adesse significabunt. Hæc tamen affectio quamvis infantibus magis, quam mulieribus gravis sit, ut diximus, non propterea despicienda erit, cum absque aliquo eiusdem mulieris præter naturam affectu etiam gigni non possit: quapropter ubi imminuitur lac, aut omnino extinguitur, vel corrumpitur, aut spissatur, vel attenuatur; præstat quidem alterius nutricis lac præbere, quemadmodum Aetius præcipit libr. quarto cap. 6. Sin autem id non permittat res aliqua instans, victu nutrix curanda est, ut ne in morbum incidat infans, ut ipse inquit; ac ipsa sibi quoque meliorem vindicet sanitatem. Itaque si lactis defectus ex sanguinis paucitate proveniat, uniuersam victus rationem mulier exposcit humectantem, & excalfacientem, Galen. teste, 5. de simplic. medic. facult. Similia item & medicamenta, siquidem quæ non desiccant, & modice excalfaciunt, lacti generando utilia sunt: ac merito dicta sunt lactis procreatricem habere facultatem; quamvis ea numero sint per quam exigua, ut idem Galen. inquit. Nam lactis, velut etiam seminis effectrices facultates partes in medicamentis duntaxat, partim in alimentis consistunt: in medicamentis, tum succos pituitosos excalfacientes in sanguinem vertimus: in alimentis autem, secundum totius substantiæ similitudinem; ubi videlicet boni sint succi, & humida, ac tepide calida, ceu est ipsum lac medium habens temperamentum, quo ad colorem attinet, pituitæ, & sanguinis: licet non æque ab utroque absit, sed longius abest a pituita, propius autem accedit ad sanguinem, ut eodem quinto de simplic. medic. facult. liquet; id quod etiam patebit, si eiusdem triplicem diuersam substantiam, ex qua componitur, considerabis, primam quidem crassam, ex qua caseus conficitur; alteram pinguem, ex qua butyrum; & tertiam aqueam, quam serũ nuncupamus: nam ex hisce, pinguis maxime temperata est; crassa vero paulum ab ea declinat; aquea autem frigida, & humida est, ut idem Gal. testatur quarto de simplic. medic.

medic. facult. Quapropter alimentum augere, & melioris succi cibos dare oportet: panem videlicet optimum, gallinarum, pullorum gallinaceorum, ac columbarum iuuenum, perdicum, & phasianorum carnem, hædorum, vitulorum, & castratorum, insuper & oua recentia, præsertim sorbilia. Ex fructibus vuas passas, amygdalasque dulces. Pro potu vinum, aut aquosum, aut flauum, tenue, moderate aqua dilutum, vel vinum dulce potui tribuatur, ac sorbitionibus utatur, vt Paulus iubet, lib. 1. ca. 4. Caueant exercitium immoderatum: verum sudoriarum partium exercitijs uti possunt; vberumque frictione moderata, ac fomentis per spongas, Aetio teste. Vitent animi affectus immodicos, mœstiam præsertim. Medicamenta vero, & si lacti generando proficere aliquid possint, non tamen frequenter ipsis uti, præcitato loco præcipit Paulus; eorum tamen quibus uti poterunt in fine mentio fiet. Si vero quia deterior sanguis sit, propterea lac deficiat, siquidem biliosus fuerit sanguis, primum purgationem desiderat, mox victum, quem modo dicebamus, vt eodem lib. 5. de simpl. med. facul docet Gal. Eligatur autem purgans medicamentum, quod leuiter bilem expurgat, ac non exsiccat; veluti est manna, casia fistula, syrupus ex pluribus infusio. violarum, aut rosarum, tum rubearum, tum persicarum; prius tamen syrupum exhibens ex succo intybi, aut borrag. vel ex infus. ros. vt facilius bilius expurgetur. Pari quoque ratione nigra bilis, si ea causa vitiosi sanguinis fuerit, ac defectus lactis, expurganda erit medicamento, quod talem vim habeat, nec tamen exsiccat, veluti est diacatholicon, seu syrupus domini Augustini, si cum manna, aut casia fistula ea permisceas. Verum si pituitosus fuerit sanguis, medicamenta requirit, Gale. teste ex calfacientia aut primo, aut secundo ordine, non tamen desiccantia: nam hæc pituitosos humores ex calfacientia, in sanguinem vertunt; & non ipsius sanguinis humorem depascunt, ac ipsum crassiores simulque pauciores afficiunt, vt ea quæ desiccant. Verum inter ea potiora sunt, quæ non tantum sunt medicamenta, sed & nutrimenta, vt ipse inquit; velut eruca, fœniculum, anethum, cum etiamnum virentes, & humidæ fuerint; nam siccæ plusquam oportet ex calfaciunt, & desiccant. In hunc etiam usum conferunt, smyrnium, apium, syon, & polium; eaque virentia, priusquam siccetur, ex eiusdem Gal. sententia. Similiter etiam confert fœniculi radix, & semen, ptisanæ incocta, ex Pauli testimonio, item cytisi folia ex vino nigro, aut ptisana, melanthium dulce, & anethum, pastinacæ radix, atque semen, quæ calida prius irrorato ad mouenda sunt, vt ipse Paulus refert. Confert quoque lini semen cum melle delingere, vt inquit Aetius, aut sesamum crudum cum vino dulci. item naturaliter facit lapis galactiles dictus pro amuleto alligatus, & aqua dissolutus, ac potatus, vt ipsemet fatetur Aetius lib. 16. cap. 33. intestina quoque terræ, si quinque, aut septem teras, aut plures, ac cum duobus, vel tribus recentibus gallinarum ouis decoquas, pauco fœniculo, aut anetho addito, atque ex his ferculum parabis, non parum ad multitudinem, ac bonitatem lactis comparandum confert. Similiter etiam si ea prius vino albo abluta in puluerem redigantur: & cum vino dulci 3. ij. vel ij. prædicti pulueris exhibeas. Ex Hippo. lib. 1. de morb. muliebribus habeatur: quod si lac fuerit extinctum, porrum tritum, & aqua dilutum bibendum dandum erit; calida mulier lauetur, & brassicam edat, sed & cytisi folia simul coquat, & succum sorbeat; bibat etiam fœniculi succum, seu semen, & de radicibus fœniculi, & hordeum molitum, ac butyrum simul coquito, frigefacito, ac bibenda præbeto: bonum est & hippomaratum, & hipposelinum, & cytisus: hæc omnia (vt ipse inquit) simul multum lac faciunt, & augent: viticis item fructus in vino bibendum dato; & betæ succus potatus, multum lac facit; nasturtium in vino potum commodum est, eodem auctore: hæc eadem ferè confirmavit lib. de natura muliebri.

Vitus ratio.

Citato l. 4. ca. 6.

Cap. 21.

Si ex deteriori sanguine prone. niat lactis defectus, curatio.

Qualia medicamenta facultatē habent generandi lac.

Loco citato.

Loco citato.

Præcitato loco. Lib. 4. cap. 6.

Pauco ante medium.

Prope finem.

De lactis redundantia. Cap. 57.

CVM lac velut superfluitas quædam alimenti vberum sit, vt paulo ante asseruimus, non sibi re contingit interdum, quando plus alimenti ad ea deferretur, adeo hoc ipsum redundare, vt ex eius ampliori plenitudine mulier grauetur, ac doleat, ita, vt copiam eius ferre nequeat, præsertim cum è mammis non effluat, & propterea intus detinetur. Contingit autem hoc sæpius puerperis, non raro autem & reliquis lactantibus. Talis autem mamillarum affectus facile percipi poterit, tum vñu, & tactu, tum etiam ipsius mulieris sermone. Qualitas vero affectus causa morbi est, in quantitate videlicet, & proprie in excessu, qui ex ipsa prouenit lactis copia, si in mammis detineatur; etenim lactis copia, velut quælibet alia plenitudo, causa morbi erit, cuius iterum causa est boni sanguinis multitudo: quemadmodum è diuerso eiusdem lactis defectus ex partiori, aut vitioso sanguine originem ducit, vt præcedenti cap. diximus: potissimum vero plurimum colligitur lac, oppletis sanguine communibus venis, quæ à mammis pertingunt ad vteros. Euenit autem & id mulieribus vtero gerentibus, ob conceptus imbecillitatem interdum: interim vero cum neque grauida est, neque peperit, sed ei menstrua defecerunt, Hippocr. auctore aphor. 39. & 52. quinti libr. de quibus modo noster sermo non erit, cum de his duntaxat verba faciemus, quibus à partu, aut reliquo lactationis tempore, adeo creuerit in māmillis lac, vt propterea mulieres grauentur, ac doleant; ita, vt metus sit, ne vbera inflammatione corripiantur. Si vero lac multum è mammis effluat, non amplius causa morbi, sed symptoma erit, sub genere excretorum immodice contentum; nec formidandum erit ex eo quempiam præter naturam affectum in māmīs ipsis futurum esse aut fieri: & propterea nec de hac etiam lactis abundantia hic loqui intendimus. Verum huic effectui, de quo modo verba facimus, statim succurrendum erit, alioquin metuendum est, ne mamillarum inflammationē pariat, vel instar casei lac coagatur, seu grumos vertatur: & si vitiatum quoque lac fuerit, mammarum vasa exulcerat, scabiem, panos, & papularum eruptiones quoque producit, vt inquit Aetius. Quapropter vbi imminuere ipsum volest, cibos minus alentes & paucissimos dato, vt ipsemet refert Aetius. Exiguum quoque potum tribuas, aquam videlicet, & non vinum; cauendum nanque ab eo erit. Frictiones, vincula, ac infernarum partium exercitia præcipienda sunt. Cæterum (vt Soranus inquit) vbi mammae assidue doleant, neq; à mulieribus, neq; ab infantibus exigi oportere (nam suctione plus materiæ attrahi asserit) id quod confirmauit Paulus cap. trigesimo quinto, libr. tertij. Nos vero ex Aerii sententia cap. trigesimo quarto lib. decimi sexti, ab adultis, ac peritis mulieribus, quod puerperarum mammae leniter exugantur non negamus, præsertim vñm non immodicè doleant, seu inflammatae sint: effertur nanq; foras leni hac exuctione quod in mamillis lac continetur, neque plus materiæ ad eas trahitur. Et propterea inflammationem per eam fieri prohibetur, potiusque propriatur: in vniuersum autem prohibenda sunt ea, quæ multum, ac optimum sanguinem procreare possunt: & proinde nil præstantius, quam circa initia, si quid non impedierit, poplitis, seu tali venam secare, copiosumque sanguinem ex ea vacuare permittas, vbi vires ferant, ea que iteranda, si opus fuerit. Et si altera mamillarum magis oblecta sit, è directo vena secunda erit; potissimum autem id seruandum erit puerperis, vbi menses detineantur, totisque viribus præter venæ sectionem eos prouocare conandum: nam quibus menses mediocriter feruntur, vt prius diximus ex Galeni sententia, iis lac in māmillis multum præsertim non colligitur. At si non propterea quo menses præter naturam detenti sint, sed

Affectus partes.

Affectus qualitas.

Causa.

Prognostica.

Curatio.
Lib. 16 c. 36.
Lib. 4. c. 6.
Vitus ratio.

Vena sectio.

Lib. 5. de simpl.
med. fac. c. 21.

sed quia in toto corpore sanguinis redundantia adsit, lactis quoque copia immodica oriatur, media, quæ in cubito est vena, aut interna primo secunda erit, & prout vires fuerunt, sanguis extrahendus: deinde tali quoque vena incidatur, & eis, quæ modicè repellunt vtare; potissimum vbi lactis redundantia nõ fuerit à partu. Quapropter spongia pura, molli posca è gelida imbuta, expressaq; super mammas fasciis accommodanda erit, vel palmulæ cum pane, at posca trite, deinde vincire eas, ac moderatè constringere oportet, iuxta Aetij, & Pauli sententia; vel ouo toto cum rosaceo vtendum erit, aut linteum aceto imbutum imposito, & assidue humectato; vel lentes aqua marina coquito; & cū decocto quidem mammas abluito; ipsas autem lentes contrusas imposito; aut myrti etiam decocto ipsas perfundito. Quod si lac omnino restringere malueris, alumen, & psyllium cum aceto, & coriandri succo, ac rosaceo adhibeto, ex Aetij testimonio. Poterit quoque portulacæ succus cum fabacea, ac leniũ farina adici, vel ex cremore fœni græci seminis lini, & altheæ cum succo coriandri, aut portulacæ, farina hordei, ac lentium, adiectis oleo rosaceo, aceto, ac cera medicamentum paretur, quo mamme illiniantur. Cuminum quoque cum aceto illinitum, eodem Aetio teste: similiter cuius decoctum cum modico croco oblitum, aut fœni græci succus cum apio viridi, mentha, aut ruta, farina lentium, rosaceo, ac posca imponatur. Quod si neque his lac imminuatur, vel restringatur, aut si à partu lac omnino restringere malueris (id quod assidue huius ciuitatis mulieres, nobiles præsertim, ac diuites expetunt, cum lactare nolint, ac nequeant) non amplius eis, quæ repellunt, ac reprimunt, sed quæ ipsum exsiccant, ac digerunt medicamentis, tanquam tutioribus existentibus vtendum erit; adhibitis tamen prius per vincula, cucurbitulas, frictiones, seu venæ tali sectionem, diuersionibus, prout postulabit vsus. Huius autem generis medicamenta, quibus vti consueui, hic conscribam; quibus veluti miraculo quodã cunctas, quæ ad manus meas peruenerunt, perpetuas adeo feliciter curauit, vt lac omnino e māmīs extinxissem, Illud cogi, & casari non permittens, ac à futura inflammatione penitus mammas liberaui. Excipio autem fœniculi, apii, oreoselini, maluarum, & altheæ cum radicibus, cuiuslibet. p.i. foliorum lauri, & florum chamæmeli, singulorum m. ss. quibus in aqua arte decoctis, ac in largiori vase proiectis, testis de super panno lineo māmīllis, eas fouere præcipio; de in eodem decocto, māmās abluere, ac post ablutionē rosaceo, omphacino illinire, quo tempore, vt leniter quoque exugantur permitto, vt reliquum quod in māmīs continetur lac fusum, ac liquatum promptus foras effluat, nec materia aliqua ad eas trahatur. Resinē terebinthinē deinceps quantitatem, quæ satis sit, assumens, vino albo, & odorifero, ac aqua rosacea sæpius abluere iubeo, cui duo, aut tria oua tota, ac croci scrup. i. adicere permitto, & in emplastr. formam. seu cerati, cera addita redigis; quod super lineo linteo, eoq; crasso extensum, perforato tamen in duabus partibus, ex quibus māmīllarum papillæ extra prominerent possint, imponi, ac fasciis circumligari moderateque constringi præcipio. Singula autem dicta iterari facio bis saltem in die, mane videlicet, & vespere, ante cibum; ita vt prius mamme foueantur, abluantur deinceps, & illiniantur exuganturque leniter, & demum emplastrum prædictum imponatur, & fasciis moderate constringantur, ac ligentur.

Localium medicamentorum ratio.

Aet. li. 16. c. 35.

Pau. lib. 3. c. 37.

Cirato lib. 15. cap. 35.

Lib. 4. c. 6.

*Medicam. lac
castringens ab
Aetio. v. p. 16.*

De lacte in casei speciem seu grumos conuerso.

Cap. 38.

Lib. 3. cap. 35.

Affectus.

Causæ.

Si ingrumos cō
crescat, causa ef
ficiens.Si instar casei
coaguletur, cau
sa efficiens.Li. 8. de loc. aff.
cap. 3. collige.Li. de cib. boni
& mali succi,
cap. 4.Lib. 5. de simp.
med. facu. c. 12.Pauli. li. 3. c. 35.
Aet. lib. 15. cap.
34 & 35.

Prognostica.

Curatio caseati
lactis.

Lib. 16. cap. 35.

ACCIDIT etiam plerunque à partu præsertim, Paulo teste, vt lac in mamillis casei modo coaguletur, seu in grumos concreascit; neque enim idem est, vt nonnulli sentiunt, lac in casei speciem coagulari, & idem in grumos coire; neque omnino in causis generationis iidemmet affectus conueniunt, vt dicemus: Ambo autem morbi in numero, seu magnitudine dici possunt, cum in quantitate comprehendantur, atque in excessu eiusdem: vtrumque quoque vitium cum facile tactu, ac ægrotantis sermonibus comprehendendi possit, haud aliis pro eius dignotione indiget notis: Ex lactis item copia, vel eiusdem crassitie, tanquam ex materia originem ducunt affectus ambo: Vtrum autem eorum causa sit, prompte dignoscere valebis ex indiciis abudantiae lactis, si ea causa extiterit; aut ex eiusdem lactis crassitie, modo ex ea excitentur. Itaque siue crassum fuerit lac, siue multum indifferenter in casei formam redigi potest, aut in grumos conuerti, tum ex immodica mamillarum caliditate, tum ex immoderata earundem frigiditate, velut efficienti causa, prima siquidem exsiccando, ac secernendo id quod tenue, ac seorsum in ipso consistit: reliqua vero adstringendo, ac cogendo vniuersam eius substantiam; in grumos tamen cōcrescere ipsum nequaquam à caliditate valet, sed à frigiditate duntaxat, quemadmodum extravasatus sanguis, veluti nec instar casei coagulari, nisi à caliditate poterit, vt Galen. auctoritate mox probabimus, & si plerique etiam, qui Galen. doctrinam profitentur aliter sentiant. cuius nanque constat, lac, non alio modo, quam sanguinem in grumos conuerti at is non nisi vbi extravasatus, frigefactus fuerit, in grumos vertitur: & propterea æger frigore exoluitur, ac penè exanimatur; pulsusque, imminuitur, ac frequens apparet, & denique male se habet, ex eiusdem Galen. testimonio 6. de loc. affect. & lib. de cibi boni, & mali succi, ac commen. apho. 20. 6. lib. Quod vero lac coagulari, nequeat, nisi a valido calore, apud eundem liquet 5. de sim. pli. med. facul. indiget nanque vt coaguletur, quod serosum eius, ac tenue seorsum fusum segregetur, quod vero crassum in eo est, in sese coeat: id autē (vt ipse inquit) absque valido calore peragi nequit: cuius quoque naturæ esse debet ea, quæ vrinam ciunt: nempe ex calfactoria, exsiccatoriaque; tum etiam secretoria, & coactoria. Illud idem confirmarunt Paulus, & Aetius, diuersam instituentes curationem, ac alia medicamenta, pro lactis caseatione, & pro eiusdem in grumos conuersione: à frigore itaque lac grumescit, & à calore casei modo cogitur, vt patet ex dictis: Quomodo autem intertinguere valeas concretum, ac grumescens lac à frigida intemperie, aut ipsummet casei modo coactum ab intemperie calida, non opus est, vt hic conscribam, cum cuius prompte ex earundem temperierum propriis signis conicere poterit. Id vero haudquaquam prætereundum est, quod nisi quam primum grumescens, seu caseatum lac curetur, aut inflammationem pariet, aut mammarum exulcerationes, præsertim si vitiatum lac fuerit. Qua de re vbi ipsum ab immodico calore caseatum sit, victus ratione ad frigidum inclinante instituta, eisdem ferè medicamentis, præsertim circa initia vtendum erit; quæ in præcedenti capit. conscripsimus, Pauli, & Aetii auctoritate. Priuatis autem deinceps (eodem Aetio teste) conferunt furfures in aceto concocti cum rutæ decocto supra mammas impositi: idem facit mentha polentæ admixta, & iuglans cum ruta, ac melle, vt ipse inquit. Cuminum item priuatim, vel cum polenta, & crocus cum lacte, ac muræ fomentum, & apium viride impositum (quod etiam grumos lactis dissoluit) magnopere conducunt, ut apud eundem Aetium legitur, cap. 35. lib. 16.

35. lib. 16. Folia item folani, seu halicacabi cum brassicæ folijs, si contendantur, pauca myrrha, ac croco adiectis & exiguo aceto nō minus conducunt. similiter si ex fœni græci, seminis lini, & althææ decocto cum oleo violaceo, & exiguo aceto epithemata fiant: Properit quoq; si mentham contundas, & cum hordei, ac fœni græci, althææ. & seminis lini farina, oleo rosaceo, ac pauco aceto permisceas, & superimponas. At vbi in grumos conuersum lac fuerit, victus ratione vtendum extrenuante est, ac ad calidum inclinante: similibus quoq; medicamentis; in quem vsus lentes aqua marina, aut muria decoctæ, si eisdem vtaris, quæ admodum præcedenti cap. dictum est; aut etiam cumini decocto cum modico croco, haud exiguum afferent vtilitatem. Paulus vero cap. 35. lib. 3. pane ex hydrelæo, aut mulso, aut cum perdicio herba viridi vti consuluir. Similiter superfusione calentis olei dulcis, aut fotu calidæ aque, vel decocto fœni græci, althææ, seu apij māmillas fouere iussit: In talem item vsus, chamæmelum, fœnum græcum, althæam, ac anetum eligas. Delinire vero māmillas conuenit, (vt ipse inquit) polline farinaceo cum semine lini, aut fœno græco cum hydromelite, aut etiam sesamo, quod cum melle, aut butyro sit leuigatum. Poteris insuper tritici farinam cum surfure eisdem permiscere, oleis quoque amygd. dulcium, chamæmelino, aut anethino, māmillæ inungendæ sunt. Coagulum quoque leporinū, præsertim si cum pauco aceto, butyro, aut aliquo prædictorum oleorum illinatur, in gumos conuersum lac summopere dissoluit: nam, & in ventre concretum lac curat, Galen. auctore lib. de med. paratu facilibus, in sine: potum cum vino coagulum, & cum aceto simili modo epotum, nedum lac, sed & sanguinem in ventre concretum dissoluit, vt patet 10. de simpl. med. facult. Betæ item folia si tandiu oleo fuerint incocta, quoad intabuerint, cum pane, & fabarum farina, paucoq; oleo sesamino, ac cera permista, & imposita, conferunt.

Lactis i grumos
conuersi curatio,

cap. de coagulo,

De mammarum inflammatione.

Cap. 59.

SI C V T cæteræ corporis partes, ita quoque vbera interdum inflammari solent, illud tamen præter reliquas peculiariter habent, quod nedum ex confluente ad ea sanguine, verum etiam ob lactis copiam, aut eiusdem casei instar coagulationem inflammatione affici consueuerunt. Quibus inflammatis non admodum laborare oportet in tradendis signis, pro eiusdem affectus, ac partis affectæ cognitione, nam facile ad sensum patebunt. Verum cum eiusdem inflammationis gemina causa esse poterit, sanguis inquam, aut coagulatum lac, prima causa quouis tempore ipsam excitare valet, & proprijs indicijs prompte dignosci; reliqua vero non nisi puerperis, aut vtero gerentibus, seu quibus menses detenti fuerint præter naturam: vno etenim iam trium dictorum modorum mulieris lac in māmillis habent, ac abundantius habent; interstringens autem id, tum ex præcedenti lactis abundantia, tum etiam ex eiusdem coagulatione: ex quacunque vero causa māmillarum inflammatio fuerit excitata, non spernenda erit eius curatio: Nam cum laxior, ac adenosa earum substantia sit, nec multum obtineant innatum calidum, metus erit, ne in scirrhum tumorem, & demum in carcinosum vergat, aut ea suppurata, ac ad abscessum progrediente, exedens vlcus consequatur. In curandi autem ratione, prius recta victus ratione instituta, obseruandum primo erit, vt si ex confluente sanguine, aut etiam ex lactis coagulatione, mensibus præter naturam detentis inflammatio fuerit excitata, sanguis mittatur, ex eiusdem lateris vena tali; potissimum si detenti menses fuerint, aut ex interna, vel media similiter eiusdem cubiti vena; & (si opus fuerit) non semel duntaxat, sed bis, & ter vena secunda erit. Insuper à venæ sectione, purgante medicamento vta-

Partis affectæ,
& affectus co-
gnitio.

Causæ.

Prognostica,

Curatio,

Venæ sectio,

Purgatio,

re,

Topica qualia
esse debent.

Lib. 16, cap. 37

Cap. 8.

re, eo tamen quod leniendo purgat, velut manna, casia fistula, saccharum violaceum; & interdum prædictis antidorum diacatholicon addere poteris. Post hæc ad ea, quæ reprimunt, seu repellunt medicamenta, non tamen valida con fugiendum. Tutius autem eis uti poteris, si quæ digerendi vim habent medi camenta, cum eis permisceas, in quem usum maxime conuenit, si madefa cti lintei ex aceto vini albi cum gelida aqua mammis imponantur, ac pluries ite rentur: Aut paretur decoctum ex floribus chamæmeli, cui æqualis portio olei rosacei, & pauca quantitas aceti albi admisceatur, & similiter vtare. Vel exci pe succi solani, & olei rosacei, singulorum vnc. ij. aquæ, in qua fœni græci, flo rum chamæmeli, & seminis lini ana. 3. iiii. fuerint decoctæ, vnc. iij. aceti vnc. j. s, misceantur, & mamillis (modo iam dicto) impone. Vbi vero inspexeris præ dicta medicamenta parum admodum conferre, potissimum transacto inflam mationis initio, ad ea, quæ magis digerunt, ac discutiunt progrediendum erit: quapropter hoc medicamento vtitor. R. florum chamæmeli, mellioti, fœni græ ci, althææ, seminis lini, & anethi, singulorum manip. j. ebulliant in iustæ quan titatis aqua; deinde adde olei rosacei, & chamæmeli aut anethini, vtriusque vnc. ii. aceti albi vnc. i. & madefactis in eo spongiis, aut linteis lineis, mammis sæpius imponantur. Ex farina item fabrum, fœni græci, & seminis lini, ac hor dei, & pane contrito, in aqua decoctis cum oleo sesamino, & anethino, additis duobus vitellis ouorum, & croci, ac myrrhæ ana scrup. i. emplastrum formari poterit, ac mammis superimponi. Vel ex radicibus, ac foliis althææ decoctis, seminis lini, ac fœni græci farina, cum oxymelite medicamentum paretur, ac vtitor. Sesamum quoque tritum, butyro admisto, moderateque reperfactū quo tidie bis impositum commendauit Aetius. Similiter si medullæ panis aqua ma defactæ, ac tritæ partes duas assumpseris, & perdicii herbæ tusæ partē vnā, ac cerati liquidi partem vnā, & dimidiam, simulque permisceas, & bis in die imponas, auctoritate eiusdem conducat. Si vero discuti inflammatio haudqua quam valeat prædictis medicamentis, ac reliquis similiter, discutiuntibus sæpius adhibitis: pro eiusdem suppuratione auxiliari conuenit, calida, ac humi da temperate medicamenta adhibens, quæ emplasticam quoque vim habeant; hæc nanque maturationi, ac suppurationi opitulantur, Galeno teste 5. de sim plic. med. facult. quo loco vberem eorum materiam reperies. Inflammatione autem in pus transmutata, ad eius disruptionem deueniendum erit, ferro, aut medicamentis acrioribus. Verum si ad duritiem inflammatio vergat, ea, quæ molliendi vim habeant, adhibere cōuenit; in quem usum laudauit Aetius cap. 38. lib. 16. semen lini, aut fœni græci, aceto mulso coctum, & impositum; aut sesamum illorum modice tostum cum melle tritum, & calidum appositū: vel ster cus caninum album terebinthina exceptum superimpositum. Cæterum si ex coagulato lacte inflammatio fuerit excitata, eiusdem circa initia vtendum medicamentis erit, quæ paulo ante, coagulato tacti conferre diximus. Verum si neque eis inflammatio cedat, ad ea, quæ modo commemorauimus, medica menta progrediendum erit.

περί καρδιακῆς, ἢ καρδιακῆς, καὶ καρδιακῆς

id est de cardiaco morbo, & cardialgia, seu cordia dolore. Cap. 60.

5. de loc. affect.
cap. 6.
6. de loc. affect.
c. 1. in prin.

CVM iam tempestiuum sit de ventriculi affectibus pertractare, non ab re fuerit ipsum primo in duas, easq; maximas, ac præcipuas partes se care, quemadmodum mos est apud omnes, medicos præsertim Galen. li. 5. & 6. de locis affe. quarum vna, quæ superior est, gulæque cōtinua ex multis

multis nervis sensificis est contexta: altera vero quæ huic continuatur, ad intestinorum usque exortum extenditur. Vtraque autem earum in animalibus proprio fungitur munere, ac pro utilitatis differentia, cum earum quælibet læditur, diuersa eis euenire consueuerunt symptomata, quanquam interdum similibus quibusdam afficiantur affectibus. Cæterum proprium munus primæ partis) quam os, seu ventriculi ostium nuncupant) est ciborum appetentia; quemadmodum reliquæ (quam eiusdem ventriculi spatium, seu cavitatem appellare solent) eorundem ciborum concoctio. Prioris itaque partis nos primo præter naturam affectus conscribemus, deinceps autem & alterius, hoc est cavitatis eius, quam primam partem græci diuersimode appellare solent, nam interdum καρδιά, hoc est cor, propter symptomatum vehementiam, quæ inducere videtur similia eis, quæ proueniunt ex eo viscere, quod sua natura pulsatur. ac in thorace continetur, dum afficitur, & proprie cor appellatur, nominant, veteres præsertim, ut liquet quinto de loc. affect. primo de caus. sympto. 2. de Hippocr. & Plat. dec. & commen. aphor. 17. & 6. quarti libr. Interim vero non καρδιά sed στομαχός consueto nomine, non vetustis duntaxat Philosophis, sed medicis etiam nominatur, eodemmet Galeno teste præcitato primo lib. de caus. sympto. & 8. de compos. medi. secundum locos; Quanquam στομαχόν proprie eam partem (quæ inter fauces, & os ventriculi media est, quæ etiam veteres græci usque ad Aristotelis sæculum αἰσθητήριον nuncupabant) post eum appellare consueuerunt. Latine autem gula dicitur, ut patet eodem 5. de loc. affect. nonnunquam tamen os ventris ita vocant, ut 13. method. medend. legitur, non solum medici, ut idem Galen. inquit 3. de loc. affect. verum etiam & homines vniuersi vulgo sic nominant, ut eodem 1. de caus. sympto. liquet, Celsus vero per stomachum quandoque intellexit gulam, interim quoque ventriculi inferiorem partem sic nominat, ut videre licet apud eundem li. quarto cap. 1. verum quicquid sit de huius particulæ nomenclatura, quam nos ventriculos, seu ostium appellauimus, nonnullis præter naturam affectibus conflictari ea solet, ut patet citato lib. 5. de loc. affect. innumeraque & varia symptomata hominibus, ubi offensionem acciperit, in ferre consuevit ex Tralliani sententia cap. 5. lib. septimi. At cum in ipso quidam oriantur affectus, consentientibus ei quibusdam aliis partibus, præsertim principibus, corde videlicet, aut cerebro, corde siquidem propter exactam, quam habet sentiendi vim, ac eius cum corde vicinitatem: cerebro vero propter magnos, quos suscipit molles nervos per sextam coniugationem ab eodem cerebro ortam, ob quam etiam causam os ventriculi sensu acutissimo præditum est, ac deficientis alimenti præter cæteras quasque partes exactissimam sentiendi facultatem habet, ita ut nullum membrorum, aut ita exactum habeat sensum, aut ita vtrunque principium vna secum afficiat, sicut os ventriculi, ut patet 1. de caus. sympto. quidam vero ipsi peculiare sunt, ac ad propriam eius rationem pertinent, ut eodem lib. 1. de caus. sympto. & 5. de loc. affect. scriptum est: Nos primis derelictis, ex quibus os ventriculi cum affectum sit aliarum particularum actionibus nocere consuevit (ut diximus) eos aggrediamur eiusdem oris ventriculi præter naturam affectus, qui eidem proprii sunt, & peculiare, ab eoque nostram exordiemur orationem, qui ualde molestus esse uidetur, adeo, ut cum augetur etiam propter eius (ut diximus) exactissimum (quem habet) sensum, cor ad consensum trahatur, ac eidem noxam transmittere uideatur, & si tunc stomachicæ syn copæ fieri debeant, & non is affectus, de quo modo mentionem facimus, qui ab altera eius appellatione nomen sortitus est, ut liquet primo de caus. sympto. cuius affectus adhuc apud ad Græcos tres diuersas reperio denominationes, nam interdum καρδιαλγία, interdum καρδιωγμός, quandoque καρδιακή dicitur: pro quo animaduertere dignum est, quod hæc tria nedum nomine discrepant

5. de loc. affect.
cap. 6.

1. de caus. sympto.

c. 7. in prin.

2. de Hip. dec. 6.

8. in prin.

1. de caus. sym.

cap. 7.

8. de compo. me.

sec. loc. cap. 5.

9. de loc. affect.

ca. 5. in prin.

13. met. c. 17. in

fine.

1. de caus. sympto.

c. 7.

5. de loc. affect.
cap. 6.

1. de cau. sym.

c. 7.

1. de cau. sympto.

Loco citato.

5. de loc. affect.

cap. 6.

1. de cau. sym.

Loco citato.

καρδιαλγία.

καρδιωγμός.

καρδιακή.

Quomodo in-

ter se differant.
cap. 2.

καρδιαλγία
quid sit.
cap. 8. 5

i. de usu par. c. 4
in medio.
2. de Hip. deer.
cap. 8.

καρδιαγμός
quid sit.

καρδιακή
quid sit.

Quæ pars in eis
afficiatur.

Concluditur eo
rum differētia.
cap. 7.

scripant (vt cuique patet) verum etiam & re ipsa, vt ostendemus, (quamuis quidam aliter sentiant.) Nam *καρδιαλγία* nomen assumens (vt Galen. inquit secundi metho. medend.) à parte affecta, & affectu ipso ex *καρδία* inquam tanquam parte, & *αλγία* tanquam affectu cordis dolorem significat: verum tamen nequis decipiatur, cordis cum dicimus non illius cordis, quod in thorace continetur subintelligi volumus, sed oris ventriculi, quemadmodum passim liquet ex Galen. doctrina, & potissimum in præcitatis locis; nanque huius cordis, hoc est oris ventriculi affectio est *καρδιαλγία*, vt ab eodem Galeno. decretum est secundo de Hippoc. & Plat. dec. & non alterius, neque iterum omnem oris ventriculi dolorem *καρδιαλγία*, seu cordis dolorem appellamus (vt quibusdam falso visum est) sed illum tantum (vt ipse inquit) qui fit, cum acrimonia humorum proritat, ac ipsum mordet, & proinde quinto de usu partium *καρδιαλγία* esse dicebat, mordacitatem oris ventriculi. Accidit vero (vt eodem 2. de Hippoc. & Plat. decr. patet) affectio hæc nedum ægritudine vexatis, verum etiam iis, qui diutius paulo ieiunium tolerarint, præsertim cum vehementi exercitatione fatigati cibum nullum assumpserint, quemadmodum etiam & morsus hic in mœroribus sentitur, efficit nanque mœror veluti vehementior exercitatio vt flaua bilis in ventriculum confluat, à qua postea irritati, & morsus homines cordis dolore laborant: *καρδιαγμός* vero ex *καρδία*, & *γμός* compositum a Galen. commen. aphor. 17. quarti lib. sic describitur: *καρδιαγμός* est morsus cordis, hoc est oris ventriculi, quare si hoc modo *καρδιαγμός* intelligatur cum *καρδιαλγία* coincidet: verum commen. aphor. 65. eiusdem quarti lib. quorundam autoritate per *καρδιαγμόν* non cordis, hoc est oris ventriculi dolorem intelligi asserit, sed motum quendam ipsius visceris, cordis inquam, palpitationi similem. Qua de re sic ipsum interpretando satis admodum à *καρδιαλγία* dissideret, cum non amplius oris ventriculi, sed ipsius cordis propriæ affectus esset, etenim crebrium, esse et velocem cordis motum, & præcipue palpitationi similem *καρδιαγμόν* asserit. At *καρδιακή* Græce affectus, seu morbus cardiacus latine dictus ex Alexand. sententia cap. 11. lib. septimi, & Celsi ca. decimo nono libri tertii. stomachi quoque vitium est, vt idem Trallianus fatetur, quod quidem accidit vbi humores prauis erodentes, & virulenti in ore ventriculi collecti fuerint, aut eò confluerint. Is autem affectus nihil aliud (vt Celsus inquit) quam nimia imbecillitas corporis, quod stomacho languente immodico sudore digeritur: lib. vero de finitionibus medicis scribitur, quod cardiaca dispositio est in nati caloris labefactatio, & languor. fit plerumque conflitante ore ventriculi, & stomacho cum sudoris immodica vi. Verum quod os ventris primum sit quod in ipsis cardiacis afficiatur, per consensum tamen vehementer oblædens cor ipsum, propter vicinitatem ab Aetio scriptum est lib. 9. ca. primo, non tamen adeo vt syncope oriatur Ex his itaque constat hostes affectus quamuis in parte affecta, ac causa quodammodo inter se communicent, tamen inter se ipsos nedum nomine sed re ipsa quoque dissidere. Nam *καρδιαλγία* perpetuo affectus est oris ventriculi, eiusque infestum est symptoma, & ad sensum tactus refertur, à succis mordentibus proueniens, vt patet primo de causis sympto. *καρδιαγμός* vero interim non oris ventriculi, sed eius visceris, quod in thorace continetur, affectum quendam apud quosdam (vt diximus) significat, qua iterum ratione à cardiaco morbo dictas: qui etiam ipse perpetuo est oris ventriculi affectus, veluti paulo ante demonstrauimus ex Aetij, Celsi, & tralliani sententia. Verum enimvero morbus ipse cardiacus à *καρδιαλγία* maximopere dissidere videtur. nam cum acuta, & æstuosa febris euenit (vt Aetius testatur) ac nedum à mordentibus, & erodentibus succis ortum ducit, sed eis venenosis, seu virulentis existētibus, vt Tralliano visum est. Acciditque in eo nimia (vt dicemus) corporis imbecillitas, quod immodico sudore

sudore digeritur, qui sudor supra consuetudinem ex toto thorace, facie, ceruice, atque capite etiam prorumpit, glutinosus: extremis tantummodo partibus, siccoribus, atque frigentibus (Aetio, & Celso testibus) adeo ut propè in synopem incidant taliter affecti. At καρδιαλγία ex acrimonia duntaxat humorum proritante, ac mordente os ventriculi, cum videlicet samme biliosi fuerint, & non ex eorum quoque venenositate, seu virulentia efficitur, sentiunt quoque hunc ventriculi morsum (quem καρδιαλγίαν appellamus) non tantum ægritudine vexari, verum etiam ijs, qui diutius paulo ieiunium tolerarint, præsertim si aliqua vehementi exercitatione fuerint fatigati, pariter etiam & mœrore confecti (ut Galeno visum est, neque adeo immodico sudore digeruntur, aut imbecilliores sunt toto corpore cardialgici, velut cardiaci, fit etiam καρδιαλγία citra febrem, eamque acutam interdum, id quod nequaquam fieri potest in cardiaco morbo, ut diximus. Quantum igitur delirarint, ac Galeni doctrina, & a veritate re cesserint qui καρδιαλγίαν cum cardiaco affectu confundi putarunt, ex iam dictis luce clarius liquet, sed toto (ut inquit) cœlo a veritate lapsi sunt, qui easdem affectiones non ori ventriculi, sed cordi tribuerunt, cum perpetuo in vtrisque affectibus ventriculi ostium afficiatur (ut ostensum est ex Galeni, Aetii, & Tralliani sententia) similiter quoque dicendum, & de καρδιογῶν iuxta Galeni decreta præcitatæ aphorif. decimo septimo, & 65. quarti lib. quamuis interdum quidam velint (ut diximus) per καρδιογῶν cordis affectionem intelligere, de qua non est modo sermo faciendus. Quod vero os ventriculi in eis afficiatur patere poterit ex non nullis indiciis. Nam in καρδιαλγία angor quidam ac dolor cum quodam morfu, ac rosione sentitur in inferioribus thoracis partibus proprie sub pectoris cartilagine (ut Galenus inquit eodem secundo lib. de Hippocr. & Plat. decre.) quare ex dolore cum posito, os ventriculi affectum esse est coniiciendum. Nec minus, quinimo magis circa eundem locum dolor cum morfu & erosione sentitur in cardiaco morbo cum vehementius ventriculi afficiatur ostium adeo ut accedat desperatio quædam, angor animi, & corporis iactatio (ut Aetius refert:) Quod vero vtrique affectus symptomata sint maioris, minorisq; duntaxat ratione dissidentia in genere noxæ, functionum animalium sensitiuarum, ac proprie sensus tactus, cui vis potere poterit. Nam in dolorum genere continentur, cum vtrique affectus dolores sint cum erosione, & morfu, licet in cardiaco morbo maior sit offensio, Nam languor, labefactatio, ac exolutio innati caloris, ac totius corporis sequitur, adeo ut quidam (Tralliano auctore) qui ualde sensibile os ventriculi habent, statim intereant, cum immodicam humorum erosionem sustinere nequeant: præter autem angorem, erosionem, ac morsum, qui in καρδιαλγίᾳ sentiuntur in ore ventriculi, consuevit quibusdam bilis exactæ uomitus euenire, interim uero descendit idem humor, & ex aluo summe biliosa egeruntur, ut testis est Galenus eodem secundo lib. de Hippocrat. & Plato. decre. Quod autem febris non necessario accidat in καρδιαλγίᾳ ostendunt eiusdem Galeni uerba eodem loco dum dixit, neque ægritudine uexatis tantum, verum etiam ijs, qui diutius paulo ieiunium tollerant, accidit, ut morsus hos ventriculi sentiant. At in cardiaco morbo præter id, quod ipse cum acuta febre & maxime æstiosa euenit (ut Aetio, & Theodoro Priscano uisum est) pulsus aderit densus, & obscurus ijs, qui eo morbo affliguntur, extremarum partium frigiditas, sudores circa faciem, & ad pectus usque glutinosi; inueniesque odorem corporis eorum terrestrem nares percellentem & pulsus circa ipsum cor uehementiores, ac magnos. Accidunt ad hæc desperatio, angior animi, & corporis iactatio, Licebit autem protinus scire morbum cardiacum esse, (ut Celsus inquit) ubi venarum exigui, imbecillique pulsus sunt. Sudor autem supra consuetudinem,

Aduersus eos qui dictos affectus non dissidere putant. Contra eos, qui cordis esse affectus putarunt,

Quod os ventriculi afficiatur, signa. Cap. 3.

Qui affectus præter naturam sint.

Eorundem signa. Lib. 7. cap. 11.

Cap. 3.

tudinem, & modo, & tempore ex toto thorace, & cervicibus, atque etiam capite prorumpit, pedibus tantummodo, & cruribus siccioribus atque frigentibus: ex his denique indiciis dignoscet cum καρδιαλγία, tum cardiacum morbum. Quæ vitia ambo consequuntur, nedum calidam oris ventriculi intemperiem, verum etiam & eiusdem erosionem, ac morsum, quæ erosio solutio continui est, ut patet quart. de simplic. medicament. facult. Horum autem affectuum causa humor est acris, & mordens quomodocunque in ore ventriculi contineatur, seu ad ipsum confluat, quamvis præter acrimoniam, & morsum virulentus, seu venenosus, ac malæ qualitatæ particeps sit oportet in cardiaco morbo (ut Tralliano visum est) & proinde non mirum si ex lumbricis etiam sursum ad os ventriculi ascendentibus, ac eidem rosionem, ac morsum inferentibus (ut idem Alexand. inquit) possit interdum cardiacus oriri morbus. Verum ubi humores pravi rodentes hunc excitent morbum, ex proprijs indiciis redundantia talis succi, ætate, temperamento, anni tempore, victus ratione præcedente, ac reliquis prompte dignoscet, si vero ex lumbricis ad os ventriculi ascendentibus exoriat cardiacus morbus, ex proprijs lumbricorum indiciis illud percipies simul cum victus ratione præcedente, ac alijs modo dictis, nec aliter percipies ubi ex inflammatione oriatur, quam ex proprijs signis inflammationis, similiter si καρδιαλγία ex præcedenti ieiunio, cum vehementi aliqua exercitatione, aut ex mœnore immodico fuerit orta, non magno negotio ex ægri, aut astantium sermonibus id percipies.

Prognostica, De καρδιαλγία autem; quantum ad prognosticum spectat scriptum reliquit Hippocrat. aphor. sexagesimo quinto quarti libr. Quod si febrientibus accidat, malum est. Propterea quod ventriculi mordetur os, atque ob id malus est casus, inquit Galen. in commen. modo cordis morsum significat, quæ etiam ratione & καρδιαλγία in febribus iudicanda est mala. Si vero sine febre, aut alijs minime ægritudine vexatis incidat, non adeo mala erit, neque periculosa. At cardiacus morbus cum in acuta febre & maxime æstuosa fiat, perpetuo periculum minatur, confirmat id eius causa, cum à rodentibus, ac venenosis succis fiat, seu ab alicuius visceris inflammatione, adeo ut quidam os ventriculi valde sensibile habentes, cum immodicam humorum erosionem sustinere nequeant, statim ex eo intereant (ut Alexander inquit.) Nec minus periculosus erit cardiacus morbus a lumbricis ascendentibus ad ipsum os ventriculi ortus, nam hæc bestia (ut ipse refert Alexander) adeo repentinam mortem, & syncopas non minus quam perniciosi humores inferunt, ut nonnulli statim cum a lumbricis roduntur, intereant. Hæc autem passio) ut Theodorus priscianus ait libr. secundo ad Timotheum capitu. duodecimo,) frequentius iuuenibus, quam cæteris ætatibus evenire consuevit, in augmento ægritudinis, hoc est circa diem sextum, & quam maxime eo tempore, quo æstas calidior incanduerit. Quantum vero ad curationem spectat, cum prædicti affectus ratione maioris, minorisque (ut diximus) differant, propterea nos communem eorum tum victus, tum medicamentorum rationem instituemus: qua de re aer frigidus eligi debet, ita ut solem domus, in qua decumbit æger non admittat, sitque minime alta, sed depressior, nec valde lucida, fenestris tamen patentibus sic, ut perflatus quoque aliquis accedat, ut Aetio, ac Celso visum est, leuique ueste, ac molli, & usu priore detrita contegantur ægri potissimum in cardiaco morbo, pavimentumque irroretur, ac folijs consternatur myrti, quercus, maxime vero vitis, atque ipsis etiam rosis: Somnus eis competit moderatus, Vigiliæ tamen immodicæ vitandæ sunt, quies præcipienda est, ita, ut omnis fere motus quamvis exiguus interdiciatur, Alius ut sit levis magnopere confert, quare si non natura, arte saltem cum glandibus, aut clysteribus lenibus sic servanda erit. Immodici animi affectus vitandæ

vitandui sunt præsertim mœror, quoniam hic ex se ipso cardialgiã excitat, vt prius ex Galeni mente diximus. Cibus autem esse debet ex infirmissima materia, & stomacho aptus (vt Celsus visum est.) Vt vero Alexander inquit, qui præterquam quod refrigeret, etiam particulam resolutam possit confirmare, non multus quidem, sed sæpe tamen nocte, ac die dandus est, vt nutriat, neq; oneret. Qua de re panis ex aqua frigida, aut ex vino albo, & tenui, frigidusq; , ac dilutus tribuendus est, ex Aetij testimonio : interim vero paulatim ipsis offerri debent quæ ægre concoquuntur, & noxiorum humorum rotioni, ac acrimonix resistunt, veluti sunt ventriculi anserum, pedes suilli : & ex volucribus macræ, & non fœtidæ in ptisanæ decoctione eliquate, aut etiam per se, quæ etiam frigida exhibentur, si caloris sensus circa stomachum sit, & eger inflammatione non vexetur, alijs calida exhibenda sunt (vt idem Aetius inquit). Atqui probe refrigerant, corroborantque tum mali punici grana comesta, tum succus eorum ad hæc mala non admodum dulcia, sed mediocriter adstringentia, pira, persica, & vuæ, quæ austerum frigidumque succum obtinent. Conueniunt insuper lactuca cum aceto, pulli gallinacei, perdices, phasiani, turdi, merulæ, ac reliquæ aues montanæ cum omphacio, vel mali medici, seu limoncelij acido conditi, Hippocra. vero libr. 2. de morbis vulgaribus mulierici cui os ventriculi dolebat, & nihil remittebat dolor, polentæ pollinem in mali punici succo inspersum semel in die in cibo tribuens ipsam curauit, & non reuomebat, vt ipse inquit. Potus sit aqua hordei, aut seminum coriandrorum præparatorum decoctum, seu aqua, in qua exigua cinnamomi quantitas fuerit decocta, & nisi necesse sit, ad vinum festinare non oportet, vt inquit Celsus. Si autem verendum sit ne deficiat eger, vinum tenue, album, dilutum tribuendum est, frigidum vbi eger inflammatione non vexetur, & immodici caloris sensus circa stomachum sit, alij vero calidus potus tribuendus erit. Quod si stomachus resolutus parum continet, & ante cibum, & post eum, sponte vomere oportet, rursusque post vomitum cibum sumat, Celsus auctore. Si vero (vt inquit Aetius) nulla stercora intestino recto subdeant, neque aliàs etiam excrementorum multitudo insit intestinis, egri autem cibum non sentiant, & tabescant, ptisanæ succum, aut alicuj per clysterem infundere oportet tepefactum, conquassato cum eo ouo crudo. Ultra hoc enim quod ea, quæ stomachum inferne molestia afficiunt, euocat, & educit, etiam alimentum optime corpori sufficit, ex languore ob non acceptum cibum viscere affecto, siquidem id quoque (vt Celsus inquit) vires tuetur, hoc item potu vtantur, qui reliquos cibos continere non valent. Excipiantur micæ panis mediocriter torrefactæ, macerentur in vino austero, tenui, & albo, & demum fortiter exprimantur, & ex eodem vino singulis tribus, vel quatuor horis exhibeantur vnc. iii. vel iiii. donec pulsus robustior fiat, sitque vinum frigidum : Vbi immodicus fuerit circa stomachum caloris sensus, & inflammatio non adsit. Alijs vero tribuatur dilutum & calidum, idq; potissimum cardiacis. confestim vero circa initia proritandus vomitus erit, leuioribus quibusdam vt egelida aqua cum pauco aceto, acetoso syrupo, aut oxysaccharo, præsertim ij, qui natura ad vomitum proni sunt, Quod si mordaces succi in ventriculi ore contenti vomitu excerni nequeant, per inferiorem aluum protinus purgandi sunt eo medicamento, quod cum hoc quod vim habeat prædictos expurgandi succos, etiam ventriculum ipsum roboret, nec admodum calidum sit. Qua de re tamarindorum excipiens vnc. i. factoque ex eis decocto in fontana aqua, in ipso dissoluens mellis aeri vnc. iii. rhab. infusi in vnc. ii. succi rosarum 3. i. vel scrup. iiii. spicæ grana iii. vel iiii. pro potu tribuas, vel loco mellis aerei tantundem syrup. ex pluribus infus. ros. rubearum, vel vnc. iiii. permisceas :

Alex. li. 7. c. 11.

Sect. 2. in principio.

Purgatio.

T post

Topica.

posthæc ea, quæ os ventriculi roborare valent intus, & extra adhibenda sunt, Intus siquidem syrup. ex oxysaccharo, ex infusione, vel succo rosarum, aut ex malis punicis, seu de pomis, vel de acido mali medici, extra vero auxiliantur (vt inquit Aetius) folia rubi cum pane, aut myrti folia, ipsaque myrti bacce, aut pampinis vitis, aut plantago cum pane, aut mala cotonia, & palmæ stomacho, ac sinistræ mammæ impositæ, vt ipse inquit. At imbecillioribus sufficiat polentam cum palmis imponere: aut palmas in vino madefactas excipe, & adiectis aloe, & mastiche simul tere, deinde affusa cera, & oleo rosaceo, seu mēlino simul miscere, & vtere eodem modo: Quod ex palmis, œnanthe, acacia, rosis, alumine, hypocistide, & rhoe cataplasma conficias, atque iam imponas, vt sinistram mammam, & ventrem ipsum complectatur, sudores reprimat (vt idem inquit Aetius) stomachumque & cor ipsum firmitatis auctorem placet, & cohibet. Exudantibus vero partibus, sudorem prohibere oportet, id autem præstat oleum acerbum, vel rosa (vt inquit Celsus) vel melinum, aut myrteum, quorum aliquo corpus leuiter perungendum est, vel myrtus trita sicca inspergantur (ex Aetij decreto) vel œnanthe, aut hordeum in primis quidem collo, & thoraci, & locis sub alis, ac inguinibus ea sunt adhibenda. Eodem modo auxiliatur malicorium cum manna inspersum, aut galla per se. Illinuntur etiam ad coercendos sudores (vt idem auctor inquit) oleum myrteum, œnanthinum, rosaceum, melinum, & lentiscinum: circumlita etiam sudores cohibent manna, & amyllum candido oui excepta. Extreme vero corporis partes refrigerate concallescendæ sunt cum multa frictione ipsarum partium, linteisque calidis adhibitis, aut alijs calefacientibus. Quod si ex visceribus quoddam inflammatum sit, & propterea cardialgia, aut cardiacus morbus fiat, & eadem inflammatio curanda erit. Si ex ascendentibus lumbricis, ea medicamenta tribuenda erunt, quæ ipsos tum interficere, tum etiam e corpore expellere valeant: expelles autem, si prius enecaueris, necabis autem amaris medicamentis, vt Gal. inquit 14. meth. med. & nos infra decimus. Si vero cardialgia ijs, qui diutius paulo ieiunium tollerant, accidar, iis consulendum est, vt non tarde, sed citius cibum capiant, vitentque ieiunium. Similiter si ex mœrore flaua bilis in ventriculum confluat, aut ex vehementiori exercitatione. Vitandi & mœror, & vehementior exercitatio erunt. Cunctis vero varia odoramenta offerri debent, præsertim rosæ, & vinum (vt Celsus visum est) aut aquæ rosacæ, & myrtillorum excipe vnc. iiii. vini odoriferi vnc. ii. santalorum 3. ii. & fiat odoramentum:

Cap. 19. in fine,

Odoramenta,

περί κυνάδος όρεξος :

Id est de canina appetentia.

Cap. 61.

Lib. de humori-
bus in medio.
1. de caus. sym-
cap. 7.

Quatuor acci-
dentia ordine

Quemadmodum stirpibus, vt pote terre affixis, terram, sic quoque hominibus, ceterisque animantibus natura pro nutrimenti veluti penu, ventrem fabricauit, vt liquet apud Hippoc. libr. de humoribus, & apud Gal. libr. 1. de caus. sympt. Tribuit autem animalibus ipsi & penuriæ sensum, quo scilicet ad cibum, potionemque proritata tempore expleantur, vocaturque huiusmodi implendi desiderium appetentia, quæ ex penuriæ quidem sensu fit, cum secundum naturam existit, quando scilicet venæ ex ipso ventriculo veluti emulgentes, sugentesque aliquid trahunt, non ferens autem cum succum ventriculus, sed veluti diuulsus offensæ eius medelam cibum comparat. Verum suctus quidem ipsius sensus, fames est: atqui suctionem naturalis omnium partium appetentia præcedit, tamen ea naturalem qui-

dem

dem opus est, non animale, ut quæ modo dicta est. Talem autem appetentiam vacuatio præcedit. Qua de re necessum est ex Galen. decreto præcitato loco ad hoc, ut secundum naturam excitetur hæc animalis appetentia, quatuor ordine quodam, symptomata sese deinceps sequentia præcedant. Primum nanque omnium totius corporis inanitio, seu vacuatio est, secundum naturalis euacuatarum partium appetentia, tertium ventriculi suctus, quartum ipsius suctus sensus, quintum vero iam dicta ventriculi animalis appetentia. Verum cum præter naturam sit appetentia hæc animalis, vitiosaque redditur, propterea quod in quantitate modum excedit, à quibusdam (ut Galen. testatur tum præcitato 1. de caus. sympt. tum com. aph. 21. secundi lib.) *καὶ αὐτὴν οὐκ ἔστι*. Græcè dicitur, Latine canina appetentia; Non ab re sic nuncupata, quoniam in hac affectione ægri uomunt pituitam, & cibum cum assumunt, retinere nequeunt, ac post vomitum statim alium appetunt, quemadmodum canes (ut Alexand. visum est cap. 5 lib. 7.) In his enim qui canina vocata appetentia vexantur (ut inquit Gale. 6. de loc. affect.) videmus quod assatim impleri paulo post aut euomunt, aut fluore deiciunt. Nam non potens ipse ventriculus deuoratorum pondus sustinere, multa impetuose ingerere, atque ea celeriter excernere cogitur. Id quod etiam & animalibus quibusdam integra valetudine degentibus accidere solet (ut ipse inquit) in quibusdam scilicet auiculis quas seleucidas in Asia vocant, quippe quæ iugiter locustas edunt, easque celeriter excernunt. Est quæ, (ut eidem Gal. placuit præcitato comm. aph. 21. libr. 2.) vehemens & insedabilis ciborum appetentia: quam non necesse est ut quatuor iam dicta symptomata naturalia ordine præcedant, ut dicemus, Sed affectio quædam præter naturam est ipsius oris ventriculi: ut liquet tum 1. de caus. sympt. tum etiam 5. de loc. affect. Nam eius proprium munus est ipsa animalis appetentia, cuius gratis ad ipsum par neruorum, haud mediocriter à cerebro. ex sexta scilicet eius coniugatione defertur, & disseminatur, & ob eam causam pars hæc ventriculi sensu acutissimo prædita est, ut liquet tum quarto, tum 9. de vsu partium: & licet hoc neruorum par in alias etiam ventriculi partes vsque ad fundum ipsius protendatur, tamen quia maxima sui parte os ventriculi contexit, minor vero in alias partes vsque ad fundum disseminatur, propterea non toti ventriculo sensus alimenti deficientis, ad quem sequitur animalis appetentia, (quamuis prædictis neruis participet) donata est facultas hæc, sed ipsi ori duntaxat, utpote quod exactioris, ac acutioris sensus existit, cum maiorem prædictorum neruorum participet portionem, pari ratione nec læsio prædictæ appetentiæ animalis quomodocunque fuerit, toti ventriculo tribuenda erit, sed potissimum eius primæ parti, quæ est circa os. nam quamuis similibus dispositionibus, quales sunt illæ quæ in ore ventriculi fiunt, interdum afficiatur ventriculi spatium, atque similia quoque ei adueniant symptomata, quoniam longe maiorem inferunt violentiam ea quæ in ipsius ore contingunt (ut Gale. testatur 5. de loc. affect.) Idcirco medicis ea, quæ in parte ventriculi inferiore eueniunt, perinde, ac si omnino non fiant, & despiciere & contemnere solent. Non ab re itaque ipsa canina appetentia instrumentum appetentiæ læsum esse, hoc est os ventriculi cum Gale. 5. de loc. affect. decernimus; & quamuis exigua quædam non magnopere modum excedens reliquis ventriculi partibus affectis gigni possit eam tamen perinde, ac si omnino non fieret, despiciamus, ac contemnimus. Neque alio indicio indigemus pro notitia iam dictæ partis affectus, oris inquam ventriculi, cum eius propriæ facultatis oblesione iam pateat. Ipsa vero affectio symptoma est in genere noxæ unctionum animalium, atque ipsius sensus tactus: atque offensus ventriculus ipse, & veluti diuulsus ab aliqua causa præter naturali non ferens talē diuulsionē, quæ per immodicā suctionē fiat, ad

quodam sese cō
sequuntia. quæ
ventriculi appo
tentiam præce
dunt cum secū
dum naturam
appetit.

1. de caus. sympt.
loco citatō.
Canina appeten
tia cur nuncu
petur.

6. de loc. affect.
ca. 3 post med.

Quid sit.

Quæ pars in ea
afficiatur.
1. de cau. symp.
cap. 7.
5. de loc. affect.
cap. 6.

4. de vsu par.
cap. 7.
9. de vsu part.
Cap. 12. ante
medium.

cap. 6.

Loco citato.

Quis præter ea
affectus sit.

Signa.

causæ.

cap. 7.

Causarum 20.
gmo.

cap. citato.

Alex. lib. 7. c. 5.

Loco citato.

Cap. 7.

Act. lib. 9. c. 21
Prognostica.

iam dictam excitatur vitiosam apparentiam in quantitate modum excedentem, & propterea vitiosa dicitur, & ipsa functio deprauata est, non diminuta, nec ablata. In hac affectione ægri plures cibos appetunt, & cum appetitum cōhibere nequeant (vt inquit Aetius capitu. 21. lib. 9.) in ingerendis nimis cibis modum excedunt, deinde multitudine eorum aggrauati, & assumptos citra nocumentū ferre non potentes ad vomitum diuertunt, deinde rursus cibo se explentes iterum ad vomitum reuertuntur, quemadmodum canes. Hoc autē immodicum implendi desiderium naturalis affectus similitudine ex morfu oris ventriculi consimili existente suctu naturaliter effecto, perpetuo generationem habet, & propterea ex tactorio genere symptoma est, veluti quodlibet aliud, quod circa os ventris contingit, vt liquet primo de caus. symp. Verum hic morsus non ex vnica duntaxat causa proritatur nam quādoque propter solam intemperaturam oris ventriculi frigidiorē existētē fit, interim vero propter humores acidos vitiosos, ac frigidios, quos exorbuīt os ventriculi, vt patet apud Gale. com. præcitati aph. 21. 2. lib. At si ex frigida intemperie fiat, egestiones multæ ex ipsorum ventribus procedent, crudis existentibus nimirum cibis, aut semicoctis. Si vero adfuerint acidi quoque succi, aderunt simul cum his acidi quoque ructus, nec mirum si frigida intemperies, frigidique vitiosi succi in ore ventriculi redundantes propter frigus, alimenti, & non potui desiderium excitent, Nam frigiditas tunicas ipsius ventriculi cum vacuat, tum etiam cogendo, ac constringendo ad maiorem appetentiam irritat, vt Gal. inquit primo de caus. sym. Qua ratione fit vt non parum ad esuriem frigiditas eorum, quæ in ventre habentur, conferat etsi libr. primo de caus. sympt. frigidæ duntaxat intemperiei non meminerit, velut com. apho. 21. 2. lib. voluit tamen eam contineri sub frigidis succis nanque ipsi non alio modo, quā propter frigus caninam excitant appetentiam, vt ipse inquit. poterit insup & morsus hic similis suctui ex immodica totius corporis digestionē, ac vacuatione cum inops reddatur, alimenti originem trahere, ita vt altera sit ex Galen. sententia causa caninæ appetentiæ. verum hæc immodica vacuatio duplicem habere poterit causam, quia aut ex caloris robore, vel ex retentricis facultatis imbecillitate fieri potest, vt ipse inquit eodem libr. 1. de caus. sym. Interlinguas autem si a caloris robore fiat euacuatio, & per consequens canina appetentia, quoniam (vt inquit Alex.) neque siti carent ægri, neque acidum humorem vomunt, veluti supradicti, nam immoderata caliditas tale quid accidere non permittit, vt quæ omnia facile in vaporem dissoluat, & latenti perspiratu extenuet, atque digerat, vnde etiam alius his magis adstricta est, quā citata, immo ventris egestiones longe pauciores procedunt, quā pro eorum, quæ ingeruntur, modo, ac proportionē, & stercora, quæ egerunt ægri, existunt sicciora (auctore Aetio ca. 22. præcitati lib.) verum ijs, qui ob retentricis in vniuerso corpore facultatis infirmitatem laborant (vt idem inquit Alex.) cibi minime cocti, & subinde alterationem non experti excernuntur. Quare etiam tales continuis illorum corruptionibus laborant: breuib. autem verbis sic has duas causas interstinguere docebat Gale. primo de caus. symp. quoniam in hac plurima sumptorum incidit deiectio, in alia vero ceu conflata ex totius habitus vacuatione alimentum in corpus deduci. Quapropter longe pauciores aderunt ventris egestiones, Hipp. vero, & Galen. in præcitato apho. 21. 2. lib. hanc causam, scilicet totius corporis vacuationem, non tetigerunt. Nam de ea duntaxat mentionem fecerunt, quæ vini potione curatur, a qua insuper causa potissimum affectus hic constituitur, vt Paulo visum est capitu. 52. lib. 2. ex hoc autem affectu aliquando & ad vomendi consuetudinem delabuntur, (ut inquit Aetius) sæpe etiam & aliis affectio nibus obnoxij fiunt, coeliacis uidelicet, & dysentericis, atque aquæ intercurtem.

tem . Propterea quod priusquam priores cibi sint concocti alios ingerant. Quidam etiam volunt quod ubi diu perdurauerit canina appetentia, quâdoq; permutatur in βέλινον, interim in soporem, & interdum ad mortem. Ea vero canina appetentia, quæ ex immodica dissipatione ortum ducit, si priusquam ad summum peruenerit, eam cognoueris (vt Gal. testatur 6. de loc. affect.) non difficulter curabitur. Nam ubi quis duplum consuetorum alimentorum assumpserit, neque corpus ali videatur, idque citra alui florem, hunc affectum non solum priuati, verum & medici paruipendunt. Cum vero triplum ingerit idoneis auxilijs liberari potest, priusquam scilicet ad quadruplum, vel ad quintuplum perueniat. Qua de re non omnino paruifacienda erit affectio hæc, sed mox pro eius curatione si ex frigida intemperie, aut frigidis succis excitetur, aer eligatur ad calidum, & siccum inclinans. Vitandæ sunt vigilæ immodicæ, ac somnus omni conatu alliciendus erit. Exercitium moderatum confert, prius tamen alui excrementa natura, vel arte ducantur. Inter animi affectus vitandi potissimum sunt timor, & mœstitia. Quò vero ad cibum, & potum attinet inquit Galen. præcitato aphor. 21. 2. lib. quod qui famem caninam patiuntur, iis vini potus, non cibi multitudo remedium est, & subdit, equidem multos ipse sanauit, qui indefinenter famefcabant, vinum ipsi abundanter exhibens, ex eorum genere, quæ multum calefaciunt, quæ colorem flauum habent, vel rubeum absque adstrictione; siquidem oportet cum ad prandium accedunt, primum illis afferre pingua edulia atque (vt ita dixerim) oleagina, & quæcunque alia ex multo parantur oleo. Postea vero vnum aliquod ex vinis, quæ diximus etiam nondum siccant, ad potandum dare oportet, statim enim sedatur ipsis fames, & talem longo tempore victum exhibendo, cessat omnino. hæc Galen. Alexan. vero fere eadem asserens dixit vtendum esse calidioribus, præsertim vino mero, cibus pinguibus, & omnibus oleosis, ac carnibus suilis, hæc enim comesta (vt ipse inquit) prius, exaturant ipsos, & immodicam eorum appetentiam obtundunt, vt in posterum copiosorem cibum nolint assumere. Potum etiam (vt inquit Aetius) præbeamus ante cibum, multum, ac acruatim bibendum calidum sanè, aut acriter tepidiorem. Item sorbitiones appetitum destruentes exhibendæ erunt, veluti sunt plures cum melle multo, & oleo plurimo, aut adipe anserino, gallinaceo, aut suillo. cerebella item, & pinguiore volucrum partes, ac piscium eodem modo, & exoleribus, malua, conueniunt, & omnino quæ appetitum auertunt, ac satietatem inducunt, & magno cumulo acceptata modice alunt. Admiscere etiam conuenit panibus (dum fermentantur) acriora, & vrinam cientia similiter & vino, quod in potu sumunt (vt idem inquit Aetius) veluti est cuminum, anisum, petroselinum, & quæ eius generis existunt. Ad vinum etiam, & piper, & mel, & spica nardi ultra ea, quæ dicta sunt adiiciantur. Abstinere vero oportet ab omnibus acidis, ac adstringentibus cibus, & potibus, maximè vero a fructibus. Eorum autem bellaria sint pestachia amygdalæ, nuges pineæ, colymbades etiam oliue ex melle exhibendæ sunt. etsi neque his cedat affectio, ea quæ dissecare, ac repugnare, calefacereque possunt in cibus quoque annectemus, veluti sunt allia, porrum, thymus, satureia, origanum, pulegium, & quæ his similia existunt. Pariter & oxymel simplex, aut scyllinum, aut ipsum met rosaceum mel cum aliquo ex iam dictis decocto præbeamus, & ubi cognouerimus quod humores pituitosi, & acidi in ipso ventris ore fuerint impacti, ac veluti aqua in spongiam imbibiti, eos quoque purgabimus ex hiera. Nanque hæc non tantum calefacere potest (vt inquit Aetius) sed differare, ac repugnare, extrahere ex profundo oris ventris imbibitum humorem, & per aluum inferne euacuare. quin & robur ventri addit, vt ne facile nocuum humorem suscipiat. Poteris autem 3. ii. exhibere ex vino cum aqua calida

cap. 2.

curatio.

Vitus ratio.

Medicamentorum ratio.

Si fiat ex immodica corporis dissipatione, curatio.

diluto, vel 3. i. & s. eiusdem excipiens & scrup. ii. trochiscati agaraci addens, cataportia formato, ac præbeto nedum semel, sed bis, & ter, ubi opus fuerit. Si vero ex immodica totius corporis dissipatione canina appetentia excitetur, abstinendum erit à continentia calido, ac vini potu, & ab omnibus, quæ tum extrinsecus, tum intrinsecus calefacere possunt, Aetio teste. Qua de re aer frigidus eligatur, quies iniungatur, somnusq; mediocris, omninoq; immodicæ vigiliæ vitentur. Et si ex immodico calore dissipatio fiat, clysteriis utendum est lenibus, caueantq; ægri ab immodicis animi affectibus, præsertim ira. Cibi eis exhibendi sunt stabiles, & ægre corruptibiles. Vinum (ut diximus) omnino ipsis dādum non est, sed aquæ potu utantur, vel seminum coriandrorum præparatorum decocto. Cutem autem ipsorum condensare, ac spissiore reddere oportet cum oleo quopiam adstringenti utpote omphacino, myrtheo, aurorofaceo, interim eis admixto alumine scisso in aceto accerimo prius trito. Conferunt item & lauacra frigida, si nihil id fieri prohibeat. A balneis vero calidis abstineant, illinere quoq; convenit eorum cutem ex infra scripto vnguento, Quod, R. succi plantaginis, semperuiui ana unc. s. santalorum, rubeorum, sanguinis draconis, & boli armeniaci singul. 3. iii. olei myrtini, cytoniorum, & rosacei omphacini ana vnc. i. farinæ hordei 3. iii. ouorum albuminis vnc. s. aceti parum, & ceræ quantum sufficiens sit, fiat vnguentum.

περί κίπης, ἢ μαλακίας

id est de citta, sine pica. Cap. 62.

1. de caus. symp. cap. 7.

Pica unde dicta sit,

Quid ea sit. 1. de caus. symp. loco citato.

Quæ pars in ea afficiatur. 5. de loc. affect. cap. 6.

Loco citato. Quis affectus præter naturam sit pica. Pica signa. Causa.

Accidit nonnunquam nedum mulieribus vtero gerentibus, verum etiam & viris deprauata quædā appetentia non quidem in quantitate modum excedens, sed in qualitate prauas etenim qualitates appetunt) Gale. auctore lib. i. de caus. symp. & Aetio libr. 9. cap. 23.) quæ affectio à Græcis κίπης & μαλακία dicitur, à Latinis pica, quæ secundum quosdam à pica auicula nomen accepit. Secundum alios ab hederæ similitudine, quæ κίττος à græcis uocatur, nam sicuti illa uariis plantis (pro ut occurrunt) se implicare solet, ita mulieres ex pica laborantes uaria edulia appetunt, atque ea contraria, quæ tum uoluptatem, tum insauitatem, gustanti exhibent (eodem Aetio teste cap. 10. lib. 16.) Est autem affectio hæc ut idem auctor asserit) stomachi languor cum nausea, & auersione ciborum, bilis, ac pituitæ uomitum inducens, uel ut testatur cap. 23. lib. 9. Concupiscentia quædam est uitiosarum qualitarum ciborum. Nam acida, & acerbæ interdum, nonnunquam acria quoque, interim uero uel cimoliam terram uel testas, uel extinctos carbones, aut alios huiusmodi cibos absurdos appetunt, ut Gal. inquit eodem primo de caus. symp. Quod uero in hac affectione uentriculi cistium conflictetur ab eodem Gal. liquet præcitato loco, & 5. de loc. affect. patet insuper & ex eius propria functionis offensa, quæ appetentia est. Quod autem symp. sit, ac noxa eiusdem appetentiæ, quæ deprauata est, in qualitate tamen & non in quantitate, uelut canina appetentia excedens, liquet ex eodem Gal. præcitato lib. i. de caus. symp. Aberrat enim facultas hæc appetendi cum non cibos, quinimmo prauas appetat qualitates, utpote (ut diximus) acidam, acerbam, acria, cimoliam terram, uel testas, seu extincto carbone, aut alios huiusmodi absurdos cibos. Apparent etiam taliter affectis assiduæ expuitiones, oris uentris morsus, ac anxietate. Insequitur autem prauam eiusdem oris uentriculi intemperiem, cum eius tunica prauo aliquo excremento fuerint imbutæ quæ fit ut mulierculi uitioso humore repletis euenire soleat affectio

affectio hæc, maxime cum vterum ferunt. Pro varietate autem vitiosi humoris prædicta varia, ac peregrina edulia appetunt, & propterea alio signo non indigent pro eorum dignotione, quanquam etiam & per vomitum idem manifestari consueuerunt. Assolet affectio hæc (Aetio auctore) vtero gerentibus fieri fere circa quadragesimum diem a conceptu, sæpe vsque ad quartum mensem durat. At Galen. complures ait vtero gerentes huiusmodi vitio laborant vsque ad secundum, ac tertium mensem, in quarto vero quiescunt, partim quod vomitione vitiat humores expurgantur partim quod concoquantur, vtpote exiguum cibi tum sument muliere ob fastidium, partim etiam quod multitudo vacuatione sit diminuta, quippe primis duobus mensibus fœtus paucum ad se sanguinem attrahit: eo quod parum adhuc auctus sit.

Prognostica.

Vbi vero iam creuit, tum plurimo indiget alimento, atque tunc non id, quod optimum est è venis allicit, verum etiam quia maiorem alimenti copiam requirit, aliquid vitiosi simul attrahit, & ita fit, vt vniuersum corpus plenum esse desinat, & minori humorum vitio crucietur. Idem quoque affectus non nunquam & viris ipsis accidit, cum humor quispiam vitiat, ad os ventris fuerit delapsus, vt diximus, qui neque, despiciendus est. Pro curatione autem affectionis huius victus ratio prius instituenda erit, diuersa pro varietate vitiosi, & prauis redundantis humoris. Verum cunctis commune est, vt cibis vtantur moderatis, qui neque facile corrumpantur. Quapropter panis succo cotoneorum, aut malorum puniceorum maceratus confert, similiter cichorium. Ex quibus deligendæ sunt, quæ neque pingues, neque virosæ sint. Conueniunt item pedes, ac rostra, & ventriculi porcorum, & erinacei marini recentes. Sint tamen omnia (vt diximus) quantitate moderata, & si cibos auerferentur, obsoniorum varietate, ac iucunditate illectentur: Abstineant tamen à dulcibus obsonijs, verum ijs qui terram appetunt nihil ita prodest veluti amyllum recens: Cunctis vero confert ante cibum oliuas albas, muria conditas cum pane molli exhibere, aut quinque, vel septem amygdalas maras.

curatio.

Vici ratio.

Post cibum autem vix passæ, mala punica, ac pyra exhibeantur. Sic etiam potus moderatus, ne alimenta ventriculo innascent, ac vinum fuluum, odoratum antiquum, & subadstringens bibant. Quod si vinum auerferentur, aquam ex cinnamomi decocto potabunt. Si vero stomachus ab acri, acidove, aut falso humore morderetur, ad excitandum vomitum, tepidam aquam bibere poterunt, vt humor affligens reuomatur. Nec quiquam erit incommodi si difficilior fiat vomitus, addere parum aut aceti, aut acetosi syr. & si crassius fuerit quod euomunt, & ob viscositatem difficulter excernatur, raphani etiam decoctum cum aceto mulso exhibebimus. Nam omni studio conandum est, vt infestus humor citra molestiam per vomitum educant, præsertim ipsis vtero gerentibus, quibus in hoc casu purgans medicamentum exhibendum non est, vtpote cum affectus hic in primis mensibus oriatur, In quibus omnino vitauit Hippo. apho. i. quarti libr. purgantia medicamenta exhibere, ea præsertim, quæ huic affectioni commoda essent. Verum viris ipsis si accidat hæc affectio, & per vomitum sedari nequeat, purgans medicamentum exhibebis, prius tamen quibusdam syr. adhibitis pro ratione redundantis prauis succi, veluti est syr. ex oxyfacch. acetosus, oxymel simplex, atque ipsum Scyllinum, si opus fuerit. Sit autem purgans medicamentum ex picra Gal. compositum, atque ipso rhab. seu agarico, prout redundans prauus succus requirit. euacuato autem plurimo vitioso humore, exhibendus est eis (vt inquit Aetius præcitaro cap. 23. lib. 9) mali punici dulcis succus, mentha sicca inspersa, item portulacæ cremor, & ipsa quoque in cibo sumpta confert, Polygoni decoctum potum, similiter, etiam anethi, & rhapontici, ac spicæ nardi cremor, item intybi succus, vel ipsa herba cruda, aut cocta assidue comesta, forinsecus autem adhibi

Medicamentorum ratio.

Vomit.

Purgans medicamentum.

Topica.

ta languido stomacho conferunt (vt idem Aetius asserit ca. 10. lib. 16. œnau-
the, balauſtium, roſæ, citini, myrtus, ſmirnij coma, ſœniculi ſemen cum vino
cataplaſmatis modo adhibita, addita etiam galla, aut cumino, aut abſyn-
thio, palmularum item carnes vino cocto, aut maceratas tritas pro empla-
ſtro imponere prodeſt, aut mala cotonea cum poſca trita, roſaceo, vel nardi
no cerato excepta, addito croco, aut lana ſuccidam, vel linteorum vino, &
olco, aut aceto & oleo, vel roſaceo & aceto, aut nardino & uino imbuero, &
ſtomacho adibero, morſus enim (vt ipſe inquit) & ſtomachi puncturas
mitigant.

περί βούλιμο.

ideſt de bulimo, ſeu ingenti eſuritione.

Cap. 63.

βούλιμος.
quid.
cap. 7.

Quæ pars in eo
afficiatur.
Loco citato.

Quis affectus
præternaturam
ſit.

Quibus diffe-
rat a canina ap-
petentia.

cap. 14.
βούλιμος.
poſt principiu.

Eiusdem affe-
ctus ſigna.

Modus genera-
tionis eius.

3. de cauſ. ſymp.
cap. 1. circa
principium.

Cum ventriculi oſtium indigentia, ſimul ac refrigeratione, & imbecil-
litate virium laborauerit, ſymptoma quoddam in eo excitatur, quod
à græcis βούλιμος, a latinis autem ingens fames, ſeu vehemens eſuri-
tio dicitur, Gal. auſt. li. primo de cau. ſymp. 88 etenim dictio græca alijs
adiecta vocibus vim habet augēdi ſignificationes earum. Quæ affectio hac eo-
dem Gal. com. apho. 21. lib. 2. ſic deſcribitur, quod eſt labe factatio facultatis a
frigore externo, quæ a fame quidem inchoauit, ſed non habet eam amplius
adiunctam. Quod vero in hac affectioſe os ventriculi affectum ſit, liquet eo-
dem lib. primo de cauſ. ſymp. Nanque ipſe Gale. eam connumerat inter af-
fectiones, quæ ori ventriculi contingunt, cum dixit, quod βούλιμος eſt ſym-
ptoma ex indigentia ſimul imbecillitateq; & refrigeratione huius loci, hoc
eſt oris ventris ortum. Patet inſuper quod hæc affectio ſymp. ſit in genere
noxæ functionum propriæ ipſius appetentiæ deprauatæ: Verum quam uis in
hoc communicet cum canina appetentia, differt tamen ab ea, quoniam licet
a fame quidem & ea ingenti βούλιμος inchoet, velut & appetentia canina,
propter virtutis tamen concidentiam, quoniam in animi deliquium ſtatim
incidunt qui βούλιμω laborant, immò ipſe βούλιμος (vt idem Galen. inquit libro
primo de art. cur. ad Glauconem) nihil aliud eſt, quàm animi defectus, pro-
pterea eam famem non habet amplius adiunctam βούλιμος, veluti canina ap-
petentia. Præterea (vt ipſemet Gal. inquit eodem com. apho. 21. 2. libr.) vni-
uerſalior eſt canina appetentia, ipſo vero βούλιμος affectus magis ſpecialis,
atque particularis, præter id quod in cauſa etiam differant, vt dicemus. Nam
a frigore externo perpetuo ferè βούλιμος exoritur, Ipſa autem canina appe-
tentia ex reliquis nonnullis alijs cauſis (vt diximus.) Dignoſcitur autem affe-
ctio hæc, quoniam in principio fames multa adest, quæ tamen non uſquequa-
que perdurat. Nam poſtea repente animo linguatur cum extremarum par-
tium refrigeratione, & ſpiritus defectione, vt Aetius inquit capit. 6. lib. 9. Cum
itaque tria neceſſario concurrant in huius ſymp. generatione, indigentia
ſcilicet, imbecillitas, & refrigeratio ipſius oris ventriculi, non ab re viden-
dum eſt, quomodo hæc tria ordine ſe conſequantur. Atqui dicendum ex Gal.
atque Aetij ſententia frigiditatem oris ventriculi primo neceſſariam eſſe,
qua demum fames excitetur, eaque ualida, ingens, ac vehemens propter duas
cauſas cap. de canina appetentia traditas, quæ non niſi a ualida ipſius oris uen-
triculi refrigeratione ortum habet. Verum cum ipſa quoque immodice cre-
uerit, neceſſario imbecillitas ipſius facultatis, ac ex conſequenti virium ſequi-
tur labefactatio geminam ob cauſam, tum quia omnis immodica intempe-
ries vires exoiuit vt liquet com. apho. 20. 2. libr. & 3. de cauſ. ſymp. & propte-
rea licet frigiditas oris ventriculi appetentiam augeat, in tantum tamen eam
augeri contingit, vt appetitus deficiat, quemadmodum ipſis ſenibus accidit,
licet

licet nedum os ventriculi, sed totum corpus frigidum habent eodem Galen. teste præcitato aphor. Tum etiam quoniam aucta eiusdem oris ventriculi refrigeratione immodice, propter eius exactum sensum, ac ratione vicinæ, eam ipsi cordi impartitur, ipsumque valde refrigerans, non ab re causa existit, ut animi deliquium accidat, immo propterea Galenum hanc affectionem dixit nihil aliud esse, quàm animi defectum, & ipse Aetius præcitato loco de βελίμω sic scriptum reliquit, βελίμω ex stomachi frigiditate oboritur, indigentiaq; ac virium imbecillitate, & ab externo frigore fere in totum initium capit. Oritur nanque hæc ingens fames simul cum virium imbecillitate ex refrigeratione oris ventriculi, quæ semper ferè ab externo frigore ortum ducit, & propterea peregrinationes (ut inquit Aetius) & itinera longa, maxime per niuem facta affectionem hanc inducunt, proinde quidem in locis desertis, aut in balneo in hoc malum collapsi ex instanti perierunt auxilij facultate destituti. Quapropter auxilia confestim pro eius curatione adhibebis. Nam quæ assidui etiam βελίμω & exoluunt, & in animi deliquit incidunt, quibus ægrè auxilium reperitur ex eiusdem Aetij auctoritate. Et quoniam affectio hæc frigiditas est iuncta siccitati (ut Gal. inquit 5. de simp. med. facult.) propterea eius sanatio per contraria perficitur, ut ipse asserit calidis siquidem, & humidis tum cibus, tum medicamentis. Idcirco si in vijs quidam ex ingenti fame animo linquantur, eos reuocabimus (ut 8. de compositione medicamentorum secundum locos idem Gale. Archigenis auctoritate scriptum reliquit) odoramentis aceti, aut pulegij, aut quæ forte obtingit, terra aceto macerata, aut malis, seu pyris, aut alijs similibus fructibus, qui ad manus sunt. Insuper panem odorandum dabimus, præsertim si recens fuerit, & ingerere ipsum quoque cogemus, nec non caseum boni odoris, præterea & suillam carnem assatâ, ac coctam, & in vniuersum omne, quod valde nutrit, & potissimum ea, quæ odorem nidorosum, ac probè conditum habent. Per huiusmodi enim odores (ut idem Galenus præcitato loco) ut plurimum tales reuocantur. Hoc etiam tempore & extremæ ipsorum partes constringendæ sunt, manuum, ac pedum summitates calidæ aquæ feruentiori imponendæ sunt, Ipsiq; excitandi tum maxillarum punctura, tum capillorum, ac aurium distentione. Ipsi vero ab exolutione, & animi deliquio reuocatis panem in vino dilutum, aut etiam aliud quidpiam ex ijs, quæ acruatim reficere vires possunt, exhibebis, veluti sunt oua sorbilia. Compendiosissimum enim auxilium (ut inquit Aetius) ex cibo sperare possunt, quem etiam si oblatum acceptare non possunt, ori indere oportet violenter, cogereque ut ipsum transglutiant, Euestigio enim, & à fame & ab animi deliquio liberantur, & celeriter excitantur. Virabimus autem omnino in his, qui hac affectione sunt apprehensi, longiorem cibi dilationem, ac inediam, & ne alternis tantum diebus cibum offeramus. Verum solerti ratiocinatione facta singulis horis simplicissimum, modicumque cibum dabimus. At si in febribus contingat hanc affectionem oriri, nam sic quoque excitari potest, ut Aetio visum est præcitato loco, & Pauli cap. 50. lib. 2. licet tamen ea raro accidat, Inspiciendum est quo accessionis tempore contingat: Nam si in remissione, seu declinatione febrilium exacerbationum irruat, intrepide eis cibi sunt offerendi, quos diximus. Si vero in principio eueniat, aut vigore apparuerit, per prædicta odoramenta, conabimur eos primo reuocare, potissimum pane calido vaporem adhuc mitterente, vel polenta aqua, seu posca madefacta. Frictio quoque tunc temporis extremarum partium adhibeatur, & cataplasma ex palmis, aut malis coto reis in vino diluto decoctis ventriculo applicetur, atque hæc vsque ad remissionem facere oportet, ut oportunè cibum offeramus. Quod si ex his nihilo melius habeant, audendum est per ciborum ingestionem auxilium offerre

causa.

Prognostica,

Curatio.
5. de simpl. fac.
cap. 5.

Cap. 4. circa finem,

Curatio, si in febribus accidat.

10. meth. cap. 3.
4. 5. & 6.
Alexandri hi-
storia de Mu-
liere quædam.

vnam, atque alteram in vino madefactam bucellam panis tribuentes, vt ex inde refocillati vsque ad remissionis tempus perueniant, In quo tum corpo- ris curatio, tum sufficiens cibus ordinetur. Nam neque Galen. ipse veritus est in principio, incremento, ac summo vigore exacerbationum febrilium, potif- simum calidis, & siccis corporibus, quibus etiam stomachus fuerit imbecillius cibum offerre, non vni duntaxat, aut alteri, sed pluribus, vbi vsus postularet, præsertim panem ex vino dilutum vt liquido constat apud eundem libr. 10 meth. med. Nouit etiam Alex. (vt ipse inquit cap. 6. lib. 7. mulierem quandam quæ adeo ingenti fame laborabat, vt nunquam saturari se diceret, verum & rosionem in stomachum sentiebat, & capite dolebat, cui exhibita hier pro pur- gante medicamento vermem euacuatione proiecit longitudine (vt ipse re- fert) duodecim cubitorum, atque tunc immoderata, & furiosa appetentia conqueuit. Propter quod innotuit eam bestiam fuisse causam, quæ ad cibum sumendum egram compelleret, atque omnia consumeret, & non affectio βόλιμος dicta. Si vero a frigidis in ore ventriculi, & siccis redundantibus suc- cis hæc affectio exciteretur, Idem prius concoquendi, præparandi, ac expur- gandi sunt. Nanque iam dictis commode vtare accessionis tempore, vt ab ani- mi deliquio reuocentur.

περί ἀνορεξίας, καὶ ἀσιτίας, καὶ ἀποσιτίης

Hoc est de cibi fastidio seu inappetentia. Cap. 64.

cap. 7.

commentario. 1.
com. 28.
1. de caus. sym.
In cibi fastidio
seu inappetentia
quæ pars
afficiatur.
Loco citato.
Quis affectus
preter naturam
sit.
citato loco.
causæ.

causæ magis
particulares.

Contingit non raro (vt Gal. inquit primo de causis symp.) vt suc- tionis sensus in ore ventriculi pereat, vel suc- tio non fiat, aut corpus ip- sum non inaniatur, & propterea affectio quædam exciteretur, quæ a græcis communiter ἀνορεξία dicitur, a Gal. interdum ἀσιτία vt patet cō. aph. 17. 4. lib. ab Hippoc. autem cum præcitato apho. tum etiam apho. 3. 6. lib. ἀποσιτίη nuncupatur, & aph 6. 1. 5. lib. ἐσθὴ cibi fastidium ab Hippocr. & Galen. appellatur, a latinis modo cibi fastidium, interim inappetentia dicitur, quan- quam inter ἀσιτίας & ἀποσιτίης, hæc differentia tradatur a Gale. n. primo de morb. vulg. quod illi appetentia carentes cibum non sumunt, reliqui oblatos fastidiunt, quæ quidem affectio contraria existit caninæ appetentiæ. Nanque in illa immodice appetunt: In hac nullo modo, ac nihil appetunt ægrotan- tes. In qua affectione quod os ventriculi læsum sit patet à Gale. præcitato pri- mo lib. de caus. sympt. & com. apho. 3. 6. lib. Insuper & ab eius propriæ func- tionis oblatione: Nanque ipsa appetentia nedum oblata est, sed omnino abolita vt eodem primo de caus. sympt. liquet, & propterea symptoma est in genere noxæ functionis animalis, & propriæ ipsius appetentiæ ablatae necessario consequens aut ad deperditionem sensus suctionis venarum, quem famem naturalem ipsius ventriculi appellauit. Gale. eodem primo de caus. sympt. aut quod exuctio non fiat, aut quod corpus non euacuetur, vt diximus: quinimo (vt idem Gal. testatur eodem loco) ex eisdem etiam affectionibus non qui- dem pereuntibus, sed propius ad abolitionem accedentibus, imbecilla, seu exigua oritur appetentia, & propterea quæ de inappetentiæ curatione dice- mus, deferuire etiam potuerunt pro ipsius exigue, seu imbecillæ correctione. Dictarum vero affectionum, seu inappetentiæ (vt Alex. inquit capit. 7. lib. 7.) aut intemperies quædam, aut humores in stomacho contenti causæ sunt, si- militer (vt Paul. asserit capitu. 37. libr.) duæ fastidij causæ esse poterunt, Aut vitiosa stomachi intemperies, aut humorum redundantia. Nanque si humo- rum adsit redundantia vtique inanitio non fiet, potissimum si nedum in ore ventriculi

ventriculi, sed in vniuerso corpore fuerit. Si vero vitiosa quapiam intemperie stomachus laborauerit, siue cum humore, siue absque eo, vnum duorum necessario consequitur, quoniam aut non sentiet suctionem ventriculus, aut eadem non fiet: Etenim si talis fuerit intemperies vt omnino sensus ipsius oris ventriculi destruat, utique suctionem non sentit, idque fieri potest, aut eo primario affecto, aut per consensum cerebri, seu sextæ coniugationis nervorum, similiter & suction non fiet, aut cum non ad sit dissipatio, seu inanitio, aut quod reliquæ corporis partes propter earum imbecillitatem non fugant, etiam si inanitio fiat. Qua de re dicebat Gal. præcitato 1. lib. de caus. sympt. quod velut ad excitandam famem frigidus in ventriculo non parum confert. Nam & vacua reddit corpora (vt cap. de canina appetentia diximus) ac ipsorum tunicam cogens, constringensque famem suscitatur, ita inter potissimas, continentesque causas, quibus fames impeditur, calor numeratur: Quippe qui solida corpora laxando, dissoluit, atque ad attractionis functionem reddit imbecilliora, humida vero fundendo, ac liquando supramodum extendit. Quamuis interdum frigida quoque oris ventriculi intemperies immodica ipsam excitare possit, vt liquet com. aph. 20. 2. lib. Hæc nanque vires corporis emortuas reddit, & deicit. Vnde etiam cibi fastidij causa efficitur, Alexand. auctore præcitato loco. Testantur autem calidam ventriculi intemperiem (Paulo teste) sitis oleosiq; ructus, si cibus præter voluntatem sit assumptus; Item si frigidiora potius, & elaboratu peruicacia hac derenti queant concoquere: Frigidam vero intemperiem contraria indicant, neque enim in hac ægri sitiunt, neq; frida sustinent, & acida nonnunquam eructant. Si vero vna cum calida intemperie biliosorum adsit redundantia, humorum rosionem, ac morsum ventriculi sentiunt laborantes, Nauseaq; magis & siti conficiuntur, & si humores computruerint, hi etiam interdum febricitabunt, vt Paul. asserit. Pariter si cum frigida intemperie crassi, viscosique succi redundarint, ij nec rosionem ventriculi, nec sitim experiuntur omnino. Communiter autem omnibus superuenit nausea, etsi in ventriculi sinus humores se receperint, etiam ex his ipsis vomitus erumpit. Si vero infarcti tunicis adhaerescunt, etiam eo quod ingesserant sursum educto, nausea solum, non vomitu premuntur ægrotantes præterquam cum cibos assumpserint. Immodica autem corporis plenitudo præsertim humorum crudorum inationem prohibens, si inappetentiæ causa fuerit, quemadmodum vrsis, & quibusdam latentibus alijs animalibus euenit, quæ per multum tempus à cibo abstinēt, maxime hyberno tempore, haud difficulter dignosci poterit. Similiter etiam si propter quampiam aliam causam, vtpote cutis densitatem, aut otiosam vitam impedita fuerit inanitio, & per consequens excitata inappetentia. Ad si calidi fuerint vitiosi succi totum corpus occupantes præter alia signa, Rigor aderit, & febris cum cibi fastidio, seu inappetentia, quæ haud negligenda erit, cum opus sit ad vitam necessarium ipsa appetentia, Gale. teste apho. 3. 6. libr. Quamuis si iuxta principium morborum accesserit, aut iuxta vigorem cum vires adhuc sustinere possunt, nihil molestiarum infert, Aetio auctore cap. 20. libr. 9. Modico enim alimento ægri opus habent, vt ipse inquit. Si vero in declinatione totius morbi appetitus perditio accedat, aut in diuturna imbecillitate, aut viribus debilitatis, aut ex immodica euacuatione, periculo non vacat, ex eiusdem auctoris sententia. Augetur etiam affectio hæc & ab ætate, Incommode enim hoc malo pueri afficiuntur, vtpote qui vocares natura sunt, & alsiduo fomite opus habent. Quare magnus præternaturam excessus significatur, si pueri appetitus perditione fuerint affecti. Calida itaque intemperies os ventriculi infestans, ac cibi fastidium excitans, refrigerante victu, curari debet (Paulo & Alex. testibus) Quapropter frigidus aer eligendus erit, moderatus somnus,

Loco citato,

Prognostica,

curatio si ex calida oritur intemperie,

atque

atque vigilia, & quies magis precipiende sunt, Alui excrementa singulis diebus educenda saltem arte clysteriis lenibus, si natura defecerit. Iram vitetur, anxietates, ac reliquas animi perturbationes immodicas. Cibi quoque refrigerantes exhibeantur, præcipue qui ex aceto parantur. Qua de re panis, posca imbutus esui, ipsaque posca potui detur (vt inquit Paulus) conueniunt quoque lactuca, & cichorium ex aceto, vel posca, & quæcunque alia contrario intemperiei calidæ superanti resistunt: Similiter & aqua per se frigida si moderate bibatur confert. Nam immoderatus in frigidantium non modo non iuuat, sed etiam sæpe insanabilem morbum efficit, vt Paulus refert. Præterea cibi apparentur plures, & uarii, ac optimo apparatu, & ultra dulcedine etiam allicientes, & appetitum irritantes, ac multi alimenti, & omnia quæ exhibentur (vt Aetius inquit) eiusmodi esse conuenit, vt facile deuorari possint. Quæ enim multa commanducatione indigent, iniucunditatem quandam afferunt, & appetentiam euertunt. Quapropter oua sorbilia interdum, & gallorum testes, & ex volucribus non graueolentes, & montanæ exhibeantur, quò sufficiens alimentum corpori offeratur, Nec non pedes suili in decoctione plurimum eliquati, idque commune sit cibi fastidio ex quacunque causa orto. Conandum est etiam vt per odora menta appetitum reuocemus ex posca, aut uino diluto, aut malorū cotoneorum, seu odoratorum pyrorum decocto, vel aquæ rosatæ excipe vnc. iiii. aceti vini albi vnc. i. santalorum omnium 3. ij. misceantur & fiat odoramentum. Extrinsecus vero eis, quæ fouere stomachum & corroborare queant, ac calidam, intemperiem alterare, vtendum, Veluti est oleum rosaceum, omphacinum, ac cytoniorum, vel dictis olei additis succi lactucæ, cicorii, portulacæ, vel solani vnc. i. santalorum, & corallorum rubeorum scrup. i. cum pauco aceto, ac exigua cera fiat vnguentum, quo utare. Vel cytonium accipias & in posca decoquito, contundo, ac stomacho imposito. Quo etiam tempore moderata corporis frictione, atque etiam pedum, ac manuum palpatione, ac contrectatione accuratione vt conuenit, eodem Aetio teste: Saccellos item parare poteris ex rosi, violis, corallis, ac fantalis, qui parum posca inspe si stomacho applicentur. Si vero nedum ex calida intemperie, sed etiam ex mordacium biliosorum humorum redundantia cibi fastidium proritetur priusquam alia adhibeatur curatio, prædictos humores, aut vomitu, aut per aluum reiiciendos curabimus. Per uomitum quidem vbi facilius æger vomat, quibus etiam facilior reddi potest, copiosa aqua tepida exhibita sola, aut pauco aceto, seu syr. acetoso addito. Satiùs etiam fuerit (vt Paulus & Alex. testantur) si priusquam tepidam exhibueris, humectantia ægro exhibeas alimēta, veluti ptisanæ cremorem, vel ouorum lutea, deinde exiguo tempore interposito, vomitum prouocaueris. Nanque his sine noxa erit, & utilissimus, ut Alex. inquit. At difficilius æger uomuerit, melius erit materiam ad ventrem prouocare copiosiore temperatoq; alimento prius humectatam: Ita nanque ea purgantibus medicamentis prompte obedire poterit, ut refert idem Alex. qua etiam ratione aquam hordei pauco saccharo addito exhibere poteris, aut syr. uiolaceum, uel ex infus. rosarum, seu de succo cichorii cum eadem aqua hordei, aut cichorii, uel lactucæ, ut humores alterentur, ac contemperentur, quibus aliquot uicibus assumptis purgans medicamentum propinabis, esto autem id quod stomachum non, offendat, aut calidā intemperiem augeat. In quem vsum unc. iiii. mellis aerii aut unc. iiii. syr. ex pluribus infus. rosarum rubeorum cum tamarindarum decocto exhibebis, uel loco prædictorum casia fistula utare, & interim si uidebitur 3. i. rhab. uigorati in aqua hordei, aut cichorii macerati, & per colū transfusi prædictis adicere poteris. Deinde ad ea, quæ stomachum ipsum intus, & extra alterant, ac roborant, modo a nobis conscripta redeas, quo etiam tempore

Si simul cum calida intemperie vinosi succi redundarint curatio.

pore miua cytoniorum simplici, ac syrupo ex citri acido vti poteris per se, aut cum aqua hordei, vel cichorii. Item cytonium ipsum saccharo conditum confert, vel eorundem cytoniorum succus cum aceto, & melle permixtus modo quo Gal. docet. 6. de sanit. tuen. tribuatur. Qui autem ob frigiditatem cibos fastidiunt, contrarijs etiam medendi sunt tum cibis, tum medicamentis ac reliquis, quæ victus ratione continentur. Inter cibos vero magnopere commendauit Alex. ius columbæ, & vuas passas, etenim ipse stomacho sunt gratæ contemperantque maligna, & cruda concoquunt & propter id, quod nō subito corrumpuntur, nutriunt. Pro potu quoque vinum vetus, & conditum confert, Item decoctum, rutæ, anisi, & petroselinii. Insuper alia his & alimenti & medicamenti nomine conueniunt, Paulo & Alexandro testibus, Decoctum etiam cinnamomi, aut piperis ex aqua calida communi conducit, vel etiam ipsum medicamentum, quod inscribitur diatrionpipericon præbebis, aut diacalaminthes dictum. Iis enim si quotidie vtatur is, quem frigidus venter infestat, nihil incommodi sentiet, Galeno auctore 6. de sanitate tuenda, veluti quibus venter, aut frigidus est, aut etiam temperatus: cæterum si ad frigus propensior (vt ipse refert) iis aptum medicamentum est, quod diaspoliticon vocant. Ex horum quoque numero est theriaca, quæ cum stomacho sit idonea, maligna quoque contemperat. Vnde etiam iis (vt Alexander inquit) quos humida recrementa maligna, & praua infestant, recte hoc antidotum exhibetur, vt vna quoque vice datum appetitum abolitum frequenter reuocauerit. Conducit præterea non parum succi absynthij potio, seu syr. ex eo confectus. Cæterum quibus stomachus nimius refrigeratus est (vt idem fatetur Alexand.) etiam medicamenta ex pipere, & gingibere confecta porrigere necesse est, quorum numero etiam id habetur, quod ex malis cotoneis paratur adiectum habens piper, myrrham, aut ligusticum, aut costum, aut pulegium, vel satis iuxta Gale. sententiam (eodem sexto de sanitate tuend.) sic componas. Accipies (vt ipse inquit) succi malorum cotoneorum, quæ dulciora, maioraque sunt, ac minus acerba, Strutia in Asia vocata, sextarios Romanos duos, quibus mellis optimi tantundem miscbis, aceti sextarium vnum, & semissem, & cum super prunas modice coxeris, & spumam detraxeris, immittes vnc. iii. gingeris, piperis albi vnc. ii. deinde rursus in simili igne recoques, donec mellis crassitudo existat, quæ vtrique crassitudine stomachia medicamenta præparari solent, idque maxime dandum est ieiunis mediocris mistri modo: Quanquam nec si à cibo sit sumptum, quicquam lædit. Commodè quoque dabitur etiam si prius pransus quispiam ante cœnam id sumpserit, maxime tamen tempestiue id duabus horis, aut tribus ante cibum obtuleris. Verum si medio temperamento ventres habeant ita vt nec biliosum excrementum, nec pituitosum congerant, iis piperis, & gingeris dimidium eius, qui prædictus est, modi sat erit, Vt sit piperis vnc. j. gingeris vnc. ij. quæmadmodum si immoderata frigiditas temperiem vitiat, ij quatuor gingeris, piperis tres, aut duas & semis vncias iniicias. Hoc namq. medicamentum tum ad appetentia excitandam ijs, quibus ea languet, tum ad concoctionem ijs, qui parum feliciter cibos concoquunt, vtile est, in summa ventri robur conciliat. In quauis tamen intemperie dicta, poteris medietatem piperis, ac gingeris assumere, aliàs erit medicamentum admodum acre, vt ipse expertus fui; Quandoque præterea ex citro quod conficiunt medicamentum non parum prodest cum melle præsertim. Extrinsecus vero vtendum eis, quæ fouere stomachum, & corroborare queunt, veluti oleum est mastichinum, de absynthio, nardinum. Poteris item hunc in modum iniunctionem parare, Recipe menthæ siccæ, ligni aloes, singul. scrup. i. mastiches 3. iii. aloes 3. ii. succi absynthii 3. iiii. olei nardini

In fine.
Si ex frigida in-
temperie inap-
petentia fiat,
curatio.

Cap. i. post prin-
cipium.

In fine.

cap. 10.

dini & mastichini ana vnc. s. cerę quod satis sit, fiat vnguentum. Vel sacculos componas excipiens menthe vtriusque, ac absinthii cuiuslibet p. vnum, corticum citri, ligni aloes, mastiches, cinnamomi ana 3. ii. maceris, galange ana 3. i. rosarum siccarum p. ii. omnibus rite contusis, saccelli figurentur ad formam scuti, qui per se, vel in vino gręco seu guarneto macerati, prius applicentur, ac pluries iterentur. Emplastrum quoque conficere poteris ex palmulis, aloe, mastiche, vino & hordei farina, ac croco, adiectis oleo nardino, ac absynthii succo, nec non cerę & terebinthine parum. Sin autem nedum ex frigida intemperie, sed ex viscosis humoribus cibi fastidium ortum fuerit, ipsos extenuando, incidendo, ac abstergendo medeberis, ea adhibendo, quę oxymelite, seu ex muria componuntur, vt sunt cappares ex oxymelite parati oliuę quę ex muria, aut oxymelite condiuntur, ac sinapi cum oxymelite, & aceto comestum: & si largius detergere volueris, etiam oxymelite Iuliano dicto vtere Paulo & Alex. auctoribus in quem etiam vsum si hęc non suffecerint ea compositio, quam picram vocant, accommodata est: Nam acrimonia ac calore eorum, quę in se habet, crassos, ac lentos succos diffecat, ac detergit Gal. auctore eodem 6. de de sanita. tuen. Verum assidue vt hoc medicamento non licet (vt ipse inquit) sed singulis septem, vel decem diebus eam exhibere poteris pondere 3. i. s. aut 3. ii. exhibitis etiam prius, quę iam dictos humores preparare, valent, vt mel rosaceum, aut ipsum oxymel, etiam scyllinũ si opus fuerit, aut id medicamebtum, quod ex malis cotoneis paratur, quod mox ex Gal. mente censurpsimus, dabis. Verum eiusdem nedum 3. i. sed .ii. vel .iii. exhibere poteris, & quandoque plus, & demum ea condonanda sunt, quorum supra meminibus, potissimum diatrion pipereon, diacalaminthes, aut theriacę 3. i. eorum pro qualibet vice tribuens cum paucis vino odorifero, aut aqua mulsa. Hisq; conducit (si non difficulter uomant) vomitus, qui cum aqua tepida, & oxymelite proritetur. Insuper & aliis medicamentis conscriptis extrinsecus vtare, ac exercitiis, & frictionibus valentissimis, quin etiam & digitorũ in os immisione stomachus turbatus sepe ad excipiendos cibos est conuersus ex Pauli, & Aetii auctoritate. Quare hoc ipsum tum ante curationem, tũ post eam est faciendum. Euomuntur enim aliquando biliosa, aut pituitosa quędam, quę perdit appetitus in quibusdam sunt causa, atque ita ab hac accessione eos liberabis. Si vero ex virium imbecillitate appetitus perditio contingat considerare oportet qualis intemperies vires exoluat, & per contraria eam ipsam corrigere. At si propterea quod suctio non sentitur, cibi fastidium accidat, cerebro, aut neruis ab eodem ipsi stomacho distributionis, prospiciendum erit, & cognita eiusdem causa, eam prius auferre necesse est: Si autem propterea quod totum corpus plenum existat, eiusdem corpori inanitione non peracta inappetentia fiat, Idem vacuandum est, diuersimode tamen pro varietate redundantis succi quo causa etiam valentiores exercitationes conferunt, Iis etiam quę cutem rarefaciunt, u. pote balneis, ac frictionibus uti oportet, ubi ex cutis densitate eadem inanitio non fiat. Ceterum si ob alicuius uisceris inflammationem, aut ob turationem appetentia deperdatur, illius etiam habere curam conuenit, ut inquit Aetius. At si exulcere in stomacho, aut uentriculo existente ortum ducat inappetentia, ab omnibus acribus & cibis, & porionibus abstinere oportet, ac uti medicamentis, quę leniunt, puta sorbitionibus ex oleo, tnm, ii, quę ex amylo, lemnia terra & lacte, uel quę melle paucissimo conficiuntur, ut quę purgent citra rofionem ex Pauli decreto. Extra ucto ex palmulis, & cydoniorum carne, & polęta epithema facies, & ceratum ex melino, uel rosaceo cum ammeniaco, & thure.

περί διψης σφοδράς.

ideſt, immoderata ſiti. Cap. 65.

IN potionis appetentia totidem quoque fiunt ſymptomata, quot accidunt circa cibi appetentiam, atq; ijs etiam ſimilia Gal. auctore 1. de cauſ. ſympt. Nanq; interim abolitum omnino eſt deſiderium potius, Quādoq; vero diminutum, quæ quidem eiſdem cauſis ortum habent, exceſſu, deſectusq; duntaxat differentibus: de quibus ſymptomatibus modo tractare non intendimus: Verum de ea potionis appetentia mentionem faciemus, quæ vitioſa eſt, & ad portionem ſe habet cum ea, quæ circa alimentum eſt praua, Aliquando quidem immodicum poſtulans potum, Interim vero alieni per eam deſiderantur, perinde ac cibi. Hoc ſymptoma ſiue ingentem, ſiue immoderatam, ſiue vehementem ſitim appellabis, Perpetuo in eo venter & præſertim eius os affectum erit, vt liquet ex Gal. cum primo de cauſ. ſympto. tum 6. de loc. affect. Quanquam non ſemper primario ipſum afficiatur, ſed quandoq; per conſenſum, vel iocinore, & maxime ſima eius parte, vel pulmone, vel meſenterii venis, ſeu ieiuino inflammatis ex ſentia eiſdem Galen. præcitato libr. 6. de loc. affect. & Alex. cap. 8. lib. 7. Dignosces autem cum per conſenſum ab aliqua prædictarum partium inflammatione os ventriculi fuerit affectum, ex proprijs ſignis inflammationum earundum partium. At ſi primario oblaſum ſit, nullum tale apparebit indicium inflammationis prædictarum partiū. Quod vero os ventriculi in hac affectione oblaſum ſit, ex eius etiam proprij muneris offenſione, (quod quidem appetentia cum cibi, tum potus eſt,) cui libet patere poterit. At quod ingens ſitis ſympt. ſit. in genere noxæ functionum, atque ipſius appetentiæ deprauatæ, luce clarius eſt. Nec pro eius ſymptomatis notitia alia conſcribenda ſunt indicia, cum res ipſa ex laborantium relatione pateſcat. Quanquam non ſemper vnum ſectetur oris ventriculi morbum. Nanque aut ventriculus calida, aut ſicca aut vtraque intemperie affectus eſt, & maxime os ipſius, vt idem Gale. inquit præcitato 6. de loc. affect. Et propterea tum ipſe libr. 1. de cau. ſympt. & 1. de ſimpl. de facul. tum etiam Aetius libr. 5. cap. 119. & libr. 9. cap. 4. ac Pau. libr. 2. cap. 52. & Alex. eodem cap. 8. libr. 7. Sitim oriri teſtati ſunt aut ob penuriam humiditatis, aut ob abundantiam caliditatis. Verum nedum ex nudis hiſce intemperiebus, ſed cum vitioſis quibusdam coniunctis humoribus, qui falſi, aut biliſi ſint, ventrem mordentibus excitari poterit quandoque, teſtante Gal. 1. de cauſ. ſymp. Nec mirum ſi ab eis potio magis, quàm cibus appetitur. Nam præter quam quo ab iis caleſcat, ſicceturq; ventriculus (vt ipſe refert) quæ vtique ſitis cauſæ ſunt, etiam liquari, fundiq; tum in eo, tum venis ſuccos contingit. Fundendorum autem ſuccorum ſymptoma ea, quibus continentur implet. Quemadmodum contra frigidity vacuat. Deſiderantur etiam prædictis ſuccis in ventris tunicis redundantibus alieni potus quandoque, perinde vtique ac cibi, pro dominantis vitioſi ſucci ratione. Atque hoc quidem in longo tempore iis, qui vitioſa victus ratione ſint niſi, ſuperuenit: Aliquando autem & immodica ſitis ex naturali humido ipſius oris ventriculi in eo veluti feruente oritur, vt patet eodem 1. de cauſ. ſympt. id quod etiam fieri nequit niſi ab excedente eiſdem oris ventriculi caliditate. Et propterea nō ab re decretum eſt a iam dictis auctoribus præcatis locis, nec non & a Gal. iterum aph. 19. 4. li. ingentem ſitim aut ob humoris inopiam, aut ob caloris copiam, aut propter vtrunque excitari. Nec admodum difficile erit dictas cauſas interſtinguere. Nam ſi ob humoris inopiam excitetur, tum ex infirmi loquela, tum ex iis, quæ præceſſerunt

cap. 7.

Quæ pars affi-
ciatur immode-
rata ſiti.

1. de cau. ſymp.

cap. 7.

6. de loc. affect.

cap. 2.

6. de loc. affect.
loco citato.

Quis affectus
præter naturā.
Ingentis ſitis
cauſæ.

6. de loc. affect.
cap. 2.

1. de cauſ. ſym.

cap. 7.

1. de ſimpl. fac.

cap. 30.

loco citato.

citato capite.

Cap. 30.

commentario,
4, comm. 23.citato lib. 5,
cap. 19.

Loco citato,

Prognostica,

capite citato,
curatio,

cesserunt facile percipies, utpote si ex defectu potus sitis aduenerit, aut ab ea affectione, quam diabetem nuncupant, seu ex aliqua copiosa euacuatione præcedente orta fuerit. Poterunt & eiusdem esse causa ii, qui pertinaciter sibi sustinere sitim imperauerint, aut in nauigio ex aquæ dulcis defectu mari nam biberint. Verum si ob caloris copiam ea fiet citra acriū humorum redundantiam, præter immodicā sitim excedenrer, in ventriculo sentient laborantes caliditatem. Id autem contingit interdum ex alicuius medicamenti assumptione, quod calidum, acre, ac mordax fuerit, At si ex caliditate, & siccitate simul copulatis quidam siti premantur in febribus ardentibus, & adurentibus omnibus, ac ætate, & graui æstu laborabunt, Etenim in his præsertim febrientibus caliditas multa est, & siccitas succedit, multa humiditates per violentiam febris consumpta (Aetio teste eodem cap. 219. lib. 5.) Si autem simul cum caliditate vitiosi adsint succi redundantes falsi aut biliosi, haud difficulter ex iis, quæ precedenti cap. diximus, interstinguere poteris, præsertim ex oris sapore diuerso, salso, aut amaro. Quamquam si falsi humoris copia in ventre fuerit congesta (quemadmodum accidit in aquæ incercutem affusionibus) aut pituita falsa ventri illita inhæserit { vt Galen. fateatur 1. de simpl. med. facul. } ex caliditate simul cum humiditate coniuncta sitis orta erit. Si autem biliosi redundarint succi, à calida & sicca ventriculi dispositione sitis proueniet, cum talis fuerit naturæ is succus. Fiunt quoque nonnulli sitibundie x immodico vini meracioris potu, præsertim veteris, ac ciborum calidorum esu, & qui quandoque viperas deuorarunt, aut qui vinum, in quo talis serpens fuerit mersa, biberunt, non ob aliam causam, quam earum aliquam, quas supra diximus. Verum ne quis decipiatur, animaduertendum nos ingentis sitis, quæ in ægris excitatur corporibus, & non exiguæ, modicæ, seu superficialis, quæ in sanis quandoque corporibus oriri consuevit, verba fecisse. Nanque licet ea ob siccitatem etiam, aut caliditatem fiat. tamen neque à toto corpore, neque ex magno ventriculi partium affectu excitatur, Galen. auctore 6. de morb. vulg. Sed (vt ipse inquit) Erasistrati auctoritate arescentibus, aut incalentibus locis illis, per quos ab ore ad ventriculum humor delabitur, fieri consuevit. Et propterea si arescentibus locis illis fiat, somnus remedio est, corporis penitioribus, atque iam dictis locis madefactis, utpote per somnum sanguine ad interiora delapso (vt ipse inquit Gal.) vel quia idem somnus humores concoquit, vt testatur Aetius. Verum si ob caliditatem iam dictarum partium superficialis sitis aderit, atque à somno expergefactis, Vigilantibus facile sedabitur. Calescunt enim dum in stomacho cibi concoquuntur, calido quodam halitu ad eas partes delato, quæ caliditas cum in vigilis circa superficiem expanditur, à tali siti facile liberantur, euanescente siquidem calefactarum partium caliditate. Verum si ob comestorum, epotorumq; calorem ventriculo excafacto, à somno siticulosi fiant, absq; externo subsidio per vigilias sitis non sedabitur, & propterea Hippoc. eodem 6. de morb. vulg. dicebat, siti superficiali somnus medela est. Siti vero ex somno vigilia quibusdam. & apho. 27. 5. lib. qui noctu bibere appetunt (inquit) iis admodum sitientibus si superdormierint bonum. Neque enim omnibus à somno excitatis ab eodem affectu sitis oboritur: Verum ingentis sitis, de qua modo sermo habetur, non paruifacienda curatio est, cum si nimium inualescat, ex ea ægri perire poterunt, quemadmodum Galenus nonnullos vidit immodice sitientes perire ex diuersis causis, ac modis quoque diuersis, vt patet apud eundem præcitato lib. primo de caus. sympr. At pro eius curatione non semper refrigerantibus, humectantibusque vtendum erit, sed vbi causam accurate distinxeris, atque internoueris, ita tandem congrua adhibenda curatio est, Alex. teste præcitato cap. 8. lib. 7. & proinde iis, qui ex siccitate sitiunt, humectantia

stantia conueniunt, ita vt aer humidior consuetudo eligatur, temperatus tamen in calore, & frigore. Somnus solito longior conuenit. Nanque hoc duntaxat curari hæc sitis consuevit. Quies etiam præcipienda erit. Nam & ipsa ex accidenti humectat, saltem seruans humiditatem, eam scilicet, quæ ex cibo prouenit, non excitatur, vt patet apud Gal. com. aph. 1. 3. 4. lib. cibi quoque potus humidiores sint. Et si ex immodica euacuatione fuerit siccitatis orta, erunt cibi eligendi nedum humidiores, sed qui multum, ac prompte nutrant, optimiq; alimenti, & qui facilius cōcoquantur, veluti contusa, seu iura ex carnibus gallinarum, aut pullorum, ptisana, seu eius cremore adiecto. Potus sit aqua, aut vinum album, tenue, subastringens multa aqua permixtum. Si vero ex defectu potus fuerit excitata, abundanter ijs tribuendus erit, viribus consentientibus. At si ex diabetica dispositione, Ea curanda erit. Verum vbi ex caloris copia orta sit sitis, si ob caliditatem edulorum, aut ob multum vini meracioris potum excitata fuerit, Medela est, frigida potus, Gal. teste 6. de morb. vulg. & Actio præcitata capitu. 1. 19. lib. 5. Similiter & ex eiusdem Actii auctoritate, vbi longo iam tempore stomachus æstuat, radice dulcis succus potatus auxiliatur, atque ipsa etiam radix ex aqua. item pampinorum vitis, cremor, & portulacæ succus, vt apud eundem patet cap. 4. lib. 9. eodem pacto cucumeris satiui semen commanducatum, vel decorticatum, & tritum, & ex aqua potatum. Nec minus prodest tum lactuca, tum portulacæ semen manducatum, & ex aqua potatum. Vniuersa autem victus ratio in his ad frigidum vergat. Vbi vero cum caliditate coeat humiditas, & propterea sitis fiat, optima eius medela acetum est, vt Gal. inquit primo de simpl. medica. facul. Poterit insuper & eisdem exhiberi mali medici, seu limoncelli succus cum aqua frigida, Item malorum cydoniorum, vel pampinorum vitis, vel mali punici succus sorbitioni per se, aut cum aqua datus confert. At vbi ex calore simul, at siccitate sitis fuerit orta, optima medela est (Gal. teste ibidem) acetum vt quod strenue refrigeret, & quouis expedite permeet, & aqua, quæ supra quam quod refrigeret, omnium sit vel humidissima. Nihil enim est aqua humidius (vt ipse inquit.) Componi autem inter se debent, vt facile potari possint, dico acetum & aqua. Id quod ex sumentis gustu, & non nostro iudicium facere oportet. Rati tunc fore conuenientissimum, & proinde etiam vtile, cum eidem fuerit iucundum. Ab extra vero conducit sanguinariæ, intybi, sonchi, pampinorum Vitis, seu portulacæ succus cum aqua rosacea, ac paucis aceto permixtus, si frigidus stomacho adhibeatur: Vniuersa vero victus ratio frigida, & humida præcipiatur, Verum si in febrientibus sitis accidat, lenimenta quædam sitis excogitanda sunt, ex Actii sententia, quandoquidem & mensuram, & tempora potus discernere oportet. Nam si sine detrimento bibere possent ægri quando vellet, hanc sane sitis medelam statim amplecterentur: Sed quoniam intempestiue sumptus potus non solum sitim non extinguit, sed etiam contra auget, propterea non ab re, eadem (vt diximus) lenimenta sitis excogitanda sunt, quibus oportet vti in principiis, ac exacerbationum augmentis, quo tempore potus prohiberi debet. In vigoribus autem primum per gargarismos, & collutiones oris squallorem corporis mitigare oportet. Deinde declinatione incipiente potum dare. In remissione vero etiam volentes aliquando cogendi sunt, vt potum assumant. Mitigare itaque oportet hanc sitim per irrigationem capitis ex oleo frigidissimo vel rosaceo, Paulo & Actio testibus. Optime etiam facit (vt inquit Paul.) nigra lactuca seu comman- ducatum. Ad hæc cucumeris semen in ore retentum, vel portulacæ viridis seminis, similiter & peponis, succiq; radice, dulcis & tragacanthi singulas partes æquales assume, & cum saccharo ad fabæ magnitudinem reducito, ac vtere. Aut seminis cucumeris satiui excipe 3. iij. tragacanthi 3. ii. traga-

Gal. 6. de mor.
vulg.
Loco citato,

cap. 3. & 19. in
fine.

Sitis curatio
in febrientibus
lib. 5. cap. 19.

canthum contundito, & cribrato, semen vero conterito, & cum crudorum ouorum recentium albumine, ac saccharo catapotia formato, & his vnum sub lingua tenendum exhibeatur, vt paulatim dissolutum diglutiatur. Ad ieci autem saccharum his medicamentis quo iocundiora fiant, quod in aqua rosaceo dissoluatur. Conducit etiam melonis indi semen, aut eiusdem parua frustula, eius substantiæ, quæ est inter externum corticem & internam medullam, si in ore detineantur. Ex succo etiam malorum punicorum, vel pampinorum vitis, aut cytoniorum cum aqua permixtis, in accessionum vigore, gargarismi, & oris collutiones faciendæ sunt. Pariter & ex vino albo aquoso multa aqua permixto. At in declinatione exacerbationum vbi inceperit, ac in earum remissione potum dare conuenit aquæ frigidæ vbi omnia consentiant, seu pauco aceto adiecto, vt diximus, ex Galeni sententia, vel vnc.iii. syr. acetosi simplicis; aut ex oxysaccharo assumas, ac frigidæ permisceas, vel vt tutius exequaris non aquæ frigidæ, sed aquæ hordei miscebis. Verum vbi vitiosus quispiam humor in ventriculo contineatur, biliosus si fuerit, ac prædicta refrigerantia, & humectantia non suffecerint, ita vt ex eisdem alteretur, ac contemperetur, per vomitum vacuari procurandum est, cum his, quæ præcedenti capitulo diximus, modo laborans non difficulter vomat. Nam si difficulter vomuerit, per inferiora purgandus erit lenientibus duntaxat medicamentis, vtputa casia fistula, melle aereo, saccharo violaceo, aut sy. ex pluribus infu. viol. vel ros. cū tamarindorū decocto. Deinceps quæ diximus medicamenta intus, & extra sitim arcentia propinentur. Pariter si pituitosus, ac salsus fuerit, is qui redundat succus, quæ astringunt, ac repurgant eundem humorem, offerre conuenit. Veluti est prisana ac eius cremor, radicis glycyrrhizæ decoctum ex aqua, ac ipsummet rosaceum mel, seu diluta aqua mulsa: & vbi hæc detergere non valuerint, quæ purgant adhibeto, casiam videlicet fistulam cum trochiscato agarico, autem diacat. & deinde ad ea, quæ sitim arcent, præsertim ex calida, & humida affectione ortam, præbenda te conuertas. huiusmodi sitim a salsa pituita ortam nouit Alex. per salsos cibos (vt ipse inquit) finitam fuisse. Quæ vero sitis ex inflammatione oritur, cuiusuis prædictarum partium curata inflammatione sedebatur.

περί λυγμῶν. idest de singultu. Cap. 66.

Singultus quid sit.
3. de caus. sym.
cap. 2. post principium.

Quibus singultus a vomitu differat.
3. de caus. sym.
cap. 2.

ORITVR interim veluti cōuulsua oris vētriculi affectio, siue stomachi cōuulsio quædā, quæ a græcis λυγμός, quandoque autē ab Hipp. λυγμός dicitur, a latinis aut singultus nuncupatur, qui motus quidam est vehemēs, ac violētus stomachi, quo rē infestātē expellere conatur, vt Gale. sententia liquet cum 3. de cau. symp. tum com. apho. 39. lib. Hic quidem motus (licet eiusdem generis sit cum vomitus) fortior tamen illis, ac vehementior est, cum per eū stomachus appetat, ac conatur eorum aliquid expellere; quæ in ipso continentur; Non siquidem in eius latiori spatio, sed in ipso ventris corpore, atq; ea, quæ sunt in ipsius ore penitiorē. At quod ea, quæ veluti absorpserit stomachus, seu ventriculi os, quæ quidē per singultum excernere tentat ventriculus ipse, vehementiori motu indigeant, vt expellātur quàm ea quæ in capacitāte ventris continentur, & per vomitum expelluntur, omnibus fere clare patet. Mediocris itaque in vomitibus erit stomachi, motus, siquidem per vomitum ea duntaxat appetit expellere, quæ in ventriculi spatio latiori continentur: Fortior autem, & uehementior in singultu, cum ea, quæ sunt in ipsius ora penitiorē, atque in ipso ventris corpo-

re infarcta, expellere tentat ventriculus, vt liquido constat apud Galenum præcitato lib. de caus. sympt. & com. aph. 39. 6. lib. Valeant ergo Arabes, & eorum doctrinam sectantes, qui contrarium sentiunt. In hac affectione quod os ventriculi affectum sit præcipue, patet apud Gal. tum præcitatis locis, tum etiam 3. & 5. de loc. affect. cum pars hæc (vt sæpius diximus) exactioris sit sensus, quandoque ex eiusdem Gal. sententia com. aph. 3. lib. 7. ne dum os ventriculi, verum etiam totus ventriculus ipse. Nonnunquam etiam, & pars ea, quæ proprie stomachus appellatur (gulam nominant) affici potest, licet non adeo exactioris sit sensus. Affectio hæc cum contineatur sub communi genere motuum illegitimorum, seu deprauatorum, vt liquet ex Gale. lib. 2. de caus. sympt. & maxime eorum, qui à facultate fiunt, a causa tamen præternaturali irritata. Propterea nulli in dubium venit quod symptoma sit, in genere noxæ functionum naturalium ipsius stomachi deprauatarum. Nanque nõ vnus duntaxat facultatis opus, seu deprauatus motus est, sed duarum ex eiusdẽ Gal. decreto præcitato lib. 3. de caus. sym. nempe expultricis, & retentricis. Miscen- tur etenim tum morbi, tum symptomata interdum tam expultricis, quam re- tenticis facultatis (vt ipse refert.) Verum primum quidem expultricis motus est non legitimus, secundo loco retentricis, ac complectentis facultatis eius- dem ventriculi, vt ipse Gal. inquit. Qua ratione nemo inficiã ibit nos ipsum dixisse illegitimum esse motum expultricis ventriculi facultatis, cum eiusdem primo noxa sit, secundario vero ipsius retentricis. Primo. nanque per hunc prauum cupit ventriculus, media ex pultrice facultate, id quod contristat rei- cere. Secundaria vero cum prauè venter singultit: retentrix quoque facultas oblæditur, cum prauè, & non naturaliter cibus complectatur: propter eundem illegitimum, seu conuulsiuum ventriculi motum (siquidem conuulsio in to- tum non est, sed veluti conuulsio quædam & ambarum virtutum commune symptoma) vt eisdem Gal. placuit, idque non ab re. Nanque conuulsio solis ac- cidit musculis, ventriculus autem nec stomachus musculus est. Sed in hac af- fectione similitum affectu, tum mori mouentur eis, quibus instrumenta re- spirationi seruientia per tussim ex intemperie ortam, omnibus nimirum ven- triculi partibus quod contristat expellentibus. Quod vero ob geminam cau- sam excitari possit, ab Hipp. decretum est aph. 39. 6. lib. Inanitionem inquam vel repletionem, veluti & ipsa conuulsio proprie dicta. Illud idem confir- mauit Gal. com. aph. 13. eiusdem 6. lib. Quamquam magna ex parte a plenu- dine raro autem ex inanitione fiat singultus, vt ipse inquit. Hos sectati sunt Paul. lib. 2. cap. 56: Alexand. cap. 15. lib. 7. & Aetius lib. 9. cap. 5. Verum circa hanc Hippo. sententiam hæsitare videtur Gal. lib. 6. de comp. mede. secundum locos, asserens quod ipse in conuulsione tertiam aliquam causam supra eua- cuationem, & repletionem nondum reperit, singultum autem sine his fieri vidit, vt pote ex acris humoribus aut serosis, & medicatis stomachum mordentibus, quos vbi vomitu reiecerint, statim singultu liberantur. Quin etiam ex deuorato pharmaco ex tribus piperis generibus constante, vel ipso met pipere tenuiter cribrato: Si statim vinum postea biberint, & præsertim calida aqua temperatum, omnino singultiunt, calore quidem potus piper ad interiora deuehente, sua vero acrimonia ipso ventriculum molestante vt ipse Gal. refert præcitato comen. apho. 39. 6. lib. ex quorum numero ipse erat, vt patet cum præcitato lib. 8. de comp. med. secundum locos, tum 3. de loc. affect. Amplius & a cibo in mordacem qualitatem corrupto; quin etiam ex rigore, seu frigiditate oris ventris singultus excitatur, vt ipse refert: Quan- quam etiam asserat dignum consideratione esse, num ob nimiam euacuatio- nem fiat singultus, veluti & conuulsio. Id tamen admittendum erit, ex Hip- pocratis auctoritate, quamuis raro accidat. Ex quibus liquet non solum

Vide Auic. lib. 3. sen. 13. tract. 3. cap. 19. 3. de loc. affect. cap. 7. 5. de loc. affect. cap. 6. Quæ pars in sin- gultu afficiatur. Quis affectus præter naturam sit singultus. Cap. 1. Lib. 3. de caus. sympt. cap. 2.

Bisariam posse singultus gene- rari.

Dubium a uer- sus Hipp. Cap. 3. post me- dium.

8. de composit. med. secundum loc. Cap. 3. 3. de loc. affect. cap. 7.

cap. 7.

Resolutio.

cap. 3.

Prognostica

Curatio si fiat
ex inanitione,

ex repletionem, & inanitionem singultum fieri posse, verum etiam ex nonnullis alijs causis morsum ipsi ventriculo inferentibus, ob immodicam videlicet caliditatem, vel frigiditatem. Quod vero vehemens caliditas, atque frigiditas, morsum inferant, ac media continui solutione, dolorem proritent, liquet ex Gal. 4. de simpl. medic. facul. Quamuis vna erodendo, reliqua vero diluendo id efficiat. Quod etiam præter inanitionem, & repletionem, iam dictæ causæ singultum excitare valeant, confirmatum est à Paulo, Aetio, & Alex. præcitat. locis. verum ne calumnia Hipp. aliqua tribuatur, ac de insufficientia damnetur, nec Gal. & reliqui iam dicti authores vt superflui condemnentur, dicere possumus primo Hipp. præcipuas, vniuersales, ac maximas tantum causas recensuisse ipsius singultus, quæ sunt inanitio, & repletio, reliquas vero particulares tanquam manifestas omisisse, quas demum Gal. & reliqui particulatim enarrarunt. Vel rectius dicamus quod quamuis plures esse possint particulares singultus causæ præter repletionem, & inanitionem, cunctæ tamen ad eas reduci possunt. Nanque cum omnes morsus ratione (vt diximus) ipsum efficiant, aut calefacientes causæ erunt, ac humores calidi, acres, & mordaces: & sic quis nam vereatur quod vim habentes exiccandi, dicere poterimus, ex inanitione singultum fieri ex talibus causis? Quemadmodum ipsemet Gal. decretum reliquit apho. 1. 5. lib. vel non calefacientes, sed infrigidantes ventriculum ipsum immodicè, propterea singultum excitabunt, quo casu quis etiam verebitur quod singultus hic reducetur ad eum, qui ex plenitudine oritur? Nam cum rigor, & frigiditas omnia neruosa corpora efficiant ad distandum difficilia, sunt causa vt hæc repleantur, atq; ideo singultus inde existant, vt testis est Gal. com. aph. 13. 6. lib. Non itaque defecit Hipp. in narrandis causis singultus, nam considerata rei natura duæ duntaxat vniuersales (quas ipse refert) erunt. Nec de superfluo Gal. & reliqui condemnari possunt, vt qui speciatim magis, ac manifestas causas præter inanitionem, & repletionem conscripserint, licet ad eiusdem reduci possint cunctæ, quæ dictæ sunt, vt reliquæ, quæ ab alijs narrantur. Quemadmodum si in febribus singultus fiat, stomacho præsertim, aut aliquo alio viscere inflammato. Tot itaq; singultus causæ esse possunt particulares, licet vniuersales tantum duæ sint. Quæ omnes particulatim facile dignosci queunt. Nam si ab inanitione excitetur, ex præcedentibus causis inanientibus, vt immodico sanguinis fluore, aut alui profluvio, seu reliquis huiusmodi dignoscere valebis. Si ex repletionem, aderunt & plenitudinis signa, sic si ex acris humoribus, & medicata qualitate præditis, eorum signa aderunt, & vbi vomitu eos reiecerint, statim à singultu liberantur, veluti etiam si ex cibo corrupto in mordacem qualitatem aliqui singultiant: Hi quoque à vomitu statim liberantur, Similiter ex rigore oris ventris, aut ob eiusdem partis frigiditatem, vel ex deuorato pharmaco ex tribus piperis generibus singultire contingat, ex relatione ægri facile percipi poterit. Quamnis pueris maxime ob corruptionem alimenti in ventre, aut ob eiusdem partis frigiditatem singultus accidat, Galen. teste 8. de comp. med. secundum locis. Frustra itaque conterendum tempus erit in narrandis alijs signis causarum singultus cum promptè quælibet earum percipi poterit, tum ex ægroti sermone, tum etiam ex iis, quæ supra, diximus. Verum singultus ex inanitione si fiat, siue ex immodico sanguinis fluore, aut ex nimia purgatione, semper malum erit, Hipp. auctore aph. 3. & 4. 5. lib. Nec minus & malum erit vbi à vomitu singultus excitetur. Indicat enim vel cerebrum neruorum principium, vel ventriculum pati non mediocrem inflammationem, ex sententia Hippocr. & Galen. apho. 3. 7. lib. Similiter & malum erit si ab illo singultus fiat, vt liquet apud eundem Hippocr. apho. 18. præcitati lib. 7. At si singultus in altiore sopore, aut animi deliquio, aut tetanis obortus fuerit, mortem non longe abesse præfagit, vt inquit

inquit Aetius. & singultu tamen correptum sternutatio superueniens liberat inquit Hip. aph. 13. lib. 6. quando scilicet ex plenitudine fiat, vt Galen. exponit. Vbi autem ex euacuatione ortus fuerit singultus, curabitur per alimenti conuenientis assumptionem, & per ea, quæ defectum expellent, eodem Aetio teste. & si perseuerauerit adhuc immodicus sanguinis fluor, aut alui profluuiū eisdem prospiciendum erit. Ijs maxime conducit oleum amygd. dulcium potum per se, aut cum aqua tepida, pariter & ptisanæ cremor per se, vel cum confusa pullorum carne. Si vero ex frigiditate, calfacientibus curari debet (Gale. & Aetio testibus) tum cibus, tum medicamentis. Quapropter in potu ruta cum vino exhibenda est, aut apium, cuminum, calamintha, asarum, pulegiū, dictamum, aut nardus celtica, quodlibet eorum per se, aut simul mixta in aqua malsa decocta, vel etiam seseli, & daucus, sed castoreum ex Gal. Aetii, & Pauli sententia, vel syr. de mentha, seu è corticibus citri paratum exhibe. Interim quoque 3. i. diacalaminthes, aromatici rosati, aut diarhodon seu diacinnamomi cum exiguo vino, aut aqua malsa præbebis. Foveri etiam extrinsecus debet stomachus oleo, in quo ruta, cuminum, & absynthium sint decocta, vt idem Aetius inquit. Insuper oleo mastichino, nardino, costino ab extra vti poteris, similiter & saccelli parentur vtraque mentha, absynthio, calamintha, ac pulegio ana p. i. macere, gariophyllis cinnamomo ana 3. ii corticibus citri, ligno aloe, & chia mastiche ana 3. i. confusis omnibus saccelli formentur, ac calidi per se, seu parum inspersi vino albo odorifero applicentur. Quod si simul cum frigiditate frigidorum, viscosorumque humorum copia adsit, extenuantibus, & incidentibus vtendum est, Alexan. auctore. Inter quæ summopere acetum scyllinum approbat, ac ipsum oximel scyllinum. Paulus vero, ac Aetius eis, qui integræ sunt ætatis 3. i. castorei ex posca potui tribuunt, quin etiam & ipsum forinsecus (vt aiunt) impositum cum oleo sicyonio, aut antiquo commodum existit. Denique (vt Paulus refert) spiritus retentio potens est remedium. Ab extra vero vsus (ut inquit Trallianus) fuit castoreo, styrace, & mastiche, oleo ipsa incoquens, agitabatque inter coquendum oleum ruta, & ex eo stomachum uehementer fouebat: & ubi hæc non suffecerint, per uomitum modo dicti succi uacuandi sunt, præsertim si facile uomant qui etiam iuuari poterit ex potu aquæ tepidæ cum oxymelite, etiam scyllino si opus fuerit. Et si ægrè euomant, per inferna ex hiera, & agarico (nisi quid prohibeat) uel tutius per clysteres purgabis, qui eodem agarico, & hiera, rosaceoque melle dicatho. aut medicamento ex dactylis parari poterunt, oleo, & sale adiectis cum mercurialis, caricarum, florum chamæmeli, foliorum betæ, ac maluarum decocto. Curat item sternutatio singultum a plenitudine ortum, Hippoc. & Gal. testibus præcitato aph. 13. 6. lib. Nam uolento opus est motu, ut ueluti concussæ ipsum efficientes humiditates diffentur, atque euacuentur, hoc autem facit sternutatio (ut Gal. inquit) pariter & uomitus sufficiens erit ipsius medela, ut liquet eodem 8. de comp. medic. secundum locos. Qua ratione etiam ex Aetii decreto, confert extremarum partium adstrictio, compressio spiritus, uociferatio concinna cum plurimo clamore, deambulatio longa, & concitata gestatio, atque adhuc magis equitatio, & cucurbitulæ cum plurima flamma pectori, stomacho, & dorso affixæ. Vbi vero ob caliditatem, mordacemque acrimoniam singultus fiat, primum uomitum reperimus sufficientem medelam, Gale. & Aetio testibus. Quod si excrementa rodentia, & corrupta fuerint, iis utendum esse constat (ut inquit Trallianus) quæ contemperant, & simul id, quod rodit, abstergere possunt. Quapropter temperata aqua, & pane ea imbuto, ac copiosa ptisana utendum. Item pisciculo aliquo, qui aceti paulum habeat, & pullis columbarum. Obtunditur etiam dictorum excrementorū mordacitas, si in trybi succus fue-

Si ex frigiditate.

Si ex frigidiorum humorum copia.

Cap. 3. post medium.

Curatio singultus a caliditate orti.

Loco citato.

cap. 1.

rit putatus. Item cucumeris semen decorticatum, tritumq; bibitum, & lactuce semen, eodem modo: ad hæc portulacæ succus potatus, ipsaque portulaca in cibo sumpta, & myxarum decoctum in potu acceptum. Maximeque omnium tamen præstat (ut inquit Aetius) lac recens multum, potatum. Id vero sit asininum, aut caprillum: adhuc exhiberi poterit utiliter syr. violaceus, ex nymphæa, de papauere, ac de infu. rosarum, seu de succo cichorij. Conducunt etiam pariter & hæc si ex cibis in mordacem qualitatem corruptis aliquis singultiat, prius tamen præcedente vomitu, ut diximus. Sic etiam si singultus fiat ex serosis quibuscunq; & medicatis humoribus, stomachum mordentibus. Verum ubi mordacitas ex iis non alteretur, abstergetur, ac discutiatur iis, quæ sensus stupefactionem inducunt, uti opus erit eiusdem Gale. & Aetii decreto. In quem usum 3. i. medicamenti Philonii perfici, aut romani exhiberi poterit. Quamquam ipsi pharmacum quoddam mixtam quandam facultatem habens alterandi, discutiendi, attenuandi, ac resiccandi, & sensum obtundendi conscribunt. Quo et si videbitur, uti poteris. Nam Gal. præcitato li. 8. de comp. med. secundum locos nedum idem medicamentum Asclepiadis auctoritate conscripsit, sed particulatim quodlibet medicamentum simplex, quod in ipso ingreditur, exposuit, ac eius vires examinavit. Ab extra vero oleum rosaceum, citoniorum, de papauere, ac ex nymphæa applicari poterunt, quolibet eorum per se, aut cum aliquo aliorum permixtum, adiiciens solani, aut portulacæ, lactucæ, seu intybi succum, nec non aceti parum. Verum si ob ipsius ventriculi, aut alterius visceris inflammationem singultus fiat, ex eiusdem inflammationis curatione sedabitur. Id vero ex iis, quæ paulo post dicemus, patebit. Similiter si fiat ex spiritu flatuoso, eis, quæ ipsum discutiunt intus, ac extra adhibitis soluitur. Consulto et prætermisimus particularem victus rationem singultus, prout diuersa exigebat eius causa, ne nimium prolixi essemus, tum quoniam studiosi ex iis, quæ diximus in aliis stomachi affectionibus pro causarum diuersitate petere poterunt.

περί ὑπιντίας, ἀνατροπῆς, ναυτίας, ἢ ναυτησίως, καὶ ἐμέτε.

id est de supinitate, stomachi subuersione, nausea,
& vomitu. Cap. 67.

cap. 2.

Ga. 4, ante finē

QUAMVIS venter cum pro naturæ lege se habeat, ut trahat quidem ad se superne per stomachum, Deorsum vero excernat: Tamen cum ab aliquo, quod morfu, pondere ve contristet, vexatur, eiicere id statim cupit, & quocunque vergit, id quod offendit, eo abutitur ad expulsionem, & interdum si toti ipsi ventriculo talis affectus contingat, utroque et eius ore utitur ad expellendum Gal. teste 3. de caus. sympt. Non ab re itaque in hoc expulsionis conatu, in eo plures excitari possunt deprauati motus, ac symptomata expultricis seu eiusdem ventriculi facultatis. Verum nos posthabitis his, quæ proueniunt, cum venter eiicere cupit, per infernum os in pyloro existens, quoniam de his infra pertractabimus, de eis mentionem faciemus deprauatis motibus expultricis facultatis, ventriculi qui (præter iam dictos) ipsi accidunt, cum cupiat id, quod contristet, excernere per supernum os in gula existens. Si autem plures sunt, prout diuersimode offensus ventriculus ipse a diuersis causis fuerit. Nam quidam est, qui a nonnullis græcis ὑπιντία, ἢ ὑπιντία, latine verò supinitas stomachi appellatur, qui affectus contingit quandoque iuxta intemperiem quamcunque ipsius stomachi, citra tamen viciatos humores. Fit etiam per humiditatem multam quidem, non tamen malignæ qualitatis, ut liquet Galen. 8. de comp. medic. secundum locos. Irregularis enim stomachus (ut ipse inquit (per largam humectationem similiter

ut

vt ligamenta neruorum, lassatur. Quidam vero a græcis ἀναπονη, à latinis subuersio dicitur. Quanquam, hæc vox indifferenter duo significare poterit ex eiusdem Gal. auctoritate. Nam quandoque appetitus perditionem sic appellare possumus: Interim vero nauseosas affectiones ab accepto cibo fientes contingit etenim quandoque hoc vnum solum symptoma accepto cibo, vt si paulo fortiori motu moueantur, statim vomant. Appellant aliqui etiam tales stomachicos, Verum hæc affectio quandoque ad solam oris ventris debilitatem sequitur quod cibos amplecti eisque obuolui non poreft, velunt tota ventris amplitudo solet. Quandoque vero & cum vitiata alicuius, modica tamen humiditatis, complexu. Nam multa quemadmodum & valde vitia- ta citra cibum nauseam efficit (vt poterius dicemus) quam nauseam græci cum ναυτίαν, ναυτίνον appellare solent. Quandoque ipsa ventriculi vis ad alium deprauatum excitatur motum, vt quæ ipsum contristant, detrudat, quæ licet non idem sit cum singultu, eiusdem tamen generis est, vt eidem Gal. liquet com. aph. 39. 6. lib. maioris ac minoris ratione differentes. Nam vehementior ille, medioris autem hic stomachi motus existit (vt præcedenti capite dictum est). Appellatur vero à græcis ἐμετος, à latinis vomitus. Verum quanquam quatuor hi affectus nominati paulo inter se dissideant, tamen nos quoniam prius, qui stomachi supinitas appellatur, facillime curabilis est, quia aut attringentibus solis, aut quæ siccare humiditatem possunt, ac constringere laxatum corpus, curabitur, aut alternatibus, vel eisdem simul mixtis de quibus in cura nausæ, & vomitus mentio fiet, amplius verba de eo non faciemus, velut neque de ea, quam græci ἀναπονη, latini subuersionem nuncupant. Nam si ea ἀναπονη hoc est appetitus perditionem significabis, iam eius curam conscripsimus. Si vero per eam intelligatur id symptoma, quod accedit sumpto cibo, vt si paulo fortiori motu moueantur, statim vomant, ex ijs etiam, quæ nausæ, & vomitus curabuntur, curari poterunt, potissimum cum parum à nausæa discrepet, quando à modicè uitiata humiditate exoritur. verum si ob oris ventriculi solum fiat imbecilitatem, curabitur vt supinitas. Reliquum est vt consuetum morem seruando, de nausæa, & vomitu à nobis sermo fiat. Ii nanque maximam inter se cognationem habent, ac vnus reliquum præcedit. Nam nausæa vomitionem præcedit, licet non perpetuo ad nauseam vomitus consequatur, cum nonnulli nausæarunt, nec tamen vomuerunt, vt Gale. inquit 2. de caus. sympt. similiter Paulus cap. 155 lib. 2. dicebat, Nonnulli vero turbantur, sed nihil euomunt, humore ipsis tunicis imbibito quæ nausæa deprauatus est quidam expultricis facultatis ventriculi motus, quo venter ipse ea, quæ eius corpus contristant, quam citissime per stomachum vacuare appetit, vel breuius, irritus quidam est conatus ad vomendum, vt quidam volunt, seu inanis quedam vomendi irritatio, hæc interdum ad vomitum impellit (vt diximus.) Interim vero & citra vomitionem fit, vt ex Galen. mente declaratum est. Ad vomitus prauus quoque est eiusdem expultricis facultatis ventriculi motus, quo ea quæ in eius capacitate, seu latiori spatio existunt, ac ipsum contristant, & in se fluitant, reiciat quam citissime per stomachum, vt ex eiusdem Gal. verbis colligi potest præcitato libr. 2. de caus. sympt. Ex quibus facile quispiam colligere poterit tum conuenientiam, tum etiam & differentiam inter nausæam & vomitum. Quod vero in ambabus hisce affectionibus os ventris potissimum afficiatur, liquet apud Gale. cum 2. de caus. sympt. tum etiam 5. de loc. affect. Dixi autem non ab re potissimum, quoniam & totius ventriculi affectiones esse possunt, quemadmodum & reliquæ iam dictæ, vt apud eundem Gal. liquet præcitato lib. 5. de loc. affe. & cum nemo sit qui vereatur ventriculum in hisce affectionibus obledi, easque esse proprias eiusdem affectiones, citra quæ symptomata nihil è ventre per os

Nausea cum vomitu conuenientia & differentia.

1. de caus. sym. Cap. 4. prope medium.

Nausea quid sit.

Vomitum quid sit.

cap. 3.

Que pars in eis afficiatur.

2. de caus. sym. cap. 3.

5. de loc. affect. Cap. 6.

Loco citato.

Qui affectus
præter naturam
sunt.

cap. 3. & 4.

Loco citato,

Nauseæ signa,
Aet. lib. 9, 6, 10,

Nauseæ, & vo-
mitus causæ.
2. de caus. sym.
Cap. 2.
3. de caus. sym.
cap. 2.
8. de composi-
t. med. secun. loc.
cap. 3.

efferi potest, ex sententia eiusdem Gal. com. apho. 43. 2. lib. Propterea in hoc sermo protelandus, & tempus conterendum non est, etsi ventriculus per se quandoque per consensum, maxime in vomitu afficiatur, ut ex causarum enarratione patebit. Verum qui affectus præter naturam sint, non admodum liquet cum Gal. quandoque naturalis expultricis facultatis symptomata appelleret. Interim vero huiusmodi motus licet pravi sint, naturæ opera nuncupet, ut eodem 2. lib. de caus. sympt. scriptum est. At si quis eiusdem verba probe intellexerit, pro comperto habebit utrunque verum existere. Nam cum nullum animal nauseare, aut vomere ab aliquo doceatur, immo à seipso, ac à propria eius natura, (seu ut ita dixerim) à principio intrinseco, & per consequens naturaliter hos exercent motus, cui in dubium venerit motus hos naturæ esse opera? At quoniam nunquam natura ipsa tales exorditur motus, nisi grauata, aut stimolata à quapiam præter naturam causa, quæ naturam sic violenter mouere cogit, Propterea inter symptomata, quæ præter naturam sunt, annumerantur, ex illo siquidem sympt. genere sunt in quibus causa aliqua, quæ præter naturam est, ad tales actiones naturam stimulat. Hinc fit, ut symptomata potius, quàm naturæ opera appellari mereantur, cum nunquam ex se ipsa natura tales exordiretur motus nisi à causa aliqua præter naturali fuisset stimolata. Et propterea non motus, secundum naturam, seu actiones, sed affectiones potius appellari merentur, quia quodammodo ab alio, & non omnino à se natura in hoc opere motum habet, irritata scilicet, ac coacta à præternaturali (ut diximus) causa. Contrahit etiam seipsum ventriculus circum ea, quæ ab ipso excernuntur ad eum modum id quod in se continet, extrudens, quo manus nostræ aliquid exprimunt, ut Galenus inquit. Facultas autem, quæ motum ei præstat, vna è quatuor naturalibus est, expultrix scilicet, appellata, cuius propriæ facultatis symptomata sunt nausea, & vomitus ex Galeni decreto eodem 2. lib. de caus. sympt. Eiusdem nanque pravi motus sunt, ut diximus. Verum licet vomitus toto genere præter naturam sit, tamen si tempestiue fiat, hoc est cum id, quod contristat expellitur, ad animalis commodum per eum, non erit symptoma in genere læsionis actionum, sed alteri generi sympt. subiicitur, quod scilicet est affectuum præter naturam ex Gale. decreto libr. de diff. sympt. in fine. Sic quoque de nausea sentiendum erit, si ad eam talis consequatur vomitus: Semper etenim præter naturam quempiam affectum consequuntur. Dignoscitur autem nausea quando ipsa in illa inani vomendi irritatione lancinat tantum ventriculum ipsum & nullum humorem educit, Aetio teste. Distinguitur etiam à subuersione, quoniam ea non nisi cibo assumpto, hæc autem sine cibo assumpto fit, ex Pauli sententia eodem cap. 5. 4. lib. 2. Quamuis Gal. aliam præter hanc afferat diuersitatis causam, quoniam ea aut propter solam ventris debilitatem, aut cum vitiata alicuius, modicæ tamen, humiditatis complexu fit. Hæc vero ex multa, & etiam valde vitiata, citra quoque cibum afficitur. Vomitus autem signa frustra quispiam conscribere tentauit. Verum à nausea ipse differt, quia per vomitum perpetuo aliquid extra excernitur, per nauseam autem nequaquam, quamuis ad eam (ut diximus) vomitiones interim consequantur, interim vero non. Hæc symptomata nonnullos sectantur vetriculi morbos, qui diuersimode à diuersis quoque causis oriri possunt, ea propter ut manifestior fiat eorum morborum cum dignotio, tum curatio, Ad dignoscendas eorum causas me conuertam. Quoniã & in his quoque non exiguum inueniemus inter dicta symptomata differentiam: sunt vero in vniuersum due præcipuæ prædictorum symptomatum causæ. Nempe copia, vel humorum vitium, seu prauitas. Copia siquidem ventriculum grauando, Prauitas autem, seu vitium morsum inferendo affligens, ut patet apud Gal. cum 2. & 3. de symp. caus. tum 8. de comp. med. secun. locos,

&

& apud Alex. cap. 13. libr. 7. Atqui copia humorum ex pondere, ac tensione, quæ in ventriculo sentiuntur, percipi poterit, ita vt cum eos ferre non potest vëtrculus, ad nauseam, seu vomitum excitetur. Verum si ciborum fuerit hæc copia, facile ex ægri, vel astantium sermone percipi poterit, quemadmodum si sine cibis tensio, seu pondus sentiat, humorum esse copiam coniectandum erit. At si non multi, sed prauī humores fuerint, qui ventriculum obsederunt, si biliosi fuerint, oris amaritudo, sitis, atque ardor simul cum morfu in ore ventriculi, & inappetentiā aderit, & absumpti cibi in amaram, seu nidorofam qualitatem vertuntur; quemadmodum si frigidi fuerint neque siticulosus erit æger, neque ardorem in ore ventris sentiet, sed è contra frigus, & quandoque immodicè appetet, percipietq; in ore acidam qualitatem, acescentq; in ventre cibi assumpti & si dulcis fuerit pituita, eandem sentiet in ore qualitatem. Verum si falsa sit, sitis quoque in his augebitur, minueturq; appetentia, ac fortasse abolebitur, præter id quod similem quoque sentiet in ore qualitatem. Quod si vomitus ad has causas consequatur, facilius per vomitionem redundans succus dignosci poterit, tum visu à medico, tum gustu à laborante. Verum vbi saniosi, serosiue, ac tenues fuerint redundantes humores, non solum ante cibos, sed & post acceptum cibum vomitum inducunt, perpetuo nimirum motu versati ex Aetij sententia cap. 10. libr. 9. Ex vitiosis autem cibis deuoratis, aut vbi in ventriculo fuerint corrupti, si vomitus fiat, facile quoque ex laborantis, aut astantium relatione simul cum vomitionum qualitate percipitur. Atqui neque hoc satis erit pro causarum dignotione, sed diligenter cōsiderare oportet, num in ventre duntaxat tales redundant succi, an ex aliqua quadam parte, seu ex vniuerso corpore humores in ventrem confluant. Ad hæc num in lato ventriculi spatio contineantur, eoq; fluitent, innatentq; an in eius corpore infarcti, aut infixi fuerint? seu eius tunicis adhærescant, qui generantur in ventriculo humores, aut ab alijs partibus transmittantur? Hæc namque cognitu per quàm necessaria sunt, viroq; indigent exercitatæ considerationis. Nam si vniuersum corpus fuerit affectum, plethoricum quidem ex plethoræ signis id iudicabis: Si ex vitiosis humoribus repletum, id ipsum ex colore, & eruptionibus palmarum circa cutem cognoscitur, atque ex ipsa adeò vrina (vt inquit Aetius). Quòd si non ab vniuerso corpore, sed ab aliqua eius parte vt capite, splene, seu hepate humor ad ventriculum fuerit transmissus, Aeger ipse primum affecti membri lationem sentiet: Aut enim caloris sensus iuxta affectum membrum ipsi contingit, aut frigoris, aut grauitatis, aut etiam tactui nostro durum succumbit: Nec nausea intensa, & crebrior si ipsa excitetur, aut vomitus, si is quoque fiat, crebrior, & intentus erit, sed leuior & insigni aliquo spatio interposito vrgebit, totiusque præter hæc corporis habitus perpetuo considerandus erit. Ab ijs illud existimandum erit, qua nam victus ratione sit vsus, Vtrum ne frequenti cruditati, aut satietati inciderit, Idque in otiosa vita, ac præcipuè præter consuetudinem, an contrà. Illud deinde perpendendum, an aliud membrum corporis certo temporum circuitu vexari solitum nunc non vexetur, vel aliqua consueta excretio ijs retenta sit. Verum si nihil horum adsit, & crebre, intensq; nulloq; insigni spatio interposito vrgebunt prædictæ affectiones, certum est ventrem ipsum per se, ac primario affectum esse, redundantesque humores in eo esse genitos. Num vero in latiori eius spatio contineantur, ac fluitent redundantes succi, vel in eius corpore adhærescant, seu infixi sint, hoc modo interstingues. Etenim si vomitus statim post nauseam obortam, etiam citra violentiam comitetur, humorem noxium in lato ventriculi spatio esse non dubiò censendum. Sin autem nausea quidem excitata fuerit, verum nihil notatu dignum per vomitiones efferatur, humores noxios. Si biliosi sint, vel serosi, in ore ventriculi absorptos

Cap. 4.
circa mediū,

2. de caus. sym.
cap. 4.
Dubium,

Ratio,

Prognostica,

Aph. 10. lib. 7.

Tex. 39. & se-
quentibus,

Curatio,

Cap. 2.

ptos esse, vel si viscosi sunt ipsi ori ventriculi infixos esse, intelligito ex Tra-
liani decreto. Nam cum humor quispiam in ipsis ventriculi tunicis contineat
tur, nausea quidem vexabit, sed inanis, & sine vomitu, & quæ irritat dunta-
xat, nullum humorem euacuans, Gal. auctore 1. de loc. affect. Quamuis humo-
res crassi, ac viscosi, qui superficiei ventris infarcti adhærent, ante cibum etiā
magis nauseas, atque inanes vomitiones moueant. Et propterea nil mirum
si ex talibus oriatur succis nausea. Quod vomitus eam non sequatur, potissi-
mum si expultricis facultatis quoque adsit imbecillitas, veluti etiam non ra-
ro euenit, quod ea robusta existente, humoribusq; tenuibus in ventriculi tu-
niculis existentibus, exigua quædam eorum portio ex nausea violenta in ven-
triculi capacitatem effundatur, ac proinde excitato vomitu per os eiiciatur,
& hæc esse in causa mihi videtur, Quod interim vomitus nauseam comite-
tur, quandoque vero citra vomitum nausea fiat. Quanquam succis etiam in
ventriculi spatio consistentibus, nausea illa exigua, quæ vomitum præcedit,
excitetur similis ei affectui, quem Græci *κέρχρον* dicunt, qui tussim præcede-
re solet ex Gal. auctor. eodem 2. lib. de caus. symp. id quod etiam Aetius con-
firmavit, licet a quibusdam prauè eius verba fuerint intellecta. At si quispiā
scire cupiat cur absorpti, seu infarcti in tunicis ventriculi humores ipsius cor-
pus molestantes, præsertim qui morsum inferant calidi vel frigidi existentes
singultum potius quàm nauseam efficiant: Respondebimus nos eos cum non
adeo morsum inferant, nauseam excitare, cum uero mordacitatem ualidam
efficiunt, singultum promouere, & propterea non semper humores etiam
mordaces in ventriculi corpore impacti singultum, efficiunt. Neque etiam
nauseam, sed quandoque vnum, interim alterum symptoma excitant propter
iam dictam causam. Verum a vomitu singultus, & oculorum rubor malum
esse inquit Hip. aph. 3. 7. lib. quemadmodum etiam a tuberculi introsum ru-
ptione vomitiones si fiant, malæ sunt, eodem auctore aph. 8. & eiusdem lib. &
iterum ab ileo malus est vomitus, idem inquit, quoniam is non semper ad-
est, sed quando exitiales ilei sunt (Gal. auctore com. aph. 10. lib. 7.) Nausea ve-
ro quandoque (vt quidam volunt) signum crismus existit. Interim vero signū
malum, vt in febribus pestilentibus, quando in conualescentibus multiplica-
tur indicat recidiam. At vomitio vtilissima est, si pituita ac bile permixta
quam maxime fuerit, si non multa nec crassa sit. Syncerior enim deterior est
siue fuerit porracea, aut liuida, aut nigra, quicumque ex his fuerit color malū
esse censendum est, auctore Hip. 2. prognost. Exitiale quoque admodum est,
si idem homo omnes vomit colores. Et si vomitio liuida graue oleat ocys-
simam indicat mortem, & (vt summarim dicam) omnis subputris, ac subfoeti-
dus odor in omni vomitione malus est, Hipp. auctore præcitato loco. Quod
autem interdum vomitus ualitudinis causa recte fiat experimentis credens
Celsus approbavit. Commonet tamen, ne quis qui ualere, & senescere uo-
let, hoc quotidianum habeat, ut liquet lib. 1. cap. 2. Pro dictarum autem affe-
ctionum curatione illud primum animaduertendum est, quod ubi ex immodi-
ca humiditate citra uiciatos humores fiant, quæ uelut mador quispiam circa
affectam partem existens sola quantitate, & copia affligat, & ueluti irriguum
os ventris reddat, aut totum uentrem ob eandem multam humiditatem exo-
lutum, ac laxum habeant laborantes, Vtilissimus astringentium eduliorum,
potum, ac pharmacorum usus existit, languido nimirum, exolutoque tunc
reddito uentriculo ipso admodum laxatorum articulorum, ut liquet apud
Gal. 8. de compositione medicamentorum secundum locos. Quemadmodum
ubi uiciati fuerint redundantes circa uentrem, & Homachum humores, in ma-
ximum perueniunt detrimentum ægri. Ex astringentium eduliorum, potuū,
ac pharmacorum vsu, ex sententia eiusdē Gal. præcitato loco, & Pauli cap.

54 lib. 2. Verum si iam dicti succi præter id quod vitiosi non sint, frigiditatem per mixtam habeant, calfacientia prædictis astringentibus misceri debent, ex eorundem auctorum decreto. Humida nanque intemperies siue sola consistat, siue cum calore, frigore, ve coniuncta sit, omnium facillime curatur, ut patet 7. meth. medend. Ad hæc sciendum quod veluti graueolentia omnia stomachum subuertere solent, sic odorata corroborare. Quapropter cum ea multipliciter auxilientur stomacho, ob vitiatos serosos humores subuerso nedum in medicamentis ipsis, verum etiam in cibis permiscenda erunt. Et quoniam diximus per consensum quandoque a toto, vel quapiam corporis parte affectiones has gigni posse, quæ quidem curari haudquaquam possunt, nisi prius totum corpus, aut primario affecta pars curetur, Ita tamen, ut neque eodem tempore ventrem ipsum negligamus Galen. eodem auctore præcitrato loco: Propterea de iis a nobis sermo non fiet, sed eius duntaxat nausæ, & vomitus curationem aggrediemur, qui causam habent nedum in ventriculo contentam, sed in ipso etiam genitam. quo fit ut propterea etiam de nausæa, & vomitu ex bile ortis verba non faciamus, cum neque ipsa in ventriculo oriri possit, nisi ab aliis partibus, iocinore præsertim, aut eiusdem bilis vesica ad ipsum transmittantur. Aer itaque eligatur ad calidum vergens, ite somnus, quies, ac etiam moderata inedia competunt Alex. & Paulo testibus. Hoc enim victu (ut inquit Alex.) pituita non solum alteratur, extenuaturq; sed etiam in sanguinem benignum, probumque conuertitur, ut eiusmodi quoque humor per inopiam alimenti nutrire possit, præsertim ubi dulcis fuerit. Quamquam in vomitionibus frequenter. & paulatim cibus offerendus est (ut inquit Paulus) præsertim ubi biliosi fuerint. Decubitus autem sursum vergens in omnibus quomodocunque nausæantibus, & vomentibus adornetur in cōuenienti & affectioni contraria domo, Aetio auctore præcitrato loco. Vbi autem vires in ediam etiam moderatam non ferant, Contusæ carnes, ac iura pullorum, seu gallinarum tribui poterunt pro cibis, modo eorum quantitas modica fuerit, cum quibusdam odoratis paratæ, ut cinnamomo, gariophyllis, sen aniso, cotoneis etiam, aut mali punici granis simul incoctis, aut exiguo omphacio, & aqua rosacea adiectis. Quod si contusas carnes, seu iura assumere noluerint, poterunt ipsas quoque carnes gallinarum, pullorum gallinaceorum, columbarum iuuenum, phasianorum, perdicum, turturum, turdorum, merularum, leporum, ac capreolorum iuuenum, commode pro cibis capere, & interim easdem assas adiectis, prædictis odoratis, interdum etiam, elixas, & præter iam dicta odorata decoqui cum eis possunt hyssopum, pulegium, serpillum, sampuchus, fœniculum, oreoselinum, thymus, & reliqua huius classis, potissimum ubi crassa, & tenax pituita in causa fuerit, & tunicis adhærescens, atque impacta. Pro potu vinum exhibeatur ruffum, subadstringens, & vetustius, ut inquit Aetius, vel aqua mulsa vinum nanque adeo calefacit ventriculum, ut in qualitate eius calorem non intendat, licet eiusdem substantia augeat: & mel de spumatum ipsum per se optimum nutrimentum frigido ventriculo est ut liquet 6. meth. med. A cibis autem semper cotonea mala, mespila, corna, sorba, eos fructus quos azarosas vocant, aut alia pyra adstringentia, seu mala punica gustare poterunt. Exiguam autem quantitatem ex eis capiant, ut cibum duntaxat continere valeant. At quod natura, vel arte alui excrementa subducere quotidie conferat, ac vitare immodicos animi affectus, cuilibet patere poterit. Ceterum ubi tenues, ac serosi fuerint vitiati humores, qui stomacho impacti nausæam, efficiunt, confestim vomitu eiiciendi sunt, qui digitis, aut pennis immixtis proritari debet, vel liberaliori tepidæ potu, seu tenuissimo ptisanæ succo exhibito, ut Alex. & Aetio visum est, vel etiam mulsa ex Gale. & Pauli sententia. Verum eo casu tam ptisanæ cremoris, quam aquæ mulse

lumen

De odoratis no
ia.

Cap. 9.

7. meth. ca. 11.

Vetus ratio.

cap. 7.

Medicamentorum
ratio.

sumendum plus est ex eiusdem Gal. decreto 3. met. med. quam vel nutrimenti, vel etiam deiectionis causa sumeretur. Idoneum quoque est (eodem auctore ibidem) si malsa, in qua incoctum absynthium sit, bibatur. Nam, id quoque) ut ipse inquit) tenues succos, quicunque videlicet in ipsius ventriculi ore continentur, commode deorsum impellit. At difficulter vomant, nedum prædicta malsa, in qua incoctum absynthium sit, uti poterunt, verum & aliis quoque purgantibus medicamentis quibus prædicti redundantes ferrosi succi deorsum impellantur: sunt autem ad eiusmodi affectus, ubi scilicet vitiosi succi in ventriculi tunicis fuerunt recepti idonea pharmaca, ex genere eorum quæ modice purgent, sic ut eorum vis super ventriculi, & intestinorum loca non ascendat, aut si quid ultra vasa quoque in mesenterio contingat, speciatim vero quæ ex aloe componuntur, sunt aptisima, & si illa præsto non sint, Aloe ipsa per se, ut liquet eodem 7. meth. med. Nam ubi humiditas vitiosa tunicas ventris perrigat, picra ex aloe utilis est expurgans humiditatem

Cap. 11. eodem, Gal. auctore 8. de compositione med. secundum locos. Exhibeantur itaque ipsius medicamenti ex aloe, & potissimum ea elota. 3. ij. aut ipsius met aloes (ubi ipsius medicamentum haberi nequit) 3. i. vel 3. i. s. formatis ex ea seu iam dicto medicamento composito, catapotis: Postque per aliquod tempus vnc. ii. vel iii. syr. ex pluribus infus. rosarum rubearum. vel persicarum exhibere conuenit, vel 3. s. prædicti medicamenti ex aloe assumens diacath. 3. iiii. cum vnc. i. pulpæ casia fistulæ bolus figuretur, ac tribuatur. Poteris quoque uice prædicti medicamenti 3. i. elotæ aloes admiscere. Nanque ea licet purget minus, roborat tamen ventriculum magis, ut eidem Gale. visum est. Verum quibus lenta pituita ventriculo est infixæ, his prius exhibenda sunt quæcunque hanc dissecant, Postea purgandum. Quod si ad vomendum sunt idonei, non inutile erit per radiculam ex oxymelite euomere, eodem Gal. auctore præcæ tato lib. 7. meth. med. Si vero inepti admouendum sint, nedum ipsum oxymel tribuendum erit quo frigidit, crassi, & glutinosi humores attenuentur, ac dissecantur, verum etiam & ipsum oxymel scyllinum cum aliquorum incidentium, repurgantium, calefacientiumque decocto. veluti est hyssopum, serpillum, pulegium, absynthium, fœniculi, & oreoselini, ac capparorum radix, quibus sæpius assumptis, prædictum quoque pharmacum ex aloe præberi poterit, & si videbitur, robustis potissimum corporibus trochiscatum addas agaricum ex eo 3. i. assumens. Verum ubi pituitosi succi acidi, aut dulces fu erint eos concoquere tentandum est, ipsi naturæ in hoc opem ferendo, quiete, inedia, & somno (ut diximus ac aliis. quæ concoctioni tum intus tum extra opitulantur. His quoque peractis, ad ea, quæ stomachum, ac ventriculum ipsum roborant, ipsorumque intemperie alterant intus, ac extra adhibita cõfugiendum est. Quapropter medicamentum, quod ex calamintha constat, seu pharmacum ex tribus piperis generibus, aut aliud quoddam consimile commodum existit, ex vino tenui, aut aqua potatum si. 3. i. eorum exhibeas. In quem usum cõfert diacinnamomum, aromaticum rosaceum, dianisum. ac medicamentum ex xylo aloe confectum. Insuper diarhodon si simili pondere eodem modo exhibeantur. Forinsecus aut (ut inquit Aetius) stomacho mastichen chiam vnguento nardino dilutam, & tritam, purpureaq; lana excepta imposito. Vel recipe chiaz mastiches, & aloes ana vnc. i. diluantur, & dissoluantur in oleo de absynthio, ac nardino & similiter cum purpurea lana ventriculo imponentur, aut olei mastichini, & de absynthio, ac nardini, singul. vnc. i. excipe, & menthæ sicæ cinnamomi, maceris, & galangæ ana 3. i. chie mastiches 3. iiii. permisce, & cum pauca cera vnguentum facito, ac imposito. Item vtriusque menthæ, & absynthii ana p. i. excipe cinnamomi, chiaz mastiches, & ligni aloes ana 3. ii. corticum citri, maceris, calami odorati ana 3. s. gariophyllorum scrup. i. rosarum

Loco citato.

rosarum rubearum siccarum manipulum. s. Omnia contundito, simulque miscero, & saccellos in scutiformi figura formato, ac stomacho imposito, qui insuper macerari in vino græco, aut guarneto poterunt, in quo absynthii parum fuerit decoctum, & sæpius iterati calidi applicentur. Verum ubi emplastris magis uti volueris, chiam mastichen assume, quæ in oleo nardino, ac de absynthio diluatur, ac maceretur quantum satis sit, ac dimidiam quantitatem eius, ipsius aloes adice, adeo ut in emplastri formam redigantur, in corioque scuti formam obtinente extendas, & utere, & si mauis cinnamomi, maceris, gariophyllorum, ac calami odorati exiguum puluerem addere poteris, ex torrido item pane, vino græco, aut guarneto macerato, & vtraque mentha, ac absynthio contusis, ac cinnamomi, aloes, & chiaz mastiches puluere optimum medicamentum ad frigidum ac laxatum stomachum parabis. Sæpe tamen accidit, ut in ipso ventriculi sinu contentus humor vomitum excitet, qui humor per vomitum etiam expurgatus causa est, ut prior vomitus facile quiescat, & propterea non ab re prouocari etiam debet cum aliquo ex prædictis vomitus. Pari etiam ratione ubi multa, aut corrupta alimenta in eo taliter contineantur. Nanque utilis est vomitus plenis, & biliosis omnibus si vel nimium se replerunt, vel parum concoxerunt. Nam siue plus est quam quod concoqui possit, periclitari ne corrumpatur non oportet. Si vero corruptum est, nihil commodius est, quam id qua via prædictum expelli potest, eiicere, Celso auctore eodem cap. 3. libr. primi, Id quod dicere solent medici, Vomitus vomitu curatur. Quanquam non propterea euertunt Hipp. sempiternæ veritatis axioma, quod videlicet contrarium contraria sunt remedia, & quod curatio perpetuo a contrariis fiat, Cum per vomitum humores euacuantur, qui nauseam, & vomitum stomacho inferrebant, & propterea per contrarium fit curatio. Nam prorsus euacuare alienum, naturæq; inimicum humorem, eiusdem retentioni contrarium est, Galen. auctore. 6. de morb. vulg. rescindit etenim vomitus eum effectum, ob quem prius & nauseabundi ægri erant, & vomebant, Causa per eum abscissa. Verum usque adeo iuuari a medico vomitus debet, quo ad naturæ commodum fiat, ac per eum id quod contristat, expellatur: ubi autem immodicus fuerit, nec ad animalis commodum fiat, sed per eum id quod non deberet expelli, excernitur, & propterea non conferat, Is reprimi debet Hipp. auctore aph. 2. primi & 2. quarti lib. Quo casu (ut inquit Aetius) extremæ corporis partes fricentur, manibusq; calefactis palpentur, & violentius astringantur, deinde pedes, & manus in aquam solito calidiorum demittantur, Stomachus quoque absynthii cremore irrigetur, apio insuper, cumino, aut petroselino adiuncto, vtraque mentha, ac spica, nec non cinnamomo, & chia mastiche, seu calamo odorato, macere, & galanga, pauco vino astringente odorifero addito. Ex ijs quoque epithemata fiant, ubi prædicti fuerint redundantes succi frigidi. Nam si calidi fuerint a toto, vel ab alis partibus transmissi, sandalum, rosa, corallum, ac alia infrigidantia absynthii cremori adiungenda sunt. Odoramenta etiam, ubi immodicus fuerit vomitus, naribus olfacienda admoveantur, ex eiusdem Aetij decreto, velut sunt rosæ, mala cotonea, pulegium, mentha, spica nardi, vel ex aqua rosacea, myrthina, ac florum citrangelorum cum pauco aceto rosaceo odoramentum fiat. Poteris insuper addere sandalos, citri corticis, ambre, seu mosci parum. Ceterum affectione diutius permanente, & cibus præ morbo non retentis, Cucurbita ad os ventris cum plurima flamma affigatur, donec locus rubefiat, atque ipsa adhuc affixa, cibus præbeatur, ex eiusdem Aetij monumentis, ac Pauli cap. 55. libr. 2. Cibus autem frequenter, & paulatim dari debet, ut dictum est antea, post quem semper aliquod astringens præbeas. Ex palmulis quoque, malicorio, & galla, vino astringenti incoctis, & pane

Commentario. 2.
com. 9. in med.

tolto

costo simul contrito, puluereque chiæ mastiches, ac cinnamomi cataplasma applicandum parari poterit. Et si biliosi fuerint succi, ac calida ventriculi intemperies acacia, hypocistis, balauustum, rhu cataplasmati adiungantur, ac prædicta in posca decoquantur. Ad quotidianas autem nauseas, & ascendentem cibum, ac vomitus coriandri semen tenuissimè tritum cochlearij mensura veluti farinā aquæ inspersam bibendum præbet Aetius, aut mastiches cochleare ex frigida aqua vel lactucæ albæ semen cochlearij mensura ex aqua ijs, qui stomacho exuruntur. Ad vomitum restringendum confert ex Plinij Secundi sententia lib. 2. cap. 11. si mastiches vnc. i. cumini denariū vnum accipias separatim trita, postea vna passa enucleata permisceas, & linteo inductum stomacho suppones. Similiter menthæ cacumina cum succo mali granati trita, & potui data, & ad eos, qui cibum continere non possunt, & eliciunt, betonicæ denarios duos accipe, & mellis decocti, quod sufficiat pastillos facito, & ex his pastillum vnum glutiat, ex aquæ calidæ ciathis duobus, vt ipse inquit. Sanguinis autem vomitus cap. de cruenta spuitione studiosi remedia petant.

περί φλεγμονῆς τοῦ στομάχου ἢ νοσήσας.

Idest de inflammatione stomachi, vel ventriculi.

Cap. 68.

Veluti ceteræ corporis partes, sic quoque stomachus inflammatione tentari potest, quæ licet variis modis in Gal. doctrina intelligi possit, Hic ea duntaxat, quæ ex calidis redundantibus succis oriri consuevit per φλεγμὴν hoc est inflammationem intelligi uolumus, siue sanguis fuerit, siue bilis, aut uterque quomodocunque permixtus. Cum itaq; ea oritur siue in ore, siue in alia quauis ventriculi parte, ex dolore simul cum positu pars ipsa affecta faciliè dignoscitur. similiter & ex proprii eiusdē partis muneris oblæsione, appetentiæ siquidem, si in ore ventriculi, Concoctionis cutem, si in eius cauitate excitetur. At quod ipsa morbus compositus sit in magnitudine primo, & secundo in intemperie, & tertio in soluta continuitate, luce clarius patet apud Gal. cum lib. de differ. morborum, tum 3. de temp. lib. de inæquali intemperie, ac reliquis plerisque locis. Quapropter non ab re eam insequuntur tumor præter naturā, grauitatis, ac multi caloris sensus, & dolor, circa partem affectam. Accedunt ad hæc sitis valida, & febris ardens: Tumor autem & calor etiā tactu à medico iudicari queunt. Nausea quoq; consequetur, propterea quod inflammationis causa in ventriculi tunicis contineatur. Verū vbi biliosus magis redundet succus, ita vt inflammatio erysipelaris naturam referat, vementer erit ardor, sitis immoderator, ac ardentissima febris, sed minor tumor, ac grauitas. Ex quibus etiam signis interstringui poterit diuersa causa eiusdem inflammationis, præcedente victus ratione, ætate, temperamento, anni tempore, ac reliquis non prætermissis. At vbi stomachus inflammatio nem sustinuerit, magna opus est diligentia, vt inquit Alex. c. 14. lib. 7. Quoniā maximum morbum, & necessitatem corpori affert. Quod si imbecillis fuerint viribus, quæ ea laborant, mortifera vt plurimum esse solet. Quamuis nedum ijs, sed etiam qui valentiores ipsis sunt, ab ea interimi consueuerunt. Nam quibus vel iecur, vel ventriculum phlegmone obsidet, veluti pleuriticis, peripneumoniacis, ac synanchicis vna salus est, videlicet ipsum virium robur, ex Gal. decre. 10. meth. med. Pro eius itaque curatione aer temperatus, seu parum ad frigidum vergens eligatur, Somnus item moderatus, aut paulo breuior. Nam si longior

Partis affecte dignotio.

Quis affectus præter naturam sit inflammatio.

Eiusdē inflammationis signa. De diff. morb. cap. 12.

3. de temp. c. 5. Lib. de inæqu. in temp. cap. 3.

causæ.

Prognostica.

Curatio. Cap. 5. in fine.

gior

gior fiat quam oportet, potius ipsa inflammatio augetur, detento insimul in tali somno intus, nedum præter naturam calido innato, sed alieno, & eo, quid præter naturam est. Ad quorum detentionem non immerito inflammatio ipsa (vt diximus) augetur: Similiter quies iniungenda est, motusque vitandus, Nam prima sunt) vt inquit Celsus cap. 5. lib. 4. quies, & abstinencia. Et si alius suapte natura humecta non sit, lenibus clysteribus lenienda erit, Immodici animi affectus non parum nocent, & propterea vitandi sunt. Quantum vero ad cibum, & potum attinet, dicebat Gal. 23. meth. med. quod in inflammatione cum iocinoris, tum ventriculi exquisitissimo victus est opus, quippe cum munus eorum toti animali commune sit, acceditque omnibus animalis partibus maximum incommodum, siue non probe concoctum alimentum sit, siue non rite in sanguinem conuersum. Quanquam commune sit in qualibet partium internarum inflammatione tenuissimo vt victu, modo vires valeant, Speciatim autem vt possunt qui stomachi, aut ventriculi inflammatione laborant, pro cibo, prisana, seu eius cremore, Et si erysipelatis magis naturam referat, vt poterunt lactuca, cichorio, seu endiuia, quam vulgus scariolam vocat, in aqua hordei decoctis, aut in paruorum pullorum gallinaceorum iure. Pro potu aqua hordei vtantur, aut ea, in qua semina coriandrorum præparatorum fuerint decocta, seu exiguum cinnamomum, cui iterum adicere poteris succi malorum puniceorum acidorum parum. A vino autem, & carnibus quibuscunque omnino abstinendum, quoad vires valeant. Confestim autem, modo nihil prohibeat, vena secanda erit, eaque interna, præsertim vbi totius corporis plenitudo adsit omnium humorum ex æquo, aut ipsius sanguinis, & prout vires ferunt, sanguinis quantitas extrahatur etsi opus fuerit denuo reperatur. Vbi vero bilis redundauerit magis, eadē quoque vena secanda erit, minor tamen sanguinis quantitas educenda. Utendumque pariter in vtrisque frictionibus, ligaturis, cucurbitulis, ac reliquis diuersionibus, præsertim circa initia, ac omnino à medicamine, quod aluum deliciat, abstinendum eo tempore est, quo phlegmone ventriculum, aut intestina occupare cœperit, siquidem longissime à tentata fluxione parte quod redūdat reuellere, nequaquam ad eam trahere conuenit, ex eiusdem Galen. sententia præcitato lib. 13. method. med. Post hæc ad ea, quæ extrinsecus applicantur, confugiendum est, quæ mixtæ facultatis esse debent, quemadmodum in inflammatione iocinoris dicemus, Idque non in generatione phlegmones modo vt Gal. inquit) Nam id omnium inflammationum commune est, quando etiam si quis repellentibus tantum illo tempore vtatur, non peccet, sed etiam cum nec affluat amplius quicquam, nec repelli possit, quod in laborante particula continetur, Propterea quod tunc multus in ea sanguis contineatur isque crassior, atque vehementer, impactus, & virtus partis iam debilior est, vtpote cum in suo vigore consistat, quo tempore vix duntaxat quæ à phlegmone sumitur agendorum est indicatio, hanc *σάφρησις* Græci vocant, huic tamen ea, quæ à parte affecta sumitur indicatio eodem etiam tempore copulanda erit. Quæ quoniam ex numero earum est, quarum munus toti corpori est ex usu, siue os eius, siue cauitas afficiatur. Propterea robur eiusdem seruari debet. Non ab re itaque coeuntibus contrariis indicationibus, compositum quoque esse medicamentum oportet, eodem Galen. teste præcitato lib. 13. meth. med. Id quod commune existit omnibus partibus, quarum functiones vtilis toti corpori existunt, vt ipse inquit. Ob hanc igitur causam à principio ad finem vsque mixta curatio esse debet ex astringentibus, ac laxantibus. Attendendum autem (vt inquit Alex.) qua re magis opus sit atque cuius copia magis intendi debeat. Quamuis circa initia semper astringentia intendi debeant. Nam etsi eis duntaxat vtaris eo tempore non peccabis, ex Gal.

cap. 13. collige.

Medicamentorum ratio.

Vene sectio.

Purgatio num. exhibenda sit.

cap. 12. Topica.

Cap. 16.

Loco citato.

Gal. auctoritate, vt diximus eodem 13. meth. med. Qua de re oleum omphacinum, rosaceum, aut cytoniorum adhiberi poterit, uel etiam de absynthio, potissimum ubi non valida fuerit inflammatio, aut feruor ingens, vel ex rossis, & absynthio parte vna floribus chamemeli, radicibus, ac foliis althæe parte media in aqua pluuiali decoctum fiat, & pauco aceto, aut vino albo aquoso addito epithemata fiât. Insuper ex oleo rosaceo omphacino mastichino, ac de absynt. ana vnc. i. chamemelino, & amygdalarum dulcium ana vnc. s. puluere santalorum, & corallorum rubeorum, ac rosarum rubeorum singul. 3. ii. ceræ quod satis sit, modicoq; vino albo, aut aceto addito vnguentum fiat, & utere. Quod si maiora astringentia requirat affectas œnanthen, hypocistin, balauftium, rhu obsoniorum, flores rosarum, ac reliqua huiusmodi adicere poteris, quæ ventriculo tum refrigerando, tum vero firmando sunt idonea. Quemadmodum ubi laxantibus magis indigeas. utpote in incremento, aut summo vigore inflammatione existente, prædictis, quæ laxantia miscenda, ac augenda, sunt, veluti chamemelum, althæa, semen lini, melilotum, fœnum græcum, adeps anserinus, seu gallinaceus, oleum chamemelinum, anethinum, liliaceum, mastichinum, ac vtriusq; amygdalæ, quibus omnibus, aut quibusdam simul permixtis uaria medicamenta, prout vsus expostulabit componere valebis, cum epithemata, tum cataplasmata, tum etiam vnguenta.

Pib. 9. cap. 16.

Cap. 5.

Quo tempore
purgatio præbe-
ri possit.

Actius vero cataplasmata huiusmodi inflammationibus maxime conuenientia fieri præcipit ex hordeo, semine lini, melle, vnguento nardino, modicoque vino adiecta mastiche, & absynthii coma. Verum ubi moderata fuerit inflammatio etiam Gal. ceratum sufficiens est, cuius descriptio habetur 8. met. med. Et ubi stomachus magis corroborari postulet, aloen augere conuenit, admiscereq; cū eo aut succum absynthii, aut œnanthen, aut succum capreolorum vitis. Ceterum ubi phlegmone prorsus inclinauerit, deiciendi ventris causa, qui prorsus non deiecerit, nihil ledes si vnc. iii. mellis aerei cum decocto vnc. i. tamarind. exhibeas, aut unc. iiii. syru. ex pluribus infusionibus rosarum, uel violarum ubi vehementior sentiat ardor, Amplius si unc. i. aut unc. i. s. casie fistulæ cum ci chorii decocto, aut aqua hordei præbeas, nedum nihil nocebis, sed summo opere proficies. Nam neque veretur Gal. hoc tempore etiam in iocinoris inflammatione (vt dicemus) ubi cauum eius afficiatur, purgantia medicamenta, modo valentiora non sint, exhibere, Immo etiam & valentiora cum ptisana permixta approbat, ut patet eodem 13. meth. med. uerbi gratia filiculam, & corticem nigri ueratri, quamuis ab hisce adeo ualentibus medicamentis abstinere perpetuo, potissimum in internis inflammationibus, consulerem. Si quid uero scyrrhosum relictum è phlegmone est, ita vt emolientia requirat, etiam corroborantia, ac astringentia cum eis permisceri debent, ex Tralliani decreto. quorum medicamentorum magna copia apud eundem reperitur, nec non apud Actium, & Paulum, & propterea vt ea conscribam superfluum fore putauit.

Cap. 5.

Loco citato.
Act. loco cita-
to.
Paul. li. 3. c. 36.

ἐπι ἀνέμω

id est de cruditate.

Cap.

69.

cap. 4. in princi-
pio.

cap. 1.

IN alter atrice uentriculi facultate (quæ concoctricem appellant, veluti & ipsam actionem, seu alterationē, concoctionem, quæ nihil aliud est quam ciborum in cōuenientē animali qualitatem alteratio, ex Gal. sentētia li. de diff. sympt. Fit aut ea à vētriculo cibū sibi assimilāte, propter certam quandā elementorū tēperiē, quæ proprietatē corporis eiūde efficit.) Accidit quandoq; frustratio, quæ quidē ipsius alterationis, seu cōcoctionis symptoma est eodem Gal. teste 3. de caus. sym. Verum cū frustratur, propterea quod nulla omnino alteratio

alteratio fiat, id symptoma præcipue à Græcis ἀπεψία, à latinis cruditas nominatur, modo, quo in animi functionibus immobilitas, in sensibilitas dicitur, significantibus his vocibus actionis amissionem, ac priuationem. Quandoque vitiosa alteratio, fit quæ iterum à Græcis ἀπεψία, à Latinis quoque cruditas nuncupatur. significatur tamen non sicut prius priuatio, sed deprauatio duntaxat ipsius alterationis. Cum autem deprauatio hæc duplex esse possit, vel quod tarde, & non dum conuenientium mutationem cibis suscipiat, vel quod corrumpatur omnino, ita vt naturæ gratiam prorsus recipere nequeat, Priorem quidem Græci βραδυπέψια, Latini tardam concoctionem nominare solent: Secunda vero nomen proprium non inuenit, vt patet eodem tertio de caus. sympto. Sed quoniam diximus ἀπεψία nominari posse tam priuationem concoctionis, quàm etiam eius deprauationem, tamen quia equiuoce quæ vitiosa facta est, cum ea, quæ omnino non sic nominamus, Propterea clarioris doctrinæ gratia, priuationem alterationis ἀπεψία, eius vero vitium ἀσπεψία, sicuti tarditatem seu imbecillam alterationem βραδυπέψια nominabimus. Erit nanque βραδυπέψια, siue concoctionis tarditas mutatio quedam inconuenientem qualitatem, sed ægre, & spatio longiore. Nam velut inchoata, & deficiens in ea actio est, ἀσπεψία omnimoda priuatio eiusdem actionis, ἀσπεψία vero alteratio in alteram qualitatem, non tamen in eam, quæ secundum naturam est, vt liquet apud eundem Galen. præcitato libr. tertio de caus. sympto. Et quanquam cruditas proprie nuncupetur ea concoctionis frustratio, in qua omnino deprauata est actio, ita quod alteratio non fiat, Nam concoquendi traditas vt (diximus) βραδυπέψια & eiusdem operis prauitas ἀσπεψία proprie nominari poterunt. Omnes tamen nos vniuersali vocabulo vtentes cruditates nominabimus, eum in qualibet earum concoctio ipsa frustretur, vt diximus, & ex eisdem fere causis oriantur, maioris duntaxat, & minoris ratione dissidentibus. At quia concoctionis opus in partibus ab ipsis ventriculi ore inferioribus fieri nemo negat, necesse est (vt Galenus inquit quinto de locis affectis,) hanc ipsam partem cum non bene disposita fuerit, cruditatem esse causam. Non ab re igitur ventriculus ipse secundum eius spatium seu cavitatem oblaesus est, cum & ipsum coctionis instrumentum sit à natura fabricatum quomodocunque concoctio vitiosa fuerit, modo vitia eiusdem à quopiam externo errore non proueniant. Fieri nanque poterit cruditas aliqua (vt dicemus) absque quod ventriculos afficiatur, vt apud eundem Galen. liquet cum primo, & quinto de locis affect. tum tertio de caus. sympto. Quapropter licet prædicta tria concoctionis symptomata dixerimus, eiusdem functionis frustrationem insequi, non tamen semper intelligendum erit, quod facultas ipsa fuerit læsa. Nam cum aliquo errore externo aliquod prædictorum efficiatur, nequaquam ipsa facultas læsionem patitur. Erunt itaque facultate ipsa oblaesa prædicta symptomata in genere noxa functionū, naturalium alteratricis videlicet: Verum in vno symptomate vtputa in ἀσπεψία ipsa actio erit, diminuta, in ἀσπεψία ablata & in βραδυπέψια deprauata. Duo autem priora symptomata facile dignoscuntur, Nam ciborum assumptorum qualitas siue ructare velint. siue vomere, plane seruatur, licet in βραδυπέψια aridi quandoque ructus fiant, Interim ventriculus halituoso impletur spiritu. Veram deprauata concoctiones ructus iniucundus proueniens manifeste indicabit, qui modo vnum modo alterum vitiosum saporem præferat: Et si per alium corrupti cibi deliciantur, necessario aderit deiectionem graueolentia. Causa autem eorum symptomatum communis, alterationis facultatis frustratio est vt sæpe diximus prima vero eiusdem frustrationis causarum genera duo sunt, vt idem Galen. inquit præcitato libr. tertio de caus. sympto. Alterum ex facultate ipsa læsa, Alterum ab excer-

Cap. 6.

ἀπεψία

ἀσπεψία

βραδυπέψια

Cap. 1.

Quid per cruditatem intelligendum sit.

Quæ pars i cruditate afficitur
Ca. 6. circa finē

1. de loc. affect.

cap. 1.

5. de loc. affect. 6. circa finem.

3. de caus. sym.

cap. 2.

Quis affectus præter naturam sit cruditas.

Signa.

Cause.

Loco citato.

no quopiam errore proueniens. Virtutis autem lætio adhuc bifariam esse potest, aut culpa propriæ substantiæ ex aliqua primarum qualitatum intemperie, utpote cum præter naturam calfacta, in frigidata, humectata, aut exiccata fuerit: Vel læditur virtus ipsa ab aliquo instrumentali morbo, ut erysipelate, phlegmone, œdemate, scirrho, abcessu, & aliis huiusmodi quorum omnium occasione venter facultate eius concoctrice oblecta male concoquit. Verum in eiusdem ventriculi temperamenti vitiis propria eius substantia laefactata concoctio læditur: In ceteris morbis, qui tantum sunt instrumentales duntaxat impedita: Qui vero ex intemperie simul, & instrumentalis morbo compositi affectus sunt, utroque modo sunt noxii, ex sententia eiusdem Galen. præcitato loco. Et tot itaque internis causis affectus ventriculus male concoquit. Verum ipso minime affecto, è nonnullis etiam causis concoctio impediri potest, ut propter cibi, ac potionis immodicam copiam, vel propter eorum qualitatem alienam, aut propter intempestiuitatem, intelligo autem per intempestiuitatem, acceptionem ciborum antequam prior cibus probe subierit, ac etiam præter consuetam horam, similiter propter incongruum ordinem, vel somnum exiguum aut vitiosum excrementum. Quamquam si ex eo concoctinem frustari contingat (etiam ventriculo ipso minime affecto) inter internas causas connumerari debet. Cum denique tot possint esse frustratæ concoctionis causæ, quæ via ipsa discernendæ, ac dignoscendæ sint, non ab re disserendum putaui. Verum si ex immodica cibi, ac potionis copia vel praua eorundem qualitate, seu intempestiuitate, vel incongruo ordine, aut exiguo somno prædicta symptomata excitentur, haud egro ex laborante ipso, seu astante percipi poterit. Interim vero ubi corruptela assumptorum sequatur, ex ipsa corruptionis differentia, alimentorum qualitas præassumpta argui poterit. Nam si in fumosam qualitatem corruptela vergat, argumentum est ex calidioribus, magisque biliosis cibis prouenire: Si vero ad acidam, ex iis qui frigidiores natura sunt, magisque pituitosi. At si in ventriculo cibi non suapte natura in fumum transmutentur, & quispiam fumosum ructum emittat, efficientem huius causam calidam ipsius ventriculi intemperiem esse coniiciendum erit. Si vero saporem acidum referunt, eam frigidam esse necesse est, quamuis similiter in excrementis fiat eum in ipso ventriculo contineantur: Nam acidæ qualitates quidem creant, quæ pituitosa sunt & frigida. Fumosa vero quem calida, & biliosa, ut liquet eodem libr. tertio de caus. symp. Ut vero distinguas utrum intemperies aliqua duntaxat calida, vel frigida, an vitiosus quispiam humor ventrem infestet, dare oportet cibos, qui suapte natura modo corruptionis quam maxime aduersentur, ex Galen. auctoritate primo de locis affect. ut panem illis, qui in fumum transmutare cibum consueverunt; vel autem iis, qui acidum à cibo saporem percipiunt, deinde considerare excrementa tum ea quæ euomuntur tum quæ per aluum deiciuntur. Nam humor aliquis cum illis quidem biliosus ac calidus, cum iis autem pituitosus, ac frigidus excernatur, an nullo vacuato humore ipsa exigua quandam mutationem habeant. Nam si sine humore per quam exigua in ipsis facta mutatione, deici videbis intemperie duntaxat ventriculum laborare percipies. Si vero humor quoque deiciatur, qui cibum corrumpere possit, videbis cibos huiusmodi humore submersos, & ab ipsius ventriculi actione manifestius alteratos. Verum ubi in tunicis ventriculi impactum contineatur excrementum, id quod ex inani nausea, siue vomitu, quæ irritat duntaxat, & nullum humorem euacuat, dignoscet: Si calidum fuerit præter nauseam sitis vehemens aderit, & interdum febris. Si frigidum maior ciborum cupiditas excitabitur, nec siti, nec febre affligentur. Sed quoniam in eiusmodi intemperies, calidam videlicet, & frigidam breui perducitur ventriculus,

Si ob calidam
aut frigidam in
temperiem ven
triculi fiat cru
duas, ligna.

Loco citato.

c. 4. post princ.

ericulus, in humiditate vero, & siccitate, adeo intemperatus venter esse, ut actionem amittat, non potest sine prolixo temporis spatio, ut inquit Galen. præcitato lib. 3. de caus. symp. Propterea humidæ, & siccæ eius intemperantiæ signa conscribere prætermisimus. Quamuis humidam intemperiem præcessisse debet hydrops, Siccam vero vel senium, vel marasmus, ut idem Galen. inquit, & propterea ex eisdem dignosci possent. Similiter ex affectibus dictarum intemperierum. Nam sicuti frigidus superante, frigidi affectus excitari solent, & calido contrarii, eodem modo ex sicco sicci, ex humido contrarii affectus sunt. Si vero ab instrumentalibus quibusdam morbis prædicta symptomata oriantur, ex eorundem instrumentalium morborum propriis indicibus dignosci queunt, quorum partim in præcedentibus tradita est notitia, partim etiam ex dicendis præstabitur: Nunc autem tempestivum erit cum valde ex usu sit, inuestigare, ex qua prædictarum causarum parata sit excitari *βραδυπνοια*, seu *ἀπνοια*, vel *δυσπνοια*. Pro quo diximus quod promptius *βραδυπνοια* oritur ex exiguo somno, ex cibis, qui difficulter corrumpuntur, & si ultra quam vires tolerant sumantur, ex eiusdem Galen. auctoritate præcitato loco, & Aetii cap. vigesimo quarto lib. 9. Quemadmodum ubi citra corruptelam coctionis omnino priuatio sit, ita ut quales accepti sunt cibi, tales permaneant iuxta omnem eorum qualitatem, quæ propriæ *ἀπνοια* dicitur. Scire licet prorsus superatum esse ventriculum, aut ab immodica ciborum multitudine, ut ad virtutis imbecillitatem, vel a valido frigore, seu ob vehementem insiti caloris refrigerationem, ut apud eosdem liquet. Adeo enim in tali statu venter non concoquit, ut etiam concoquere prorsus non tentet, Circa mediocres etiam, & consuetos cibos si nihil in totum effecerit ventriculus, maximam eiusdem esse intemperiem prodit. Cæterum si cum corruptione cruditas oboritur, quæ propriæ *δυσπνοια* dicitur, ex calida, vel frigida intemperie, præsertimque ex calida excitatur, cum nullum esculentum vehementer calfactum durare imputre possit, ut liquet apud eundem Gale. Similiter ex recrementis calidis, aut frigidis, aut vitiosis ciborum qualitatibus iuxta ventrem consistentibus. Aliquando etiam ex inordinata sumptione ciborum, aut potuum, aut intempestiuitate fit, ut apud eundem Aetium patet. Ex quibus itaque causis quodlibet prædictorum symptomatum oriri paratum sit, ex his liquido constat. Quare ad eorum prognostica veniamus, ac curationem. Etenim vitanda maxime cruditas assidua est, cum ex ea vitiosi humores, morbi que gignantur, siue ex boni, siue ex mali succi cibis fuerit orta, quanquam ea deterior sit, quam vitiosi succi cibaria effecerunt, ut liquet a Galen. libr. de cibis boni & mali succi. Quodcunque tamen prædictorum symptomatum ex cibis oritur, ex facili corrigetur. Quod autem ex ultimo virtutis collapsu in lenteriam, aut tympaniam hydropem finitur, Galen. teste eodem tertio de caus. sympto. omnes quoque magnæ ventriculi intemperies, veluti & aliarum partium virtutem deiciunt, ut ibidem patet, & commen. aphor. 20. secundi lib. Et propterea cum circa mediocres, & consuetos cibos nihil in totum effecerit, maximam ostendit ventris intemperiem, ut dictum est. Pessima autem in amarabili abundantibus naturis cruditas est, citissimeque febrem accendit, in qua cibi in nidorulentam, & fumosam qualitatem corrumpuntur, quando ea quæ in acidam vertit, ut raro talibus naturis contingit, ita minus nocet, eodē Galen. auctore octauo method. medend. Nidorosa etiam, ac fumosa cruditas minus eisdem noxia est, si aliis lubrica fuerit, si astringitur, grauis est, si quidem ex astringitione eius vitiosæ naturæ in febres prompte incidit, præsertim si ad solita conuertantur opera, eodem Galen. auctore ibidem. Omnium etiam prædictorum trium symptomatum pessimum est *ἀπνοια*, si vitio facultatis fiat, sicuti *βραδυπνοια* minus affert periculi. Causa uero ex prædictis colligi po-

Curato loco.
Si ob siccam.
vel humidam.

Prognostica,

Ca. 14.

Cap. 1.

Cap. 5.

Curatio.

Vitus ratio.

Medicamento-
rum ratio.

Cap. 4.

Cap. 5.

Cap. 7.

6. de simpli. fac.

Cap. 6.

7. meth. cap. 7.

terit, Ne quis autem in crudiratem incidat inquit Aetius, Cautione in omnibus prædictis est vtendum, vt neque in multitudine eorum, quæ in cibo accipiuntur, neque in qualitate, neque in acceptionis oportunitate neque, in ordine delinquant, & vt quæcunque concoquere valeant, ea tantum ingerant, & non quæ appetitus expostulat: Mensuræ enim maxime omnium diligentem respectum habere oportet, appetitumque refrenare, & neque plusquam vires tolerant, accipere, neque quæ natura difficulter concoquantur iuxta etiam tempus accipiendi cibi, neque impetuose, neque aceruatim, neque solidis partibus, aut absque commanducatione eos ingerere oportet, neque etiam potus cibum interpellet, id enim vnionem ciborum impedit, singulosque ventri innatare facit, vt idem Aetius refert. Somnus autem, & quies conferunt. hæc communiter pro victus ratione seruanda in cunctis prædictis symptomatibus dicta sint satis. Nam si separatim cuiuslibet victus ratione cōscribere tentaremus, diuersa quidem instituenda esset pro causarum diuersitate, ut puta si ex intemperie calida, aut excrementis calidis excitarentur, contraria victus ratio præcipienda esset: Pariter si ex frigida intemperie, aut excrementis frigidis, ad calidum vergentem victum instituere deberet. Quas victus rationes diuersas poterunt etiam studiosi ex ijs, quæ in præcedentibus ventriculi affectibus præcipimus, petere. Nec secus & medicamentorum rationem reperient, tam si calida fuerit, quam frigida ventriculi intemperies citra humores, vel cum humor redundantia, potissimum cap. de nausea, & vomitu. Ibi etenim & quæ alterant, purgant, ac roborant pro vtraque intemperie, ac vtriusque excrementis corrigendis abundanter conscripta reperient. At si ex aliquo instrumentali morbo prædicta excitentur symptomata, nemini in dubium venit, quod in eorum curatione, & ipsa quoque delentur. Verum vbi ex alimentorum multitudine, quæ concoqui nequit, aut eorum vitiosa qualitate cruditas fiat confestim procurandum erit vomitu, aut purgatione per infernas partes ipsos expurgari: Eijciendus etenim est cibus si coacuit intus, aut computruit. ex Celsi auctoritate libro quarto cap. quinto. Dico vomitu si laborantes facile vomant suapte natura, nam cogere eum, qui vomere non potest, absurdum est, ex Galen. decreto primo de locis affec. Erit qui quoque ijs qui suapte natura facile euomere possunt, vomitus proritandus, quo promptius euomant potu aquæ tepidæ multæ pauco aceto aut syrup. acetoso permixto, seu oximelite. At si vomere haudquaquam valeant, præsertim vbi multum, aut corruptum nutrimentum notabiliter ad inferiora ventris sit motum, A diuandum est, vt citius descendat, aut glande subdita, aut leui per inferius infusione per clysteres videlicet, vt octauo method. medend. à Galen. scriptum est, veluti etiam si crudum, aut diminutè concoctum in superiori ventriculi parte alimentum adhuc consistat, modo concoqui possit, aliquid diatrionpipericon dabis simplicissimi quidem, modo, quo ab eodem Galen. libr. quarto de sanit. tuend. scriptum est: Vel si id haberi nequit, tantundem piperis longi, aut albi, si hoc ad sit, aut nigri exhibere conuenit. Similiter extrinsecus adhibiti concoctio iuuanda erit, vt si expensa manu os ventris apprehendatur, aut pueruulus carnosus admoueatur, vt Aetius refert. Nā quid æque concoctionis ventri conferre nouimus atque corpus humanum illi impositum Galen. auctore quinto de simplic. medicament. facult. & septimo metho. medend. Proinde quidam pueros boni habitus noctu ad mouentes per quietem longe euidentissimum adiuumentum sentiunt, eiusdem quoque utilitatis gratia quidam paruos catellos per quietem ventri imponunt, vt apud eundem liquet præcitatis locis. Verum seruandum ante omnia est, ne puellus humectus sit cute, qui enim noctu sudore profunduntur, refrigerant potius, quam calfaciant, vt ipse Galen. inquit, neque iis duntaxat, sed reliquis quoque medicamentis

camentis moderate calidis ab extra adhibitis concoctio iuvari poterit, Quorum syluam habes in præcedentibus conscriptam, & Galeno 8. meth. medend. Quod si non ex alimentorum praua qualitate, sed intempestiuitate, aut inordinata eorum sumptione, seu exiguo somno, cum corruptela cruditas generetur, non alia ratione curari debet, quàm si ex prædicta alimētorum vitiosa qualitate, aut multitudine fuisset excitata. Illud tamen particularim attendendum erit, quod quibus ob flauæ bilis copiam, in ventriculo contentam, vel calidam admodum eiusdem intemperiem *δυσπεψία*, seu cruditas cum corruptela accidit, cibos corruptu difficiles, difficilesque concoctu offerre conuenit. Nam quæ concoctu difficilia sunt, non facile alterantur, ac corrumpuntur, sed si in multum calorem inciderint, concoquuntur magis, quàm si moderato occurrerint ex Galen. decreto primo de alim. facult. quod etiam confirmauit Celsus eodem cap. 5. lib. 4.

Cap. 5.

1. de alim. facult.
cap. 1.

περί τῆς πνευματώσεως, καὶ ἐμφυσήματος γὰρ ῥός.

idest de inflatione ventriculi.

Cap. 70.

PRÆTER iam dicos affectus accidit quandoque ipsi ventriculo ut instrumento coctionis, retentrice, seu complectente ipsius facultate imbecilla existente, affectus quidam, qui a græcis, præsertim a Paulo cap. 38. libr. & a Galen. tertio de caus. sympto. *πνευματώσις γὰρ ῥός* dicitur, quamuis quandoque ab eodem Galen. (ut patet 14. metho. meden. *ἡ μυσσημα* nuncupetur, a latinis autem inflatio ventriculi appellatur. qui affectus nihil aliud est, quàm eiusdem ventriculi distensio, & dolor ex flatuoso spiritu, Nam cum natuosus spiritus in eo gignitur, aut per os excernitur, & sic rustū creat, aut per sedem, Quo casu sonorum, silentemve flatū gignit, vel ipse neutra parte emittitur, & sic affectum creat, qui inflatio vocatur ex Gale. auctoritate 2. de caus. sympt. Ventre scilicet impotente ad excrementosum, nebulosumque excernendum spiritum, quos omnes Hippocr. simul cum Gale. ultimo aphorif. quinti libr. *πνευματώδεις*, hoc est ventosos appellat. Inflationis vero generatio vitio retentricis, & complectentis facultatis prouenit, nam eius probitas in duobus consistit, cum videlicet tempus, complectendi cibi cū tempore concoquendi exæquat, ac cum cibos prorsus vndique constringit, ita ut nullum locum relinquat inter ventrem, & cibos vacuū, & ex eiusdem Gale. sententia. Verum iniustum complectendi tempus excretio celer, & ciborum in inferiori ventre corruptela consequuntur. Imbecillum vero ciborum complexum modo clydones, hoc est fluctuationes cum sonitu succedūt, modo vero inflationes. Differunt autem hi duo affectus, quamuis ambo imbecillitatem retentricem facultatem consequantur, seu eam prorsus non complectentem, tum ratione materiæ, tum etiam ratione causæ efficientis, ut apud eundem Galen. liquet præcitato lib 3. de caus. sympto. Verum reliqua fluctuatione cum sonitu, quam Græci *κλυδωνία* appellant, quæ citra portionem fieri non potest, sed ventre valenter præfrigerato, vel cū in eo nihil contineatur, quod verti in flatum possit, efficitur, Ad inflationis tractationem deueniamus, affectus rentes primo quod in ea venter ut coctionis instrumentum afficitur ut eodē lib. de differ. sympto. liquet. Id vero liquido paterit ex frustrata eiusdem propria ventriculi coctione, propterea quod retentrix, seu complectens, facultas non vndique prorsus cibos constringit propter eius imbellitatem, sed locum quandam vacuum derelinquit inter ventrem, & cibos. Accedit ad hæc eiusdē ventriculi distensio, ac circa eundem tumor. Hic affectus a Gal. 14. meth. med. inter morbos reponitur in quantitate, seu magnitudine. Verum ab œdemate

3. de cau. symp.
cap. 2. ante med.
dium.14. meth. cap. 6.
Quid sit inflam-
matio ventricu-
li.

cap. 2.

Loco citato,

Quæ pars in in-
flatione afficia-
tur,
cap. 4.ca. 6. colligitur.
Quis affectus
præter naturam
sit,

Quomodo ab
cedemate diffe-
rat.
Loco citato.

cap. 2.

Causæ.

14. metho. loco
citato.

Modus genera-
tionis.

Cap. 1.

Flatuosi spiri-
tus generatio
ex quibus fiat.

cap. 2.

Concluditur
modus genera-
tionis inflatio-
nis.

causarum diver-
sarum notina.
Prognostica.

discrepat, quoniam œdema prementibus nobis cedit, digitique admodum at-
te in ipsum descendunt. Inflatio vero digitis pressa vestigium non retinet, ac
sonitum veluti tympanum reddit, ex eiusdem Gal. decretis eodem 14. meth.
medend. Grauitas quoque, distensio nedum circa ventrem ipsum, sed iuxta
totum pectus, Aliquando vero retro iuxta collum, ac dorsus, atque ipsa ver-
ticula irruit. sæpe autem & vtrinque occupatos tenet, Aliquando & tumore
circa os ventris efficit, ructusque inanes sunt modice alleuantes, & inhibito
flatuum, qui per aluum excerni consueuerunt. Quibusdam eorum dolores ac-
cidunt, & appetitus perditiones, ac capitis dolor vt patet ex Aetio Archige-
nis auctoritate cap. 27. libr. 6. Si vero ante perfectam restitutionem cibum ac-
cipiant, amplius membra ipsa inflantur, & cum dolore distenduntur, leuantur
autem alimento inferne subeunte, & flatibus, siue per ructus, siue per intesti-
na exclusis, vt idem Aetius inquit. Vbi vero flatuosus spiritus per intestina
mouetur, multiformes edit sonitus, quorum non omnes nomina sunt sortiti
Verum prudenti viro ex diuersis sonitus differentiis quale, quantumque ex-
crementum sit, ac quo maxime loco voluatur indicare potest (vt eodẽ tertio
de caus. sympt. apud Gale. legitur.) Ipsius itaque inflationis causa spiritus fla-
tuosus existit (vt eodem 14. method. a Galen scriptum est) Verum quoniam
oportet medicum non solum sympto. agnoscendorum facultatem habere, ac
generationis eorum inueniendæ peritum esse sed etiam modi, quo generen-
tur, qui inter effectricium causarum differentias numeratur ex eiusdem Galen.
sententia præcitato lib. tertio de caus. sympto. Propterea non ab re fuerit mo-
dum generationis eiusdem flatuosi spiritus, ac inflationis differere. Fit nanque
(vt Gale. inquit) aliuosorum spirituum, seu flatuum generatio in ipsis, quæ in
ventre sunt locis, succis quibusdam pituitosis, vel cibis inibi a deficiente calo-
re in alitum solutis, syncera enim frigiditas prorsum halitum non facit. quod
scilicet ea nec attenuat omnino, nec conficit, nec alimentum dissoluit. Fortis
autem calor cum longo interuallo nutrimentum superet, amplius quam pro
halitu generando id attenuat, nisi tamen flatuosum sit natura. Nā tunc gigni-
tur quidem spiritus turbidus, ac (vt sic dicam) nebulosus. exiguus tamẽ, & bre-
uis temporis, ita vno, vel altero ructu vacuetur. Verum calor mediocris,
qui in cibos agit quidem sed diminute, is, eos quodammodo dissoluit, non ta-
men prorsus conficit minoris efficacix existent, atque hinc oritur flatuosus spi-
ritus. Nam tanquam extrinsecus tum frigidissimi flatus sunt sereni, solentq;
magis flante borea fieri, calidissimi qui æstatis tempore incidunt ambien-
tem aerem purum reddūt. Qui vero inter hos sunt, nebulam gignunt, Itidem
in animalibus, neque in caloris summa imbecillitate, nec cum idem nimium
est vehemens, sed in iis) qui inter hos sunt) statibus flatuosum excrementum
gignitur, Quemadmodum decretum reliquit Gal. præcitato li. 3. de cau. sym.
Pater igitur ex iis flatuosi spiritus generationis modus, quoniam ex humori-
bus vel cibis languida caliditate in vapores dissolutis, in ventriculo genera-
tur, vt liquet apud eosdem Paulum, & Aetium præcitatis locis, & cum ipse
expelli nequeat, eodem ventre impotente ad excernendum, intus detentum
prædictum affectum (quem inflationem ventriculi vocamus) creat. Verum si
ex flatuosis cibis inflatio oriatur, ex exiguo, & brevis temporis spiritu flatuo-
so orto, qui vno, vel altero ructu vacuatur, comprehendi poterit. At si ex eis-
dem cibis natura siquidem non flatuosis, sed in vapores per mediocrem cali-
ditatem resolutis, inflatio fiat, ab assumptione eorundem paulo post tempore
inflatio generabitur, & proinde ex laborantium, seu astantium sermone id
prompte percipies. Verum si neque assumptio ciborum præcesserit, neque
eorundem natura flatuosorum pituitosos humores in ventriculo contentos,
ac in halitum solutos, inflationis causam esse existimabis. Nam si ex atræ bi-
lis

lis in eundem ventriculum effusione flatus quidam generetur, quam effectio-
nem hypochondriacam, ac flatuosam nominant, Præter reliqua peculiariter
metus, & mœstitia aderūt. Quemadmodum cap. de melancholia differuimus,
& propterea non est cur hic iterum de ea mētionem faciamus. Quantum ve-
ro ad prognostica spectat, non omnino despicienda eius curatio est. Nam vbi
diu perdurauerit, metus erit ne in hydropem siccam præcipuè terminetur, &
si multiplicetur ventriculi inflatio in conualescentibus recidiuam significabit,
Nanque qui à morbis immodice se satiant, flatuosi, ac toto corporis habitu
turgidi redduntur, vt eodem tertio de caus. symptomatum à Galen. decretum
est. Quod vero qui morbo regio laborant non multum ventosi sunt, ab Hip-
pocr. aphor. 72. quinti libr. scriptum est. Indicatio vero curationis omnium
inflationum communis est, Galen. auctore 14. method. medend. Vt quod præ-
ter naturam est, vacuetur, in quocunq; id contineatur loco. Propria vero post
hanc communem est, vt tenuissimis, & calidis potestate medicamentis id per-
ficiatur. Quæ de re aer eligendus erit ad calidum vergens, Somnus solito lon-
gior concilietur. Nam vbi somnus accesserit, (inquit Paulus.) etiam ex toto le-
uat affectos, mirificè etenim concoctionem iuuat, vt patet duodecimo meth.
medend. Exercitatio primo levis, deinde maior adhibenda est, maximeque ea,
quæ superiores partes moueat, quod genus (vt Celsus refert cap. quinto libr.
quarti.) in omnibus stomachi vitiis aptissimum est. Frictiones item extrema-
rum corporis partium si adhibeantur, cōferunt. Alius omnino sit levis, & vbi
fuerit astricta citra dilationem clyster infundendus (ex Aetii sententia) In-
terponenda quoque abstinentia est, ex decreto eiusdem Celsi, Nam inedia
actioni huic necessaria existit, Aetio teste, præsertim vbi ex dissolutis in vapo-
rem cibus orta fuerit inflatio. At si eam ferre non possint, cibi exhibendi sunt
calidi, minimeque inflantes: eodem modo calidæ potiones, Sintque concoctu
faciles, & boni succi, quantitate exigui, diuidantur autem ex sententia eiusdē
Aetii, ita vt in prandio tertiam: In cœna vero reliquas duas accipiant partes.
Fructuum vero, ac olerum humidorum esum semper habeant suspectum, Po-
tus cibum non interpellet, Per omnem tamen cibum vinum meracius exhi-
beatur, at non multum. Nam multum potum tanquam infestissimum hostem
deuitent, vt liquet apud eundem Aetium, & si non ita diu ante cibum sumpse-
rit, aut cibus fuerit natura flatuosus præassumptus, primum vomere præcipe,
cui auxiliari poteris potione aliqua earum, quas præcedente cap. commemo-
rauimus. Post vero vomitum eos fouere oportet ex oleo, quod tenuiū sit par-
tium, quandoque rutam habeat incoctam, aut aliquod calidorum seminum,
cuiusmodi sunt cumini, apii, & petroselini, ex Galen. decret. eodem decimo
quarto meth. med. Quandoque vero diutius perseverante affectione, maiori-
que existente frigiditate præter iam dicta, Daucus, baccæ lauri, nigellæ, & ru-
tæ semen oleo incoquantur, ac ex eo irrigationes fiant. Interim etiā prosunt
calida, & sicca fomēta, quæ ex milio, aut etiam milio & furfure parari possunt,
præsertim si mediocris fuerit dolor, Vel ex semine lini, ordeacea, & loloacea
farina, cumino, & semine anethi, aut apii, aut fœniculi, oleo rutaceo, aut hydro-
melite cataplasma conficiatur, Quandoque vero admiscendum est oleum lau-
rinum, vel tragoriganum, centarei coma, aut eryngii semen, vel radix, baccæ
lauri, aut melanthium. Cucurbitulæ etiam cum multa flamma admotæ bonæ
magnitudinis umbilicum vndique comprehendentes toto symptomate fre-
quenter vniuerſim liberant vt Paulo visum est, licet ante eum Gal. præcitato
lib. 14. meth. med. de ea sic ea scriptum reliquerit, Aliquando vero & cucurbita
magna bis, ter ue sine incisione medio ventri affixa, tanta uero ac taliter appli-
cata etiam totum umbilicum comprehendet, & 12. libr. eiusdem pro curatione
doloris ex spiritu flatuoso orti propriam quandam curationem ex cucurbita,

31. de caus. sym.
cap. 1.

Curatio.

14. meth. cap. 6.

Vitiis ratio.

12. meth. cap. 3.
post princ.

Medicamento-
rum ratio.

Loco citato.

14. metho. loco
citato.

12. meth. c. vii.

cum flamma copiosa subinde admota moliri testatur, videbiturque tibi (ut ipse inquit) præfidiū hoc in huiusmodi affectionibus incantamēti cuiusquā simile quid efficere, siue in intestinis, siue in quauis corporis particula talis dolor fuerit excitatus, illico enim cucurbita admota, qui spiritu flatuoso cruciātur cum à dolore liberi, tum omnino sani redduntur. Glandes quoque interim confidenter, & citra dilationem, supponendæ sunt ex rebus flatum discucientibus formatæ, velut est rutæ semen, & cuminum æquali pondere cum melle cocto, aut ex rutæ folijs contusis cumino, pauco sale, & caricis simul inuolutis balanos cōfice. Poteris insuper clysteribus uti, quos sic parabis. R. foliorum rutæ, florum chamæmeli, pulegii, & calaminthæ an. manip. s. seminis anisi, fœniculi, dauci, & cumini an. 3. iiii. furfuris p. i. caricarum nume. iiii. fiat decoctum secundū artem, de quo libram vnam assumito, aduicitoque vnc. iiii. olei anethini chamæmelini, vel rutacei, mellis rosacei vnc. ii. confectionis de dactylis 3. iiii. diacath. 3. 7. vel benedictę 3. iiii. misce, & fiat clyster pauco sale addito. Vtilis quoque eis existit in ieiunio potio absynthij, aut hyssopi, aut rutæ, ut Celsus refert, aristolochia insuper longa, siue rotunda 3. pondere potata flatum dissoluit, & tardę cōcoquētes iuuat, quod & calaminthæ decoctum, aut ē polium cum melle modico, & paucissimo pipere tenuissime trito facit ex Aetii testimonio, Similiter ouillus talus, aut suis, ut Paulo visum est, vstus, & potatus, torminibus, ac inflationibus medetur. Vtile etiam est castoreum ex posca bibitum 3. j. pondere acceptum, & acetum scyllinum, tum ante tum post cibum, aut ante somnum, si ipsum absorbeant, ut patet apud eundem Aetium. Nec minus confert si 3. i. exhibeatur confectionis de cinnamomo, aut de xilocaloe, dianisi, aut diacumini, diacalaminthæ, aut diatrionpipereon cum exiguo vino diluto. At si ex pituitosis humoribus in halitum dissolutis cum in ventre contineantur, inflammatio fiat, priusquam tales euacuentur succi, nullum prædictorum medicamentorū exhibendum erit. euacuabuntur porro aut vomitu, si laborantes natura proni ad vomitum sint, (exhibito quandoque alios ex superscriptis medicamentis, quæ vomitum facilem reddunt, etenim eis necessarius modo in ieiunio, modo post cibum vomitus est, ut apud Celsum liquet,) aut per inferiorem ventrem, eis tamen prius concoctis, ac præparatis, vel per clysteres, & eos quidem acres si fieri poterit: mirifice etenim ii ex acrium iniectione leuantur, ut Gal. refert, aut per aliquod purgans medicamentū, eorum, quæ cap. de vomitu, & nausea commemorauimus, Nam indigent interdum, qui inflationem patiuntur, alui ductione, ex Celsi sententia. Poterit tamen, & ante purgationē, ubi ex flatuoso spiritu genito ex prædictis humoribus pituitosis ingēs dolor vrgeat, admoeri cum flamma copiosa cucurbita, quo ventosus prius digeratur spiritus, Post id euacuandus humor est, Gale. decreto 12. metho. meden. quoniam ijs illico ad tempus dolor cucurbitula sedabitur, quamuis redeat (ut ipse Gal. inquit) vel sequente nocte, vel postridie, vel etiam tertio die similis dolor. Cum vero per vomitum, aut aluum expurgatus fuerit redundans in ventriculo pituitosus succus omnibus prædictis medicamentis intus, & extra uti poteris, prout magis videbitur expedire. Illud quoque (ex eiusdem Cornelii Celsi decreto) in omnibus stomachi vitiis recipiendum est, ut quomodo se quisque æger retecerit, eo ut sanus vtatur, Nam redit huic imbecillitas sua, nisi eiusdem defendatur bona valetudo, quibus reddita est. Redit autem bona valetudo, ut vno verbo dicam, iis, qui ex flatuoso spiritu dolorem, seu digerentibus adhibitis, & extenuantibus tum cibis, tum per sedem iniectionibus, tum cataplasmatibus, tum humidis, siccisque fomentis, ut ex Gale. patet eodem 12. method. medend.

12. meth. cap. 3.

Cap. 4.

περί λευτερίας, καὶ κοιλιακῆς διαθέσεως :

Id est de leuitate intestinorum; & coeliacha, seu ventrali

affectione. Cap. 71.

Cum eadem retentrix, seu complectens ventriculi facultas tempus retinēdi, ac complectendi cibos cum concoquendi tpe haud exæquat, si prorsus eos non complectatur affectus quidam oritur, qui à Græcis λευτερία, à latinis ventriculi, ac intestinorum leuitas dicitur. Quod si eadem non vsque ad consumatam concoctionem retineat, & complectatur, alter excitari solet affectus, qui à Græcis κοιλιακή à latinis coeliaca, seu ventralis affectio dicitur. In iustum nanque complectendi tempus (vt Gal. inquit lib. de diff. symp.) omnino diminuta ciborum concoctio excipit, Deinceps vero, vel celer ciborum exitus, vel eorum in ventre corruptela. At clericis ciborum exitus inseparabilia symptomata sunt deiectionis humiditas, & digestio in corpus diminuta. verum prima affectio, quam λευτερίαν Græci nominant (vt quibusdam eorum antiquioribus visum est) tale nomen sortita est: Quoniam qui prius talem ei indiderunt appellationem, fieri ipsa putabant propter intrinsecæ superficiei intestinorum leuitatem, ob quam cibos in eis contentos non amplius retinent, quemadmodū retinebant cum suam seruarent sibi à natura inditam asperitatem. Cuius etiā sententię videtur esse Aetius cap. 51. lib. 9. Cum dixit lienteria quemadmodū ipsum nomen indicat, leuor quispiam intestinorum est. Quam opinionem tanquam erroneam Gal. commen. aphorism. lib. sexti reprobauit, asserens quod in pluribus aliis, qui primi rebus nomina imposuerunt, sunt collaudandi non tñ in leuitate intestinorum. Causam autem erroris eorum asseruit esse ignorantia causarum propter quas aliqua excrementa intempestiue excernantur, sicuti in ventriculo veloces ciborum exitus, neq; enim intestinorum leuitas est, vt ipsi opinantur, seu aliæ causæ, prout infra dicemus. Nec minus ignorant quod ipsius ventriculi propriū est cibos amplecti, ac se circumstringendo certo tēpore retinere, & postea ad inferiora dimittere, inq; proprio eius temperamēto perficere, & non cum suam seruat à natura inditam asperitatem. Maxima autem affectionis huius proprietas in cita ponitur deiectione, propter quod cibi omnino incocti permanent. Quo fit, vt intestinorum leuitas nil aliud sit, (vt eodem Galen. auctore præcitato comment. aphorism. primo sexti libri ac 22.3. & 12. quarti libr.) quā velox exitus eorum, quæ comeduntur, atq; bibuntur, quæ talia deiciuntur, qualia fuere deuorata, cum neque secundum consistentiam, neque secundum colorem, vel dolorem, vel vllam omnino qualitatem in ventriculo facta fuerit mutatio ciborum. Qua re si quis vellet breuiorem huius affectionis asserre definitionem, diceret eam esse carentiam coctionis, vt idem Galen. inquit. Altera vero affectio quam coeliacam nominauimus ab ea, quæ afficitur, parte, nomen assumens, ex Aetii sententia cap. trigesimo-septimo lib. 9. Velox quidam est exitus eorum, quæ per os assumuntur, verum nō omnino crudorum, & incoctorum. Nam in ea affectione solum leuia, & humecta excrementa egeruntur, ventre pro imbecillitate ea digerere nequeunte, vt ipse inquit, quapropter nec concoquuntur omnino, nec digeruntur alimenta, sed humectia, imperfecteque cocta redduntur, neque ita celeriter ea, quæ assumpta sunt in coeliacis egeruntur, quemadmodum in lientericis. Sunt vero ambo hi affectus cum ventriculi, tum intestinorum simul communes, quem admodum Gal. testatur 6. de loc. affe. neque enim absurdum est symptomata quædam intestinis, & ventriculo simul affectis euenire, ut ipse inquit. Idem confirmauit

Cap. 4.

Leuitas intesti-
norum unde no-
men sumpserit se-
cundum quosdā,

Impugnat Gal.
prædictorum opi-
nionem,

Quid sit intesti-
norum leuitas.

Coeliaca vnde
nomē sumpserit.
Coeliaca.

Quæ pars in ei
afficiatur.
cap. 4.

Qui affectus
præter naturam
sint,

Quomodo in-
ter se com-
municent & diffe-
rant,

Cap. 4.

6. de loc. affect.
Cap. 2.

Cœliacæ signa.

Ante medium.
Signa leuitatis
intestinarum.

3. de caus. sym.
c. 1. colligitur.

confirmauit præcitato aphorif. duodecimo quarti libr. Cum dixit intestino-
rum leuitatem consequi ad omnium, quæ ad aluum pertinent, instrumento-
rum intemperaturas, hoc est ipsius ventriculi, in quem cibos deuoramus, & eo-
rum, quæ illos ex hoc suscipiunt, atque transmittunt, intestinarum, Insuper &
ex excrementis illud argui poterit. Ambo etiam symptomata sunt in genere
noxæ functionum naturalium, retentricis videlicet, & non concoctricis, vt qui-
dam putarunt. Neque enim (vt Galen. inquit eodem commen. aphorif. primi,
sexti libr.) quia omnino incocti permanent cibi ideo cito deiiciuntur. sed quia
cito deiiciuntur, iccirco nullam habent coctionem, Quibus verbis liquet pro-
pterea cibos non concoqui in prædictis affectibus, quoniam citius deiiciuntur.
Id autem prouenit ex offensa (vt diximus) retentricis facultatis, impotentis
liquidem tanto tempore cibos detinere, quanto indigeret concoctrix facultas
pro eorum concoctione, & deprauato motu expultricis intempestiue prius-
quam absoluta concoctio sit, expellentis. Verum quanquam ambæ (vt dixi-
mus) affectiones eiusdem facultatis symptomata sint, vt puta retentricis. In vna
tamen eadem diminuta est, vt in cœliaca, in qua cibos non complectitur vs-
que ad consumatam concoctionem: In altera vero abolita est. Quod vero in
intestinarum leuitate prorsus retentrix facultas cibos non complectatur, sed
omnimoda fiat eius actionis priuatio, apud Galen. liquet eodem libr. de differ.
sympto. Ad quod in Cœliaca affectione non omnino ablata sit prædictæ facul-
tatis actio, liquet ex Aetio præcitato loco, & Paulo capitu. quadragesimo, libr.
terti. Et quoniam leuitas intestinarum subito euenire nō potest, vt patet sex-
to de loc. affect. Propterea Cœliaca præcedere eam solet, Nam ab initio paruo
quodam tempore cibi in ventriculo retinentur, procedente autem, atque au-
cta passione, ne hoc quidem (vt eodem commen. aphorif. primi. sexti libr.) li-
quet, præsertim vbi ventriculus frigidior fuerit, Leuia autem & humecta ex-
crementa egeruntur ventre præ imbecillitate ea digerere nequeunte, & non
cibi crudi, & incocti inferne prodeunt in Cœliaca affectione, vt Aetio visum
est; Sequitur autem Cœliacos assidua egestio, aliquando fœtida cum animi de-
liquij sensus, cibumque auersantur, ac decolores, & vehementer graciles fiunt,
vt etiam Paulus testatur, Languida cum sit, & imbecilla ventriculi facultas in
Cœliacis, nec concoquuntur, nec digeruntur alimenta, sed cruda humentia,
imperfectaque redduntur aluo continentur fluida, quanquam quæ assumpta
sunt non ita celerius, veluti in intestinarum leuitate, egerantur, Verum in in-
testinarum leuitate (vt Hippocr. testatur libr. de affect.) cibi secedunt non pu-
trefacti liquidi, Dolor autem non adest, & corpus attenuatur. Vt vero Aetio
visum est cap. 5. libr. 9. Cibi crudi in ea, & nihil immutati excernuntur, im-
mo talia deiiciuntur, qualia fuere deuorata ex Galen. sententia, Aegri quoque ci-
bum nō sentiunt, & malum corporis habitum acquirunt, quod vtrunque ma-
lum incorrigibile existit, Succedit enim (vt idem Aetius inquit) assidua excre-
tio cibi colore subalbida, inæqualis, & aquosissima citra sanguinis, ac bilis com-
plexum, atque intensa est cruditas in lientericis (vt Paulus refert) vt alimenti
assumpti genus ex iis, quæ egeruntur, aperte cognoscatur, atque hac nota po-
tissimum a Cœliacis discernitur. Quapropter Gal. præcitato com. apho. primi
sexti libr. paucissimis verbis leuitatis intestinarum signa perstrinxit, cum di-
xit, Atque ideo nos, & alii medici plurimi citam ciborum, nullam habentium
coctionem deiectionem, dicimus esse leuitatem intestinarum. Id autem quod
in vtrisque affectionibus excernitur, symptoma est in genere excretorum im-
modice, vt in 3. de caus. symp. liquet, Nam tum multitudine, tum qualitate præ-
ter naturam est noxa, vt diximus, perpetuo retentricis facultatis ventriculi,
ac intestinarum insequens. Ex his itaque liquet in quo conueniāt, ac quibus
discriminentur inter se Cœliaca affectio, & leuitas intestinarum. Verum cum
eodem

eędem causę maioris duntaxat, ac minoris ratione differentes, vtriusque affectionis esse possint, quas trademus causas leuitatis intestinorum, eadem intelligendę sunt de ventrali affectione. Et quoniam (vt sępenumero dictũ est ex Galen. sententia l. br. de differ. sympto.) semper quolibet symptoma a morbo aliquo ortum habet, non ab re iam dicta symptomata aliquem consequuntur ventriculi morbum, Isque genere duplex esse potest, vt ex Galen. liquet præcitat. aphor. Aut intemperies aliqua, propter quam imbecilla redditur retentrix facultas tam ventriculi, quàm intestinorum, Vel exulceratio occupans superficiem earundem partium similis illis, quę in ore fiunt, quas gręci *αφθας* nominant. Verum vnā ab alia hoc modo discernes ex eiusdem Gale. sententia, Nam in illa quę accidit propter ventriculi, atque intestinorum imbecillitatem, absque vllō doloris sensu fiunt deiectiones: In ea vero, quę ex exulceratione proficiunt, inest quidam morsus sensus cum deiectiones fiunt. Hęc autem exulceratio a quorundam humorum mordacitate, ac acritudine, totius ventriculi, ac intestinorum abrasa superficie ortum habet, & quamuis ipsę vires non multum patiantur si hac ratione fiat leuitas intestinorum, Necessarium tamen est, vt permeantibus cibis partes exulceratę dolorem sentiant, & ideo illos propellant, atque ex ipsis citissime emittant. Hoc vero in omnibus partibus factō, velox ciborum exitus consequetur, & nullum fiet initium coctionis. Obitur autem frequenter dysenteria magna præcedente, & ex profunda vlceratione cicatrice densa, & leui succedente ex Aetii auctoritate. Idem ferme confirmauit Celsus cap. decimo sexto libr. 4. Cum dixit ex torminibus interdũ intestinorum leuitas oritur, quę cōtinere nihil possunt, & quicquid assumptum est, imperfectum protinus reddunt. Qua de re facilliter percipi poterit lienteria, si ex acribus, ac mordentibus succis ventriculi, ac intestinorum superficiem exulcerantibus originem trahat. At ea leuitas intestinorum, quę potentię retentricis sequitur imbecillitatem, omnino quidem sit (vt diximus) ex intemperatura, Verum ea nonnũquam habitualis est, sic nanque nominant illam, quę ipso corporis habitu læso sit, uel propter humorem aliquem, qui in ventriculo, atque intestinis continetur, euenit ex sententia eiusdem Galen. præcitat. aphor. & velut eadem ventriculi intemperatura calida, vel frigida esse poterit, licet sępius frigida, vt liquet apud omnes artis medicę auctores, Raro autem calida: Pariter si eędem cum humore fuerint, idem humor aut calidus, aut frigidus erit, raro tamen calidus, Cum & ipsę præterquam quod cum deiectionibus excerneretur, fore etiam exulcerationem pareret. Propterea distinguenda est primo vnā ab altera temperatura, & secundo vnus ab altero humore. Verum ne longiores simus, ac eadem sępius repetamus, qui ex ac̄te hęc velint interstinguere capit. de nausea, & vomitu, ac etiam cap. de cruditate propria signa reperient, Inrerim nos ad prognostica deueniamus. Erit itaque primum ipsius Cœliacę affectionis, quod si diutius duret, ad magnam omnino desperationem res deuenit ægris ad conuenientem diætā pigrescentibus. Et si affectus autumnō incipiens ad hyemem vsque se extendat, difficilius omnino curatur, ex Aetii sententia præcitato loco. Cum vero inseparabilia symptomata sint, celeris exitus ciborum, qui ad diminutam concoctionem consequetur, propter iniustum complectendi tempus, deiectionis humiditas, & digestio in corpus diminuta (vt diximus ex Gale. sententia lib. de differentiis symptomatum) si eadem Cœliaca prorogabitur, necessario atrophia consequetur, propter diminutam in corpus alimentorum digestionem. Alexander autem de Cœliaca cap. octauo lib. octauo, sic retulit, Hic morbus curatione initio adhibita facile tollitur, postea vero difficilius, Vbi autem inueterauerit, tarde remouetur. De lienteria vero sic scriptum reliquit Galen. com. eiusdem apho. i. sexti libr. Quod quę sit humorum

Cap. 4. & 1.

Quos morbos
cemitentur hęc
symptomata.Quomodo vnũ
genus morbo-
rum, ab altero
secernatur.

Causę.

Act. lib. 9. cap.
ultimo.

Prognostica.

Lib. 9 cap. 37.

Cap. 4.

Versus finem li-
bri.

Chrandi metho-
dus.

Si ex calida in-
temperie fuerit
orta, curatio.

Lib. 9. cap. 37.
Vicus ratio.

Aet, loco citato.

rum acritudine, totius ventriculi, atque intestinorum abrasa superficie, ces-
sante humorum malignitate, statim sanatur cibus, ac potibus, qui vim den-
sandi habent, Quod si longiori tempore perseveret, in alteram passionem
transmutatur, quæ dysenteria, hoc est difficultas intestinorum nominatur,
In longis autem leuitatibus intestinorum si ructus acidus superueniet, quod
prius non erat, signum bonum est, inquit Hippocr. præcitato aphorif. Indi-
cat enim (vt Aetius refert) eodem cap. 51. libr. 9. Ructus acidus iucundi quid-
piam factum esse, & ventrem, ac intestina non veluti inanima, cibum snere
pertransire. Verum non simpliciter dixit Hippocr. bonum esse signum acidus
ructus in leuitatibus intestinorum, Sed primum quidem in longis adiecit, de
inde addidit, Vbi prius non fuerit, pro veritate eiusdem sententiæ, quæ om-
nia a Galen. præcitato aphorif. primo, sexti libr. diligenter exposita sunt, ete-
nim illis leuitatibus intestinorum, quæ neque adhuc incipiunt, neque ex pitui-
ta fiunt, non insunt acidi ructus. Quod si aliquando fiant, (vt idem Galen. in-
quit,) significant tantisper cibum in ventriculo retineri, donec principium mu-
tationis accipiat, & naturam suorum operum reminisci. Ipsæ iterum intesti-
norum leuitates cum spirandi difficultate, & lateris punctura, in tabem desi-
nunt, ex eiusdem Hippoc. sententia in Coacis prænotionibus. Et quoniam eo-
dem medicationis ductu vtendum est in leuitate intestinorum, quo ad Cœlia-
cos, & dysentericos: (vt Aetius refert) propterea quæ dicemus de vnius cura-
tione, etiam alterius subintelligenda erunt. Commune itaque vtrisque erit
(vt idem auctor refert) quod vim retentiuam, ac cōcoctoriam facultatem tū
ventris, tum intestinorum omni modo refocillare oportet. Quod sane per ci-
borum conuenientium exhibitionem fieri potest, perque dietam refocillan-
dis, ac restituendis uiribus aptam. Nam si ab exulceratione superficie ventri-
culi, atque intestinorum, propter humorum acritudinem intestinorū leuitas
fiat, Modus curationis eius patebit in cura dysenterix: Particulatim etiam nos
præcipiemus curationis viam, primo lienterix ex calida intemperie, seu cali-
dis etiam succis, adhuc non exulcerantibus si redundarint, ortæ, secundo eius
quæ ex intemperie frigida, ac frigidis etiam succis redundantibus, & cum vna
tutissima, & compendiosissima via ad affectionis extirpationem diætā existat,
eodem Aetio teste, Propterea more solito, de ea primo mentionem faciemus.
Eligatur itaque aer ad frigidum vergens. Somni solito longiores præcipian-
tur, potissimum nocte. Nam diurni nocentissimi sunt, nisi lassationis sensus
adfit, aut nox vigilata præcesserit. Vespere autem a cœna dormiendum, ma-
xime ubi a somno surrexerit, ad deambulationem prodibit, ita ut pro uiri-
bus aggrediatur, deinde frictionem simplicem adhibeas, parce videlicet, &
minime confricando, maxime ventrem. Cætetum a prandio etiam deambu-
lationibus indulgendum est, & animi aliqua laxamenta adhibenda, vt idem
Aetius inquit, Nam exercitationes, & frictiones huic morbo necessarie sunt,
eodem Celso auctore præcitato loco. Vitet immodicos animi affectus, præ-
sertim iram, Cibi eis conueniunt, qui non nimis astringunt, & reprimunt
sed qui astringentes facili concoqui, & in totum corpus distribui possunt,
vt placuit eidem Alexandro præcitato loco. Quapropter cibi ex chon-
dro, oryza, & halica, & similibus, cum quibus astringens aliquod decoqua-
tur, pyrum scilicet, malum cydonium, mespylum, & id genus alia exhibean-
tur ex Pauli, & Aetii testimonio. Panis item bene elaboratus tribuatur, ac
etiam sim lago cum eisdem astringentibus in pullorum iure decocta, simi-
liter intybus, & cichorium, carnes etiam exhibendæ ex gallinis iuuenibus,
columbis, perdicibus, phasianis, & montanis passerculis, & ex aliis quoque
auibus, quæ non sunt pingues, præter palustres. Ex pedestribus etiam teneri-
mæ, & friabiliores competunt, præsertim leporum, & capreolorum, conco-
ctis.

Etis simul quibusdam fructibus astringentibus, ut cydonijs, pomis, aut myrti
 baccis, quæ interim assæ exhibeantur. In quorum ventre aliquod prædictorū
 astringentium reponatur, & inter assandum assidue aqua rosacea, ac ompha-
 cio, & germinibus myrti irrorentur, vitella item ouorum assa, & aceto intin-
 cta commendantur ab Alexandro: Ex fructibus etiam conueniunt vua modi-
 ca pensilis, cythia poma, ac pyra, sorba, mespyla, & corna, ac reliqui astring-
 entes similes. verum mediocritas in illis seruanda erit, atque hi ipsi (ut in-
 quit Aetius) cum pane exhibendi sunt, ac etiam ante reliquos cibos. Verum
 si fieri poterit duobus, tribus ve diebus a cibo abstinere oportet, ut Alexan-
 dro, visum est. Nam adseruandi in media sunt si ferre queant, aut certe omni-
 no modico cibi vsu, ex eiusdem Aetii sententia. At si id ferre non possint pro-
 spiciendum est, si quicquam aliud ut cibum diuidamus. Duas itaque tertias
 partes cibi in cœnam reseruantes, atque ipsum etiam, (qui in prandio exhi-
 betur) panem dimidiatum per se sumat, reliquum vero cum obsonio simpli-
 ci (ut ex eodem Aetio liquet.) Verum non insalubriter poteris duarum ciba-
 tionum quantitatem, tribus vicibus impartiri, serueturque eadem ratio ci-
 bandi, ut in cœna maior exhibeatur quantitas. Potus erit vinum aquosum,
 tenue, subastringens, quantitate autem exhibeatur paucum, & nec cibum in-
 terpellat, sed post omnem cibum præbeatur: Multus enim potus (ut inquit
 Aetius) ventris fluxionibus infestissimus existit. Satis item iis proderit lactis
 potus, ita ut principio calidum, & recens multum detur, postea vero ad me-
 dietatem decoctum, aut etiam ad tertias: hoc enim modo exhibitum simul si-
 stit, ac temperat fluxiones. id autem sit caprillum, vel ouillum. In omni autem
 fluore ventris, tum in hoc præcipue (ut Celsus visum est) seruandum, ut cum
 pleraque vtilia sint, qualis est plantago, & rubi, & quicquid malicorio mixtum
 est, ea potissimum ex his dētur, quæ maxime eger volet, deinde si omnia ista
 fastidiet, ad excitandam cibi cupiditatem, interponatur aliquid minus vtile,
 sed magis gratum: Parum etenim deterior potus, aut cibis, suauior autem,
 melioribus quidem, sed minus suauibus est præferendus, ut patet aphoris. 38.
 secundi libr. At ubi, nedum calida intemperies, sed acres, & mordaces succi in
 intestinis, & ventriculo redundantes leuitatis intestinorum causæ sint, prius
 quam vires extreme deficient, Conuenienti purgatione vtendum erit: Prius
 tamen si occasio dabitur, concoquendi, ac præparandi ipsi sunt syrupo ex infu-
 sio. seu succo ros. videlicet, ex succo cichorii, myrtino, seu oxy saccharo, succo
 cytoniorum quem miuā appellant, aut oxalidis, seu citri acido cum aqua plan-
 taginis, aut oxalidis simul permixtis, deinde sequens tribuatur purgans medi-
 camentum, quod recepit corticum mirobalanor. citrinarum 3. iiii. tamarin. 3. **Purgatio.**
 vii. patetur arte decoctum in aqua cichorii, & acetosellæ, in cuius quantitate
 sufficienti dissolue mellis aerii vnc. i. s. vel syr. ex pluribus infusionibus rosarū
 rubearum vnc. iiii. rhāb. optimi in parte prædicti decocti macerati 3. i. fiat po-
 tus. Quod vero purgatio talibus competat, patet apud Aetium cap. præcitato
 scilicet 37. libr. 9. A purgatione vero per astringentes potus operæ pretium
 est eis opem ferre, veluti est plantaginis semen tritum, siccum, ac potatum,
 Proderit etiam & lapathi, seu oxylapathi semen tritum, Cancris etiam mari-
 ni, vel fluuiatilis testam vltam cochlearii mensura, si præbeas cum aqua con-
 fert, calidum item papaueris torrefactorum 3. i. ante somnum cum vino dilu-
 to potata. quin etiam semen capitis papaueris tritum exhibitum egregie au-
 xiliatur. mirabiliter autem acerba, & immatura mora profunt sicca, trita in
 potu exhibita. Eodem modo & rubi mora immatura, & accerba, ex eiusdem
 Aetii decreto, aut quinque folij radice decoctum potui dato, Item rubi radi-
 cis similiter, ut Alex. visum est. In hunc etiam vsum syr. de ribes, aut qui ex in-
 completis, & aridis rosis conficitur, conferunt. et si cum eis 3. i. cornu cerui
 vsti,

Medicamento-
rum ratio,

Purgatio,

Quæ post pur-
gationem præ-
benda sint,

Vomitus,

Topica,

Si ex frigida in-
temperie dicta
lymptomata ex-
citeantur, Cura-
tio.

Videtur ratio.

Medicamento-
rum ratio.

Vomitus,

vsti, aut seminis plantaginis, vel oxalidis præbeas, conducunt magis. Simili-
ter etiam confert si drac. i. trochif. de spodio, vel de terra lemnia tribuatur bo-
num est etiam corticis quercinæ glandis decoctum, itemque pelliculæ deco-
ctum, quæ sub cortice quercus reperitur, vt etiam Aetio placuit, quidam, quo-
que (vt ab eodem Aetio, & Paulo scribitur.) gallinarum ventriculis vtuntur
desiccatis, ac tritis potui insperfis. Nec minus eis commoda sunt quæ vrinam
cient, cum deriuationem moliantur, fluxionemque sæpe transferant, veluti
est apium, fœniculum, anisum, adiantum, acorum ex prædictorum auctorū de-
creto, in quem vsum syrupo ex duabus, vel tribus radicibus, aut de byzantiis
permixto cum eo, qui ex absynthio conficitur, aut myrrino vel ex infusione
rosarum cum aliquo prædictorum decocto vti conuenit, nequaquam enim ne-
gligendum est ventriculi, aut intestinorum robur. Eo etiam tempore quo vri-
nam cientia tribuuntur, eorum etiam quantitas minor esse debet, licet cau-
endum sit, ne nimium largus etiam fiat eorundem vsus. Mirabiliter quoque vo-
mitus efficaces sunt, tum à cœna, tum ieiunio facti maxime si humores in ven-
tre collectos percipiemus. Nam si in intestinis contineantur, non possunt per
vomitus euacuari, ex Galen. sententia commen. aphorif. I 2. 4. lib. Iuuandus
quoque eiusdem erit vomitus ex aliquo eorum, quæ sæpius in præcedentibus
adnotauimus. Perperuo tamen animaduertas, vt proni sint laborantes natura
ad vomendum, nam si difficulter euomant, nequaquam his proritandus erit.
Ab extra insuper ventriculo, & intestinis auxiliari oportet, Quapropter illi-
nantur oleo cytoniorum, myrrino, vel rosaceo aut de absynthio, vel olei cy-
toniorum, & rosacei. singulorum drac. i. recipe olei de absynthio vnc. s. sanda-
lorum, & corallorum rubeorum ana drac. ii. hypocistidis, balauftiorum, & aca-
ciæ ana drac. i. chiæ mastiches 3. s. & cum pauca cera, ac vino astringenti vngu-
tum seu ceratum conficito, & vttere. Cytoneum item in vino astringenti deco-
ctum, ac contusum, si accipias, adiciasque hypocistidis, & boli armenij drac. i.
corallorum, & santalorum rubeorum ana drac. ii. chiæ mastiches 3. s. magno-
pere proderit si eo venter illatur. Saccellos item parabis in eundem vsum ex
purpureis rosis siccis, santalis, corallis balauftio. hypocistide, corticum citri,
cinnamoni, ac chiæ mastiches pauca quantitate addita: iidem etiam si in suc-
co cytoniorum, & aqua rosacea præmacerentur, & pluribus vicibus ventri ap-
plicentur modicè calidi, magnopere proderunt. Verum si ex intemperie dun-
taxat calida citra acrium humorum redundantiam. Cœliaca. aut lienteria orta
fuerit, eisdem quoque medicamentis vtendum erit intus, ac extra exhibitis,
relictis tamen eis, quæ purgationem moliantur, ac vrinam ciunt, quibus etiam
nec vomitus promoueri debet, sed tantum alterantibus, atque astringentibus
modo dictis medicamentis vtare. Sin autem ex frigida intemperie, aut pitui-
tosis succis intestinorum leuitas, seu cœliaca fiat; Aer eligatur ad calidum ver-
gens; contrarii quoque cibi adhibeantur ad calidum scilicet vergentes, cum
quibus etiam nonnulla calida, ac ventriculo ipsi grata admisceatur, velu-
ti est anisum, cuminus, cinnamonum, galanga, calamus odoratus, & ga-
ryophyli, ac reliqua similia. Competunt adhuc, & brassicæ bis coctionem
experta, ex Pauli & Aetii sententia. Vinum autem eis tribuatur calidius,
ac vetustius modice dilutum cum pluuiali aqua. Reliqua pro victus ratione
seruanda sunt, vt præcepimus supra. Verum si cum frigida intemperie pi-
tuitosa adsint excrementa, ea, prius concoquenda, ac præparanda sunt cum
syrupo ex absynthio, ex mentha, & corticibus citri, aut myrrino cum mel-
le rosaceo, aut oxymelite simplici. Demum aut vomitu expurganda sunt præ-
sertim si in ventriculo consistant, Isque iuuandus erit cum iis, quæ sæpius in
procedentibus adnotauimus, modo proni ad vomendum laborantes sint,
aut purgans medicamentum præbendum est, ita vt per aluum expurgentur

In quem vsum infraſcripto vtare. Recipe corticum myrobalanorum chebularum 3.iiii. infundantur in aqua meliffæ, & borraginis, & facta forti expreſſione in ea diſſolue ſyrup. e pluribus infuſionibus roſarum perſicarum vnc.ii. agarici drac.i. fiat potio, vel. 3.i. aut ſcrup.iiii. pulueris hiære ſimplicis Galeni, & ſcrup.ii. prædicti agarici excipe, & catapotia formato, ac præbeto, poſt quæ iterum aſſumant mane, & veſperi ante cibum per duas, ſaltem, vel tres horas vnc.s. ſyrup. aut ex abſynthio, aut ex mentha cum pauco puluere cinnamomi galangæ, aut calami odorati, aut cum aquo prædictorum aſtringentium medicamentorum eadem permisceas, ac præbeas. Confert etiam, ſi thuris granum fabæ magnitudine in vini nigri cyatho vno diſſolutum ſanguinariæ ſucco pari menſura admixtum præbeas, aut radicis pœoniæ decoctum, atque ipſa etiam radix ſicca trita potui inſperſa vt inquit Aetius: Similiter ſi chiæ maſticheſ tãtundem ac eodem modo exhibeas, nec minus antidoti theriacæ, aut mithridati aut micletæ ſi drac.i. cuiuſlibet dabis proderit, præſertim cum pauco vino aſtringenti. commodè quoque in iis vti poteris, prædictis vrinam cientibus, & calidioribus, atque acrioribus. Extrinſecus vero oleum maſtichinum, de abſynthio. myrtinum, ac nardinum adhiberi conuenit, aut vnguentum ſic, conficito, Recipe olei maſtichini, & myrtini ana vnc.i. de abſynthio vnc.s. cinnamomi, galangæ, & maceris ana 3 s. ſpicæ ſcrup.ii. chiæ maſticheſ 3.i. cum cerra, & vino odorato fiat vnguentum: Sin autem maioris ſacellis, vt vtriuſq; menthæ & abſynthii, ſingulorum p.i. aſſume, chiæ maſticheſ, cinnamomi, ligni aloes, & corticum citri, cuiuſlibet 3. ii. garyophyllorum, maceris, galangæ, & calami odorati ana 3.i. roſar. rubear. ſiccarum manip. i. s. figurentur ſacculi ſcutiformes, qui pauco vino odorato calido inſperſi ſæpius iterentur, vel in vino græco aut guarneto, & pauco cydoniorum ſucco macerati calidi applicentur, ac iterentur ſæpius Eorum etiam vnus ſemper ſupra ventrem adhibitus, ac alligatus confert. Emplaſtrum quoque ex chia maſtiche diſſoluta in oleo nardino, & de abſynthio adhiberi poterit, quemadmodum etiam & Galeni ceratũ ſtomachicum dictum, aut emplaſtrum, ex gallia, quæ omnia præter tamen purgationem ac vomitum, & ea quæ vrinam ciunt, conducunt ſi prædictæ affectiones ex intemperie duntaxat frigida ventriculi vel inteſtinorum fuerint ortæ. Et cum in omni fluore ventris, tum in hoc præcipue neceſſarium eſt (vt Celſus refert) non quoties libet deſidere, ſed quoties neceſſe eſt, vt hæc ipſa mora in conſuetudinem ferendi oneris inteſtina deducat, Propterea id prætermittere nolui, Nam nõ parum cõducet, ſi illud laborantibus præcipiatur, quẽadmodum etiam, & medicamentum noſtrum, quo vti conſueuimus. Id autem recipit vtriuſque menthæ, contuſæ, & abſynthii ana manip. i. micæ pannis tore facti vnc.i. cinamomi, aloes, maſticheſ, galangæ ana ſcrub.ii. vini odorati, ſeu aceti, & aqua rofaceæ quantam ſatis ſit, miſceantur, & ventri applicetur abunde calens; nam tale eſſe cõuenit cum primum imponitur, talium vnumquodque quippe quæ tepida ſunt omnia ventriculi firmitudinem diſſoluunt, Gal. tette. 8. method. medend.

Medicamentum
purgans.

Quæ a purgatione
exhibenda
ſint.

Topica.

Cap. 5.

περί τῆς χολέρας.

id eſt de cholera.

Cap. 72.

C V M rotus ventriculus ab aliquo, quod morſu, pondere ve contriſſet, vexatur, idque eiice: e cupiat, ſuperno, infernoque ore ad excernendum tens, affectus quidam gignitur, qui à Græcis χολέρα vt patet 3. de cauſyptio. à Latinis ſimiliter cholera dicitur, quamuis barbaram ſectantes medicinam cholericam ſeu cholericam paſſionem nuncupent, nomen ſumens, vt idem Galen. faterur 2. meth. med. a cauſa putata, quamuis id non ex propria

Cap. 2. poſt medium.

Cap. 2.

Cholera unde
nomen ſumpſerit.

Quid cholera

Quæ pars in ea
affecta sit.

Cap. 2.

3. de caus. sym.
cap. 2.

3. de caus. sym.
cap. 2.
Quis præter na-
turam affectus
sit cholera.

Eiusdem affe-
ctus gna.

propria sententia fateatur, sed medicorum auctoritate, qui sunt a Omidio Hu-
ius quoque sententia videtur esse. Celsus libr. quarto, cap. 11. cum dixit, Er-
go eo nomine morbum hunc *χολέραν* Græci nominarunt, cum prius bilem es-
se eius causam asseruisset. Huius autem contrarium sentit Alexander, qui cap.
decimo sexto, libr. sexti de hac affectione verba faciens dicebat, Ne autem
quis affectum hunc ideo *χολέραν* vocari putet, quod a bile omnino, fieri con-
sueuerit, sed quia materia quæ per ventrem affertur, ex intestinis videtur ex-
cerni, intestina vero *χολάδες* veteres appellabant, ut etiam Homerus testatur
his verbis *κῆχυντο χαλὰι χολάδες*, quod est, fusa erant humidi intestina. Qua
de re huius gratia affectum hunc (ut idem Alex. inquit) veteres *χολέραν* nun-
cuparunt, eo magis cum non ab una duntaxat causa, bile videlicet (ut ipse te-
statur) affectio hæc excitari solet. sed quicquid velint de eius nomenclatura,
Nihil aliud est affectio hæc (ut apud eundem Alexand. præcitato loco patet)
quàm immoderata perturbatio, quæ per aluum, & vomitum propter stoma-
chi subuersionem, offensionemque, provenit. Paulus vero cap. trigesimo nono
libr. 3. dixit, quod cholera est immodica ventriculi perturbatio supra, infra-
que erumpens, & auctor libri, qui inscribitur de finitionibus medicis, in secun-
da descriptione eiusdem affectus ait, Quod cholera est acutus affectus cum vo-
mitibus biliosis multis, aluique deiectionibus: Verum quæ nam pars in hoc
affectu oblata sit, non admodum liquet: Nam Celsus præcitato loco circa prin-
cipium capitis asseruit, Choleram commune stomachi, atque intestinorum vi-
tium videri posse, Nam simul & deiectio, & vomitus adest. In calce vero eius-
dem capitis dicebat, sed hic quidem morbus & acutus est, & inter intestina
stomachumque versatur; sic ut cuius potissimum partis sit non facile dici pos-
sit. At cum totus ventriculus per eius superiores partes stomacho, hoc est gu-
læ continuus sit, per inferiores vero ad intestinorum usque exortum extenda-
tur, Galen. auctoritate sexto de locis affe. non ab re hæsitauit Celsus cum in-
spexisset bilem in hac affectione supra, infraque erumpere, cuius potissimum
partis affectus esset, quanquam ex præcitata Galen. auctoritate. tum ex uerbis
eiusdem lib. 3. de caus. sympto. cum de hac affect. verba facit facile patere po-
terit, ventriculum ipsum in hoc vitio affici, non tamen secundum superiorē
duntaxat, aut inferiorem eius partem sed secundum motum, Cum dixit, quod
si toti illi talis affectus aliquando contingat, etiam utroque ore simul vitur
ad expulsionem, veluti in vocatis choleris. Ipse itaque ventriculus totus pri-
mo afficiatur, coafficiuntur autem cum eo tum stomachus, tum intestina ipsa,
Cum id, quod eum contristat utroque osculo expellere tentet, per supernum
quidem quod in gula, seu stomacho existit, per infernū vero, quod in pyloro:
Quod vero hæ partes simul affectæ sint, ostendunt (eodē Celso auctore) plu-
ra indicia, inter quæ vnum est, quod simul & deiectio, & vomitus accidunt, Et
præter hæc inflatio est, ac intestina torquentur. Verum sicut nausea, & vom-
itus expultricis facultatis ventriculi prauis motus sint, pari ratione, & chole-
ra ipsa, ut patet tertio de caus. sympto. Quare symptoma est in genere noxæ fa-
cultatum naturalium, & propriæ expultricis deprauatæ (quæ proprie chole-
ra dicitur.) Nam quandoque citra eiusdem facultatis noxam fit, licet perpe-
tuo aliquem præter naturam affectū consequatur, veluti supra de vomitu di-
ctum est, quanquam eam non proprie choleram nominat, ut si fiat propter ci-
borum quantitatem Alexand. auctore. Eius autem indicia sunt (ut inquit Ae-
tius cap. 12. libr. 9.) Vomitus biliosus, & nidorosus, & acidus ad plures horas
continue perseverans, & venter inferne eadem excernit, sequiturque sicis, &
exudatio, impeditus pulsus, musculorumque manuum, ac pedum, maxime ue-
ro surarum contractio & tensio, & (ut refert Celsus) nedum bilis supra in-
fraque erumpit, sed primum aquæ similis, deinde, ut in ea recens caro lota
esse

esse videatur, interdum alba, nonnunquam nigra, vel varia. Verum (vt Paulus testatur) ciborum cruditas apparet, quæ nonnunquam ex magna alimentorum prauitate, interim ex vitiosorum humorum superfluo trahit originem. Nam neque ex vna duntaxat causa excitatur, sed etiam multis, vt Alex. vsum est, Nempe ob copiosorem cibum assumptum ac corruptum, quia concoqui non potuerit. Item ob prauorum humorum, ac ciborum, seu potionum (stomachum præsertim offendentium) qualitatem, qualis est (vt ipse inquit) pepo, & pingues, dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiã ex copia bilis naturam sursum, ac deorsum ad excernendum irritantis. Nec non ob nonnulla frigida applicata. Aut frigidarum aquarum vsum, si eas bibant, aut in eis diu natauerint. Nonnullæ etiam aliæ particulares, cibi, & potus, colericæ bilis sursum, ac deorsum eruptionis esse poterunt causæ, vt 7. de morb. vulg. liquet. Quæ causæ omnes faciles interstingui poterunt. Nempe alimentorum assumptorum copiam, aut eorundem (ac etiam potionum) prauam qualitatem ex laborantis, seu astantium loquela percipies, veluti etiam si præcesserit vsus frigidarum aquarum, aut frigidorum medicamentorum ab extrâ adhibitorum. Verum vbi ex copia bilis, seu aliorum prauorum humorum redundantia cholera fuerit excita, ex propriis eorundem humorum signis, ac sæpius iam dictis eos discernes. Quod vero cholera acutissimus sit affectus syncopem insignem, immodicamque virium resolutionem inducens, omnibus in cōfesso est, vt inquit Alex. Iccirco accurate internosci, & celerrime curari merito postulat; etenim dilatio in omnibus acutis morbis nociua est. In hoc autem affectu, etiam exigua, ac leuis curandi mora, aut simplicem offensam, sed etiam absolutam subinde tabem (quæ phthisis dicitur) conciliat. Idque ferè confirmauit Celsus, cum dixit. Neque tamen vlli morbo minori momento succurritur. Cholericæ vero affectionis magis in æstate fiunt, & febres intermittentes, & quibus errores accidunt, eæ quandoque malignæ fiunt, & ad morbos acutos perueniunt, vt eodem 7. de morb. vulg. Hippocr. scriptum reliquit. Quoniam vero nulli morbo (vt diximus) minori, quam huic, momento succurritur: Propterea relicta victus ratione, quæ fere eadem est cum ea, quam instituiamus præcedenti cap. de leuitate, intestinorum, nisi quod leuiter astringentia, nedum in cibis ipsis permisceri debent, aut parum ante assumi, sed etiam post eos cum simul ingruat vomitus: & alui fluor. Quanquam & eo quoque moderata esse debent, nec a principio. Nam si quis in principio, aut coaceruatim ea, quæ efferuntur cohibere aggrediatur. Is maioris mali auctor erit, ex Aetii sententia præcitato cap. 12. libr. 9. Inutilia enim cum sint (vt ipse inquit) euacuatione opus habent. Qua de re conuenit, si ea non sponte ferantur, opportune potius irritare. Nos reliquam aggrediemur curationem. Corruptis itaque in ventriculo cibis siue propter eorum copiam, siue prauam qualitatem, aqua tepida exhibita ægrum vomere iubeto, potissimum, vbi purum sit, quod per ventrem, aut vomitum excernatur, sed nauseant, vellicenturque ægri. Quo casu etiam aqua mulsa vtendum erit, vt quæ aluum, & vomitum sine noxa irritare pōt, vt Alex. refert. Verum si eam non libenter sumant, modo dicta tepida aqua ipsis liberalior dari debet, atque vomitus sollicitari, aut digitis, aut pennis donec corrupta abunde euacuata tibi esse videntur. Per vomitus etenim oportuna prouocationem vomitus ipse soluitur, & cessat (eodem Aetio teste.) Quod si post aquæ tepidæ potum vomitus non incidat, miscuisse tamen nouam materiam corruptæ prodest, parsq; sanitatis est vomitum esse suppressum, ex Celsi sententia. Quo tempore etiam somnum ægris precipere oportet, ac quietem, & præcordiorum forum (vt idem Alexand. asserit). A somno vero paulatim cibo reficiantur, ita vt cruditas tantum

causæ.

Versus finem
libri.

Prognostica.

curatio.
Loco citato.

Vomitus.

Medicamentū
purgans.

Topica.

Animaduertio.
Quæ denoran-
da sint, ubi bilis
adfit copia,

Cataplasmata.

Vbi intolerabi-
lis existat effu-
sio.

vitetur. Nisi. n. quid impedimenti fuerit, celerrimè rursus ad naturalem sta-
tum reuertuntur, potissimum, si corruptio ob copiam ciborum fuerit oborta,
quanquam neque huiusmodi affectum proprie choleram nominant. Nec mi-
nus vbi procliuiora fuerint corrupta alimenta, vt per aluum excernantur, ea-
demq; via natura expellere tentet, conuenit iuuare excretionem per sedem,
purgantibus tamen medicamentis leuioribus vtendo, diuersis pro natura cor-
ruptorum alimentorum, præsertim eis, quorum mentionem fecimus præcedēti
capite. Quæ iterum in pauca exhibeantur quantitate, ne in grauiora pericula
ægri ex immodica euacuatione ducantur. Id quoque seruandum erit vbi bilis,
seu quibis alui succus vitiosus, ac corruptus ad excretionem procliuis naturā
irritare videatur, nihil autem mentione dignum, vel per aluum descendat, vel
per vomitum erumpat: Verum vomitus per solam aquam tepidam irritetur,
derelicta aqua mulla. Aluus vero ducatur aliquo prædictorum cap. præcedenti
annotatorum, prout diuersus requirit redundas humor. Cum vero humo-
rum excretio quieuerit, venter oleo mastichino, de absynthio, vel nardino cū
vigno exiguo fouendus, & probi succi cibo vtendum erit. At si immodica fiat
inanitio, ita quod vehementer, & vomitus, & deiectio vexent, Cauendum pe-
nitus, ne quiquam tribuatur, quod vomitum, vel aluum ciat, sed imbecillus
ventriculus refici iis deuoratis debet, si fieri potest, quæ corroborēt & recreare
queant, nempe victu, & medicina (vt liquet ex eodem Alex.) Exhibēdi itaque
sunt in cibo pulli tum gallinacei, tum columbini, perdices, phasiani, turdi, &
reliquæ mōtanæ auiculæ. Insuper poterit parari iusculū ex aliquo prædictorū,
præsertim pullorum gallinaceorum, cum omphacio, & pauca aqua rosacea, aut
eorundem, carnes contusæ cum eiusdem simul mixtæ: hoc etiam tempore &
ante, & post cibum maiora astringentia adhiberi poterunt, veluti mespyla, &
sorba, cytonia & corna, & hi fructus, quas vulgus azarolas vocat, mala punica,
& reliqua pyra astringentia. Et vbi bilis adfit copia, ptisanæ cremor erit ido-
neus refrigeratus. Item lactuca refrigerata, pauco, aceto adiecto, similiter etiā
intybus, vt Alex. refert. Nec erit absolum offerre mediocriter aquæ frigidæ
potum cyathi mensura. Cauendum tamen erit ne nimium frigida existat aut
aceruatim exhibeatur. Cui pampinorum vitis, aut mali punici acidi succus
modicus instilletur, vel in eadem aqua capreolorum vitis decoctum fiat, aut
rosarum, aut œnanthes, seu rhu. Cui etiam menthæ paxillum sit adiectum.
Item eiusdem acidi mali punici succus cum menthæ succo absorbendus detur,
multa tamen quantitate succus mali punici, menthæ succum excedat. In quem
etiam vsum syr. ex omphacio, è ribes, ex citri acido, ac succo malorum punico-
rum acidorum, item myrtinum, & ex infusione rosarum siccarum, & incom-
pletarum cum pauca quantitate eius, qui ex mentha conficitur, tribuere pote-
ris. Nec minus cataplasmata, vnguenta, ac alia topica medicamenta ventri im-
ponenda sunt, quæ vim astringendi, ac ventriculum roborandi vim habeant,
quorum copiam requiras precedenti cap. Particulatim autem ex palmulis,
œnanthe, hypocistide, acacia, rhu, & malicorio, succoq; eiusdem cataplasma cō-
fici poterit, & ventriculo adhiberi, ex Aetii, & Pauli sententia, vel semperui-
uum, & lactuca cum mica panis, rosaceoque excepta imponatur. Quandoque
vero capreolorum vitis, aut vix acerbe, aut polygonii succus cum cerato probe
confecto miscebitur, & maxime iuuabit, vt inquit Alexan. At vbi intolerabilis
effusio existat, adeo vt flusio sisti nequeat, vires vrgeant, & extremorum refri-
gerationes conuulsionesq; & animi defectio oriantur, ad vinum transeundū
est mediocriter astringens, neque viribus validum, & quod dulce quidem sit,
non autem odorum, idque cum mica panis exhibeatur, aut in ipso eadem mace-
retur, exprimatursq; Atque ita paulatim, & per interualla cochleare absorbeat;
Nam vinum omnium maxime subito, & celeriter vires collapsas refocillare
potest;

potest; Ac multos noui (vt inquit Alexan.) ex sola illius portione præter spem mortis periculum euasisse. Salutare quoque erit, si eidem vino menthæ decoctum admisceantur, nam saluberrimum medicamentum erit, vt idem auctor asserit, præsertim vbi vomitus diutius perseveret: omnique modo eisdem somnus procurandus est & quies. At si ne his quidem auxilijs cibum retineat, magnopere conducis cucurbitulas ad mouere statim cum æget illum assumpserit contra ventriculum ipsum; nam valide retrahendo vomitum fieri prohibent. Præterea si diutius adherent, etiam concoctionem iuuant, & ventrem, ne amplius, profluat, cohibent, eodem Alex. teste. Aluo autem adhuc egerent (vt inquit Aetius) amyllum cum decoctione capitum papaueris per clysterem infundatur. Simul etenim cohibet, & refrigerat, somnumq; inducit, vt ipse refert. Frictiones quoq; per manus adhibita quietæ, & mites, præterea extremorum deligaturæ, eisdem conducunt & si quidem aluus vrget, plures brachijs, & iuncturis, quibus illa cum manibus committuntur, cum frictiones, tum vincula iniicienda sunt. Sin autem vomitus, tum femora, tum talos constringi, & paululum ipsa dissoluendo rursus deligare oportet, vt patet ex eodem Tralliano, quod materiam semper in contrarium reuellamus. odoramenta quoque naribus admoveantur, ac illitiones soporiferæ circa frontem, vbi vigilæ torqueant. At si extremæ corporis partes frigent, vngendæ sunt calido oleo, cui ceræ paululum sit adiectum, calidisque fomentis nutriendæ (ex Celsi auctoritate) & ad conuulsorias contractiones in musculis factas calida linimenta ex oleo modico imbuta circumponere oportet, tum cerata liquida. quibus adiectum sit aliquid castorei, & irini olei, ex Pauli, & Aetii sententia. quo etiam tempore interponenda potio absynthii est, vt idem Celsus fatetur.

Cucurbitulæ.

Frictiones. & vincula.

Si vigilæ torqueant.
Si extremæ partes frigeant.

πρὸ τῆς διαρροίας, καὶ ῥιωδίας.

Id est de alui profluvio, seu ventris fluxu.

Cap. 73.

VB 1 & liquida aluus, & sæpius quam ex consuetudine fertur, affectus quidam exoritur, qui à Græcis διαρροία communiter simulatq; ab Hipp. apho. 25. & 30. 3. lib. ac 32. 6. alijsq; plerisque locis appellari consuevit. Quanquam ab eodem Hippocr. & Galen. quandoque ῥιωδία nuncupetur, vt patet primo de morb. vulg. à Latinis autem diarrhœa, seu alui profluvium, quanuis à Celso cap. 19. libr. 4. ventris fluxus nominatur, qui copiosior fluxio est alui, diuturna, sine phlegmone, & exulceratione, vt lib. de finitio, medicis scriptum est, vel (vt liquet apud Gal. eodem primo de morb. vulg.) deiectio est, & semper assidue humorum excrementorum, sine dictis affectibus, (vt ipse inquit) qui affectus prius ab eo descripti erant, dysenteria videlicet, lienteria, & tinesmus. Cum itaque aluus fluxione laborat, seu humidior efficitur citra cruentas deiectiones, tensionem, ac incoctorum ciborum excretionem, alui profluvium est, & dicitur. In quo quæ nam pars primo afficiatur non admodum patet. Nam licet deiectio optima, quæ mollis constansq; est, & eo tempore secreta, quo secunda valitudine assuevit quantitateque est pro ratione cibi assumpti, colore subrufa, nec admodum graueolens, non solum inferiorem ventrem bene valere offendit, sed etiam nihil in eum decumbere ex alijs visceribus præter naturam, ex Hippocr. & Galen. sententia prognost. intelligendo per inferiorem ventrem ventriculum ipsum, & item ieiunum simul cum intestino omni, vt Gale. asserit. Non tamen contraria deiectio (vt patet ex Gal. ibidem, & primo de crisi) confestim indicabit eundem inferiorem ventrem præter naturam se habere. Nam quandoque permu-

Commentar. 2. tex. & comm. 7. & 36. Alui profluvium quid sit, Li. de finit. med. post medium. Commentar. 2. com. 36.

Dubia est pars affecta.

Tex. & com. 13. 1. de crisi. c. 11. in prin.

tabitur tum in substantia, & colore, tum etiam copia, ex permixtione alicuius confluentis humoris. Neque etiam seruabitur tempus secretionis assuetum, & tamē venter inferior bene valebit. Sed à iecore, aut liene aut aliqua quauis alia parte, seu corpore toto, vel duabus, seu pluribus in eundem ventrem confluere contingit excrementa aliqua. Quae de re alui delectiones, vbi præter naturam se habeant ventrem interdum solum esse affectum significant. Sæpe vero decumbentis aliunde materiæ in eum indicia habent. Atque hæc multiplicia sunt prout multæ quoque partes, vel corpus totum (vt diximus) eandem materiā, seu humores in iam dictum ventrem demittitur. Idque aut critice esse poterit vtputa cum per eos totū corpus, aut iecur, vel quæpiam alia pars expurgatur; Iterim vero symptomaticæ. Quo casu affectionem, aut corporis omnis, aut partis alicuius, (vt diximus) aut aliquarum indicabunt. Ex quibus liquido constat in diarrhœa non perpetuo vnā affectam esse partem, neque etiam venticulum, aut intestina duntaxat, sed interim iecur, aut alienem, seu cerebrū, aut corpus totum affectum esse citra ventriculi, aut intestinorum oblaxionem. Interdum vero contingit quod venticulus ipse, aut intestinorum aliquod afficiatur corpore toto, aut reliquis eiusdem corporis partibus bene valentibus. Et quoniam tum pro prognostico, tum etiam pro curatione huius affectionis magnopere conducit determinate partis primario affectæ, cognitio; veluti in cunctis alijs præter naturam affectibus necessarium esse monstrauimus; ea de re id docere conabimur. Interstinguens namque si à toto corpore diarrhœa fiat, quoniam aderunt alicuius redundantis succi in toto signa, siue in toto habitu fuerint, aut in vniuersis vasis, qualiscunque etiam fuerit redundans succus. Particulariter autem ea conscripta reperies apud Gal. cum lib. de plenitudine, tum etiam 4. de sanit. tuend. ac alijs plerisque locis. Præter id quod ociosa quoque vita præcessit, consueti exercitii dimissio, ac ingestorum ciborum, & potuum copia, aut consuetæ alicuius excretionis retentio, neque ullum aderit signum particularis partis affectæ. Verum si à toto fiat propter eiusdem corporis liquationem, cum portio carnis, quæ colliquatur in ventrem defluit: Tunc per aluum excernitur deiectio exigua, glutinosa, optima, admodum graueolens. Pariter si propter vniuersi corporis retentricis facultatis imbecillitatē ex totius corporis extenuatione præcedente, ardentissimaq; febre, seu hectica, seu etiam tæbe, id coniicere poteris, quemadmodum Hippoc. scriptum reliquit aphor. 11. 12. & 14. 5. lib. Cerebro autem affecto spumosa aderunt excrementa, vt idem inquit Hippocr. apho. 30. 7. lib. nec minùs & imbecillitatis eius apparebunt indicia, ac destillationes, quandoque dolor. Quæ omnia scripta reperies cap. de dolore capitis, ac destillatione. Consuevit quoque vitio cerebri orta diarrhœa in somno potissimum longiori magis, quàm in vigiliis generari. A iocinore vero vbi ortum fuerit alui profluvium, vt plurimum chilosæ erunt alicui deiectiones, probe tamen ventriculi coctione celebrata, potissimū si attractrix iocinoris facultas oblaxa fuerit, idque non ob aliud (vt dicemus) quàm propter distrutionis imbecillitatem, nisi plus cibi fuerit assumptum, quàm hepar indigeat, aut citius fuerit deiectus propter ventriculi, & intestinorum retentricis facultatis imbecillitatem. Id quod dignoscere valebis ex iis, quæ diximus cap. de leuitate intestinorum. Interim quoque bilis multitudo in deiectionibus apparebit, ac signa aderunt aut inflammationis, aut immodicæ caliditatis eiusdem, quemadmodum si ab eis obstructione proueniat, obstructionis quoque aderunt signa. Sic si alius quispiam affectus iocinoris præter iam dictos affuerit ex propriis eius notis id manifestabitur. Nos vero de eis in sequentibus fusissime pertractabimus. Sed quoniam idem iecur non solum sua ipsius excrementa, sanienq; & humores præter naturam demittit in ventrem, sed etiam corpori totius; quandoquidem venter per id omnibus corporis

Quod non vna
duntaxat pars
semper in diar-
rhœa afficiatur.

Quibus indicijs
dignoscendo sit
pars affectæ in
diarrhœa.
Lib. de plenitu.
Cap. 11.
4 de sanit. tuen-
da cap. 4.

partibus copulatur, ac per illud recipit excrementa earum, vt liquet ex Galen. 2. progn. Propterea id distinguere poteris ex signis iam traditis: Si totum corpus fuerit affectum aut si alia partes, quædam ex earundem partium affectatum propriis indicijs. Verum si à plene diarrhœa proueniat, vt plurimum deiectiones ad nigrum vergentes, aut etiam nigrae erunt: Patebuntq; particulares eius ægritudines ex propriis earum indicijs, de quibus à nobis loco proprio mentio fiet. Accidit interim ab oris, seu linguæ affectione alui profluuium. Ab oris siquidem, vt in pueris cum dentire incipiunt, maxime cum caninos edunt dentes. Quoniam alimentum non bene concoquitur, neque distribuitur vt patet aph. 25. 3. lib. A lingua vero vt in blæsis, quemadmodum liquet aph. 33. 6. lib. Quoniam iis, qui balbi natura sunt, contingit aut cerebrum habere humidum, aut linguam, aut vtrunque, atque inde fluentes humiditates in ventrem suscipi, vnde & longis profluuiis capiuntur, quæ admodum Gal. scriptum, reliquit com. iam dicti aph. At si nullum aderit vniuersi corporis affecti, aut prædictarum partium affectarum signum, ventriculū, seu intestina affici putandum est. Alimenta quoque interim non probe concocta cum humidioribus deiectionibus, admodumque aquosis apparebunt. Neque tale alui profluuium determinatas habebit periodos, deiectiones tamen aderunt crebre, & exigua, & vt plurimum albe, & pituitosæ. Interdū nausea, & vomitus infestabunt, ac alia quædam symptomata, quæ imbecillitatem retentricis ventriculi, & intestinorum significabunt. Quæ omnia cap. de lenteria, & vomitu ostendimus. Verum inter reliqua, vbi diuturnum fuerit alui profluuium, propriam ventriculi passionem indicat, ex Gale. decreto com. præcitati aph. 32. 6. lib. Quod vero quodlibet alui profluuium symptoma sit in genere excretorum immodice, nemo veretur. Nam quæ in eo excernuntur, aut tota substantia, aut quantitate, aut qualitate à naturali statu recedunt. Item quod (veluti reliqua symptomata) omnino morbis succedat, vel continenter, vel aliis symptomatibus intercedentibus, cuius patet etenim semper causam aliquam habet præter naturam, quæ ad talem motum, seu actionem naturam stimulat, ex Gal. sententia 2. de caus. symp. Ad hæc etiam quod necessitate ventris profluvia eueniant, vel coctione, vel distributione frustrata (Nisi ad intestinorum exulcerationem consequantur) liquet apud eundem Gal. com. aph. 25. & 30. 3. lib. Non tamen necessario, aut retentrix, aut expultrix facultas in eis oblata est, ex eiusdem Galen. auctoritate li. de differ. symp. Nam licet tum alimentum non bene concoquitur, neque distribuitur, consuevit alui profluuium euenire, Immo absque iis fieri non potest, tamen cum ipsum, aut non probe concoctum sit, aut non distributum, vt decet, interim symptomatice, hoc est non ad animalis commodum, neque tempestiue excernitur. Interdum autem tempestiue, & ad animalis commodum cum prouidentia scilicet de eius salute, & cum virtutis robore. Id quod maxime in hac affectione attendendum est pro eius curatione. At quomodo libet fiat alui profluuium, crebriores, ac liquidiores deiectiones aderunt, cum leuiori, ac tolerabili interdum dolore. Interim autem grauissimo, vt Celsus fatetur cap. 19. lib. 4. Verum nunquid ea, quæ deliciuntur bonæ sint secretionis indicia, aut secus, sic interstingues. Nam si madens, seu aquosa deiectio crebro, & paulatim, aut vniuersim, & sæpe deliciatur, ac cum stridore, grauissimoque dolore, symptomatis rationem obtinebit, ac symptomatica erit, Natura non per se expurgante, sed ex aliquo irritamento stimulata, Neque inde vtilitas vlla prouenit. Immo talis euacuatio prauæ dispositionis erit. signum, vt liquet com. apho. 2. 4. lib. Idque potissimum, vbi in principio apparuerit, nulla cōcoctione præcedente, & in febribus. At si multo interposito tempore, ac vniuersim, citra stridorem cum exiguo, aut nullo dolore excernatur

Si ventriculus,
aut intestina af-
ficiantur signa.

Quis affectus
præter naturam
sit.

2. de caus. symp.
cap. 3.

21. de diff. sym.
cap. 4.

Modus digno-
scendi num criti-
ce, vel sympto-
maticæ per alui
profluuium ex-
cernantur.

2. progno. com.
14.

Cōmentario 2.
com. 36.
Causarum co
gnitio.

Cap. ultimo.

Pr gnostica.

præcesserint que coctionis signa, ac proportionata corporis dispositioni fuerit alui deiectionio, ægerq; facile toleret, & iuuetur ex tali euacuatione, leuius se habens, virtusq; robustior euadat, tunc bonæ secretionis indicium erit, quia natura expellit per se atque expurgat noxios redundantes succos qui corpus infestabant. Vt cunque vero fiat diarrhœa Eius causa erit, aut male concoctus, aut male distribuitus cibus in inferiori ventre vel humor quispiam ad eum confluens a toto vel aliqua corporis parte critice, aut symptomatice diductione à finibus concidente, & propterea vel iocinoris, vel reliquarum corporis partium concoctione, seu distributione, oblata tale quoque fit alui profluvium. Cum & quælibet madens deiectionio fiat, ut testis est Gale. eodem 2. prog. Propterea quod non fuerit ex ventriculo diductio adiecur, vel quia de iecore, vel liene aliquid defluerit in eum. Cum nanque humorum superabundantia per aluum expurgatur, alui profluvia fiunt, ex eiusdem Galen. testimonio com. apho. 16. 3. lib. Ex quorum permixtione cum alui deiectionibus (ut diximus) variari contingit, non solum deiectionum color, verum etiam consistentia atque odor, item & copia, neque etiam seruabitur tempus secretionis assuetum. Verum si quis velit non proprie, sed vniuersaliori vocabulo hanc affectionem alui profluvium nuncupare, cum in ea nec concoctio vetriculi, seu intestinorum, nec distributio ex eodem ventre inferiori ad iecur fuerint per se laxa, vel fateri in hac quoque affectione concoctionem, aut distributionem vetriculi, vel intestinorum oblata esse (& propterea alui profluvium dici) licet non per se & primo, non reclamabimus. Nos vero diarrhœam, seu alui profluvium dicimus quacunque humidorum excrementorum crebram deiectionem iuxta Gale. sententiam primo de morb. vulg. (ut superius adnotaui mus.) At ubi admodum aquosa deiectionio fuerit, minimeque graueolens ad candidum potius vergens, quam croceum, seu nigrum, & interim spumosa, alimenti non probam concoctionem, seu eiusdem imperfectam distributionem indicabit, aderuntque nonnulla signa eorum, quæ ventrem ipsum affectum ostendebant. Verum si ex alimentorum copia, aut eorundem mala qualitate talia fiant excrementa, ex ægro, seu assistentibus id percipere valebis. Quo casu nec coctio, nec distributio per se oblata erunt. Vbi vero ruffa, seu admodum crocea alui deiectionio fuerit, bilem esse causam iudica, potissimum si ætas temperamentum, habitus biliosi fuerint, ac tempus anni, regio, & aeris constitutio ad calidum vergent, similiter & antea acta vita. Sic si pituitosa, aut melancholica deiectiones fuerint, ac modo dicto ad pituitam, vel ad melancholiam vergant, pituitam, aut melancholiam alui profluvii causam esse putabis. Quod si syntectica fuerint alui excrementa, id quod calidissimis, ac pestiferis febribus contingit, si in corporibus generentur humidis, ac mollibus, & pinguibus, ut liquet. 10. meth. med. colliquationem tum carnis, tum adipis significabunt, habebuntque diuersum curationis modum: Cum iis videlicet quæ refrigerant, & humectant corpus, nutriendes nos aquam primum frigidam exhibentes, ut fusius dicetur, cum de febribus sermo habebitur. Vno autem die fluere aluum (ut inquit Celsus præcitato loco) sæpe pro valetudinem est atque etiam pluribus dum febris absit, & intra septimum diem id conquire scat. Purgatur enim corpus, ut ipse inquit, & quod intus læsurum erat, utiliter effunditur. Verum spatium periculosum est. Interdum enim tormina, ac fibrillas excitat, viresque consumit Alex. vero cap. 5. lib. 8. dicebat alui profluvium in febribus difficiliorem esse curationem, animadversionemq; & coniecturam requirere. Quod vere balbi a diurne alui profluvio capiuntur liquet apud Hipp. aph. 3. 2. 6. lib. similiter quod longo alui laboranti profluvio spontaneus vomitus superueniens morbum soluit, aph. 15. eiusdem scriptum est. Quemadmodum quod exigua deiectionio glutinosa, candida, & subcrocea ma-

la sit, potissimum vbi lenis fuerit: exitiosior vero si nigra, aut liuida, aut optima, aut foetida: diuturnior, si versicolor sit, sed nihilominus etiam exitialis, idēmet Hip. scriptum reliquit 2. prognosticorum. Quantum ad curationem spectat, animaduertendum, quod licet alui profluuium tum in febribus, tum citra febres eueniat, & in febribus difficilior sit eius curatio, ex Alexandr. & Aetii sententia, tamen si citra febrem contingat, neque facilis eadem erit, cum & ipsa diarrhæa (vt diximus) aut per viam symptomatis, ac vacationem symptomaticam, vel per modum iudicationis prouenire possit. Et propterea non semper eodem modo curanda erit. Facta nanque per modum crisis, ita quod per eam totum corpus, aut aliqua eiusdem corporis pars expurgetur, ac vtiliter ea excernantur, quæ sint corporis commoda, minime reprimere, seu inhibere conuenit, ne materia in aliam conuersa partem, prauos alios affectus generet, veluti phrenitim, aut lethargum, seu perniciosas parotidas, vt idem Alex. ac Aetio visum est. Sed cum salubriter à natura aliena euacuantur, aut vsque quo eadem omnem curam suam impenderit, expectare oportet, aut ipsius etiam motus adiuuare. Nam (vt idem Alex. fatetur) vidit quandoque ventrem initio affectus ad quartum, quintum ve diem profluxisse, & postea fluorem, aut per se, aut medici auxilio substituisse. Vnde ægri in magnum periculum inciderunt, vtpote in aliquem prædictorum affectum. Quid plura? Hipp. apho. 20. 1. lib. decretum reliquit; Quæ iudicantur, & iudicata sunt integrè, neque mouere, neque nouare aliquid, siue medicamentis, siue aliter irritando, sed sinere oportet: & Gal. in com. dicebat, Nos Hippocratem docere, quando sit totum ipsi naturæ permittendum, quod ad curam pertinet ægrotantis, nihil aliud nobis agentibus, nisi victum conuenientem instituentibus, quando etiam non sit totum ipsi naturæ permittendus, sed aliquid nos oportet operari, & proinde cum integra iudicatio facta iam est, vel adhuc sit, totum naturæ permittere, & nihil nos nouare oportet. Vbi vero non integrè iudicatur, aut iudicatum est, id, quod deficit, supplere nos conuenit, id quod etiam confirmauit 9. meth. med. & lib. primo de arte curat. ad Glauc. cum dixit. Sed neque si fuerit febris cum profluvio ventris, alia est opus euacuatione. Verum hæc sola sufficit, quamuis non sit pro multitudinis ratione: quicunque enim his plus adimere fore necessarium putantes, aut sanguinem mittere, aut ventrem mouere tentarunt, in grauiora pericula duxerunt. Redeuntes itaque ad ea, vnde oratio diuersa est; Dicimus cum Hippo. & Gal. ac reliquis præcitatis auctoribus, quod cum integrè iudicatio facta iam est per alui profluuium, vel adhuc sit, totum naturæ permittendum erit, nihil aliud nobis agentibus, nisi victum conuenientem instituentibus. Erit autem conueniens victus, quo ad eius quantitatem, prout vires requirunt ac reliqua, quo ad qualitatem spectat, diuersus pro diuerso redundante humore, & vt summam dicam, similis ei, quem instituimus cap. de cruditate, lien-teria, aut cholera, donec ipsa se natura componat, & ad integram perueniat sanitatem. At si non integrè videatur iudicare, ac segnis natura in euacuando fuerit, motum eius adiuuare oportet, (& si criticè euacuet) vt prædictis Alex. & Aetio visum est; seu id, quod deficit supplere nos conuenit, vt Gal. placuit præcitato com. apho. 20. primi libr. quo ex coniunctis ambobus perficiatur, quod postules, ex eiusdem Gal. auctoritate præcitato lib 9. meth. meden. Sed mox quispiam inficias ibit, asserens pugnare hoc eiusdem Gal. sententiæ nunc citatæ primo de art. curat. ad Glauc. vbi præcipit, quod quamuis euacuatio non sit pro multitudinis ratione, tamen ea sola sufficit, quæ à natura fit, nec alia opus est euacuatione. Cui responsum sit Galen. non sibi ipsi pugnantiâ conscripsisse, si quis ea, quæ præcitato com. ac primo de art. curat. scripta reliquit, recte inspexerit: Nam licet quo tempore natura corpus expurgat,

2. prognost.
tex. 21. 22 et 23
Quæ attenden-
da sint circa
eius curationē.
Act. lib. 9. c. 35.

9. meth. cap. 5.
1. ad glauc. c. 14.
post princ.

Concluditur cu-
randi via.

Qualis victus
competat.

9. meth. cap. 5.
Dubium.
1. ad glauc. loco
citato.

Responsio.

Loco citato.

Si ex corruptis
cibis fiat, medi-
camentorum ra-
tio.

Si ex bile fiat,
curatio per me-
dicamenta.

Si ex pituita o-
biatur, curatio.

De Agarico no-
ta.
Cap. proprio.

id quod excernit non sit pro multitudinis redundantis humoris ratione eo tempore: Confidendum autem ei sit, quod in futurum ualeat ipsum integre expurgare, cui in dubium venerit totum naturæ esse permittendum, & nihil innouandum ut diximus. Id quod consulere voluit idem Galen. præcitato primo lib. de art. curat. ad Glau. At si quæ iudicantur, tempore, quo iudican- tur neque integre a natura iudicantur, neque omnino fidendum, quod ab ea in futurum perfecte & integre iudicari valeant, Tunc oportet (ut idem Gale. præcipit præcitati apho. com.) id quod deficit nos supplere, & hanc senten- tiam sectati sunt Aetius & Alex. ut superius dictum est. Iuuanda itaque ipsa natura erit pro curatione diarrhææ cum non integre, perfecte, ac indeficien- ter ipsa iudicauerit, aut indicat, neque fides habetur eam posse in futurum integre iudicare, & corpus perfecte expurgare, per eandem siquidem viam, per quam natura expellere tentauerit. Nanque ducere oportet quo maxi- me natura vergit per loca conferentia, eo ducere iussit Hipoc. apho. 21. primi lib. Quo loco subdebat Gal. quod quæ videlicet, neque iudicantur, neque integre sunt iudicata, illa sunt, quæ ducere oportet per locum, ad quem ex conferentibus natura vergit. Corruptis igitur cibis in causa diarrhææ exi- stenribus, pro natura corruptelæ eorundem assumptorum ciborum purgandi erunt. Nam si ad frigidum corruptela vergat medicamentis, quæ frigidos expurgant succos, uti oportet. Si ad calidum, quæ calidos humores expur- gant propinanda sunt, quemadmodum cap. de vomitu, & lenteria scriptum est. Deinceps vero eis, quæ ventrem roborant eodem loco conscriptis vten- dum. Verum ubi biliosa fuerint alui deiectiones bile ad inferiorem ventrem confluyente, eadem prius contemperata, domata, euicta, ac preparata ex oxy- saccharo, seu syr. ex infus. rosarum, aut cichorii succo tale purgans medicamen- tum exhiberi poterit, Recipe tamarind. vnc. i. fiat decoctum in aqua cichorii & acetosellæ, in cuius expressione dissolvas rhab. 3. i. vel scrup. iiii. cui exigum qui spice fuerit additum, maceretur autem per aliquod spatium aut in vnc. i. s. sit succi rosarum, aut in parte prædicti decocti, & absque hoc, quod per co- lum transfusum, misceantur ei mellis aerei vnc. ii. aut vnc. i. s. & exhibeatur. Po- teris etiam prædicto decocto addere corticum myrobalanorum citrinarum 3. i. vel 3. ii. Perpetuo autem tam in hoc, quam in quolibet alio alui profluui- o ubi purgans medicamentum præbetur, moderatum sit oportet. Ne ex immo- dica euacuatione vires prosternantur. Pari ratione astringentia magis, vel minus admiscenda erunt cum purgantibus medicamentis, prout magis, vel minus alui profluuius laborat, ac vires ipse magis vel minus euacuare per- mittunt, ac plus, vel minus ventris partes fuerint imbecille. Vbi vero pitui- tosus fuerit redundans succus, eodem prius concocto, ac preparato ex melle rosaceo, seu ex oxymellite, syr. è succo borrag. vel è corcibus citri, aut re- liquis similibus, idem expurgandus erit, aut ex agarici decocto cum syr. è plu- ribus, infus. rosarum vel rubearum, vel persicarum, & diacatho. Vel loco præ- dictorum syr. vñ. i. mellis aerei adiecto, aut ex eodè agarico simul cum rhab. ac pauca spica formato catapotia, & vtare. Post quæ aliquod leniens medi- camentum exhiberi poterit, & si videbitur prædictis medicamentis 3. i. aut 3. ii. myrobalanorum chebularum adicere poteris. Quanquam nostris tem- poribus cane peius & angue Medici quidam thessalici pro curatione alui pro- fluuii agaricum vitent, quadam Ioannis Melues auctoritate (ab eisdem prauè intellecta) freti, quod videlicet læsionem aliquam imbecillis visceribus im- primat, ea debilitans, ut propterea indigeat permixtione abstergentium cum ipso, velut ipse inquit. Verum cum agaricum ipsum primo gustu dulce sit, sed paulo post sub amarum, ac acrimoniæ quandam spetiem temporis spatio inducens, leuiculeque astrictionis sit particeps, & propterea digerendi vim habeat,

habeat incidendi, ac expurgandi infarctus viscerum, ex Galen. auctoritate 6. de simp. med. facult. Ad hæc cum omnibus in vniuersum interioribus vitiis accommodatum sit, vt liquet apud Dioscoridem cap. primo lib. 3. miror Ioannem Mesuem talia proferentem, & a quo sapiente (vt ipse inquit) ea transcripserit. At si & illud quoque admittatur, per eundemmet liquet permixtione abstergentium cum ipso id vitari posse, quod. s. læsionem non imprimat in visceribus, ea debilitans. Ipse vero cum sæpius eo vsus fuerim & in decocto, & in substantia, vbi vsus exposulauit, ingentem semper vtilitatem ex eo provenire conspexi, nullumque incommodum ægris ex eius assumptione exortū fuit nedum pro curatione alui profluuii, verum etiam dysenterix propriæ dictæ, ac hepaticæ, veluti nuper in Ferdinando de Capua primogenito filio Illustris Ducis Termularum experius sum, cui cum bis in catapotiis simul eum rhab. ipsum exhibuissim, præter aliorum medicorum votum, ex eo perfecte curatus fuit, tum ex alui profluuiio, tum etiam ex hepatico affecto, quibus decem fere mensibus laborauerat. Erat autem affectio hepatica ex frigida iocinoris intemperie orta, aluique profluuium pituitosum. Tuto itaque, ac cum ratione agarici diluto, seu decocto aut etiam eo in catapotiis redacto cum paucis rhab. ac chebulis pro cura alui profluuii pituitosi vtare. Et vt Ioanni Mesuæ satisfacias, ac empiricis istis hodiernis medicis, qui vires medicamentorum ignorant, & quod ex eis proueniant diuersæ operationes cum diuersarum, ac inæqualium sint substantiarum nesciunt, aliquod abstergentium ei permisceto. Etenim quauis ætate non deerunt semper noui thessali, veluti huc vsque adeo non defuerunt. Si vero ex succo melancholico fuerit excitata diarrhæa, Idem e fumarix succo parato syr. aut borraginis, seu lupulorum cum eo, qui ex infusione fit rosarum, aut e corticibus citricum aquis mellyssophylli, lupulorum, & oxalidis prius concoctus, ac præparatus. expurgandus quoque erit ex infra scripto medicamento, quod recipit senæ, epithymi ana 3. iiii. corticum myrobalanorum indarum 3. ii. fiat decoctum in aqua cælesti, vel acetosellæ, & borraginis, in quo vnc. ii. aerei mellis aut vnc. iij. syr. ex pluribus infusionib. rosarum rubearum, cum vnc. s. diacath. dissoluas. Interim quoque qualiscunque fuerit redundans humor, clysteribus vtendum erit, ex hordei non decorticati, ac torrefacti decocto, gallinarum, seu pullorum gallinæorum iure, saccharo rubeo vocato, ac oleo rosaceo paratis, præsertim vbi bilis redundarit. Pituita autem redundante in vitem olei rosacei chamæmelino, aut anethino vtendum, & loco sacchari rubei, rosaceo melle. Similiter etiam vbi nigra bilis deiiciatur, eisdem, vel similibus vtare. At purgatione vero, vel vbi alui profluuium diutius perseuerauerit vires consumens, ac habitum colliquans, tunc sane resistere ei oportet, tum per ea, quæ per os sumuntur, tum quæ per anum infunduntur, atque ea, quæ forinsecus imponuntur, ex Aetii decreto, & etiam Alexan. Nam cum euacuatio modum excedit (vt inquit Paulus capitu. 57. libr. 2.) cohibenda alius est. Verum vbi biliosa, & puracrementa fuerint, non statim admodum adstringentibus medicamentis cohibere oportet, sed in magis salubria ea permutanda sunt, ac contemperanda, iuxta eiusdem Alexan. & Aetii sententiam. * Velut sunt cibi, bonum, atque paulo crassiores succum generantes, cuiusmodi ptisana est, & eius cremor, Pauli auctoritate. Poterit autem ea parari ex torrefacto hordeo probe contuso, seu extenuato, & aquæ pluuiali adiectis mali punici acidi granis, ac oxalidis foliis, aut in iure gallinarum seu pullorum gallinæorum, eisdem quoque adiectis, hordeum sic paratum decoquatur. Biliosus nanque humor cibus lenientibus magis, vt descendat, quam, in corpore retineatur, est sollicitandus, vt inquit Alex. Alias totū morbum grauiorem efficit, & nonnulla alia symptomata gignit, vt ipse refert. Verum ad ta

6. de simpl. fac.
cap. de agaric.
Aduersus Mesuem.

Si ex atrabile
fiat, curatio.

Clysteres.

Vbi diutius perseuerauerit alui
profluuium,

De lacte nota.

les biliosas fluxiones nullum compendiosius remedium reperitur, ut prædictis Alex. & Aetio uisum est, quàm lac bubulum, aut caprillum. Qua de re si febris non urgeat, tepidum, recensque multum, ac potatum magnopere auxiliatur, aut ad ignem decoctum, & assidue agitatum, donec ad tertias sit redactum, similiter etiam, si per filices luuiales ignios, & candentes ferri laminas in ipso extinctas coctum fuerit, potui datum iuuat. Spuma vero dum lac coquitur penna, aut cochleari auferri debet. Hoc uanque nullum præsentius remedium ut Alexand. inquit, ad biliosas fluxiones inuenire licet. Si vero simul cum alui profluuio bilioso, febris quoque urgeat, lac ipsum purum assumptum plus noxæ, quam commodi afferre solet, quare ipsum exhibere vitabimus. Verum si quarta pars aquæ lacti misceatur, coquaturque una, donec dimidium totius consumatur, ipsum exhiberi poterit absque periculo, ut eisdem Aetio, & Alexan. visum est. Sed mox obiiciet quispiam asserens hoc oppugnare Hippo. atque Gale. sententiæ apho 64. lib. 5. quo loco malum esse lac, quibus in febribus acutis biliosæ sunt deiectiones scriptum est, quoniam in nidorem celerrime verteretur. Cui respondebimus nos primo Hippoc. ac Gal. decretum veritatem habere, cum nulla præcesserit corporis euacuatio, sed multa adhuc adsit in corpore bilis copia, & febris acuta sit valida. Nos vero post purgationem ipsum probauimus, ac febre non adeo calida existente. Secundo, & melius, quod cum simul aderunt biliosæ deiectiones, & febris aut lac ipsum non competit, ut Hipp. & Gal. visum est, aut si exhibetur, id affusa aquæ quarta parte, & decoctum (ut diximus) donec dimidium totius consumatur, exhibendum erit, quo modo exhibitum approbarunt Aetius, & Alex. nec Hipp. & Gal. illud negarunt. Etenim vitarunt purum ipsum lac, & non prædicto modo præparatum. Verum adhuc Galen. verba præcitato comp. aph 64. 5. lib. præbent dubitandi ansam. Nam non solum utrisque simul iunctis biliosis scilicet deiectionibus, & acuta febre noxium esse lac, ipse ex intentione Hipp. statuit, sed etiam seorsum in alterutro aduersatur, ut ipse inquit. Qua de re nec si absque febre acuta fuerit alui profluuium,tribuendum esset ex Gal. sententia. Nam in vniuersum, eo auctore celerrime ab omnibus causis calidis in nidorem conuertitur. Nisi esset quod ex iis, quæ diximus primam responsione primi dubii, facile nodus hic dissoluitur, neque enim magna existente syncere bilis copia, nullaque præcedente, aut exigua euacuatione lac probamus. Nec probarunt eo casu Alex. & Aetius, sed eo tempore ipsum exhiberi præcipiunt, quo diutius perseverarint fluxiones biliosæ, adeo ut & habitum veluti colliquent, ac vires consumant, quo tempore lac ipsum euinci, ac mutari, a bilioso excremento, cum exiguum sit, in nidorem non valeat, citiusque distribuitur, cum partes refectione indigeant. Vel dicas ex prædictorum sententia ubi hæsitabis, ne in nidorem conuertatur lac, quod ipsum ad ignem decoctum, aut per fluuiales filices, seu ferri lemnias ignitas paratum, tuto exhiberi poteris; & sic sententiæ Gal. non repugnabit. Tales siquidem lac sic præparatum, non adeo prompte in nidorem vertetur, veluti si purum exhiberetur, & cum hoc quod aluum non subducit, contrarium etiam efficit, eodem Gal. auctore 3. de alim. facult. & 10. de simplic. medic. facult. Quo fit, ut optimum sit remedium dysentericæ, & omnium ventris acrimiarum fluxionum, ut ipse inquit. Et ubi affectio adhuc non cesserit, viresque admodum ex biliosis deiectionibus immodicis imbecillæ redditæ sint, adstringentibus quoque resistere oportet syr. ex citri acido, aut e ribes paratum exhibens, pariter, & myrtinum & eum qui ex infusione rosarum siccarum, ac cydoniorum succo conficitur, & si videbitur, puluerem margaritarum, cornu cerui vsti, & seminum oxalidis, ac plantaginis adicere poteris, eiusdem pulueris assumens scrup. i. vel ii. cum vnc. i. vel vnc. ii. alicuius ex prædictis syr. Nec minus confert, & rola-

3. de alim. facu. cap. 15.

10. de simplic. fac. ca. de lacte.

Quo tempore adstringentibus utendum sit.

Bile redundante.

Que per os exhibenda sint.

& rosaceum saccharum vetustum cum aqua oxalidis, vel plantaginis exhibitum, & ubi hæc non suffecerint, ad trochiscos, de spodio, seu e succino deuenientum erit, seu de terra lemnia. Similiter per ea, quæ per aluum infunduntur auxiliari oportet, ex decocto videlicet plantaginis, rhu obsoniorum, balaustrorum, lypocistidis, ac hordei non decorticati, ac torrefacti, cuius decocti assumpta sufficienti quantitate vnc.ii. vel vnc.iii. olei rosacei omphacini & tantundem sacchari rubei, & vnc.ii. vel vnc.iii. succi plantaginis, aut portulacæ, duosque ouorum vitellos adicias, & vtare. Extrinsicus vero irrigationes adhibeantur ex oleo omphacino, rosaceo, myrteo, seu cytoniorum cum vino, quarta videlicet vni parte ei admixta. Sit autem vinum album, & subastringens. Poteris insuper malicorium, gallas, cupressi pilulas, balaustrum, hypocistim, & reliqua quoque astringentia in ipsa irrigatione incoquere, similiter certatis, vnguentis, emplastris, ac reliquis medicamentis cap. de henteria, & vomitu conscriptis vtare. Ad alias quoque alui fluxiones, ubi sufficiens iam euacuatio fit facta, fluxioq; ipsa adhuc perseueret, adstringentibus etiam medicamentis eis resistere oportet, quomodocunque adhibitis, siue per os sumantur, siue per aluum infundantur, aut extrinsecus imponantur, vt diximus. Quæ de re syr. ex absynthio, e corticibus citri, myrtinum, & eum, qui ex mentha conficitur præbeto, aut diacotoneon cum speciebus, potissimum autem eo medicamento, quod a Gal. 6. de sanit. tuenda ex succo cotoneorum, zinzibere, ac pipere albo, aceto, & melle conficitur, vtare. Minui autem poterit, & piper, & zinziber, prout venter magis, & minus frigida intemperie laborat. Cum prædictis item syr. scrup. i. aut 3. s. infra scripti pulueris exhibe, qui recipit vtriusq; menthæ siccæ 3. ii. cinnamomi, maceris, galangæ, singul. scrup. i. seminis plantaginis, cornu cerui vsti, & seminis oxalidis ana 3. ii. fiat puluis. In quem etiam vsum, si recenti theriaca, aut mithridato vtaris, non parum confert. Nec minus & 3. i. vel scrup. ii. trochiscorum e spodio, seu e terra lemnia, si tribuantur cum iam dictorum syruporum aliquo conducit, mora etiam immatura, & adhuc acerba ad solē pluribus diebus desiccata, deinde trita, & reposita, vsuq; expectente bibita, magnum pharmacum alui restrictiuum fiunt, vt ad diuturnas etiam coeliacas affectiones commode exhibeantur, aliasq; omnes, quæ fluidæ existunt, atque etiam dysenterias, ex Aetii auctoritate. Cōrunduntur quoque eadem mora, & obsoniis admiscuntur, quemadmodum etiam rhus culinari consuevit. Magis tamen aluum cohibent rubi mora immatura, & acerba eodem modo exiccata, & in potu exhibita, vt idem inquit Aetius. Decoctum insuper ex foliis, & corticibus pini, pilulis copressi, fursure, gallis, ac foliorum plantaginis cum oleo myrtino, aut mastichino per annum infundas. Nec minus extrinsecus ex oleo mastichino, myrrino, de absynthio cum tertia, aut quarta vini odorati parte admixta, irrigationes competunt. Similiter ex oleo nardino, aut costino, & si mauis vnguentum, hoc modo parabis, Recipe chix mastiches, corticum thuris ana 3. iii. pulueris menthæ, & cinnamomi ana 3. i. s. olei nardini vnc. s. olei mastichini, & de absynthio, singul. vnc. i. vini odorati, & ceræ quantum satis sit, fiat vnguentum. In oleo quoque nardino, ac de absynthio si vnc. i. s. chix mastiches dissoluas, & in emplastri formam redigas, atque ventri superimponas, magnopere confert. Pariter & emplastrum è gallia, aut id, quod a Galeno describitur primo de art. curat, ad Glauc. Constat autem ex palmulis, vino farina hordei, croco, aloe, ac mastiche. Adhibebis etiam ventri sacculos ex milio, sale, aut panico factos, aut etiam ex fursure, & hordeo torrefacto. Nam hi quoque fluxiones desiccant, ut Alex. uisum est. Nec minus, & ex cumino, & apii semine. Nam & ij urinam quoque cient, cum & hoc etiam tempore conferat ea exhibere quæ urinam ciunt, fluxionesque ad intestina eo diuertunt, ut eisdem Alex. &

Quæ per aluum
infundenda.

Topica.

Pituita aut atra
bile redundante,

Sumenda per os
In fine.

Infusa per aluū

Topica.

Loco citato,

Actio

Si quod ex-
cernitur per alui
profluuium fue-
rit symptomatis
ratione, curatio.

Vicius ratio.

Com. 2. tex. 29.

Com. 116.

Conciliantur
Galeni sententiæ
in diuersis locis.

Cap. citato.

Aetio visum est. Diuersa siquidem pro redundantis humoris diuersitate. Nam quibus supramodum humida aluus deprehenditur, iis potum minorem exhibebimus, ac præterea illi viam ad vesicam parabimus, Galen. teste com. aphor. vltimi 4. libr. Cæterum extremæ corporis partes nempe brachia, & crura, cum deligari debent, tum etiam fricari: nam & hæ quoque alui fluxiones diuertunt. quo etiam tempore & reliquis partibus ad ventrem fluxionem mittentibus, si ita fieri contingat alui profluuium prospiciendum erit, pro vt affectæ partis dispositio exigit. Vbi vero alui profluuium, ortum fuerit natura non per se corpus expurgante, sed propter aliquod irritamentum, aut quia præ multitudine à vasis redundantes non contineantur succi, ita vt quicquid excernatur, symptomatis ratione sit, neque inde vlla proueniat utilitas, immo talis euacuatio prauæ dispositionis sit signum, potissimum si cum febre copulatur, siue simul cum ea inuadens, siue ad eam sequatur, (circa initia tamen) siue ipsum alui profluuium febrem præcedat, & deinceps ipsa consequatur. Tunc neque totum naturæ permittendum erit, nec ipsam iuuare oportet. Quinimo ipsum alui profluuium cohibere necessarium erit, iuxta Hippocr. decretum aphor. 24. lib. Cum dixit in medicationibus talia educere è corpore, qualia sponte proderunt, vtile. Quæ vero contrario modo prodeunt, cohibere oportet. Neque enim in hoc imitari naturam debemus, cum ex eius euacuatione nulla proueniat corpori utilitas. Quæ de re vbi vires, aut ætas non prohibeant, in hoc alui profluuium audacter venæ secanda erit, vt & ipsum alui profluuium cohibeatur, ac qui confluent ad ventrem redundantes succi cum quo non oportet, vergant, reuellantur, ex eiusdem Hippocr. sententia 6. de morb. vulg. cum dixit, reuellere, si quo non oportet vergant: & si ex toto confluant succi, media vena secanda erit. Si ex iocinore, interna dextri cubiti, si ex liene, sinistra. Si ex capite, externa cubiti vena incidatur. Verum non tanta sanguinis copia exhaurienda erit, quantam exigit dispositio, sed minor, & potius, si oportuerit, iterari debet, quàm simul multam sanguinis copiam educere. Et si quispiam obliiceret asserens id aduersari Gal. sententiæ 4. de ratione vict. in morb. acut. cum dicebat, fluente aluo, sanguinem non detrahes. Nam si post detractionem perseverat fluor, virtutem prosternebat. Respondemus nos Gal. verba veritatem habere aluo criticè fluente, & non symptomaticè. Id quod nos etiam cum eo asserimus. Verum si symptomaticè fluxerit, venæ sectionem eum non prohibere, quemadmodum nos admittimus. Quamquam etiam, & de immodica sanguinis missione, immodicoq; alui fluore coctione, vel distributione cessante, etiam orto, ibi loquatur. Id quod ostendunt eius verba, cum dixit. Nam si post detractionem perseveret fluor, virtutem prosternebat. Quo casu neque nos talem consuleremus sanguinis missionem. similiter eiusdem Gal. verba intelligenda sunt, conscripta primo de art. curat. ad Glauc. cum dixit. Quicumque enim ijs (loquens de alui profluuium cum febre) plus adimere fore necessarium putantes, aut sanguinem mittere, aut ventrem mouere tentarunt, in grauiora pericula duxerunt. Neque enim aluo fluente sanguinem mittere oportet, si id quod excernitur, fuerit naturæ ratione, ac exinde iuuetur animal; Velut etiam neque secanda vena erit si alui profluuium adeo modum excefferit, vt vires prosternebat. Vires etenim tunc eam prohibebunt, & eò magis si eadem copiosa fieret. Verum vbi circa initia alui profluuii, præsertim cum febre coniuncti, exactè noueris naturam ex irritamento aliquo, aut ex multitudine grauata, per aluum excernere, neq; exinde utilitas proueniat animali, (vt diximus) venam secabis, iam dictis Hippo. auctoritatibus fretus, ac etiam Gal. commento aphor. 22. 4. lib. cum dixit, quando aliquis incipit morbus, si quid excernitur, nihil tunc excernitur naturæ ratione, sed sunt omnia symptomata earum, quæ præter naturam sunt.

sunt dispositionum. Quo enim in tempore a causis morbum facientibus natura grauat, & adest cruditas humorum, tunc aliquid vtiliter euacuari est impossibile, siquidem oportet coctionem præire, subsequi vero discretionem, & postea euacuationem, ut bona sit crisis. Nec illud ratio, & auctoritas duntaxat affirmant, verum etiam experientia ipsa comprobatur. Nam cum fere annis vinctiquinque in curandis ægris vacuauerim, sæpiusq; mihi talia occurrerint præ manibus alui profluvia, cum venam secari iussissem, semper ægris bene successisse conspeximus, nec unquam quidpiam mali superuenit. Hac item ratione frictionibus, vinculis, ac aliis extremarum partium reuulsionibus salubriter vtendum esse consulo, & vbi iam dictis reuulsionibus tale alui profluvium etiam non cesserit, prædictis quoque tum medicamentis, tum cibis adstringentibus intus, extraq; adhibitis, ac per sedem iniectis vtare. Nam omnino quibusvis modis cohibere tale alui profluvium oportet, cum ex eo nullum animali paretur commodum. Nec illud obliuioni unquam tradas rogo. Nam qui aliter curare tentarunt, nedum in grauiora pericula ægros duxerunt, sed exitii causa fuere. Si vero ob retentricis facultatis imbecillitatem orta fuerit diarrhœa, ea exhibenda sunt medicamenta, quæ ad alias immodicas alui fluxiones approbauimus, intus vel extra, prout requirit intemperies, quæ imbecillitatis causa existit.

περί δυσεντερίας.

torminibus.

id est de dysenteria seu

Cap.

74.

INter intestinorum mala, tormina esse consueuerunt, δυσεντερίαν græci vocant. Celso auctore cap. 15. libr. 4. Idq; nomen ipsum indicat. Nam ex numero eorū affectuum, qui nomen a læsa particula sumpserunt existit ut liquet 2. metho. medend. Intestina etenim a græcis ἐντερά nuncupantur, 2. met. cap. 2. Cælius Aurelianus lib. 4. cap. 6. dicebat à difficultate officii passio nomen accepit dysenteria. Sunt qui difficultatem intestinorum eam appellant. Nos vero quandoque dysenteriam, interim tormina affectum hunc nominabimus. Neque mirum si Celsus, cæterique latini tormina affectum hunc nuncupent. Nanque exulceratione intestina ipsa dolore torquentur in prædicto affectu. Verum in præsentiarum nomen dysenterię proprie audire oportet, Vtpote quod ex appellatione ipsa, intestinorum vlcus significatur, ut liquet apud. Gal. 6. de loc. aff. Nam quamuis tum recentiores medici, tum antiquorum non pauci hanc solam dysenteriam nuncupant, ut idem Galen. testatur 2. lib. de loc. aff. eorum tamen nonnulli non solum hanc, sed aliam quoque, quæ cruenta ob excretorum speciem nominatur, dysenteriam appellant, ut ipse inquit. Inter quos Hippoc. est, qui lib. 4. de articulis, vocabulo dysenterię vsus est, non pro vlceratione intestinorum, sed pro cruenta ex intestinis proluie, ut Gale. testatur in expositione eorundem verborum Hippocratis. Sunt etenim sanguinolentæ excretionis (in vniuersum) differentię quatuor prout idem Gale. scriptum reliquit 3. de caus. symp. quatuor succedentes affectibus; Vna quidem ipsius sanguinis (in iis quibus aliquis artuum est abscissus, vel qui exercitationem dimiserunt) per circuitum repetens, & hæc quoque solet inulieribus, retentis menstruis, accidere, ut apud eundem Gale. liquet 5. de loc. affe. Altera, cum ex imbecillitate iocinoris aquosus sanguis deiecitur, quem vtrique loturæ carnis similem dicunt. Tertia est, cum melancholici, splendentisque sanguinis deiectio fit. Quarta, & vltima est, cum & minutim, & ex quo tempore expulsio facta visitur, aliàs quidem veri sanguinis, aliàs concreti, in hac & puris non raro exiguum aliquid excernitur, etiam vlcerum crustule, quæ græce ἐφελκιδες dicuntur. Præterea membranosa quedam corpora

6. de loc. affect. ca. 2. circa principium.

2. de loc. affect. cap. 5. in fine. 5. de articulis, tex. 40.

Sanguinolentæ excretionis differentiæ quatuor.

Prima.

3. de caus. symp.

Cap. 1.

5. de loc. affect. Cap. 7.

Secunda.

Tertia.

Quarta.

De qua sermo
habebitur.

3. de caus. symp.
cap. 2.

3. de caus. symp.
cap. 2.

2. de loc. affect.
cap. 5.

6. de loc. affect.
cap. 2.

3. de art. com.
40.

Dysenteria pro-
pria dicta quid
sit.

1. de loc. affect.
cap. 2. in fine

1. de loc. affect.
loco citato.

Soluitur contra
dictio in dictis

Galenī de dys-
teria,

6. de loc. affect.
cap. 2.

Tres gradus dy-
senterie pro-
priae dictae.

Pars affecta in
dysenteria pro-
pria dicta.

Loco citato.

Num crassa, aut
tenuia intestina
fuerint affecta,
signa distincti-
na.

pora, quæ intestinorum sunt particule. Sed & stercus super his collectum sæpenumero excernitur, sanguinis in se guttas habens. De qua nos duntaxat pertractare intendimus, cum ipsa proprie dysenteriae nomine appellari mereatur. Immo nonnulli solam ipsam dysenteriam nominandam esse censent, ut apud Gal. liquet, nedum in præcitis locis, sed etiam 3. de caus. sym. & apud Alexan. cap. 7. lib. 8. De reliquis vero tribus iam dictis cruentis excretionibus pertractare fusius distulimus, cum de iocinoris affectibus verba faciemus. Hæc autem nihil aliud est, quam eorundem intestinorum exulceratio, ut eodem 3. de caus. symp. 2. & 6. de loc. affect. apud Gal. liquet, & 4. de articul. ac sexcentis aliis in locis. Cælius Aurelianus eam dixit esse intestinorum rheumatismum cum ulceratione. Ab Aetio vero capitu. 43. lib. 9. sic describitur. Dysenteria proprie exulceratio est intestinorum serpendo depascens. Nam siue dysenteria ipsa adhuc fiat, utpote mordaci humore intestina abradente, atque abstergente, (quamuis id quod factum est non dum videatur) siue facta, atque constructa sit, semper intestina ipsa exulcerata esse dicimus, ac affectum ipsum dysenteriam nuncupabimus, ut apud eundem Gale. liquet, cum primo de loc. affect. tum etiam com. aph. 24. & 26. 4. lib. Et si libro primo de loc. affect. cum mordax humor ab initio intestina abstergit, atque abradit, priusquam ea exulceret, fateatur affectum ipsum nondum dysenteriam dicit, tamen eodem libro paucis interpositis verbis, dispositionem hanc sub dysenteriae specie comprehendere asserit. Id quod etiam confirmavit com. præciti aph. 24. & 26. 4. lib. Et ne videatur pugnantia asserere, ambiguitas facile soluitur iis, quæ paulo ante diximus, ex eius decretis in præcitis locis. Nam cum primum ex mordaci succo abstergentur, ac ut ita dixerim, abraduntur intestina, ante quam vlcus in eis induxerit, quoniam id, quod factum est, fere non sentitur, tamen dysenteria est, & appellatur, nondum tamen facta, atque constructa, sed quæ adhuc fit, & propterea tum Gal. in expositione prædictorum aph. ac etiam 6. de loc. affect. tum etiam Aetius, tres posuerunt dysenteriae gradus, siue differentias, quorum vnus gradus est, cum quædam corpora pinguia excernuntur. Post hæc ubi ramenta quædam intestinorum abrasa eorum superficie interiori, quæ membranosa existit, succedit. Et tertia differentia cum aliquid ex ipsa abraditur substantia intestinorum, quo tempore non adhuc fieri dysenteriam, sed iam factam, atque constructam esse dicimus, ut ipse Gal. inquit. Quod verò in hoc affectu intestina oblata sint communi consensu græci omnes, & latini fatentur. Poterit etiam id patere ex dolore cum posito, atque ex ipsis excrementis, simulatq; impedita ipsorum intestinorum functione, distributione inquam. Verum nunquid in superioribus intestinis, ac tenuioribus, vel in humilioribus, ac crassioribus vlcus consistat, cum non mediocriter ad eius curationem hoc nosse conducatur, isto modo discernas. Nam ubi abrasiones solæ excernuntur, considerandum est, ut idem Gal. inquit præcitato lib. 6. de loc. affect. num pingue quidpiam simul cum ipsis deiciatur. Quoniam si ita euenerit, in crassis intestinis vlcus consistere credendum est. Si vero cruor excernatur intueri oportet, Vtrum is reliquis excrementis ita sit admixtus, ut vniversus misceatur vniversis, an pars eius aliqua reliquis supernatet. Etenim si admixtus est, in superioribus si vero supernatet, in humilioribus intestinis vlcus esse portendit. Verum ubi neque deiectiones iis, quæ ab vlcere emanant admodum permixtæ, neque omnino discretæ apparent, coniciendum est in mediis potius intestinis affectum existere, Tralliano auctore lib. 8. cap. 7. Id quod etiam in abrasis excrementis videre est, licet non ita manifeste, ut in cruore. Similis quoque ratio est de crustulis. Nam & ipsæ quodnam intestinum fuerit oblesum, declarant, tum ab essentia propria, tum etiam modo, quo vel commisceri reli-
quis

quis excrementis, vel vni eorum parti supernatare videantur. Etenim si latitudine, & crassitudine fuerint multò maiores, quam tenuia intestina exiguerent, vlcerationem in crassis intestinis consistere indicant, vt patet eodem primo de loc. affect. Aetius vero cum circa intestina crassa vlcera contingit, stercora ait, quæ egeruntur, multa esse, & coaceruata cum flatibus, & aliquando etiam spumosa, pingua quoque cruenta excrementis admixta apparent, inexplibilisque edendi appetitus oboritur. Tenuibus autem intestinis vlcera tunc dolores circa vmbilicum consistunt, biliosaq; & porri colorem habentia, atque omnino, variegata, stercore commixta plurimum excernuntur, citra tamen ramentorum complexum cum torminibus, & mordacitate, desperatio neque, ac exolutione, vt nõ procul ab animi deliquio ægri absint. a sitique infestantur, & febricitant, stercus quoque crudius ab eis prodit, & si ieiunum in testinum exulceratus sit, (quod raro accidit) egestionem crudiores apparent, nigriorem sanguinem vehementer implicatum habentes, bilemque abunde flauam, sitis multa, itemque nausea affligunt. Vomunt etiam aliquando, ac cibos auersantur, dolor vehemens supra vmbilicum confidet, & quandoque febres malignæ oriuntur, fiuntque ita affecti decolores, & ad animi deliquium vsque sudant. Vires etiam ipsorum cito deficiunt, neque procul ab interitu absunt, rosione etiam infestante non statim, sed post aliquod tempus eger ad excernendum vrgetur, vt inquit Alex. & (vt summatim dicam) ex rasura ipsa, & exitus tempore, & ex mitione cum stercore, vtrum in crassis, an in tenuibus intestinis vlcus sit, coniciendum erit, Galen. teste eodem primo de loc. affect. Affectus hic in quacunque intestinorum parte oboritur, semper morbus est in soluta continuitate, vt ex eius descriptione liquet, facileque ex eius indiciis deprehendi potest, vt Gal. testatur cum 6. de loc. affect. tum etiam 12. meth. med. quo loco, cum pleuritidis, tum etiam dysenterię agnitionem scientificam esse certis videlicet definitisq; notis comparatam, & non coniecturalem inquit. Verum prius ea discernenda erit ab iis, quæ ab hepate profluunt cruentis, iam dictis dysenterijs. Nam in hepaticis excretionibus nihil abrasum expellitur, atque interdum duorum, aut trium dierum interuallo supprimitur euacuatio, deinde rursus redit malum, excernunturq; excrementa prioribus multo peiora. Id vero per intestinorum vlcera haudquaquam apparet, quoniam in iis, neque assatim, neq; ex longis temporum interuallis laborantes deicere consueuerunt, eodem Galen. teste libr. 6. de loc. affect. Ab hepate item ab initio tenuis sanguinis sanies deicitur, deinde aucto malo crassus humor facibus vini haud ablimilis, vt idem Gal. inquit. Ex iis itaque interstingues dysenteriam hanc proprie dictam ab iis, quæ ab hepate procedunt. Quarum distinctam dignotionem, cum de iocinoris affectibus verba fient, concribemus. Reliquum est modo ipsius dysenterię notas cõscribere tum vniuersalis, tum etiam particularis cuiuslibet dictarum trium differentiarum. Primum etenim commune cuiuslibet dysenterię signum est, quod semper etiam procedunt mordaces quædam intestinorum dolores, vt liquet 2. de loc. affect. cum & ipsa a mordaci (vt dicemus) humore intestinum erodente, fieri solet, protinus etiam ab ipsius initio & ipse mordax humor excernitur, quem deinde interaneorum abrasiones sequuntur, postea parum cruoris simul excerni videtur, vt 6. de loc. affect. scriptum est, minutim, & exiguo tempore alias veri sanguinis, alias concreti, eodem Galen. teste 3. de caus. sympt. Non raro etiam & puris exiguum aliquod excernitur, & vlcera crustulæ græce *σπερμίδες* dicuntur. Præterea & membranosa quædam corpora, quæ intestinorum sunt particulæ, sed & stercus super iis collectum sæpenumero excernitur sanguinis in se guttas habens, vt ipse inquit, vt autem Celso visum est, quoniam in dysenteria intus intestina exulcerantur, ex iis cruor man-

1. de loc. affect.
cap. 1.

1. de loc. affect.
cap. 4.

Quis affectus
præter teturam
sit dysenteria
proprie dicta.

6. de loc. affect.
cap. 2.

12. meth. cap. 7.
Quibus differat
ab hepaticis
cruentis deiectionibus

6. de loc. affect.
loco citato.

Proprie dysenterię, notæ.

Cap. 5. circa finem.

Citato loco.

Cap. 2.

Ante medium
libri,

Tres gradus dy
senteriae pro-
prie dicte quo
modo distin-
guantur,

Lib. 3, cap. 42.

Causae.

Externae.
Internae.

Prognostica.

Cap. 2.

nat, vt ipse refert, modo cum stercore aliquo semper liquido, modo cum quibusdam, quasi mucosis excernitur, interdum simul quaedam carnosae descēdunt; frequens deiciendi cupiditas, dolorque in ano est, cum eodem dolore exiguum aliquid demittitur. Atque eo quoque tormentum intenditur idque post tempus aliquod leuatur, exiguaq; requies est, somnus interpellatur, febriculaq; oritur. Hippo. vero lib. de affec. ait, quod in dysenteria dolor adest per totum ventrem, & tormina, & egerit bilem, ac pituitam, & sanguinem combustum. Hisce itaque notis tormina discernes: Eius vero gradus, quos tres esse animaduertimus, sic distingues. Primum etenim egestio malum auspicabitur (vt Aetius fatetur) cum rugitibus subpinguibus ac biliosis, pinguedine nimirum, quae intrinsecus intestinis, adhæret paulatim circum liquefacta, & quibusdam quidem cum torminibus, quibusdam absque iis excretionibus contingunt Breuib; autem verbis Gal. com. citati apho. 26. 4. lib. dicebat quod cum dysenteria adhuc constituitur, quaedam corpora pingua primum excernuntur, posthæc nisi finire anticipauerint, quaedam ramenta ipsorum intestinorum, abrasa eorum superficie interiore, quae membranosa existit, & densa: hæc secundum dysenteriae gradum significabunt, licet adhuc etiam fientem dysenteriam hanc nominabimus. Hoc quoque tempore simul cum ipsis abrasionibus cruor simul excerni videbitur. At vbi altius exulceratio penetrauerit, ac aliquid ex ipsa substantia intestinorum abraditur, adeo, magnæ intestinorum partes excernuntur, vt possimus eas carnes nominare, quo tempore non adhuc fieri dysenteriam, sed iam factam, atque constructam esse dicimus, atque hic tertius est dysenteriae gradus. Aetius vero asserit hoc tempore sordes pelliculas admixtas habentes expelluntur, & si non celeriter cohibeatur, compendio vicinos locos depascitur. Saniosa vero quaedam excernuntur, qualia ab occisorum corporibus defluere consueuerunt. Id etiam confirmauit Paulus cum dixit, excernuntur primum biliosa varia, de inde subcruenta, postremo saniei similia, cuiusmodi a mortuorum cadaueribus solent profluere. Oritur autem dysenteria interdum ab externis causis, interim vero ab internis. Externis quidem, vt a nimio frigore, ardore, venenatorum pharmacorum potu peregrinorumque, & acrium ciborum acceptio-
ne. Iam etiam & a cruditatibus, & quæ iis similia existunt, quorum singula absque labore, vel astantium relatione percipies. At internæ causæ cuncti humores acres, atque mordaces esse poterunt, siue a toto, siue ab aliqua corporis parte ad intestina confluant. Siue in ipsis fuerint geniti. Hi vero sunt aut flaua bilis, a qua magna ex parte incipit dysenteria, vt liquet com. apho. 24. 4. lib. aut atra, vt ibidem apud Hippoc. & Gale. legitur, vel etiam ipsa falsa pituita, eodem Gal. teste com. aph. 13. 3. lib. verum quisnam eorum dysenteriam efficiat; Distingues ex qualitate eorum, quæ excernuntur, simul cum ætate, ac temperamento ægrotantis, tempore anni, vita antea facta, ac reliquis similibus. Quod vero plerosque dysentericos tenemus præcedere solet, apud Aetium, & Paulum, atque Alex. præcitatis locis liquet. Poterit quoque ex inflammatione dysenteria fieri, quam ex eiusdem inflammationis signis facile percipies. At quantum ad prognostica spectat, Dysenteria, quæ adhuc fit mordaci humore abradente, ac abstergente intestina, ita vt quaedam corpora pingua duntaxat excernantur, facile curari poterit ablata causa ipsam faciente, Natura videlicet ipsam sanante etiam absque externo auxilio velut reliquos similes consuevit exiguos affectus sanare, Galen. auctoritate primo de loc. affect. Verum vbi iam facta est, atque constructa, ita vt veluti carūculæ, hoc est magnæ intestinorum partes excernantur, lætalis siquidem est talis dysenteria, ex eiusdem Gale. atque Hipp. sententia apho. 26. 4. lib. Nam vt inquit Gale. neque caro concrefcere, neque cicatrix obduci in tali potest exulceratione

ceratione. At si in disenteria non adeo magnæ intestinorum partes excernantur, nec corpora duntaxat pingua, sed veluti ramenta quædam ipsorum intestinorum, eorum superficie interiore abrafa, quæ membranosa existit, & densa, epidermidi, quæ extimam cutis corporis ambit similis, nec adeo promptè curabitur, vt ea de qua primò mentionem fecimus. Nec adeo egrè, vel lætalis erit, sicuti ea, in qua veluti carunculæ deiciuntur, cum media quodam modo existat inter vnā, & reliquam, vt ex Galen. verbis elicitur præcitato com. aph. 26. 4. libr. In longis quoque disenteriis cibus fastidium malum esse signum inquit Hippoc. aphor. 3. 6. lib. & cum febre peius. Graues quoque sunt disenteria, quæ cum vehemēti inflammatione oboriuntur, quæque cum febris, ac deperditione appetitus, vt inquit Aetius. Pessimæ vero sunt, in quibus quæ excernuntur, porri aspectum habent, suntque nigra plurima, varia, graueolentia, & quæ vna cum excrementis sordes pelliculis magnis commixtas excernuntur. Mulieres item, quam viri senes, & pueri, quam iuuenes, & in status vigore consistentes difficilius curam accipiunt, vt idem Aetius refert. Cæterum in intestino recto atque colo consistens dysenteria facile curabilis existit. Que vero in tenuibus intestinis, difficulter curatur maxime verò in ieiunio, ex eiusdem Aetii decreto. Verum vbi longo tempore id malum inueterauerit, aut tollit hominem, vt Celsus refert, aut etiam si finitur, excruciat. Orta autem dysenteria à flaua bile sæpe curari poterit, quemadmodum si ab atra bile fiat insanabilis omnino existit, cum nihil differat à cancro ulcerato, Gal. teste com. aph. 24. 4. libr. in quo apho. dysenteriam, si ab atra bile inceperit, lætalem esse decretum reliquit Hippoc. Idem confirmauit Aetius, hanc Hipp. & Gal. sententiam dilucidius scribens, cum dixit, si igitur ab acribus cibus, aut à flaua bile dysenteria oboriatur, ferè in totum ipsam curamus. Si verò ab atra bile initum sumat, si quidem ratione iudicationis febrilium morborum atra bilis excernatur, transituque suo intestinum distendat, etiam hanc curare non desperamus. Si verò sua sponte nullo præcedente febrili morbo, neque concoctione bona apparente, atra bilis excernatur, immedicabilis dysenteria ex ea oborta existit nihilque à cancro exulcerato differt, estque omnino lætalis. Nanque morbis quibuscumque incipientibus, si atra bilis, vel superne, vel inferne exierit, lætale est inquit Hippo. apho. 22. 4. libr. et si lib. de atra bile Galen. velit semper exactæ bilis atræ humorem lætaliter excerni, experientia id comprobans in illa pestilentia prolixiore æstate orta, in qua, qui puram, exactamque atram bilem deiecerunt, omnes periire. Non propterea ibi ipsi commento præcitati apho. 22. 4. lib. nec Aetio pugnari. Nam vbi exacta fuerit atra bilis absque signis coctionis, semper lætaliter excernitur, ac exitialis casus est, præcedentibus autem coctionis signis, vbi ea excernatur, neque pura, neque exacta atra bilis erit, sed bonam significabit euacuationem, cum à natura corpus expurgetur, vt idem Gal. inquit præcitato aph. Quinimo à qualibet deiectione syncera hoc, est impermixta aquosæ humiditati, siue humor, qui eiicitur flaua sit bilis, siue atra dysenteria, malum est, vt inquit aph. 23. 7. lib. Lienosis etiam superueniens dysenteria bonum inquit Hippocr. apho. 48. 6. lib. quando humores crassi, ac melancholici qui lieni erant infarcti, trasponuntur, ac euacuantur. Neque hæc sententia aduersatur aphor. 24. 4. lib. Nam ibi de atra bile, hic de succo melancholico loquitur, ex quo etiam dysenteria oriri potest. Quod si eadem immoderata, ac diuturnior fiat, malum est, vt liquet apho. 43. eiusdem lib. 6. At vbi à pituita salsa longiori tempore mordente, atque abradente intestina, orta fuerit dysenteria, crudelissima ea existit, eodem Gale. auctore com. apho. 12. 3. lib. & propterea periculosior, quam si fiat ex bilioso humore. Nam biliosus humor transeundo affligit. Hic autem cum sit lētus moram trahit, & sua cunctatione

Conciliantur,
Gale. sententiæ
diuersæ de atra
bile.
Lib. de atra bi-
le, cap. 3. & 4.

amplius exulcerat, suoque lentore, & transitu per intestina inheret, ac tardans
 semper aliquid deterit, ut idem Gal. inquit. Non autem ita exitialis erit, ut
 ea, quæ ex atra bile oritur. Dysentericus (inquit Soranus ephesus) si post
 autem sinistram papula in modum orobi innata fuerit, cum siti admodum
 frequenti, uigesimo die morietur. Ceterum pro dysenterię curatione aer
 primo ad siccum porrò vergens eligendus erit, in actiuis tamen temperatus,
 aut modice ad calidum, vel frigidum declinans, pro ut diuersa exigit causa, a
 qua dysenteria oritur. Quies quoque præcipienda erit, ac motus omnino
 uitandus, oportet etenim imprimis conquiescere, ut inquit Celsus, siquidem
 omnis agitatio exulcerat, & Aetius principium curationis dysentericorum à
 quiete, & modico cibo fieri dixit. Somnus item procurandus, vitandæque
 vigiliæ sunt, cum optimum remedium dysentericis somnus sit, eodem Aetio
 auctore. Si alui excrementa præter naturam detineantur, nulli in dubium
 venit ea ex cerni debere per ea, quæ per aluum infunduntur, & hoc est per
 lenes clysteres, cum ab eorum retentione non parum intestinorum exulce-
 ratio augeatur. Similiter vitandi sunt omnes immodici animi affectus. Quod
 ad cibum attinet, circa initia tenui victu, ac modico cibo utendum est, ete-
 nim dysentericus propter intestinorum, & ventris imbecillitatem, ut Alex.
 inquit, haud multum potest concoquere, præsertim cum febricitat, quamuis
 quantum exhiberi debeat. ex ægri viribus maximè existimandum sit. Qua
 de re, cibi qui non multum nutrant, nec tardè concoquantur exhibendi, quan-
 titateque (ut diximus) modica, & si vires permiserint, primis saltem duobus
 diebus abstinentiam indicimus, eodem Alexan. auctore. Nam ijs tenuissimo
 victu opus est, Gal. decreto lib. 4. de artic. præsertim vbi, & iocinoris quoque
 adsit imbecillitas, ac plenitudinis affectio. Tribus autem diebus exactis. Lac
 propinamus, præsertim vbi febris permiscerit, commune Alex. & Aetii senten-
 tia, est nanque id temperatus eibus cum hoc quod depurgat, simulque ea, quæ
 in corpore sunt, contemperat, & postremo aluum sistit, ut Aetio visum est,
 & (ut summam dicam) ex Galen. sententia 10. de simplic. medic. facult. ac 3.
 de aliment. facult. optimum est remedium dysenterię, & omnium ventris
 acrium fluxionum, præsertim vbi aliamquampiam desiccantem facultatem
 habuerit adiunctam, eam (ut ipse inquit) à lapidibus, qui prædecocto ipsi ini-
 ciuntur igniti, accipit. eò usque autem lac decoqui debet, dum pleraque sero-
 si in eo humoris absumpta pars fuerit. Nec minus, si ferreos in ipsum clyn-
 dros candentes inicias, eandem, aut etiam facultatem meliorem lacti adicies
 Nam ferrum astringentis quoque facultatis est particeps. Facile tamen lac sic
 paratum in ventriculo in casum cogitur, ut idem Galen. testatur præcitato
 lib. 3. de aliment. facult. ob id mel illi admiscemus, quin & aquam etiam, præ-
 sertim pluuialem, ut plerique medicorum facilius affundere securius fu-
 erit, quartæ nimirum lactis parti affusam. Deinde cum paululum fuerit
 decoctum exhibeatur, Nam & citra noxam etiam febricitantibus tale lac
 exhiberi poterit, Alex. teste, Verum si huic lacti sic præparato parum sterco-
 ris canis sola ossa per duos dies comedentis, desiccati, ac in puluerem redacti
 permisceas, mirabile etiam dysenterię medicamentum, à Galen. expertum
 (ut liquet eodem 10. de simplic. medic. facult.) existit. Procedente verò tem-
 pore, prædictum lac poterit ad dimidium decoqui, & deinde etiam ad ter-
 tiam (ut Aetius inquit.) Quouis autem morbi tempore lac caprillum eligi
 debet, & huius penuria vaccinum, ut eidem Alex. visum est. Nec propterea
 Gal. ac Hippoc. sententiæ pugnabis apho. 84. 5. lib. ut præcedenti cap. de diar-
 rhœa differuimus. A lactis acceptione, panem madefactum offerri oportet,
 ut idem Aetius inquit. Præbebunt etiam, nedum nutrimentum, sed medi-
 camentum optimum, pulles ex lacte, apparatus veluti oryza, amyllum, simi-
 lago,

Curatio.

Videtur ratio.

Aet. l. 9. cap. 45.

Loco citato.

4. de articul.
com. 40.
De lacte nota.10. de simplic.
fac. ca. de lacte.
3. de alim. fac.
Cap. 15.

Cap. 15.

Cap. de lacte.

lago, aut ipsa etiam pitifana torrefacta cum aqua pluuiâ parata, similiter & oua lacti commista. Poterunt etiam & ex milio, ac panico prædictæ pulres cum lacte parari, aut ex ficcis, & contritis panibus, & vbi adhuc fluxus perseverauerit, ea, quæ astringunt, ac aluum sistunt pultribus admiscere oportet, Veluti sunt mali punici acidi grana, mala cytonia, sorba, præsertim succa, aut pyra, mespila, corna, seu hi fructus, quos amarenas, quosque azarolos vulgus appellat. Præstabit item prædictorum aliquod in aqua, vnde pulres fiunt decoquere: Sit autem ea pluuiâ, vel in gallinarum, seu gallinaceorum pullo- rum iure prædictæ pulres fiant, & pariter aliquod prædictorum astringentiũ adsmiscebis, præsertim vbi quomodolibet paratum lac, in acidam, vel nidoro- sam qualitatem eis commutetur. Nec minus oxalis, plantago, portulaca, cy- chorium, intubus satiuâ, aut etiam brassica, quandoque, modo fuerit biscu- sta, in iam dicto iure decoqui poterit: & quanuis olera non valde probentur in dysenteria, prædicta tamen modice degustare poterunt, Aetio, & Alex. te- stibus. Danda sunt insuper ouorum assatorum lutea, modo in aceto per ali- quod spatium fuerint præmacerata. Carnes autem, eo quod multum nutriũt, & tarde concoquantur, dysentericis non valde commode existunt, vt eisdem Aetio, & Alex. visum est. Tamen eis, qui diuturno malo vexantur, dandæ sunt, maxime vero volucrum eligendæ primo, deinceps syluestrium ferarum, pro- inde turdi, perdices, turtures, merule, gregalium columbarum pulli, starnæ. phasiani, ac similes exhiberi poterunt, ebulliant autem primum in posca myr- ti baccis cum eis incoctis, vt idem Aetius fatetur, & deinde assentur. Præsta- bit etiam si ipsis euisceratis iniiciantur myrthi bacce, sorba sicca, corna, me- spila, pyra astringentia, aut mala cotonea, deinceps consuantur, & assentur. Nec minus si elixentur, & eadem astringentia cum eisdem carnibus decoqui possunt, parumq; oxalidis, intybi, aut plantaginis adiiciendum, fiatq; elixa- tio in pluuiâ aqua, & vbi vires imbecilliores fuerint, prædictorum auium carnibus contusum, aut ius, quod consumatum appellant, parari poterit pau- co omphacio, & stillatitia aqua rosacea, myrrhina, aut oxalidis adiecti; Id quod etiam fieri poterit ex caponum, gallinarum, aut gallinaceorum pullo- rum carnibus. Nec minus proderit, si eisdem assatis modo, quo diximus, ac demum fortiter expressis, qui prouenit succus dysentericis exhibeatur. Ex pe- destribus vero interdum carnes exhiberi poterunt leporum, capreolorum, ac hædorum prius in posca decoctis, & deinde similiter assatis. Fructus quoque astringentes gustare poterunt, quamuis parce eis vtendum sit, veluti sorba, corna, mespila, mala cotonea, ac virida pyra cocta, Nec non & malum puni- cum, præsertim austerum, aut acidum, cum eis tamen panis mandi debet, co- quod facile (vt inquit Alex.) corrumpantur. Nec minus & amarenis, ac aza- rolis dictis vti poterunt. Pro potu a principio aqua pluuiâ vtendum est, ex Pauli, & Aetii decreto, & si ea haberi nequit, fontana vtendum, in qua præ- dicti astringentis fructus fuerint decocti, præsertim rhus obsoniorum, aut oxalis, vel plantago. Postea uero, vbi vires fuerint deiectæ, aut stomachus laborauerit, vinum quoque propinandum est, ex eorundem sententia: Sit au- tem astringens, & non valde vetustum, ac pluuiâ aqua dilutum, seu fontana, in qua oxalidis, plantaginisve folia fuerint decocta. Cæterum vbi ad exulce- rata intestina adhuc a toto, aut ab aliis corporis partibus vitiosus succus con- fluxit, priusquam vlceri succurratur, fluxionem ipsam auertere studebimus, ac eum, qui redundat succum vacuare, & si auersio hæc non sit vlceris, quate- nus vlceris est, curatio, ex Galeni decreto 4. method. medend. quanquam illud quoque excerpserit, vt ipsemet fatetur ex Hippocr. doctrina, illudque præser- tim seruandum erit, vbi non vtilia ab ipsa natura sponte ferantur, seu critice euacuantur, sed symptomatice. Qua de re qualiscunque fuerit vitiosus suc-

Medicamento-
rum ratio.
Cap. 5, & 6.

Vene sectio.

Quibus ab ini-
tio vena secāda
fit concluditur.

Loco citato.

cus, qui ad intestina cum sanguine confluit, ipsa exulcerans, siue à toto, siue ab aliqua confluat parte, modo critica non fiat expulsio, viribus ac aliis consentientibus, venæ sectio in brachio adhibenda erit præsertim circa primos morbi dies, & si febris adsit, ac totius corporis plenitudo, tutius sanguis mittendus erit, ex Alex. sententia ca. 6. lib. 8. Id quod etiam confirmavit. ca. 7. eiusdem lib. Verum dicta venæ sectio paulatim administrari debet, ut ipse inquit. Ita ut neque vniuersum, neque copiosum educatur, ne ægri vires imbecilliores hinc reddantur. Aetius quoque cap. 45. lib. 9. ubi sanguinis impetus vehementer in dysenteria urgeat, aut etiam, si maxima subest inflammatio, præsertim in iis, qui plurimo sanguine abundant, venam incidendam esse præcipit, si vires non resistant, & maxime in quibus consueta sanguinis excretio cohibetur. Auferre autem sanguinem oportet (ut idemmet Aetius testatur) neque multum, neque coaceruatim, quemadmodum præcipiebat Alexand. Nam ab utroque venter conturbatur, quanquam ipse Aetius in dextro cubito venam humeralem appellatam secare iussit, cum non similiter vena hac incisa, vires labefactentur, ut ipse inquit, & insensibiliter quodammodo, furtimq; sanguis auferatur. Quod si hæc non appareat, necessario media secanda erit. Cæterum fissura omnino tenuis esse debet. Nam non ob multitudinem sanguinis vacuandam sectionem facimus, sed ut materiam quasi per riuos transferamus ut ipse refert. Paucus autem sanguis etiam multo tempore missus inflammationem mitigat, & sanguinis ad intestina confluxum reuellit, innatumque calorem sensim refrigerans, somnum magis, quam animi deliquium inducit: Est quippe optimum remedium dysentericis somnus: At si male admodum affecto iocinore fluxu bili admixtus sanguis ab eo ad intestina deferatur, ita ut strigmenta quoque intestinorum deliciantur, summa intestinorum tunica humoris acrimonia derafa, quisnam verebitur internam in dextro cubito uenam secare? nedum reuulsionis gratia, verum etiam ipsiusmet iocinoris alterationis: Cum plerique medici in hoc casu, qui solam intestinorum exulcerationem, neglecto iocinore curare consueverunt, in causa sunt, ut ægri moriantur ex Galeni sententia lib. 4. de artic. Rursus ubi uehementissimus intestinae rit dolor, propter rodentium humorum acrimoniam ad intestina a toto, seu ab aliqua corporis parte confluentium, & propterea verenda sit phlegmonis generatio, aut virium defectus, cui absonum uidebitur venam secari debere? cum & idem Galenus in maximis doloribus nullum maius inuenerit remedium, quam usque ad animi defectum venam secare, aut purgare, ut patet comment. aphor. 23. primi lib. Quanquam nos venam secandam dicimus, ubi cuncta eam admiserint, nec usque ad animi defectum, sed paulatim, ac sensim, ne vires imbecilliores reddantur, ipsam probamus, prout Aetius, & Alexand. probarunt. Valeant itaque barbaram sectantes medicinam, ac thessalici nostri temporis medici, qui nunquam pro dysenteriae curatione venæ sectionem admittunt, nec admittendam esse censent nulla auctoritate, ac ratione fulciti nisi quod sic longo tempore in egrorum necem male obseruarunt. Nam viribus, ætate, ac aliis consentientibus circa initia, reuulsionis gratia, ubi magna adsit humorum copia potissimum, aut sanguinis impetus uehementer urgeat seu maxima adsit inflammatio, aut dolor vehemens, siue iecur fuerit, modo quo diximus male affectum, semper exordienda curatio erit à iam dicta venæ sectione. Id quod longa experientia, & diebus non longe elapsis etiam comprobauimus. Nam cum duo magnifici Ioannis Ferdinandi Rocchi filii dysenteria affecti essent eodem tempore, ac ex simili causa, quāquam unus per tres, aut quatuor dies prius in dysenteriam incidisset, is (quoniam a præcedente medico non fuit sanguis ei missus, quamuis alia fuissent debita adhibita medicamenta) tandem interiit, Alteri uero, cui nos fuimus accersiti, licet grauior

uior fuisse in eo ortu dysenteria, vires, ac ætas, & habitus imbecilles, non tamen adeo, ut sanguinis missionem prohiberent, priori medico inuito me præcipiente fuit sanguis missus. sanguine missio, statim melius se habuit, ac deinceps debitis aliis medicamentis adhibitis, liber euasit, vixit, & adhuc viuere. Ei tamen (quoniam ætas reluctabatur, cum nōdum vndecimum ageret annū) non fuit vena secta, sed hirudines in cubito adhibitæ (id quod seruandum esse censemus in cunctis infra decimum quartum annum). Nam licet eis sanguis mittendus sit, si ea adsint, quæ supra notauimus, tamen iis non per venæ sectionem, sed per hirudines, aut cucurbitulas, extrahi debet. Nonnullos etiā alios, dysentericos a venæ sectione liberatos & nos vidimus, & qui mecum affuerunt, a seclæ testes sunt, quemadmodum etiam Deum testor me veritatem fateri, & firmiter tenere, quod liberatus fuisset quondam excellens Don Gutterius de Cardines filius Don Leonardi, si ei iterata fuisset venæ sectio. Is nanque ætate adolescens, cum ex malo affecto iocinore, ex confluente bilioso sanguine ab eo ad intestina, in grauissimam incidisset dysenteriam, cum vehementissimo intestinorum dolore, seu potius inflammatione, ac febre fuit a me acersito ei vena secta interna dextri cubiti, duæque vel tres ad summum extractæ sanguinis vnciæ secunda ægritudinis die, & cum adhuc dysenteria perseuerasset, & dolor, & febris valida, iterum venam secare mihi visum fuit, viribus iam consentientibus. Verum altero superueniente medico barbaram sectante medicinam, ac Brasistræo circa venæ sectionem existente penitus assentiri noluit, quinimo nec auctoritatibus, nec rationibus conquiescens, primam quoque venæ sectionem condemnauit, potissimum cum reliquis adhibitis medicamentis astringentibus, resiccantibus, ac mordacitatē obtundentibus infra decimum quartum inualescente semper dysenteria, dolore ac febre morte præuentus fuerit. Hic ex numero fuit eorum, qui à Gal. damnantur lib. 4. de articul. Nam neglecto iocinori solam intestinorum exulcerationem curare tentabat, & propterea causa fuit ut eger moreretur, adeo ut de eius morte coram Deo rationem reddere debeat. Nuper quoque dum hæc conscriberem excellens Ascanius Caracciolus, cū dysenteria, tenesmo, ac febre laborasset, ex venæ sectione internæ dextri cubiti, incunctatè absque alio auxilio liberatus fuit. At si quid sanguinis missionem fieri prohibeat, aut post eam adhuc vitiosi redundabunt succi, ita ut intestinorū vlceres adhuc efficiant, aut augeant, purgationem adhibere non erit alienū, quam iterum velut venæ sectionem non vniuersam, sed per vicem tentabimus, eodem Alexa. teste, Etenim fieri nequit, ut intestinorū vlceres curentur manente adhuc ea, que ipsa efficit, aut auget, causa: Quanquam si iidem humores prompte per vomitum euacuari possent, id potius tentandum esse censerem, cum per eum, nedū eorum euacuatio fieret, verum etiam & diuerso. Id quod vbi fluxio, valenter irruat, exequendū esse iussit pro vlcerum curatione Gal. 4. metho. med. dum dixit. Vtiq; si in superioribus vlceres consistat, per inferna purgantes, si autem in inferioribus sit, superiorem ventrem vacuantes. At si per vomitum facile, qui redundant succi purgari nequeant, per aluum eos vacuare non erit alienum. Nam & si per exulceratas partes pertranseant, extra tamen educuntur per conferentia, ac communia loca. Neque id per vehementia pharmaca tentandum erit. Sed per mitiora, ac familiaria, quæ insuper vlceri nocumentum non inferant. Quorum copiam nostris temporibus inuenire haud difficile erit. Iis itaque medicamentis purgantibus leuem quandam astrictionem etiam habentibus, siue vlceres in superioribus consistat intestinis, vel inferioribus, aut mediis, tute vtare, cum neque hæc medicamenta purgantia sint vlceris, quatenus vlceres est, curatiua: etenim quæ proprie prædicta vlceres curant, pro locorum diuersitate, diuersimode etiam adhiberi debent, ut infra dice-

Com. 4a.

Medicamentū
purgans.

Vomitum.

Cap. 6.

Curatio dysente-
rix ex redundā-
te bile o. i. x.

Si ex falsa pitui-
ta, Curatio.

Diosc. li. 3. c. 1
Gal. 6. de limp.
sap. proprio.

Si ex atra bile
fiat Curatio.

A purgatione
qualia compe-
tant medicamē-
ta.

Quæ urinam
ciunt, quibus
conueniant.

Quibus infusa
magis, & qui-
bus epota me-

mus Quare si ex redundante bile dysenteria fiat, adhibitis prius (si occasio dabitur) quibusdam syrupis, ueluti is est, qui ex infusione rosarum, cichorii aut oxalidis succo, aut omphacio paratur, cum eiusdem intybi, oxalidis, aut plantaginis aqua permixtis. Hoc purgans medicamentum dato, Recipe tamariind. unc. i. corticū myrobalanorum citrinarum 3. ii. fiat decoctum in aqua oxalidis, aut plantaginis, & cichorii, in quo mellis aerei unc. i. aut unc. ii. rhab. in prædicto decocto macerati, & non colo transfusi 3. i. aut scrup. iiii. & syr. de infusione ros. unc. ii. dissolue, & præbeto. Quod si neciam dicto medicamento redundans bilis cesserit, prædictis aut aliis magis astringentibus syr. prius adhibitis, ueluti is est, qui de ribes, myrto, aut citri acetositate paratur. Iterum medicamentum purgans dari debet, quod quidem maiorem astringendi vim habeat, ac minorem purgandi. Qua propter in plantaginis, & oxalidis aqua, 3. iiii. aut unc. s. corticum myrobalanorum citrinarum decoquito, atque in ea mellis aerei vnc. i. aut vnc. s. rhab. parum torrefacti scrup. ii. vel scrup. i. cum syr. de infus. rosarum unc. i. adiecito, & si opus fuerit, tam dictas myrobalanos, quam rhab. plus torrefacito. Vbi vero qui redundat succus, falsa pituita fuerit, syr. ex succo borrag. & myrrino, de infus. rosarum aut etiam rosaceo melle, cum plantaginis, aut oxalidis aqua, aut etiam absynthii decocto, adhibitis prius, quibus iam dicta pituita purgationi paratior fiat: ex chebularum myrobalanorum decocto, aut etiam agarico, si opus fuerit (Nanque & ipsum dysentericis cōfert, ex Dioscoridis autoritate. Leiculeque astringentis est par- ticeps, ut Gal. visum est, & nos longo tempore eo usi fuimus, nullumq; incom- modum vnquam consecutum fuisse obseruauimus) ac prædictis aereo melle, & syr. de infus. rosarum, seu myrrino, rhabarbaroq; modo, quo diximus parato, medicamentum purgans tribue & ubi usus expostulauerit, id ipsum iterare cō- uenit. Nec minus, ubi dysenterix causa atra bilis fuerit, ea prius parata ex succi fumarię, borraginis, aut oxalidis, infusionis rosarum, aut pomorum syr. quod bilem atram purgare ualeat medicamentum data, quod recipit senæ, epithy- mi ana. 3. ii. corticum myrobalanorum indarum 3. iiii. aut 3. iiii. fiat arte deco- ctum in aqua oxalidis, aut plantaginis, & borraginis, seu lupulorum. In quo iterum mellis aerei vnc. i. s. aut 3. ii. rhab. (ut prius dictum est) macera- ti 3. i. & syr. de infusione rosarum vnc. ii. adiecito. Idque etiam iterare con- uenit, si redundans prædictus perseverarit succus, myrobalanosque, & rhab. torre facere si opus erit. Nam quæ secundo, aut tertio loco exhibentur medi- camenta purgantia, minorem purgandi vim, ac maiorem astringendi habere debent, & propterea à purgatione, qualiscunque redundauerit succus, quam- uis amplius exulcerationem non pariat, aut augeat, perseverante tamen ad- huc dysenteria, astringentia medicamenta, nec non exiccantia, ac obtunden- tia exhiberi debent, quemadmodum vniuerso medicorum cætui visum est, quanquam etiam post purgationem, præsertim ubi adhuc quispiam reliquus fuerit redundans succus, ea, quæ urinam ciunt ab Aetio, & Celso commenden- tur, quibus etiam & ipse vtor, aliquot astringentibus permixtis; Prosunt ete- nim ea, quæ urinam mouent (ut inquit Celsus) in aliam partem humorem auertendo, si ea consecuta sunt, si non sunt consequuta, noxam augent: Ita quod, ut ipse refert (nisi in quibus prompte id facere consueuerunt) non sunt adhibenda. Verum ad ea, quæ modo diximus medicamenta accedendum erit. Ea etenim sunt, quæ aluum sistunt; quoniam corpora plus iusto laxata astringunt, vel influentes humores obducunt, ac inspissant, vel resiccant, inte- stinorum vlcera sunt, quanquam eamē, neque indifferenter via eadem ap- proximari debeant. Nam si in crassis intestinis vlcera fiant, quæ per sedem iniicitur remediis magis egent: quippe cui magis sunt propinqua. Quæ vero in tenuibus habentur ab epotis medicamentis præsidium magis susci- piunt,

piunt, vt patet. apud Gal. cum 5. meth. med. tum 6. de loc. affect. Quauis quæ in tenuibus habentur vlcera, quæ ve medio situ posita sunt, ambo etiam requirunt, & quæ superne sumuntur, & quæ per sedem infunduntur, eodem Galen. test lib. 4. meth. med. Verum quæ vicina uentriculo sunt intestina, si exulcerata sint, iis per comesta, & bibita succurritur. Quæ uero inferius sunt sita, per ea, quæ iniiciuntur, quando neque ad ea, quæ uicina uentriculo sunt, subire potest, quod per sedem infunditur, nec integris uiribus ad inferiora, pertingere quod per os sit ingestum. Supponatur igitur in superioribus, atque gracilibus intestinis ulcus haberi, & propterea magis iuuari per ea, quæ per os assumuntur, Syr. e myrto, e ribes, aut omphacio, uel e succo oxalidis, seu ex infusione rosarum, ac earundem incompletarum, & interim quoque aridarum paratus tribuatur. Similiter is, qui ex plantaginis succo, portulacæ aut etiam polygoni paratur, cum quibus scrup. i. adici poterit infra scripti pulueris, quo ipse utor. Hic recipit seminum rosarum, oxalidis, plantaginis, ac portulacæ, singul. scrup. i. corallorum rubeorum & cornu cerui usti, cuiuslibet 3. i. amyli, draganti ana 3. s. Hic etiam exhiberi poterit cum uetusto saccharo rosaceo, aut cum eo medicamento, quod conficitur ex tota substantia, seu succo citoniorum, aut eorum fructuum, quos amarenas, aut etiam, quos corna uocant, & saccharo. Quod si nec is sufficiat ex pastillis de spodio, succino, seu terra lemnia scrup. i. uel 3. s. cum prædictorum syr. aliquo tribuatur, aut 3 i. mictæ Nicolai In hunc etiam usum conferunt mora acerba in sole desiccata & trita, aut etiam mora rubi similiter desiccata, & trita cum aliquo liquore aut obsoniis insuperfa, Paulo, & Aetio testibus, althææ radicis, aut rubi, seu hip puris decoctum ex aqua (vt eisdem uisum est) potissimum pluuiali, aut etiã radicis foliorum, seu seminis symphyti decoctum in eadem aqua, aut uino austero conducit. Nec minus cortex thuris tritus, ac potatus, aut etiam maceris cortex, & mali punici flores conferunt, ex Aetii testimonio, potissimum ubi ex falsa pituita genitum fuit ulcus corporibus, ac naturis pituitosis, & præter alia sanguinis eruptiones sistunt. Similiter, si coaguli leporis 3. i. potui detur ex sapa, vt eisdem Aetio, & Alexan. uisum & quo uetustius coagulum est, eo præstantius. Nam tale profluuium alui mederi præcipue potest, atque etiam quod leporis est (ut inquit Aristo. 3. de natura animalium cap. 21.) sed laudatissimum est hinnuli, ut ipse refert. Stercus quoque canum sola ossa uorantium cum chalibeato lacte magnopere conferre dysentericis testatur Gal. 10. de simplic. medic. facult. quem sequutus est Paulus cap. proprio de torminibus. Erinaceorum item testæ ystæ, ostrearum, & caucrorum, tam fluminalium, quam marinorum tritæ, ac etiam cornu ceruinum ustum resiccatum (ut inquit Aetius) intestinorum vlcera curant. Utilissimus etiam existit portulacæ succus, potus dysentericis, aut etiam ipsa portulaca cocta, & comesta. Nec minus conducit plantaginis semen, folia, & radix, & lapathi siluestris semen. Verum si pluribus diebus nihil remedia alia iuuerunt, uetustique iam initium est, aque bene frigide potio absumpta ulcera astringit, & initium secundæ ualitudinis facit. Celso auctore. Sed ubi uenter suppressus est, protinus ad calidam potionem reuertendum est, ut ipse inquit. Illud tamen memoriæ semper mandandum, quod communis omnium internarum partiû indicatio est, ut ea eligantur, quæ animalis naturæ maxime sint familiaria, siue ea cibi sint, siue medicamenta, fugiantur, respuanturque huic contraria, eodem Gal. auctore 4. meth. med. Qua propter medicamenta, quæ ex opio, alterco, nigro papauere, aut mandragora componuntur, vitari omnino debent, nisi fortè maxime urgeat necessitas, ex Tralliani sententia: nam licet somno dolorem leuare uideantur, & propterea uenter retineri conspiciatur. Tamen humores in unum collecti postea sine intermissione deliciuntur,

dicamenta con-
ferant.
4. meth. c. 7.

Quæ per os in-
gerenda sint.

10. de simp. fac.
c. de stercore ca-
num.
Pau. li. 3, c. 42.

Cap. 7.

Quæ per sedem
infundenda sunt.

1. de simp. facult.
cap. 34.
Lib. 4. cap. 5.
Lib. 11. de sim.
fac. cap. de pin-
guedine.

Cap. 5.

Ca. 14.

capiteque grauato. ac viribus labefactis ventrem reddunt deteriorem, & maius cibi fastidium inducunt. Crassis vero intestinis exulceratis, eis, quæ per sedem infunduntur, vt diximus, potius vtendum erit, cum & ea quoque magis conferant. Quanquam si eisdem etiam vtaristenuibus intestinis affectis nihil nocebis, quemadmodum si ea, quæ per os assumenda conscripsimus, eis tribuas, quibus crassa intestina exulcerata, sunt, nihil afferas nocuenti. Eandem tamen facultatem habere debent hæc medicamenta, utpote astringendi, obtundendi, & resiccandi, & vbi vlcera sordida fuerint, eis vtendum etiam, quæ vim habent detergendi. Excipe igitur circa initia aquæ hordei torrefacti cum corticibus, & iuris gallinarum, seu pullorum gallinaceorum salis expertis, cuiuslibet libram semis, quibus adde vitellos ouorum numero duos, olei rosacei vnc. i. s. & vnc. ii. sacchari rubei, aut mellis rosacei (Si pituitosi dysenterici fuerint potissimum tantundem, & fiat clyster, & si sanguinis copia profluat, polygoni, aut arnoglossæ succi vnc. ii. vel vnc. iii. adice. Nec minus confert asinini stercoreis succus, maxime si a pastura montana, & astringente prodeat animal, vt inquit Aetius, potissimum si sterces plantaginis succo fuerit madefactum, deinde expressum, & infusum. Quod si dolor vehementer vrgeat, caprillum seuum, vt quod inter alia sit dysentericis utilissimum, quia & facilius concreuit, & intestinis inungitur, plurimoque tempore inhzret, nec habet acrimoniam, vt hircinum, Gal. auc. 1. 4. & 12. de simplic. medic. facult. & aliis plerisque locis, Aut si id haberi nequit, hircinum, vel anserinus, seu gallinaceus adeps prædicto clysteri adiiciatur, pondere vnc. i. aut vnc. ii. si militer & oleum rosaceum augeatur, sitque rosaceum omphacinum. Hæc tamen veluti etiam & ouorum vitelli, vbi dolor non vrgeat, vitari debent quoad fieri potest, quoniam vlceris curationem impediunt, aut exigua sit eorum quantitas. hoc etiam tempore si cremoris oryzae, dragaganti, aut gummi, aut amyli vnc. i. aut vnc. s. permisceas, confert. Quod si maiori egeas astrictione, ac resiccatione, in modo dicta aqua hordei, foliorum plantaginis, polygoni, ac portulacæ pugillum. s. decoques, rosarum rubearum 3. iii. balaustiorum, hypocistidis, ana 3. ii. cui per colum transfuso seui caprilli vnc. s. olei rosacei vnc. i. sacchari rubei vnc. ii. aut sacchari rosacei vetusti tantundem succi plantaginis, aut portulacæ vnc. i. s. misceto, & fiat clyster. & si magis astringere volueris, luti armeni, & sanguinis draconis ana 3. i. adice, vel tantundem pastillorum de spodio, seu terra lemnia, aut succino, quemadmodum si magnopere dolor vrgeat, stupefacientia etiam medicamenta permiscere poteris. Nanque tutius per sedem, quam per os adhibentur vt pote 3. s. aut scrup. ii. Philonii perfici, aut catapotiorum de cynoglossa, seu eius medicamenti, quod a Nicolao Requies appellatur, Vbi vero vlcera intestina depascantur, eis, quæ crustam inducunt, vtentur, Paulo, Alexan. Actio testibus. (Et si vlcera hæc paruam omnino salutis spem promittant, vt inquit Aetius, potissimum si in tenuioribus consistant intestinis.) Verum nos medicamenta, quæ crustam inducunt per sedem infusa probamus, vbiulcus serpendo depascens circa crassa intestina consistit. Horum autem copia apud eosdem auctores, ac etiam apud Gale. lib. 9. de comp. medic. secundum locos reperitur. At si ex venenatorum pharmacorum potu oborta fuerit dysenteria, iis, quæ in venenorum potu conueniunt, erit vtendum, vt idem Aetius fatetur. Sunt autem remedia huiusmodi in triplici differentia, vomitoria videlicet, obtundentia, atque extinguentia. In quorum numero etiam acria comprehenduntur. vt ipse inquit. Cataplasmata, vero, fomenta ac unguenta, seu cerata venter imponenda, haud magnopere probamus, potissimum ubi frigida, atque astringentia fuerint. Nam quo magis cutem densaueris, tanto magis fluxiones augebunt ut Gale. inquit primo de art. curat. ad Glauc. Vbi uero cogetis, uehementi urgente

te dolore, eisdem vti, perpetuo acetum permisceas, vt medicamentorum facultas altius ad intestina penetrare valeat, aut vini albi, & tenuius modicum Sintq; ea nec facultate, nec actu admodum frigida. Horum autem medicamentorum, quoniam multa copia apud artis medicæ auctores eximios reperitur. Propterea consulto de his nos meminimus.

περί τενεσμοῦ. Id est de tenesmo, seu tinesmo. Cap. 75.

EX eodem (quo iam dicta dysenteria) genere est, & qui a grecis τενεσμός a latinis quibusdam tenesmus, a Plinio vero tenasmus appellatur, quam apud eosdem grecos interim τανασμός cum α, vt patet cum primo, & 3. de morb. vulg. tum etiam aliis plerisque locis in Hippocra. & Galen. doctrina. Quandoque vero cum, η scriptum reperitur, vt videre licet apud Celsum capit. 18. libr. 4. Id vero non ab re. Nam consueuerunt doriceam sectantes linguam per α, η, usurpare. Nec minus & apud Hippoc. vt liquet apho. 27. 7. lib. non τενεσμός, sed τανασμός nuncupari solet pro α, etiam dorice, α, usurpans, quo fit vt etiam latine nedum tinesinus, seu tenesmus, sed etiam tenasmus appellari valeat, quemadmodum Plinius affectum hunc appellare consuevit. Nec quoque talis appellatio barbara dici poterit propter iam traditas rationes. Nam proprio, & latino nomine nos carentes, nomenclaturam a grecis usurpamus, & indifferenter prædictis nominibus vti poterimus. Nomen vero sumat ab ipso sympt. vt apud Galen. constat 2. meth. medend. & com. prædicti aphorif. 27. 7. lib. quoniam in eo tensio quædam circa intestinum rectum sit, ob quam, cum cacare vehementer appetantæ gri, continuo exurgunt, vt idem sit, quod desidendi quædam cupiditas assidua, aut inanis quædam egerendi voluntas, seu (vt inquit Paul. capit. 41. lib. 3.) continua, & implacabilis desidendi cupiditas, qua nihil præter modica cruenta, vel mucosa egeritur. Id quod etiam Aetius confirmauit capit. 44. lib. 9. cum dixit, est autem affectio hæc ad excernendum promptitudo, quæ differri, ac deuitari non potest, nihil tamen, præterquam pauca cruentum aspectum habentia propellens; & post ea quædam mucosa. Qui quidem affectus symptomata infert dysenteria similia, nixus tamen multo vehementiores habet vt eodem libr. 3. de caus. sympto. liquet, eandem quoque habens causam ac dispositionem, vt patet com. præcitati aphorif. Conuenit itaque cum proprie dicta dysenteria tenesmus in dispositione, causa, & sympto. nisi quod ea sunt vehementiora, præsertim nixus, ex Galen. sententia. Differunt autem loco, seu parte affecta. nam dysenteria proprie dicta indifferenter in cunctis intestinis excitari potest, præterquam in intestino recto. Tenesmus vero non nisi in eodem intestino recto oriri consuevit, vt liquet apud Gal. cum præcitato libr. 3. de caus. sympto. tum etiam 6. de loc. affect. com. præcitati chirif. & aliis plerisque locis. Id etiam confirmauit Alexandr. capit. 9. lib. 8. cum dixit. Tenesmus recti intestini affectus est, indicant etiam ipsum affectum esse uehemens tensio, ac dolor cum positu, ac prompta desidendi cupiditas, paucis admodum sequentibus excrementis, & quod per totum morbi spatium iis, quæ a supernis descendunt, haud quaquam misceri videntur. Affectus hic, uelut & dysenteria, morbus est in soluta continuitate, quoniam prædicti intestini recti exulceratio est, ut liquet apud Galen. præcitatis locis. Et propterea licet ab initio excrementa pituitosa, & pingua sint, progressu tamen temporis, ut liquet eodem 6. de loc. affect. etiam ramenti specie deiciuntur. Comitantur etiam affectum hunc conatus, & implacabilis desidendi cupiditas cum flatibus. Descendunt autem per anum mucosa cum graui distensionis sensu. Nec non aquosa, & interdum post recrementa sanguis destillat

Plinius lib. 28. cap. 14.

Cōmentario 2. 1. de morb. vul. cōmentario 2. tex. 7. & 36. 3. de morb. vul. cōmentario 3. tex. 53.

2. met. cap. 2.

Tenesmus vnde nomen sumat præter. Quid sit.

Quibus cum dysenteria conueniat. 3. de caus. sym.

cap. 2.

Quibus differat. Quæ pars in eo afficiatur.

3. de caus. sym. cap. 2. 6. de loc. affect. cap. 2.

Quis affectus præter naturam sit.

Loco citato, Signa.

Ante medium
libri.
Cap. 2.

Causa.

Prognostica.

3. de morb. vul.
cōmentatio. 3.
comm. 5. 3.

Curatio.

Venæ sectio.

Purgatio.

destillat, eodem Alexan. auctore. Celsus vero sic de eo scriptum reliquit. In hoc æquè, ac in torminibus frequens desidendi cupiditas est, æque dolor, ubi aliquid excernitur. Descendunt autem pituitæ, mucisque similia, interdum etiam leuiter subcruenta, sed iis interponuntur nonnunquam ex cibo quod recte coacta. At Hippocr. lib. de affect. ait. Quod ubi tenesmus apprehenderit, secedit sanguis, ac mucus, & dolor fit in ventre inferiore, maxime ubi ad secessum deuenit. Scribunt tamen nonnulli (vt Gale. asserit eodem 6. de loc. affect.) quod a forti excernendi conatu præcedente dolor vehementi aliqui lapides callosos deiecerunt, iis, qui in vesica nascuntur haud absimiles. Id quod neque ipse vidit, neque alium qui viderit, vnquam audiuit. Affectus hic cum eiusdem sit generis cum dysenteria (vt diximus) haud quoque circa eiusdem causas ab ea discrepabit, Galen. teste com. apho. 17. 7. libr. modo ipsæ circa rectum intestinum exulcerationem pariant: Nam citra eam tenesmus dici non poterit. Quanquam sint, qui velint, quod a iam dictis dysentericæ causis, tum externis, tum internis citra exulcerationem fieri possit tenesmus (Nec non & a quibusdam aliis) Verum hunc tenesmum mendosum, seu non uerum appellant, præcipuè arabes, & qui eos sectantur. Nos vero cum Gale. asserimus tenesmum nec dici, nec appellari posse, etiam si quispiam dolorificus affectus a quapiam causa intestino recto fuerit ortus, nisi adsit eiusdem abrasio, seu exulceratio. Quomodo autem distinguendæ sunt, ac dignoscendæ tenesmi causæ diuersæ, a præcedenti cap. petas. Quanquam si propter stercoreum multitudinem eueniat, grauis distensionis sensus circa imum ventrem aderit, Eruntque alui excrementa præter naturam detenta. Hæc autem multitudo non in cæco intestino, vt quibusdam visum est (pace tantorum virorum dixerim) cum hoc in hominibus intestinum adeo exiguum sit, vt nullum fere habeat usum, neque intra ipsum fæces excipi possunt, velut in nostris anatomis sæpius inspeximus. Verum in eodemmet aderit intestino recto, vel cum primo colo alligatum est, vel in alia eius parte. Quod uero tenesmus neque acutis, neque longis morbis annumerari debeat, cum & facile tollatur, neque unquam per se iugulet, liquet apud Celsum præcitato loco: quod si utero gerenti superuenerit, faciat abortum, apho. 27. 7. libr. ab Hippocr. scriptum est, id autem non ab re: Quoniam (vt inquit Gal. 3. de morb. vulg.) dolorificus, & molestus affectus est, dolorificus quidem propter tensionem, molestus autem, quod assidue desidendum sit. Quare & propter vehementes, atque frequentes exurrectiones, conceptus abortitur, quando etiam ex omnibus aliis fortibus moribus, atque doloribus mulieres grauidæ solent abortire. Pro cuius curatione. proprior ratio victus talis sit, qualem in tormina supra præcipimus, Celso auctore, cibos quidem (vt inquit Alexand.) boni succi, concoctu faciles, & leuiter astringentes exhibentes: Quo uero ad medicamentorum rationem attinet. Id primo animaduertendum erit. (Num a causa quipiam tenesmus adhuc fiat, vel augeatur, vel ipsam factus desinente eius causa amplius non fiat. Nam si adhuc fiat, pro causarum diuersitate, curandi ratio variari debet, quemadmodum de dysenteria decretum est. Et propterea ea prius auferri debet, vel venæ sectione, si plethoricum fuerit corpus, seu ab inflammatione tenesmus originem ducat, vel purgatione, si ab acribus, mordacibusq; succis in toto corpore redūdantibus fuerit ortus. Et licet id a Iunioribus etiam Galenicis medicis cane peies, & angue vitandū esse cōsultū fuerit, tamē præter rationes, quæ hic asserri possent Aetuarii auctoritas cap. 6. lib. 4. sufficiens esse debet. Ea autem talis est. Cæterum quia tenesmi ex mordacibus, salisq; humoribus intestino recto impactis oriuntur, Nū ii in toto corpore abundant expendemus, ac mediocriter purgātib; educētes, ægrū ab assidua exurgēdi molestia liberabimus, Nemo igitur

vere atur

vereatur vbi plethoricum fuerit corpus, & alia non prohibeant, seu ab inflammatione fuerit ortus tenesmus venam secare, non semel duntaxat, sed sepius si opus fuerit, cum pro euacuatione, tum etiam pro reuulsione perficienda, priusquam ad ea se conuertat medicamenta, quæ tenesmum ipsum curant. Haud quoque dissimili ratione, si vitiosi fuerint in toto redundantes succi ad intestinum rectum confluentes, audacter medicamento purgante, pro redundantis succi ratione, vti debemus, quemadmodum præcedenti cap. de dysenteria docuimus: Vtputa si flaua bilis redundauerit, medicamento eam purgare vtante; Si falsa pituita, aut atra bilis, medicamentis, quæ eosdem succos purgandi vim habent, vt oportet, prius tamen eis concoctis, ac præparatis, si eadem occasio dabitur. Quamquam nec eadem medicamenta magnopere acria, ac quæ vehementem purgandi vim habeant, esse debent, cum quibus perpetuò, quæ leuiter astringunt permiscenda sunt, quemadmodum præcedenti cap. monuimus. Verum si ex stercoreum multitudinem tenesmus excitetur, tentandum primò est leuibus clysteribus, aut etiam aliquanto acrioribus eandem moliri, & vbi non suffecerint, ad lenientia medicamenta purgantia transeundum erit: Veluti est nianna, casta fistula, saccharum violaceum, syrup. ex pluribus infusionibus rosarum rubearum, aut persicarum, & si opus fuerit aliquid diacath. addendum; Nam & Paulus medicamentum quod emolliat per os assumptum hoc in casu probat. Cum uero tenesmi causa fuerit abscissa, aut idem non amplius à causa dependeat, aut eadem exigua sit, cum discutientibus, tum modicè astringentibus laborans sedes moueri debet, cum ex eisdem quoq; ægro opem feramus, eodem Actuaria auctore, totiusque viribus, clysteribus, aliisque topicis medicamentis ipsum curare vitendum erit, eisdemq; adhuc diuersis, prout diuersæ fuerint causæ, quæ ipsum effecerunt. Nam si inflammatio fuerit, facta venæ sectione, & adhuc eadem perseverante, Psisane succus cum paucis rosis, simul cum eo decoctis infundi debet (Actio teste) vel decoctum paretur ex ordeo non decorticato, & torrefacto, ac plantaginis foliis, cuius unc. viii. aut lib. vnam assumens, adiectis olei rosacei unc. iiii. & recentibus ouis totis sine corticibus numero ii. simulque permixtis fiat clyster. At eundem vsum iniici debet lac recenter multum caprillum, potissimum cum oleo rosaceo. Cæterum lumbis præcipuè circa os sacrum, sedi, ac pubi, & inter fæmineo, perineon græci appellant, for- tus ac illitiones adhiberi debent oleo myrteo, rosaceo, ipsoque omphacino, pauco vino albo adiecto. Quod si dolor intendatur, forus ex fœnu græci, maluarum, rosarum, rubearum, althææque, ac seminis lini decocto fiant, Vel in eorundem iure in sensiones faciant egri, cum efficacissima in tenesmi affectione fomenta sint sedi ad mota, eodè Actio auctore. Procedente vero tempore reiectionis rosis, ex reliquis, adhibitis chamæmeli floribus, ac meliloto fomentum paretur, & oleo rosaceo, seu myrtino chamæmelinum, ac anethinum permiscere oportet, & temporis processu eisdem solis vti. A biliosis autem humoribus, si tenesmus fuerit ortus, clysteres fiant ex hordei & foliorum plantaginis decocto, in pullorum gallinaceorum iure, sacchari rubei, & olei rosacei, omphacini, singul. unc. ii. adiectis, & vitellis ouorum numero duobus, aut ex caprillo lacte, saccharo rubeo, & oleo rosaceo, pariterque forus, in sensiones, ac illitiones ex maluarum, althææ, rosarum, violarum, ac hordei decocto, & ex oleo rosaceo omphacino, myrteo, & amygd. dulcium fiant, vel ex oleo rosaceo, retenti butyro, & adipe anserino cum modica cera solutis, interius anus vngatur, vt Tralliano visum est, potissimum vbi vehementius dolor vrgeat. Possunt insuper verbenæ decocto inferiores partes foueri, aut in aqua calida ægri desidere, Celso auctore. Post hæc ea, quæ astringunt, simulatque contemperant iniicienda sunt, vt decoctum ex rubi, myrti, seu plantaginis

Si ex stercoreum
multitudine fiat
tenesmus cura-
tio.

Quæ per sedem
infundenda sunt,

Topica.

Si a bile, cura-
tio.

Si ex pituita, cu
ratio,

Anodyna quan
do competant,

plantaginis foliis, rosis, cytinis, hypocistide, balauftio, ac hordeo, cui oleo rosacei omphacini, ac sacchari rubei vnc. ij. addas, ac vitellos duos ouorum, ubi ingens dolor adfit. At si dolor absit, aut is exiguus fuerit, oleum rosaceum, ac ouorum vitelli auferantur. Si vero pituita sit, quæ ægrum infestauerit, ac tenesimum excitauerit, fueritque adhuc exigua quantitas in recto intestino eiusdem impacta detergentibus huiusmodi clysteribus vtare primo, ac leuiter astringentibus, deinde astringentia magis, ac exiccantia medicamenta adhibeas, quæ etiam ad calidum vergant, vt Recipe hordei cum corticibus, ac cicerum rubeorum ana P. i. furfuris P. s. corticum pini, foliorum lauri, & florû chamæmeli ana manip. s. pilularum cupressi numero iiii. fiat decoctum in aqua pluuiali, aut iure pullorum gallinaceorum, è quo excipe lib. j. & adde olei anethini, & chamæmelini vnc. ii. si dolor vrgeat, vitellos ouorum numero ii. mellis rosacei vnc. ii. misceantur, & fiat clyster. Pariter circa pectionem, sedem, & fœmen calida fomenta, ac etiam olea adhibere oportet. fiant autem forus seu infusions ex floribus chamæmeli, meliloto, fœno græco, anetho, corticibus pini, lauri, ac cupressi foliis, malicorio, ac myrti baccis, parato decocto ex tribus partibus aquæ pluuialis, & vna vini astringentis. Illinitio autem ex iam dicto oleo anethino, aut chamæmelino fiat, liliaceo, irino, aut rutaceo. In hunc etiam vsum conferunt sacculi ex furfure in vino astringenti decocto parati, si sedi admoueantur. Per propriam quoque experientiam ab Aetio commendatur later per quam vetustus, & à fumo denigratus vna cum contentis in eo paleis, si tundatur, deinde feruenti aceto subactus, lintheoloq; alligatus subdatur sedi. Id vero statim ab excretionem admoueri debet, & maxime si dolor infestet, demum prædicto hordei, ac cicerum decocto malicorium, lentes myrti baccæ ac gallæ adiaci debent, corticem pini, cupressi pilulas non prætermittendo. Idque infundi debet per sedem mellis rosacei vnc. ii. adiectis. Quod si vigilæ vna cum dolore perseverante consequantur, neque prædictis cedat affectio, sedi aliquod soporiferum collyrium uideretur, vt inquit Aetius. Aut alicui ex prædictis clysteribus solani, hyoscami, aut mandragoræ decoctum adiaciatur. Eorundem autem quantitas exigua sit, neque ea adhibeantur, nisi maxima urgente necessitate. At si tenesimum frigidus præcesserit, eisdem calidis, discutientibusque foribus, infusionsibus, sacculis, ac vnguentis vtilicebis, & similibus, pro vt vsus exposulabit.

περί τῶ ἀιμορροϊδῶν.

Id est de hemorrhoidibus. Cap. 76.

Cap. ultimo.

IN sanguine generando quicquid admodum crassum, ac terreum ex ciborum natura in nutrimentum fertur, nec commodè à naturali calore alteratur, sed profus eam, quæ in iocinore sit, mutationem, subtergit, id lien ad se trahit: quod vero mediocri est crassitudine, ac planè à iocinore absolutum, simul cum sanguine in omnem partem diffunditur: requirit etenim sanguis in non paucis animalis partibus crassitudinem quandam, vt liquet 2. de natur. facult. ac seponitur quidem tanta talisque iam dicti succi portio, quanta, qualisque, si in totum ferretur corpus, noxam aliquam intert. Cum igitur naturalis temperatura hunc humorem paucum generauerit, & ratio victus adhibita confert, & splen satis attrahit ex eo, qui generatur, haudquam huiusmodi excrementi copia in ventris generatur: at ubi contraria eueniunt (dico autem contraria, vt scilicet hæpar ad generandam huiusmodi superfluitatem sit aptum, sit etiam ratio victus per tales cibos adhibita, qui crassum & facultatem humorem natura apti sint procreare, splen vero sit natura imbecillior, & quicquid de ea superfluitate generatur ad se minime trahere

trahere potens, in hoc inquam corpore turbidus fit, ac crassescit, qui in venis generatur sanguis, & nonnunquam a venis eisdem habentibus, (sicut alia omnia) vim excernendi, id quod extraneum est, ad sedis vasa quædam reponitur, interimque propter multitudinem, & crassitudinem eiusdem sanguinis, eorundem vasorum ora aperiuntur, atque per eadem vasa excernitur: quæ affectionem græci αἱμορροΐδις, appellant, ut liquet 2. de Arte cur. ad glauc. 6. de morb. vulg. & com. apho. 12. 6. libr. nam αἱμορροΐς nil aliud significare videtur, quàm sanguinis profuuium per venas sed sedis. idem confirmatur auctore eiusdem Gale. lib. de atra bile, cum dixit sæpenumero autem natura recludens venam vasorum, quæ sunt in sede, talem permixtum sanguini humorẽ excreuit, loquens de melancholico succo, quo & nomen symptomati imponunt αἱμορροΐδις, latini quoque alio proprio nomine carentes eodem modo affectionem hanc hæmorrhoida, siue hæmorrhoidas appellant. Sumpsit itaque appellationis originem hæmorrhoidis a sanguinis fluxu, ut liquet ex præcitatæ Gal. sententiis, & ab Aeti. capitu. 5. lib. 14. qui etiam affectum hunc asseruit esse velut dilatationem quandam locorum in sede factam vasis quibusdam isthic apertis, & progressu temporis callosioribus factis. Verum quamuis sæpius accidat, quod dilatatis, ac admodum impletis iam dictis venis ob copiam sanguinis sæculenti, ac crassi, ut diximus, quod per eas sanguis excernatur: & propterea tale sortitus sit nomen affectus hic: tamen non ideo si is non excernatur, modo dilatata, impleta, ac inflata eadem sint venæ ex iam dicto crassiore sanguine, hæmorrhoides quoque appellari non debent. Quapropter Aet. præcitato loco duas hæmorrhoidum dicebat esse differentias: quoniam aliæ sunt cæcæ, aliæ sunt apertæ. cæcæ, quæ omni tempore inflatae sunt, & nihil excernunt: Apertæ vero sunt, quæ per tempora sanguinem effundunt. idem confirmavit Paul. cap. 59 lib. 3. pars, quæ afficitur in ambabus differentis, adeo oculis conspicua est, ut nullo alio signo opus habeat, quoniam semper venæ sedis affectæ sunt: quanquam non adeo conspicuum sit, neque mihi ita certum, num dicte sedis venæ pro germinatione sint venæ portæ dicte (ut quibusdam visum est,) vel venæ magnæ chyli, seu cauæ appellatæ, vel vtriusque, cum ex vtriusque rami ad eandem partem pertineant, & ex porta venæ maiores: quamuis Hippocr. & Galen. doctrinæ magis consentiat eas ramos esse venæ cauæ propter ipsius Galen. verba, tum 2. de nat. facul. tum 2. de arte cu. ad Glau. capitu. de cancri & 6. de loc. affect. & Hip. apho. 11. & 21. 6. lib. Nam si perpetuo ubi minus quàm iustum est atrum succum ad se trahit lien; ut sanguis impurius, crassior, ac nigrior; sic vniuersum corpus redditur decolor, non propter aliud, nisi quod eius facultate attrahenti imbecilliori reddita, sanguis in vniuersum corpus impurus transmittitur ut liquet 3. de nat. facul. & 6. de loc. affect. & deinceps ab ipsis venis vim excernendi habentibus ad venas sedis quandoque delegatur: ut patet 2. de arte cur. ad Glau. & per easdem excernitur: necessario sequitur eas venæ cauæ dicte, & non portæ esse ramos. Cum non prius excernatur quàm per vniuersa totius corporis vasa fuerit diffusus, tam si ad vniuersam cutim, quàm si ad varices, aut ad iam dicta sedis vasa decumbat, aut ad quampiam aliam partem, quæ imbecillior fuerit. Ad hæc si propterea melancholia, & nephritide laborantibus hæmorrhoides conferunt non solum ratione euacuationis, sed qualitate humoris euacuari: quoniam pellit natura ad partes ignobiliores eos, qui tales affectus efficiunt, humores, præsertim cum melancholici, ac crassi fuerint, ut liquet citatis aphorif. cui in dubium venerit tales humores per ramos cauæ, & non portæ venæ ad dicta sedis vasa permutari, atque transferri, tanquam per conuenientiora loca, per quæ promptius, ac facilius talis fiat permutatio: nulli inquam. Audacter itaque cum

Quid sint hæmorrhoides.

2. ad glau. ca. 10. in principio.

6. de mor. vulg.

Commētario 3.

tex. 37. & com.

5. tex. 25.

Cap. 4.

Vnde nomen

sumpsit.

Hæmorrhoides
duæ differentie.

Pars quæ afficitur.

Venæ sedis unde
de oriuntur.

2. de nat. facul.
cap. 9.

2. ad glau. ca. 10.

6. de loc. affect.

in principio

Locis citatis.

Capite citato.

Affectus præter
naturam,

Cap. 4.

2. ad glauc. c. 10.
lib. de atra bile.
cap. 4.

Cap. 19.

Affectus signa.

cum Hip. & Gal. tenemus (quicquid alii sentiant) hæmorrhoidas ramos esse
venæ cauæ potius quam portæ, quamuis ex porta maiores forte proger
minationes, quam ex caua ad eundem pertineant locum. Ceterum, licet huic
affectui nomen inditum sit hæmorrhoids, propter sanguinem, qui magna ex
parte cum succo melancholico a natura recludente horum vasorum ora ex
cerni consuevit, & propterea dici posset esse symptoma in genere excreto
rum immodice toto genere præter naturam, quemadmodum & reliquæ hæ
morrhaginæ, præter mensum profluuium: tamen illud non ita facile asse
rem, cum nonnullæ sint hæmorrhoides cæcæ, vt diximus ex Aetii & Pauli
Auctoritate, & nos indies crebro obseruamus, ex quibus ne tantillum quidem
sanguinis profuit: qua ratione nec hæmorrhoides nuncupari deberent, neq;
symptomata esse in genere excretorum immodice, nisi quispiam diceret id
raro euenire, cum etiam ex eisdem cæcis semper aliquid profluat sanguinis,
licet minimum sit. quod si nec omnino quippiam excernatur, non propterea
hæmorrhoides nominari non debent; cum omnes sic appellatæ sint propte
rea quod sæpenumero, & non semper, vt inquit Gal. citato lib. de Atra bile,
natura sanguini permixtum humorem melancholicum recludens dictorum
vasorum ora, per eadem excerni. Quod item confirmari posset Celsi aucto
ritate capit. 18. lib. 6. cum dixit tertium vitium, est ora venarum tanquam ex
capitulis quibusdam surgentia, quæ sæpe sanguinem fundunt *αιμορροϊδας*
græci vocant. At si quis propterea assereret hæmorrhoidas non symptoma
esse, sed morbum, non similiarum, sed instrumentalium partium, & proprie
in cauitatem, eadem non astricto, aut constipata, sed dilata, aut patefacta
non reclamarem. Nam Aetius dicebat quod hæmorrhoids est dilatatio vena
rum sedis, ad quam dilatationem si earum ora referabantur, sanguinis fluor
consequeretur, & sic apertæ dicebantur hæmorrhoides, si vero vasorum ora
haudquaquam apperiantur, nihil excernitur, etiam si ipsæ venæ admodum di
latatæ sint, & impletæ, & propterea cæcæ appellantur. communis est itaque
vasorum dilatatio cunctis hæmorrhoidibus, & non sanguinis per ea excretio.
Quare morbum potius, quam symptoma asserendum erit: Illud quoque cum
Gal. affirmari poterit. Nam cum ex eodem humore melancholico varies, &
hæmorrhoides fiant vt liquet 2. de arte cur. ad Glauc. & apho. 21 6. lib. & lib.
de atra bile, quemadmodum varios fiunt, cum fœmorum & crurum venæ
latiores fiunt: ita quoque & hæmorrhoides, cum sedis venæ dilatantur, quin
immò omnes dilatatas venas antiqui medici *αισθησις* appellant, vt ipse inquit
lib. de tumore præter naturam: Quare cum distentis, ampliatis, ac dilutatis ve
nis sedis hæmorrhoides cunctæ fiant, & non cum ex eis sanguis profluit: (id
enim symptoma est earum, quod sæpe eis aduenit, non autem semper) pro
pterea morbum potius, quam symptomata esse non ab re quispiam dixerit,
quamuis a symptomate nomen sumpserit, quod magna ex parte ei super
uenire solet: Nam illa venarum sedis ampliatio, seu dilatatio proprie hæmor
rhoids est, non autem illud sanguinis profluuium, quod non solum ipsis venis
dilatatis sed etiam patefactis orificiis earundem consequitur, potissimum
cum non perpetuo id omnibus superuenire contingat, vt dictum est. Cogno
scas autem eas non difficulter; oculis enim conspicuæ sunt, interna quoque
sedis pars intumescit, & capita venarum supereminet, & in internam inte
stini recti partem velut vix acini lucidæ apparent, cæcæ dolorem vehemen
tem excitant, potissimum dum a stercore exeunte comprimuntur, quamnis
cæcæ plus doloris, quam apertæ afferant teste Oribasio lib. 9. sui compendii
capitu. 42. nihil que cruenti excernunt. Apertæ vero sanguinem eiulantur,
maxime quidem vnâ cum stercore, aliquando etiam sine stercore, vt inquit
Hippoc. lib. de hæmorrh. plurimis quoque habentibus hæmorrhoidas adest
dolor

dolor vniuersi corporis proprius eis, vt pote citrinus ad viriditatem declinans vt quibusdam visum est. Si vero accidat quod hæmorrhoides magis interius fiant, si vehementer exprimatur eger, sedesq; prius aqua calida foueatur, conspicua fiet tam si cæcæ quàm si apertæ sint. Verem quod hæmorrhoides originem habeant ex copia melancholici succi, seu fæcis sanguinis aut ex eodem sanguine multo fœculento, & crassiori existente cum videlicet iecur ac vniuersæ vænæ eundem humorem a se ipsis excernentes, in diſtas sedis venas reponunt, liquet apud Galen. lib. de atra bile & 1. de arte curat. ad Glau. ac luce clarius commen. aphor. 12. 6 lib. cum dicebat hæmorrhoidas fieri impossibile est absque hoc, quod propter multitudinem, & crassitudinem sanguinis, ora quarundam venarum aperiantur, hæpate ad ipsas reponente fæcem & quandoque sanguinem melancholicum. Atqui iam diximus nos circa initia huius sermonis, quibus corporibus, & a quibus causis tales coaceruentur succi seu sanguinis melancholici copia: quæ vbi non adeo multa fuerit, & dictorum vasorum sedis expultrix facultas non vehementer irritata, ac retentrix non admodum imbecilla, cæcæ fiunt hæmorrhoides: quemadmodum vbi contrarium euenerit, aperte: ex quibus sanguis profluit crassus, niges, & faculentus magna ex parte dico magnam ex parte: Nam quandoque contingit, quod sanguis per easdem venas profluat, natura duntaxat multitudinem sanguinis euacuante: quemadmodum accidit sanguinem per nares effundentibus: nonnunquam patèfactis eisdem venis ex sanguinis impetu ad eas irruentis id natura haud quaquam tempestiue ad animalis cōmodam efficiente: quo fit, vt effectus sanguinis interdū niger non sit. interim quoque accidit vt natura atrii sanguinis, seu succi euacuandi causa venam aperta, quo malo sanguine euacuato, bonus etiam subsequatur vbi diutius patefactum remaneat os eiusdem vænæ, neque prius fuerit oclusum. Quare audacter cum Gal. tenemus quod licet magna ex partem per has venas ater sanguis, ac succus melancholicus per modum fæcis genitus expurgari consuevit, tamen non omnis hæmorrhoidis talem melancholicam bilem, aut melancholicum sanguinem euacuat, vt liquet 6. de morbis vulg. Neque propterea Galen. sibi ipsi pugnancia scripsit, cum commen. præcit. aphor. 12. 6 lib. dixerit hæmorrhoidas fieri impossibilem esse præter multitudinem, & crassitudinem sanguinis hæpate ad eas venas reponentem sanguinem quandoque melancholicum, & ipsius fæcem: nam de veris loquebantur hæmorrhoidibus eo loco, que ex huiusmodi humoribus vere, & proprie vt plurimum ortum habent. At lib. 6. de morb. vulg. omnes connumerauit causas, ex quibus per sedis venas sanguis profluere consuevit, tanquam necessarium pro faciliiori intelligentia testis Hippo. ac veritate sententie eiusdē textus: quam opinionem testari videtur Actuarius in sua medendi methodo lib. 1. cap. 20. quo loco præter melancholici succi redundantiam alias quoque nonnullas, meminit causas, ex quibus per sedis venas sanguinem profluere accidit, vt pote iis, qui solita exercitia omiserunt aut pleniore victu vti cœperant, quam antea, vel quibus consuetæ è nare, aut vtero (ceu in mulieribus) excretiones supprimuntur, aut quibus mos erat venam tundere, alia ve quapiam ratione sanguinem euacuare, & consuetudinem mutarunt: vt iam quia corpus vniuersum peruadat, copia imbecillitasque adsit, iis inquam hæmorrhoides oboriuntur. At vbi melancholicus succus, siue ater sanguis ex eisdem profluit venas, haud ægre ex eius colore, ac substantia dignoscitur. Si vero alterius sit coloris suam seruans naturam si propter eius multitudinem natura ipsum excernat ex quibusdam, aut omnibus modo iam dictis causis præcedentibus illud percipere poteris: similiter ex natura habitu, & ætate ægrotantis, ac ex eo quod sequitur, vt puta conferentia: Quem admodum

Vide Auic. li. 3.
sen. 17. cap. 1.

Causæ.

Cap. 4.

Cap. 10.

Commētario, 5.
Commento. 25.
contradictio.

Conciliatio.

Loco citato.

Causarum signa.

Prognostica.

Commentar. 3.
tex. 37.Ratio curandi
cecas hæmor-
rhoidas.

admodum ubi idem sanguis immodice profluat, vel post nigri sanguinis excretionem, natura haudquaquam potente propter eius imbecillitatem, ac conceptaculorum diutinam refectionem bonum sanguinem retinere, ut eodem sanguine impetu quodam ad eadem vasa irruente oris eorundem patefactis, aut si propter multitudinem, sanguinis copiam prius vacuare tentasset, & demum propter eorundem valorum apertionem, ac retentricis imbecillitatem, eundem reprimere non valeret, ex contrario iudicari poterit. Neque enim agri facile tolerabunt: quinimo decolores, ac omnino in dies imbecilliores redduntur: Quapropter quemadmodum hæc affectio à multis morbis tutos redit, quando videlicet melancholici succi copia per has venas vacuatur, aut non immodice sanguis profluit, ut liquet ex Hippocr. 6. de morb. vulg. cum dixit hæmorrhoidibus laborantes, neque morbo laterali neque pulmonis inflammatione, neque phagædæna, neque furunculis, neque terminthis, neque lepra, neque aliis fortasse similibus (morbis supplendum est) capiuntur, inquit Gale. Itaque quoque cum contrarium euenerit, nonnullorum malorum causa hominibus existit. nam & deformitatem, & miseram vitam hæmorrhoides inducunt: multos etiam vita priuant, & deformitatem quidem propter coloris totius corporis vitium ex euacuatione succedens. Miseram vero vitam propter corporis debilitatem, quandoque etiam de vita periclitantur sic affecti, cum ob excedentem euacuationem perfrigeratum hæpar aquam intercutem operatur Aetio teste præcit. cap. 5. libr. 14. Quæ omnia idem Hippo. in apho. scribere haudquaquam oblitus est nā quod superuenientes hæmorrhoides à nonnullis aliis malis liberent laborantes, decretum reliquit apho. 11. 6. libr. cum dixit Melancholia & Nephritide laborantibus hæmorrhoides superuenientes bonum. Neque enim solum ratione euacuationis, ut inquit Gal. in com. sed etiam ipsa qualitate humoris euacuatæ hæmorrhoides iam dictas affectiones sanant. Hæ enim sanguinem crassum consueuerunt euacuare humore plenum melancholico. & aphori. 21. eiusdem 6. dicebat. in infanientibus si varices, vel hæmorrhoides superuerint, infanæ solutio fit, propter eandem causam. Quemadmodum, quod si quis rentauerit iter intercludere his, quibus consuevit per hæmorrhoidas longo tempore talis succus euacuari, quod periculum est. ne in tabem, aut aquam intercutem incidant. idem Hipp. apho. 12. eiusdem lib. sub his verbis docuit, a diuturnis sanato hæmorrhoidis si vna non seruatur, periculum est aquam intercutem, aut tabem aduenire. Hinc est quod non ab re decreuerit apho. 15. 4. lib. quod ubi sanguis infra deliciatur (hoc est per hæmorrhoidas ut inquit Gal. in com.) bonum est, quando videlicet hominis natura multum talem accumulauerit sanguinem. Nam aliter ut Galen. testatur, non est assuefaciendum ei, quæ fit per hæmorrhoidas euacuationi quæ periculosam habet vtranque immoderantiam, quod vel supramodum sanguis excernatur, vel ex toto supprimitur, ex quibus libuet quantum aberrant nonnulli hac nostra tempestate medici, qui fere indifferenter cunctis laborantibus hîrudines sedis venis adhibere iubent, etiam si non consueuerit talis lex eisdem venis succus, seu sanguis confluere, neque hominis natura multum talem cumulauerit. hæmorrhoidas item inquit Soranus æphesius cap. 18. habentes si in plantis pustulæ multæ nigro colore affusæ suboriantur 28. die moriuntur. Paulus vero de eisdem sic scriptum reliquit præcitato loco, venulis, quæ in ano extant iusto largius inanitis, habitum in aquam, subtercute resolui contingit, & affectos infelicitè cibos sentire, ac contabescere, periculum quoque est ne largum etiam sanguinis profluvium accadat, quemadmodum ne idem in totum supprimatur, unde laboriosa est curatio. Quod quidem ad curandi rationem attinet ubi cecæ fuerint hæmorrhoides, aut modice

ex

ex eis sanguis fluxerit, ea vtendum est victus ratione, quam cadit de melan-
cholica instituiamus, adeo vt per eam inhibeatur, ne multa copia talis melan-
cholici succi generetur, sed quoad fieri possit exigua, vt quæ à liene facilem
expurgari valeat. Verum vbi magnos circa sedem dolores excitauerint cæcæ
quando ex arido stercore exeunte comprimuntur, & propterea vehementes
fiant dolores aluus non semel duntaxat, sed sæpe mollienda erit. solet enim
oriri inflammatio maxime vbi dura aluus eum locum læsit, ut inquit Celsus
præc. loc. quæ de re mollibus, ac lenibus clysteribus aluus subducenda erit, ex
decocto foliorum maluarum, violarum ac betæ in gallinarū iure additis vnc.
iii. vel iiii. olei viol. aut amygd. dul. vnc. ii. sacchari, & vnc. i. adipis anseris, aut
renum caprarum, in quem etiam vsum confert vnc. i. vel i. s. cassiæ fistulæ per
horam ante cibum deuorata; confestimq; malleoli vena incidenda non semel
duntaxat, sed bis, vbi opus fuerit, & vires consentiant, ac corpus sanguinem
potissimum crasso, & melancholico plenum fuerit: nam in cruribus sectam
venæ hæmorrhoides prouocant Gale. auctoritate libr. de curan. ratione per
venæ sectionem: præter id quod per deriuationem sanguis qui in eis continetur,
vacuatur ac dolor sedatur: apponenda quoque vbi vehemens persevera-
uerit dolor, quæ illum mitigare possunt. quare in aqua dulci modicè calida
desidendum est, aut decoctis in ea maluarum, althææ, & violarum folijs inte-
rim meliloto, fœnu græco, chamæmelo, lini semine, & anethonitem & ubi
hæc non suffecerint hyosciami, ac lactucæ folia, & papaueris, tum albi, tum
nigri cortices adiaci poterunt, & vbi desidere æger in ea non potuerit, spon-
giæ in iam dicto decocto irrigatæ, & madefactæ dolenti loco adhibeantur;
fouendus insuper locus erit ex ouorum vitellis, rosarum folijs, oleo rosacco,
& cæra parato medicamento: quandoque misceri poterit mica panis in aqua
dulci mediocriter decocta: idque si intus fuerint hæmorrhoides digito illi-
nendum, si extra super illitum lineum panniculum imponendum est. Pote-
ris insuper, vbi iam dictum medicamentum dolorem non sedauerit, infra-
scripto vti quod recipit foliorum althææ, meliloti an. m. s. adipis anseris vnc.
ii. vitelli ouorum nu. iii. olei rosacei & de sem. lini ana 3. j. cæteræ albæ parum
misce, & fiat vnguentum, & in vehementissimo dolore infrascripto quoque
vtaris: ex foliorum hyosciami. m. s. violarum, & lactucæ tantundem, bulliant
in aqua, & exprimantur, deinde in dicta aqua maceretur mica panis, cui adde
vitelli ouorum. n. ii. cremoris sem. lini. & fœnu græc. ana 3. ii. olei ros. vnc. ij.
misceantur, & vtare modo iam dicto. Vbi verò prædicta non contulerint, san-
guinem ab ijs vacuare oportet hoc adhibito medicamento. ex olei de
chrysomelis, de sem. lini. amygd. amararum, ac nuclei persicorum ana 3. i. suc-
ci cæbæ, & ciclamini ana 3. ii. stercoreis columbini vnc. iij. medullæ, seu sepi-
ce ruini vnc. iij. cum pauca cæra fiat vnguentum. Vel fricentur dictæ hæmor-
rhoides cum fici folijs aut lineis linteis asperis, & crassis: & vbi hæc non con-
tulerint, aut ægri ferre nequeant, hirudines imponentur eisdem hæmorrhoi-
dibus: nam ex eis aperiri absque dolore consueuerunt, prout indies obserua-
mus: & vbi opus fuerit iterari debent: nam magnopere conferunt, vbi caute
adhibeantur. aperiunt item eas perdicij herbæ folia virida assidue attrita,
insuper & mercurialis trita & velut glans immissa, & fel bululum per lanæ
tomentum inditum Aeti. teste eodem lib. 4. cap. 6. vbi Vero appertæ fuerint
hæmorrhoides, si modicè ex eis profluat sanguis, adeo vt vires nequaquam
imbecilliores reddantur, eadem victus ratione vtendum, potissimum si san-
guis niger, & crassus fuerit, ac per certa intervalla fluere consueuerit: Neque
aliter eas suppressere tentandum, tum quoniam à multis liberant vitijs, vt
supra annotauimus Hipp. auctor. tum etiam quod si quis eas curare tentaue-
rit, quidam cum sanguinis exitum non haberent, inclinati in præcordia, ac

Victus ratio.

Sectio venæ.

Cap. 19.

Medicamenta
topica.Curatio hæmor-
rhoidum aperta-
rum.
Ratio victus.

viscera materia, subitis, & grauissimis morbis correpti sunt vt inquit Celsus præcit. loco. illi inquam, qui sanguinis profluuio imbeciliores non fiunt, quod insuper idem Hippo. decretum reliquit apho. 12. 6. libr. cum dixit, a diuturnis sanato hæmorrhoidibus, si vna non seruator, periculum est aquam intercutē, vel tabem aduenire. consuluit itaque Hippoc. in hac sententia iuxta Gal. expositionem, vnam saltem seruare hæmorrhoidem, vt per hanc vacuetur feculentia, ac vitiosa materia hepatis: præsertim in quibus solita est tempore longo per tales venas excerni, si quis eas sanare tentauerit, alias prædicta ab Hippocr. vitia superuenire periculum est. Actius vero illa Hipp. verba (Si vna non seruator) aliter exponit. Ait enim Hipp. noluisse quod vna hæmorrhoidis seruari debeat ad sanguinis excretionem, vt Gale. sentit. sed dixit, si vna non seruator, hoc est, si non adseruetur, id est si non conuenienti dieta vtetur post earum sanationem. Probat ex eiusdem Hipp. verbis in eodem aph. nam dixit hæmorrhoidas inueteratas sananti: est autem sanatio perfecta liberatio, & legitima curatio: Quare concludit ipse cum Hippo. quod non oporteat aliquā hæmorrhoidem relinquare, sed omnes excindere, & post perfectā curationē ipsarum, per conuenientem dietam ad naturalem statum corpus curatum reducere, incidereque cubiti venam tempore oportuno, quo videlicet coacervatus in corpore sanguis euacuatur, hoc itaque modo possibile est incolumes euadere, nulla penitus hæmorrhoida relicta. Atqui vera erit perpetuo Hippo. sententia quomodolibet fuerit intellecta: si quis enim hæmorrhoidas inueteratas sanare tentauerit, aut vnam ipsarum relinquare debet, aut si nullam penitus dereliquerit, præseruare eo modo detentos oportet, conuenienti victus ratione, ne talis succi copia gignatur, et si qua fuerit genita, venæ sectione statis quibusdam temporibus vacuare, præcipue ineunte uere. At si immodice sanguinem fundant, quoniam ex immodica profusione ad extremam frigiditatem hominem ducunt, ac sæpe aquam intercutem accersuerunt, vt liquet 2. de nat. facult. confestim vbi robur virium deliciatur, suppressæ sunt, simili propterea victus ratione instituta. quam cap. de cruentam spuitione precepimus) nisi quod vbi vires plurimum prosterantur facili concoctionis, ac multi, & boni nutrimenti tibi semper exhibeantur, cum quibusdam astringentibus permixti, similiter & in potu vinum astringens) si vires ferant, interna cubiti dextri vena incidenda erit reuulsionis gratia. Nam vbi cohibere voles hæmorrhoidas, quæ in brachio sunt venas secare conuenit Gal. auctor lib. de cur. rat. per venæ sectionem: quando videlicet veremur ne in tantam immoderationem hæmorrhoidum euacuatio euadat, vt nomen vel protinus interimat, vel aquæ intercutem obnoxium, aut cachecticum, hoc est mali habitus reddat. Quod si vires venæ sectionem non ferant, hypochondriis cucurbitulæ affigendæ sunt, manus item, ac brachiam vincienda, & frictiones asperæ eisdem partibus adhibendæ. Intra corpus interim quæ astringunt sumenda, vt syr. ex infusione rosarum, præsertim aridarum, & incomplerarum, myrtinus, miua citoniorum, è ribes, aut ex oxalidis succo, seu plantag. paratus cum eiusdem plantag. aut oxalidis aqua. et si non adeo extremæ imbecillitatis vires fuerint, sed mediocrem ferre possunt purgationem, redundantibus vitiosis succis in sanguine, (vt magna ex parte prouenire prospeximus immodicum sanguinis per hæmorrhoidas profluuium) purgans aliquod medic. propinandum erit, ex eis, quæ præterquam quod leuem habeant vim purgandi, talem vitiosum succum redundantem (quiuis is fuerit) facultatem insuper habeant astringendi quemadmodum sunt myrobalanorum tria genera. rhabar. agar. & syru. ex pluribus infus. rosarum rubearum: insuper & syrup. domini August. ex his poteris purgans medicamentum diuersimode componere pro diuersa ratione redundantis succi.

Sit autem eius quantitas virium robori potius, quàm quantitati humoris redundantis accommodaram, deinceps ad alia astringentia confugiendum, tam intus quàm foris adhibita. Intus sumenda cap. de spuitione cruenta requiras. Conducunt item si scrup.ii. lapidis hæmatitis tribuas cum vnc.iii. aut.iiii. poscæ, aut R. lapidis hæmatites scrup. i. radices symphiri, & althææ an. vnc. s. boli armeniacæ scrup. s. chiæ mastiches gra. iij. fiat puluis, qui cū vnc.ii. vini astringentis aut unc. iij. decoctionis aquæ sanguinaræ præbeatur. nec minus confert si 3. i. triphæræ saracenica, aut triphæræ Fœnonis dictæ aut theriacæ corporibus maxime frigidioribus, ac pituitosis, & melancholicis exhibeas cum vnc. ii. aut. iii. vini astringentis, aut si 3. i. trochiscorum de spodio, aut de terra lemina, aut de succino, calidioribus præsertim corporibus cum unc. ii. aut. iij. aquæ plantaginis aut acetosellæ propinabis. extrinsecus quoque ea adhibenda sunt, quæ sanguinem reprimere valent, vt inessus in aqua ex verbenis, Celso auctore, aut in aqua pluuiali fiat decoctum rosarum aridarum foliorum plantaginis, & myrtillosum, & in eo desiderat æger interim malicorium gallæ cytini, balauitium, & magna imminente necessitate, hyosciamus, alumen, papauer album, & nigrum quoque, si opus fuerit prædicto decocto adijciatur. In corporibus vero frigidioribus in vino astringenti prædicta decoquantur, aut saltem, permixto eo cum dicta aqua pluuiali, folia insuper, ac flores verbasci admisceantur. Quod si quis in eo desiderare non poterit, spongiæ in dicto decocto madefactæ, affectæ parti adhibeantur. ex iam dictis etiam saccelli parari poterunt, qui in vino astringenti prius irrigati admoueantur: vel infra scriptus puluis inspergatur, ac ligetur, qui recipit aloes 3. ij. corticum thuris 3. j. balauftiorum, sanguinis draconis, terræ lemnis an. scrup. i. gallarum, malicorij, & seminis rosarum an. 3. j. fiat puluis tenuissimus. Hoc insuper medicamento vti poteris R. succi plantaginis, sanguinaræ, & solani an. 3. ij. aloes, corticum thuris, terræ lemnis an. 3. ij. s. olei myrtini, mastichini, & rosacei an. 3. i. albuminis ouorum 3. vij. cæræ, & aceti, seu vini astringentis parum, fiat unguentum. Aetius præcitato loco tanquam mirum in modum sanguinem sistentia commendauit aloem, squamam ferri, aut plumbum vstum cum posca impositum. Inter cætera vero medicamenta, illud præstantissimum, ac vnicum existit, quod à Gal. describitur 5. method. medend. ex aloë, & thure, ouique candido compositum, adeo vt ad mellis crassitudinem deueniat: dein leporis mollissimis pilis excipitur, & vasis ipsis vnde sanguis profluit liberaliter imponitur. Quinimo, & toti vlceri, vbi ipsum circa vasa fuerit, alligaturque forinsecus fascia ex tenui linteo. Modum autem administrandi, ac ipsum diuersimode componendi, ex eodem loco studiosi petant. Illud tamen non prætermittam, quod in duris corporibus plus aloes immiscendum erit, in mollibus vero plus thuris vt ipse inquit. Oribasius cap. 18. lib. 9. hæmorrhoidas nimium apertas sistere inquit aloem illitam, aut dissolutam, & impositam, sistit etiā perfusio ex posca in qua ferri squama, plumbumque vstum sit vt ipse refert.

Quæ extrinsecus adhibenda.

Cap. 4.

περί γαργάρας.

idest de gargariis.

Cap. 77.

INter alia quoque multa, tardiusque plena mala, quæ sedes recipit: quod primum sepæ & pluribus locis in ea fit, cutis exciditur. Quod malum græci γαργάρας καὶ γαργάρας vocant, latini fissuras, seu rimas. Quæ quidem fissuræ, seu Rimæ non perpetuo sunt cum callosis labris, vt quidam recentiores sentiunt, sed tantummodo, cum diuturniores fiunt: tunc etenim indurantur, & callosa earum labia reduntur vt inquit Aetius cap. 3. lib. 14. Paulus quoque capit. 75. Rimas tum recentes, tum diuturnas, & quæ callum con-

A a 2 traxerint

Quid Ent Ri- me. traxerint meminit: quanquam de his quę in vulua, non autem in ano fiunt, loquatur, quare cutis sedis scissurę sunt. Rime, interim quoque cum alioſis labris morbus in ſolutione continui exiſtentes. fiunt vero quandoque in extrema ipſius inteſtini recti parte, quā Anum nuncupant. interim autem in musculo eundem anum aſtringente, ac claudente, quem σφιγκτηρα gręci nuncupant eodem Aetio auctore. Hoc malum adeo oculis conſpicuum eſt, vt aliis haudquaquam indigeat notis pro eius cognitione, tam ſi recens fuerit, et citra labiorum duritiem, ſeu callum, quā ſi diuturnum, adeo vt labra in duruerint & obcalluerint, ſeu callum contraxerint. Nec minus prompte pars, quę afficitur oculis obuiam ſit ſiue anus, ſiue musculus ipſum aſtringens ſeu claudens fuerit. Habent autem rimę non vnā duntaxat generationis cauſam, nam aliquando ex influentium humorum mordacitate, ac acrimonia conſiſtunt: interim ob inflammationem, aut condylomatū diſtentionem, circumſiſtę partes fiſſuram ſuſtinent. Si ex conſluentibus mordacibus ſuccis fiant, indicia eorundem aderunt citra condylomatū præſentiam: quinimo cum non aderunt condylomata, citra alia indicia, humores acres eſſe cauſam iudicabis. Quod ſi circa ſedem aliquod aderit condyloma, adeo in tumefcens, ac circumſiſtę partes diſtendens, vt cutis ſindatur, ipſum rimę cauſam eſſe non dubitabis: eſt autem condyloma, vt inquit Celfus cap. 14. lib. 6. tuberculum quod ex quadam inflammatione naſci ſolet, quanquam Paulus cap. 18. lib. 6. non quodlibet tuberculum inſequens harum partium inflammationem, ſed ipſum obcallescens condyloma appellauerit, vt qui manu ipſum curare intendebat: & propterea recens tuberculum, non condyloma, ſed abſolute tuberculum nuncupabat: Cum vero contraxerit callum, tunc condyloma appellari aſſerebat, tam ſi inflammatio, quā ſi rimę ipſum præceſſerint. Qua etiam ratione rimas ipſum præcedere fatetur, cum per rimas, eas ſedis fiſſuras intelligat, quę calloſa habent labra, & manus curationem deſiderant. Celfus vero tuberculum quodlibet ex inflammatione ortum, ſiue recens fuerint, & non dum callum contraxerit, ſiue diuturnum & obcallescens condylomatis nemine nuncupauit, nec minus & Aeti. cap. 3. lib. 14. per condylomata, quodlibet circa ſedem ortum tuberculum, tam molle, quā durum, & calloſum, tam recens, quā diuturnum ſignificari voluit, vt liquet ex eius verbis. Præterea ipſum fieri, cum ruga aliqua corporum in ano reduplicatorum inſurgit, ac præter naturam intumefcit, ſcriptum reliquit: nam cum ſinuofus ſit anus, coagmentatas habet rugas: Vbi vero earum aliqua præter naturam intumuerit, tunc ſane ſit condyloma, aliquando extra inflammationem exiſtens, molle: interim vero cum inflammatione durum, ac doloroſum: è ſimilitudine forte extremorum in pugno clauſo in quatuor digitis nodorum ſunt appellata condylomata. Quo ſit vt à thymis, qui in eadem parte oriri conſueuerunt, condylomata differant: nam thymi tuberculofa quædam eminentię ſunt doloris expertes, præter naturam auctę, aſpere, oblonge, ſubrubę, interim albicantis coloris, præſertim ubi manſueti fuerint, à cacuminibus eiufdem nominis herba in montibus naſcentis ſic appellatim: quę eminentię vbi paruę fuerint, thymi, vbi vero magnitudie excedunt ficus appellantur, eodem Aeti. auct. cap. 4. eiufdem lib. Quod autem rimę multi radii plena ſint mala, ex Celſo patet, eodem cap. 18. lib. 6. propterea vbi recentes fuerint, conſeſſim eas curare tentandum eſt, vt pote quę medicamentis cędant, nam cum protelatur earum cura, indurantur, & earum labra calloſa fiunt: quo tempore non amplius medicamenta, ſed chirurgiam adhibere oportet, vt inquit Aet. præcitato loco. Cæterum quod ſedis vitia omnia ob multas cauſas difficilem curationem accipiunt ſcriptum reliquit Galen. 9 de comp. med. ſecundum locos, quoniam & multo ſenſu particula hoc prædita

Cauſę rimarum

Cauſarum ſigna

Condyloma quid.

Condylomata unde dicta.

Quibus differat a thymis.

Thymi unde dicti.

Ficus quid.

Prognostica.

cap. 6. in pna.

dicta est, & propterea per acriora & austeriora pharmaca facile irritatur: præterea & ipse excrementorum alimenti transitus per se mordax est, & magis ubi eruperit bilis ipsa, & serosi quidam humores. Item quoniam neque statum tempus habent medici ad imponenda medicamenta, cum plerunque minime conuenienti tempore ægri ad excernendum concitentur, quia etiam humiditas, & caliditas eiusdem loci siccantibus, simulq; frigefacientibus opus habent, non parum confert ad hoc ut ægre curabilis ani affectio existat, siquidem mordent astringentia, locus vero subtilis sensu præditus acrimoniam ferre non potest: quod etiam confirmauit sub eisdem verbis Aet. cap. 1. li. 14. Pro earum itaque curatione vniuersa victus ratio ad humidum inclinans institui debet, & propterea, nec acribus cibis vtendum, neque asperis, nec aluum comprimentibus, nec aridum quidem quicquam satis vtile est, nisi admodum paulum ut Cel. testatur. Quapropter liquida, lenia, pingua, glutinosa meliora sunt ut ipse inquit. Vino etiam leni uti nihil prohibet, talis autem victus non propterea ita instituitur, quia talem exigit affectus: nam contrarium potius desideraret: Sed quoniam acria, aspera, mordacia, astringentia, & sicca aut mordaces succos generant, ex quibus rimæ, & earum dolor magis irritarentur ex eorum cum alui excrementis transitu, aut eadem saltem alui excrementa ob ea aridiora reddita suo transitu curationem seu conglutinationem impedirent: idcirco tali victu vtendum esse omnes præcipiunt. huius generis cibi sunt gallinarum, pullorum, fasianorum, vtulinæ, hianæ, & veruecinæ carnes elixæ præcipue earum iuxta pingua: malux item, spinachia, borrago, endiuia, cichorum, & ptisana si in eisdem iusculis decoquantur conferunt, similiter si oua recentia sorbilia tribuantur, & reliqui cibi cum butyro, & adipe anseris, aut gallinæ, ut lacte amygdalarum dulcium parati & huius generis reliqui: nec minus quies præcipienda erit eodem Celso auth. somnus concilientur, animi perturbationes vitent, præcipue immodicas aluus mollis seruetur, quæ si non natura, arte saltem mollienda clysteribus lenibus, & pinguibus: interim per ea, quæ ore sumuntur lenientia, ut pruna, vel casia fistula in parua quantitate, paulo ante cibum sumpta: Quo vero ad reliquam medicamentorum rationem, attinet, si rimæ ob confluentes acres, ac mordaces succos fuerint ortæ eisdem prospiciendum est, deinde ad topica confugiendum medicamenta. Quare eisdem præparatis, contemperatis, ac concoctis purgans medicamentum adhibeas: quod suapte natura tale sit ut tales humores ducat citra acrimoniam, ac mordacitatem, quin id & quoniâ cibis, ac etiam medicamentis semper vitare oportet, huius generis sunt mel aereum, manna appellant, Casia fistula saccharum viol. syr. e plur. infusi. ros. rub. vel vio. & interim syr. domini Aug. aut diacat. cum dictorum aliquo permixtum: Si vero propter condylomata acciderint rimæ, non minus inter initia eisdem purgantibus medicamentis utendum erit, & ubi eadem inflammata fuerit, vena prius secanda erit in cubito reuulsionis causa, & princeps purgans medicamentum adhibendum, nec non si opus fuerit vena in talo etiam incidatur, pro deriuatione simulatque euacuatione sanguinis in inflammatione contenti. Cæterum rimæ absque inflammatione quemadmodum & reliqua sedis vitia, ea medicamenta desiderant, quæ citra morsum, ac aspritudinem astringunt, ut liquet ex Gal. eodem. 9. de comp. med. sec. locos, cuius generis est infra scriptum vnguentum, quod recipit Cstruxæ, Argenti, spumæ ana 3. i. pomphol. lotæ 3. i. sem. ros. 3. ii. succi plantag. 3. i. vnc. ii. oui affati vitel. lū. vnum, adipis anseris 3. ii. excipiatur omnia cum rosaceo, & vtare, vel rasurâ linteolorum vrito eiusq; cinerem cum pari amylo tritum succo foliorum oleæ admixto, illinito ut scriptum reliquit Gal. Asclepiadis autho. eodem libr. 9. de comp. med. secundum locos, in vicem vero succi foliorum oleæ, plantag.

Cura tio.

Ratio victus,

Medicamentorum ratio.

Purgatio,

Vene sectio.

Topica.

cap. 6. circa fin.

cap. 7. in fine.

cap. 9. succo uti poteris, idem quoque Galen. lib. primo eiusdem Appolonij autho. tanquam optimum medicamentum approbavit infrascriptum ad anirugas intumescences, rimasque, ac fissuras sedis. ad ulceraque do lentia, & omnia alia, quæ ex fortiorum pharmacorum usu exacerbata sunt: etenim egregiè ea lenit etiam si serpendo exedentia, aut etiam cancerosa, aut quomodocunque maligna existunt: quo etiam medicamento cum sæpius usus fuerim perpetuo ingentem ex eo utilitatem provenire observavi. Componitur autem ex olei ros. aut myrtei, ut ipse inquit, hæmina, hoc est unc. viij. in pilam plumbeam infusa, & plumbeo pistillo tandiu agita donec crassum, & subnigrum oleum reddatur, deinde seorsum spumæ argenti lib. 1. & cærusæ tantundem terito, oleoque admisceto, & utere, prius tamen affecto loco eloto, & siccato, id quod fieri posset ex rosarum, gallarum, foliorum plantag. & rad. symphiti decocto in tribus partibus aquæ pluviæ, & una vini dulcis albi, & odoriferi, & ubi in gens, & ardens fuerit sedis dolor qui affati vitellum vino albo terito & cæratro rosaceo exceptum illinito ex eiusdem Galen. auth. eodem. 9. de comp. medicamentorum secundum locos. Aet. vero cap. 3. eiusdem lib. 14. magnopere commendavit hoc medicamentum, videlicet Resinam pinus siccam cum rosaceo terito, donec strigmentosa fiat, & qui affati vitellum admisceto, ac illinito, ex cuius auth. hoc etiam uti poteris. R. pompholigis lotæ, & plumbi vtri loti an. 3. ij. cærusæ & spumæ argenti an. 3. i. amyli, gumi draganti an. 3. i. thuris & radice symphiti an. 3. ij. omnia probe terito, & ad cæratum rosaceum admisceto, ac affectum locum illinito. huic etiam medicamento quandoque adijci poterit succi plant. vel centaurij minoris 3. i. seu alicacabi corticis radice 3. ij. interim aluminis scissi: & gallarum an. 3. i. Interim ex eo aliquid minuere licebit, prout magis, vel minus siccæ aut humidæ dolorosæ, vel citra dolorem magis, minusve profundæ fuerint iam dictæ sedis rimæ. Cuncta nanque prædicta medicamenta separatim, & coniunctim ab eodem Aet. commendantur, quæ item non minus condylomatis ubi recentia fuerint conferunt; non ut ipse dicebat in summa, perfusiones in condylomatis astringentes esse oportet, & medicamenta ipsorum astrictione quadam participare debent: Cum vero nedum condylomata ipsa, sed & rimæ diuturniores fiunt, indurantur, accallosæ fiunt, & proinde in prædictis medicamentis haudquaquam cedunt, chirurgiam desiderant, tam eorundem rimarum labra callosa reddita, quam iam dicta condylomata, (nisi medicamento ex carta vsta Gal. rosaceo potissimum dilato prius deficiantur:) quem curationis modum hic scribere non intendimus, studiosi vero petant ex Aet. præcit. loco, & Paul. cap. 80. lib. 6. quemadmodum & thimorū, tam si mansuerit, quam si maligni fuerint ac ficuum, & verucarum, seu acrocordonum curationem ca. 4. citati libri. 14. apud Aet. reperient, non admodum à prædicta dissidentem.

περί τοῦ ὑποπιντοῦτος ἢ τῆς προπτώσεως ἀρχῶν.

id est de procidente ano vel de proci dentia ani. Cap. 78.

Cela est ani
proci dentia.

Proter iam dictum musculum anum astringentem, ac claudentem, quæ græci σφιγκτηρα nuncupant, qui etiam eiusdem sedi transuersus circumiectus est, reliqui duo musculi a natura fabricati sunt obliqui quorum munus existit sedem ipsam sursum attollere, vtrinque vnus, inserti eiusdem sedi, nec in crebris, nec violentis alui deiectionibus, aliisque conatibus prompte sedes ipsa extra prolaberetur: quibus aliquando affectis contingit quandoque, ut & sedes foras procidat, quem affectum aut proci dentiam latini appellant Celso auctore capitu. 18. libr. 6. græci vero προπτῶσι ἀρχῶν ἢ

^{ἡ ἀποκρίσις τοῦ ἀνδρὸς} morbus siquidem in compositione existens, & proprie
 in situ: relicta enim sua propria sede anus foras prolabitur, adeo patens ocu-
 lis, ut aliis non indigeat indicijs pro sui cogitatione, nec minus & pars quæ
 affecta est. quoniam anus ipse, licet quandoque per se, interim per consen-
 sum afficiatur, affectis primo musculis ipsum sursum attollentibus: at afficitur
 per se & primo anus cum inflammatione tentatur, & adeo magna, ut sua gra-
 uitate cogat musculos ipsum attollentes cum contrahuntur, violenter disten-
 di: quo fit ut ipsi quoque muscoli saltem per consensum affecti sint, si ob hanc
 causam anus extra prolabatur, cum præter uoluntatem ipsi distendantur, ob
 inflammationis tumorem, ac grauitatem coacti. interim nullo proprio
 affectu laborans anus procidit ob resolutionem eorundem musculorum, aut
 ob quampiam aliam causam illos imbecillos reddentem, ita ut sursum retra-
 here ipsum iam foras prolapsum nequeant: quo casu dicimus non propter
 aliud anum affectum esse, nisi quod a propria exciderit sede ob musculorum
 aliquod uitium. Cæterum si ob inflammationem anus procedit, haud ægrè
 dignosci poterit, per inditia eiusdem inflammationis, dolorem inquam, tu-
 morem, tensionem, ac ruborem. Verum ubi citra inflammationem à pro-
 prio loco exciderit anus ob resolutionem, seu stuporem, aut imbecillitatem
 musculorum prouenire putandum est, quæ licet ex nonnullis causis externis
 & internis prouenire possunt, quarum facilis est dignotio, magna ex parte
 ex eorundem musculorum frigida & humida intemperie cum humorum præ-
 sentia, vel absque ea resolutionem, aut imbecillitatem pariuntur. Cæterum
 medici omnes conueniunt, facilius curari posse hunc affectum, si sine inflam-
 matione, quàm si cum inflammatione fiat: idem quod & iam si sine inflam-
 matione generetur, ut quam primum introducatur anus, ac curetur affectio
 conandum sit, ne temporis diuturnitate, structura mali inueterata iam adustio-
 nem peruenire oporteat: quanquam hanc partem minuere haud magnope-
 re periculosum existat, cum extremitas hæc intestini recti pars principalis
 non sit, quinimo dum oritur, & secatur nullum periculum inducit, ut in-
 quit Aet. cap. 8. lib. 14. Cum primum itaque anus procidit, considerari de-
 bet purum ne id sit, quod prouolutum, an humore mucoso circumdatum ex
 Celsi auctoritate præcitato loco: præterea cum dixerimus, & cum inflam-
 matione, & citra eam contingere, id quoque exacte dignoscendum erit: nam
 si anus nulla tentatur inflammatione, nec humore mucoso fuerit circunda-
 tus, illico intro reponendus erit, ac in pristinum locum restituendus, id
 quod digitis leniter, ac sensim ipsum retrudendo, fieri potest, prius tamen
 in aqua desidere homo debet, aut salsa, aut cum verbenis, vel malicorio inco-
 cta, decreto eiusdem Celsi, aut abluatur anus ex decocto foliorum myrti,
 malicorij, rhu obsonorium, rosarum gallarum, balaustrorum, acaciæ, &
 hypocistidis in aqua, vel vino astringenti, ubi potissimum humidior fuerit
 anus, deinde aridus inspergatur puluis, ne repositus iterum excidat. R. fo-
 liorum rosarum, & mirtillorum vtriusque 3. iij. sem. ros. & cornu cerui vsti
 sing. 3. i. rhu obsonorium 3. i. thuris 3. i. s. fiat puluis. Vbi vero multo mucoso
 humore anus circumdatus fuerit, tunc potissimum in aqua salsa æger desidere
 debet, aut vino austero abluendus, ac detergendus anus erit, in quo etiam
 si opus fuerit, gallæ, myrrha, cupressi pilulæ, ac pinus cortex incoquenda
 sunt, deinde infra scriptum aridum medicamentum inspergere licebit, ex myr-
 rhæ, thuris ana 3. iij. pilularum cupressi aluminis, gallarum ana 3. i. s. cærusæ, se-
 minis rosarum, rhu obsoniorum ana 3. i. fiat puluis. poteris & medicamento
 Galeni, auctoritate Asclepiadis vti R. gallæ omphacinæ malicorij sicci, rhois
 coriarij singulorum 3. ii. plumbi vsti 3. iij. spumæ argenti 3. viij. trita insper-
 gito, vel hoc alio eiusdem R. corticis pinus, spumæ argenti, mannæ sing.

Quis affectus
 præternaturalis
 Pars affecta.

Causæ.

Causarum signa.

Prognostica.

Curandi ratio.

Curatio proci-
 dentis sine in-
 flammatione,
 Topica reme-
 dia.

Lib. 9. de cõpo-
 med, sec, loc, c. 6

Loco citato,

Curato loco,

De pueris nota,

Curatio prouidentium inflammatione.
Venæ sectio,
Topica,

Ratio uisus,

3.ii.pilularum cupressi aridarum 3.ii. plumbaginis 3.ii. trita insperge, ubi praelaueris vino acerbo: itidem & hoc etiam utare eiusdem auctoritate R. ba-
laustiorum 3.i.malicorii 3.ii.sem. hyosciami 3.ii. cærusæ 3. viii. myrrhæ 3.ii.
plumbi loti 3.ii. tritis utitor, nec minus & reliquis ibidem 9. de compo-
sitione medicamentorum secundum locos descriptos medicamentis uti poteris.
Iuuat item ut inquit Paulus cap. 60. lib. 3. urina ipsius ægri calens adhuc su-
perfusa. Aetius tanquam proprium ipsius medicamentum commendat præci-
tato loco, infra scriptum, quod recipit fructus hericæ, gallarum, acaciæ, cæ-
rusæ succi hypocistidis, corticis pini, myrrhæ, thuris æquales partes, siccas
insperge inquit, ubi vino austero sedem prius laueris, licet a Galen. eodem 9.
de compositione medicamentorum secundum locos prius Asclepidis aucto-
ritate fuerit descriptum, & a Paulo similiter loco citato, subinde vero cum ta-
liter repositus fuerit anus, ne denuo excidat, probe deligandus erit, cruribus
etiam inter se deuinctus, ut inquit Celsus, id tamen animaduertere oportet,
quod in pueris si contingat hic affectus, astringentium usum remittere oportet,
& mitiora adhibere ex Aetii decrero. Ad hæc quod ubi urgeat, ita ut
iam dictis medicamentis non cedat affectio, etiam lumbis astringentia ca-
taplasmata imponenda sunt, ex palmulis, malis cotoneis, & similibus eiusdem
Aet. auctoritate, & sedi etiam similia. at si propter inflammationem prolap-
sus anus intro reponi non valeat, eadem prius curanda erit, venæ sectione
prius adhibita in cubito &, si opus fuerit etiam in talo, præsertim ubi in ge-
neratione fuerit, ac plenitudo adsit. Sed quoque potissimum apponenda in-
ter initia, quæ leniter altringunt ut oleum rosaceum tepidum, deinde pau-
latim chamæmelinum, aut anethinum adiciatur, aliaque apponantur medi-
camenta leuiter digerentia, ac etiam sedantia dolorem, in quem usum con-
fert desidere egrum in aqua calida, in qua malux, & althææ folia fuerint
decocta, aut flores chamæmeli, foenum græcum, fertulæ campanæ, semen
lini, & anethum: At si nolit in eandem aquam descendere, spongiæ madesa-
ctæ in prædicto decocto sepius adhibeantur, & deinceps oleo chamæmelino,
aut anethino, & rosaceo inungatur anus, atque aliquo prædictorum arido-
rum medicamentorum inspergatur: eligantur autem, quæ minus calida &
minus astringentia ac mitiora fuerint, ligeturque ut supra postquam intus re-
positus fuerit, ne iterum procidat. Victus ratio ubi adsit inflammatio, qua-
lis in reliquis inflammationibus fuerit instituta, præcipiatur, si citra inflam-
mationem contingat affectus hic, victus sit boni succi, & vinum detur aquo-
sius ut refert Aet. præcitato loco.

περί καλινῆς διαθέσεως. id est de colico affectu, seu

coli dolore.

Cap. 79.

Lib. 3. c. 43.

Quæ pars affi-
ciatur in coli do-
lore,

Est aliud vitii genus, quod in laxiori intestino (a græcis colo nuncupa-
to)igni consuevit, a Paulo καλινὴ διαθεσι nominatum, a latinis ve-
ro colicus affectus, seu coli, uel colicus dolo. Quanquam Celsus
morbum intestini plenioris eum appellet cap. 14. Vulgus autem medi-
corum colicam. Vtunque tamen affectus hic ab ea, quæ afficitur parte deno-
minationem assumpsit, intestino uidelicet colo dicto, quod quidem in hac
affectione oblatum est. Cuius affectio dolor existit. Verum quoniam ipsius
partis affectus, ac affectus signa adeo inter se confusa sunt, ac permixta, ut ne
unum fere sit quod unum tantum significare possit altero excepto. Sunt uero
& eadem numerosa quidem, licet non ex eiusdem exacta haberi possit notitia,
sed artificiosa potius quædam coniectura, ut patet ex Gal. 12. metho. meden:

Propterea

Propterea eadem enarrabimus signa, sic confusè, vt ex eisdem, tum partis affectæ, tum ipsius affectus notitia coniectura quadam, artificiosa tamen (vt diximus) haberi possit. & quoniam diximus eiusdem laxioris intestini affectus dolorem esse, qui in quoniam præter naturam affectum genere reponatur, dictum à nobis est cap. de dolore capitis: Propterea percipi potest primo affectus hic vehementissimo dolore in intimo ventre terebro perforanti simili, aut per quem palus videatur in dolente loco infixus, vt 2. de loc. affect. patet, aliaque apparebunt symptomata, quæ ad affectum iam dictum intestinum pertinent. Nam protinus inflatio quædam, & extensio, & flatus complures, & tormina, ac excrementa, si ab aluo deijciuntur flatibus plena videbuntur. Ea autem discernere licebit, si super aquam natent, ac bubulo stercore simulentur. Quinetiam, vt inquit Gal. eodem 2. de loc. affect. cibi tum cupiditas, tum concoctio deterior euadit, & præsens, & præcedens, & quæ sequitur. Accidit etenim in hac affectione, & ventriculū malè affici, vt qui parti primario affectæ continentur adhæreat. Insuper & eisdem colicos nominatos affectus magna ex parte præcedit, & cruditas, & spiritus flatuosus, & vomitus & nausea, quæ multo tempore inanis permanet, nec non in præcordiis mordacitas, fastidium, & indigentia plurima, vt ibidem ex eodem Galen. patet. Et quoniam ab ea parte, qua dolor sentitur, nullum indicium sumi potest, qui magis color, quam tenue intestinum dolor afficiat, licet minor sit, qui in tenuioribus consistit: propterea quo modo interstinguendi sunt sequenti cap. docebimus. Nunc autem eo quod hæc eadem doloris species euenire potest cum lapis in renibus, aut vrteris fuerit impactus, quod quidem discerni non potest, nisi quis accidentia, quæ postea consequuntur, expectauerit, eodem Gal. auctore. 2. & 6. de loc. affect. Quo fit vt nedum vulgares, verum etiam, & peritissimi medici decipi soleant, adeo difficillis est ab initio horum affectuum distinctio, quemadmodum & ipse Gal. deceptus fuit, qui credens se à calculo in altero vrterum impacto dolor affici, iniecto ei ru taceo oleo, simulque cum eo grauissimo cum dolore excreto humore vitreo (a Praxagora appellato) statimque dolore sedato, cognouit, neque lapidem fuisse causam, neque in vrteris, aut renibus locum fuisse affectum. Sed in intestinis potius præcipue verò crassioribus. Ea de re quibus indicijs, & quomodo hi affectus interstinguere poterunt, hic conscribam. Quamuis ob huiusmodi ignorantiam circa doloris potissimum initium, quantum ad doloris mitigationem attinet, nullam laboranti noxam inducamus, si iisdem medicamentis utamur. Siquidem vtriusque doloris præsidia omnia communia sunt, & quidem calorifica imprimis, siue ea extrinsecus adhibeantur, siue iniiciantur. Tempore vero subsequente oportet diuersa auxilia adhibere, vt eidem Gal. præcitat is locis visum est. Symptomata itaque quorum magna est in ijs affectibus copia diligenter intueri oportet. Nam in colli dolore sæpè numero dolor veluti circuire videtur, atque plurima loca occupare, qui modo in hac modo in illa parte vehementior sit. Nephritici vero dolores eodem in loco stabiles iugiter infestant. Quod si dolor in loco fuerit renibus altiore, manifestum colicæ indicium portendit. Quanquam si vno loco vbi scilicet renes ponuntur, stabilis constiterit, nihil ad notitiam potest positus ipse conferre, & proinde aliæ notæ considerandæ sunt, nam & nausea, & vomitus multò grauiores, & magis assidui aderunt dolente colo, euomuntque ita laborantes & biliosa, & pituitosa quædam, atque corrupta, quibus præassumpti quoque cibi aliquid admixtum videtur, ac retinent etiam magis excrementa, vt nec flatuū quidem, neque ructum excernere possint. quæ omnia vt Gal. inquit eodem 6. de loc. aff. colicis duntaxat euenire solent, sed alia quidem magis, alia vero minus. Insuper & colicorum cruciatus multo magis, quam nephriticorum lenientibus

Cap. 7.
Signa affectuū
partis affectæ.

Ca. 5. in medio.

Loca citato.

2. de loc. aff. c. 5.
6. de loc. aff. c. 2.

Quibus signis
coli dolor, a re-
num dolore ex
calculo, distin-
guatur.

Cap. 2.

Cap. 5.

Locis citatis.

Coli doloris
causæ,2. de loc. af.
citato loco.
12. meth. c. 7.
& 8.

Cap. 7.

Si a pituita fiat
coli dolor signa.Si ex spiritu fla-
tuoso signa.Si ex inflamma-
tione fiat, indi-
cia.Ex acris mor-
dacesque, suc-
cis si fiat, signa.

lenientibus mitigantur clysteribus, & si quid ab aluo deiciatur (vt diximus) id flatuosum quodammodo est, & sæpenumero aquæ supernatare consuevit similem habens bubulo stercore consistentiam: quemadmodum si lapis dolorem excitauerit, ipse interdum solus interdum vna cum cruore excernitur, maxime si vel asper, vel acutus fuerit. Ac si postea vrinas inspexeris, sabulosa quædam subfidere inuenies, licet nephritici ab initio difutas, purasq; reddant vrinas; quo fit, vt nephritici cum vrina lapide exeunte a dolore liberentur. Verum si in cole affectus constiterit, neque lapis, neque cruor, neque arena sed humor aliquis pituitosus, ac crassus subfidere videbitur, vt idem Gale. vi- sum est præcitato lib. 2. de loc. affect. & licet coli dolores vehementes dextra magis parte eueniant, omnino negandum non erit in sinistra quoque partem eos gigni posse, cum colon ipsum à dextris partibus, quas græci *χαρόνας* nuncupant, ad sinistras cinctura modo deferatur, Paulo auctore. cap. 43. lib. 3. & adeo ab infernis sinistris partibus ad superiores dextræ reuertitur, donec sæpenumero, & lienem, & iecur attingat, atque etiam ventriculo continen- ter adhæreat, Gal. teste cum 2. tum 6. de loc. affect. Quanquā & id sæpius pro- priis oculis inspexerimus in anatomicis nostris administrationibus. Dolor hic colicus plures ob causas oboritur, vehementissimum quidem licet inter- dum mitior fieri possit quemadmodum is, qui in tenuibus consistit intestinis, cum videlicet à leuiori causa fit veluti eodem 2. de loc. affect. liquet, præ- cipuas tamen quatuor habet internas causas, quemadmodum 12. meth. med. a Gal. scriptum est, & a Paulo cap. 43. lib. 3. Hæ nanque sunt, quæ potissimum vehementer calfacientes, vel refrigerantes, vel substantiam diuidentes coli dolorem excitant, citra quæ dolor, neque in una parte generari potest, ut li- quet eodem 12. meth. med. sunt autem hæ quatuor causæ crassus, pituitosusq; humor cum intra coli membranulas subfidet, spiritus crassus, ac flatulentus præter naturam in colo retentus qui nec illinc transmitti potest: vel inflam- matio, cum iam dictum intestinum male habeat: aut acris mordaxq; succus ipsum infestans, ac vehementer affligens. Percipiunt autem, si humor crassus ac pituitosus coli dolorem excitat quoniam ii per totum abdomen in alto excruciantur, ac intestinum ipsum pertundi, seu perforari quasi sentiunt. Tor- mina quoque affligunt, ructus, nausea, vomitio cuiuslibet humoris, sed pitui- tæ potissimum. Aluus grauius impedit nihil reddit, ac ne spiritum quidem transmittit. Stercus etiam quandoque excretum bouino simile videtur leue, & flatus plenum. ex Pauli testimonio præcitato loco præcessitque continuus ciborum quam maxime frigidorum, crassique succi vsus satietas, cruditas ocium, & id generis similia (vt ipse inquit) grauiusque dolorem hunc irrita- bant frigidiores cibi, ac potus assumpti, Veluti ex contrariis sedari percipi- es. aut saltem mitiorem fieri cognosces. At si ex flatuoso spiritu coli dolor fiat, tensionem magis experiuntur laborantes, atque rugitum sentiunt, præ- cessitque flatus generantium ciborum, ac potuum vsus, Velut sunt olera, & fructus, aqua frigida, & reliqua huiusmodi. Si vero ab inflammatione coli dolor excitetur, interdum quandam feruorem egri sentient, aderitq; febris non ignaua, vrineque retentio, simul & stercoreis, pulsus iuxta ventrem mole stabit, similiter sitis, ardor, nausea, bilis potius uomitiones, quæ nihil leuant malum vrgebunt. At si acres, mordacesq; succi coli moueant dolorem, sicut eos, qui propter inflammationem eundem experiuntur, sic etiam hos ardor sitis, & vigilia torquebunt, sed minus ac illos. Immo & febriculæ aderunt vrina reddetur acris, & biliosa deicient, ac sæpe & alui deiectio maiorem excitabit cruciatum grauiusque irritant calidiores cibi, potusq; assumpti, ex eiusdem Pauli sententia. Veluti à contrario magnopere iuuantur ex contra- rio tum cibo tum potu. Id autem magnopere attendendum est pro huius affe- ctus

ctus dignitione . Nam agnitione affectuum, quæ ex coniecturalibus notis incipiunt, cum eorum, quæ profunt, obsintque cognitione sunt coniunctæ, Galen. auctore eodem 12. metho. meden. Inter omnes vero colicas affectiones ea, quæ ex inflammatione ortum ducit est grauissima, Paulo teste, vt quæ in ileum transitionem minetur. Vehementissimi quoque coli dolores periculosiores sunt, quàm mitiores, vtpote qui à leuioribus causis fiant, Galen. auctore 1. de loc. affect. & vbi non omnino excrementa detineantur, neque in vna ipsius coli parte fixus dolor sentiatur, adhuc minus periculosus erit coli dolor: Similiter & minus minatur periculum cum clysteribus iniectis aliquod excrementum deiciatur, aut si atuosus quispiam spiritus, ex qua deiectione dolor leuetur, quàm si nec quicquam per eos excernatur, nec dolor leuetur. Alexan. vero cap. primo libr. 10. sic de colico affectu scriptum reliquit: Quod grauis quidam morbus, & dolorificus sit, ac vehementes cruciatus inducit, quia intestinum colum dictum densum est, crassum, & neruosum, ac nihil, quod in illum confluit, facile discuti possit, queamodum in tenuioribus intestinis. Huius affectionis curatio pro causarum diuersitate variari debet. Nam si ex crassis sentisque succis excitetur, In vniuersum (Aetio auctore capitu. 30. lib. 9. cuncta, quæ colicis exhibentur, attenuatoriæ diætæ esse debent, & propterea (vt Paul. inquit) victus ratio utilis erit calidior, ac sicior. Talis ergo qualitatis aer eligatur. Et quanquam per initia morbi a cibo abstinere melius sit: nam nisi finito tormento, recte, neque cibis, neque potio assumitur, vt Celsus præcitato loco testatur, Deinceps tamen illi offerendi sunt, qui boni succi, ac concoctu faciles existunt ita vt facietas, cruditasque vitentur, vt Paulus refert. cum quibus acria quoque assumi possunt, ac reliqua, quæ vim habent extenuandi, & incidendi. Sit itaque panis, neque aridus, neque calidus, vt inquit Aetius, in clibano coactus, aut si is non adsit, in furno. Ex carnibus conueniunt imprimis vlcrium, secundo loco piscium quorundam, vt eorum, qui in petris degunt, tertio ordine terrestres carnes habent: In quorum genere omnia in consueta reprobanda sunt vt patet ex eodem Aetio: Consueta vero eligenda. Quare ex volucrum genere gallinæ omnibus præstantiores sunt, deinde perdices, turtures, columbæ iuuenes, ac phasiani, fugiendaque sunt omnia, quæ in aquis degunt, tanquam graueolentia, & quæ superfluitatibus multis abundant, hædine quoque carnes, & vitulinæ ex quadrupedum genere exhiberi possunt, & paucae quædam ex syluestribus feris, varietatis gratia. Inter olera, fœniculo, apio, asparago, ac oreo selino vri conuenit. Verum ea non cruda, sed cum prædictarum carnum iure decocta. In quo insuper decoqui poterit exigua quantitas samplici, serpylli, satureiæ, thymi, pulegii, aut origani: præsertim si febris absit, quo iure duntaxat a iam dicta causa colicos imprimis saltem diebus nutrire consueui: Leguminum vsus vitari debet, prisana excepta, quæ cum lapacho in ea coliquato commoda existit: vt Aetius refert, aut vice lapathi satureia, serpyllo, vel hyssopo, vel prædictorum aliquo vtare: Prædictorum autem in ciborum quantitas moderata existat, ne venter in multis cibis conficiendis fatigetur, carnes præterea, ac piles elixari potius, quam tosti præbeantur, ne siccitas excrementa apprehendat, iucunditatis etiam, & gratificandi stomacho gratia vua alba, ducis, præ ariditate corrugata cum pane præbeatur, Aetio auctore, ac ficus maturæ cuticula auulsa, porra item, allia, ac cephæ exhiberi poterunt: maxime iis qui talibus non offenduntur, vt Paulus inquit. Inter hæc vero allium si cum pane comedatur, somnopere a Galen. 12. metho. med. commendatur: præsertim vbi dolor intestinorum citra febrem fuerit, cū ipsum ex eorum ciborum genere sit, qui & flatum discutiunt, & maxime sitim generant: & propterea ipsum agrestium theriacam appellabat. Vinum pro

Loco citato.
Prognostica,
cap. 5.

Curatio si ex
crassis ac lentis
succis excitetur
coli dolor.

Vide in iis.

Cap. 8.

potu

Medicamentorum ratio.

Cap. 8.

cap. 8. Clysteres.

2. de loc. af. c. 5,
12. meth. c. 8,
cap. 8.

potu sit subastringens, album, tenue, perlucidum, mediocri ætate, temperatura diluio, modiceque bibatur, ut ex Aetio liquet. Quod si sitis a cibo accedat, aqua calida præbeatur, infensissima enim ipsis frigida existit, ut ipse inquit: similis quoque de reliquis entibus non naturalibus (quorum consulto ut breuitari indulgeamus non meminimus) ratio habenda erit, ut videlicet, attenuent, calfaciant, ac exsiccent. Quo vero ad medicamentorum rationem attinet, illud primum animaduertendum, quod licet eis utendum sit, quæ simul incidere, & concoquere crassos humores ualent, id quod attenuantia medicamenta præstant, ea tamen vehementer calida esse non debent immo quæ valenter excalfaciunt, vitare omnino oportet. Quippe cum lenti omnes, crassique, & frigidi humores ab iis, quæ calfaciunt, nihil etiam valenter digerant, liquantur, ac in flatum mutantur. Quo fit ut à nullo in huiusmodi succis tam sit metuendum, quam a calore, qui eos liquet, atque in flatum uertat sed digerere non valeat, Galen. aucto 12. metho. medend. Horum quoque ipsorum ea maxime deligenda sunt quæ magis flatum pisciuntur, magisque siccant, similiter alienissima sunt, quæ torporem inducunt, cauendusque magnopere in huiusmodi affectibus eorum usus, ut patet à Gal. ibidem cum neque huiusmodi succos committeretur (modo soli sint) dolor vehemens. At si ex accidenti aliquo coniunctus his sit altuosus spiritus grauissimis omnino doloribus, qui ita se habent cruciantur, sed nec propterea quæ torporem inducunt, tribuenda sunt. Nam licet ad tempus quidem, qui tale medicamen biberunt, prorsus indolentes reddantur, affectus tamen is omnino fit maior. Nam & intestinorum tunica medicamentorum frigiditate densiores munusque flatui transmittendo habiles redduntur, & humor ipse tum crassior tum admotum ineptior euadit. Itaque & spatium longiori ad ægri curationem, & medico, qui egregie in arte sit exercitatus, est opus, ut idem met faretur Galen. eodem loco. Nisi enim certa ratione postmodum curatio nem egreditur, verendum erit, ne succi secundo in flatuosum spiritum versi, eundem dolorem renouent, unde rursus stupefacientium aliquid medicamentorum exhiberi sit, opus, eadem scilicet necessitate urgente, ac pari modo tertio, & quarto, & sæpe deinceps, quoad homo insanabilis effectus in malum totius corporis habicum perueniat, & post longa tandem tædia pereat. Et propterea qui generosi animal, fortesque sunt, si mediocri utuntur victu tutius longiori in tempore percurantur, quam qui valenter calefacientibus, aut etiam torporem inducentibus medicamentis utuntur, ex eiusdem Galeni sententia. Quanquam ubi vehementissimus fuerit dolor, qui aliis medicamentis mitior fieri non potuerit, iis, quæ mediocriter leniunt, ac dolorem mitigant, non antem, quæ valenter stuporem inducunt, uti licebit; nam ea omnino vitari oportet, ex Pauli testimonio. Id quod, nec etiam negauit Galenus eodem 12. metho. med. ubi præsertim febris quoque ad sit. Verum quæ, & qualia esse debent hæc medicamenta, infra docebimus. In principio itaque statim congrui iniiciantur clysteres ex communi oleo, etenim Paul. auctore, sæpe vitream simul cum fæcibus pituitam expulit, ac dolorem subito finiuit talis, clyster, aut ex eodem oleo, in quo prius fuerit decocta ruta, seu semen aliquod quod flatum dissipet. ex Gal. sententia 2. de loc. affect. & 12. metho. meden & Paul. præscirato loco, liquato prius in prædicto oleo adipe anserino. In cuius penuria gallinaceo utendum. Curandumque imprimis est ut expers sit salis, nec admodum vetus. ut patet eodem 12. method. medend. Nec minus, & clysteres parari possent ex oleo chamæmelino, vel anethino, cum eodem adipe anserino, seu gallinaceo, aut etiam recenti butyro, quod si neque ex iis dolores remittuntur. Conducunt mirifice in hunc modum clysteres parati, Recipe foliorum maluarum, althææ, mercurialis, & betula, ana manipulum

manipulum i. anethi, rutę, foliorum chamęmeli, fęnugręci, & semini lini, singul. manipulum s. anisi, fęniculi, & cumini, ana 3. ii. fiat decoctum in aqua fontana, cuius per colum transfusi, accipe libr. i. vel libr. i. s. mellis rosacei vnc. ii. olei chamęmelini, anethini, vel rutacei vnc. iiii. salis communis 3. iiii. diacath. 3. vii. aut confectionis de dactylis 3. iiii. vel hierę picrę simplicis vnc. s. & fiat clyster. interim vbi hęc non suffecerint benedictę, vel hierę picrę composite 3. iiii. adlicere poteris. Nec minus etiam confert, si vnc. i. adipis anserini, vel gallinacei, aut recentis butyri addas. Quod si ob doloris vehementiam etiam clysteres non retinuerint, glans aluo demittenda, ex Pauli decreto. Componantur autem ex melle probe decocto, cummino, semine fęniculi, ruta, hiera, sale gemma, & agarico, hunc in modum. Mellis costi excipe ad sufficientiam, pulueris hierę ex septem rebus, agaricis, & salis gummx, singul. 3. i. foliorum rutę 3. ii. fęniculi, & cumini ana scrup. formantur glandes longiusculę digitorum fere sex, eiusdem Pauli testimonio. Hoc etiam tempore fomentum siccum ex milio adhibendum est, Gal. teste eodem 12. method. med. Vel ex milio, fursure, chamęmeli floribus, meliloto, fęnugręco, lini semine, & anhero sacculi componantur, & incalcraftis lateribus, vinoq; albo irroratis prius calsiant, & applicentur. Fotus item mirifice conducunt, si ita fiant. Recipe foliorum, radicum althęę, & maluarum ana P. i. florum chamęmeli, fęnugręci, seminis lini, anethi, meliloti singul. manipul. s. anisi, cumini, & seminis fęniculi ana 3. iiii. bulliant in hydrelęo, & cum spongiis, dolentibus partibus applicentur. Insuper & infessus valde vtilis sunt ex decocto fęnugręci, althęę, & chamęmeli, artemisię, anethi, lauri, & similibus (vt inquit Paul.) Item in oleum calidum, aut hydrelęon descendere alienum non est, vt ipse refert. A balneo vero bibant absynthii, & cumini æqua proportionē decoctum, quo etiam tempore vinum absynthites conuenientissimum ad colicos pharmacum existit, si pręlibatione, a balneo, seu exercitio, opus habeant, estque eis non sitientibus valde commodum, si cyathi temperati mensura ante aridorum ciborum comestionem accipiantur, vt inquit Aetius. Conferunt non minus quoque cataplasmata, & illitiones, vt Recipe foliorum, & radicum maluarum, & althęę, ana manipulum i. farinę seminis lini, fęnugręci, & millii cuiuslibet unc. s. anisi, seminis fęniculi, & cumini, singul. 3. ii. misceantur, & cum oleo anethino, chamęmelino, aut rutaceo, & oxymelite fiat cataplasma. Illitiones ex eisdem fiant oleis adiecto butyro recenti, aut adipe anserino, seu gallinaceo, & interim fęnugręci, aut seminis lini, seu althęę cremore. Vomitus præterea, si quis facile vomat, ante cęnam præ omnibus auxiliatur, Aetio teste. & si dolor non conquieuerit, propinandum erit ipsis medicamentum diatriopipereon vel theriaca, vt inquit Paul. Et vbi pituita fuerint extenuata (eodem Paul. auctore) purgante medicamento utendum, hiera præsertim. Illud idem confirmat Aetius, dum dixit. Post dies vero septem purgatio ex hiera Archigenis suscipiatur. Poteris autem purgans medicamentum hunc in modum componere: k. pulpę casię recentē tractę vnc. i. s. diacath. 3. 7 pulueris hierę simplicis 3. i. s. fiat bolus. Vel sic Recipe confectionis de dactylis 3. iiii. pulueris hierę simplicis 3. i. pulpę casię recentē extractę vnc. i. vel vnc. i. s. fiat bolus, Aut vnc. iiii. excipe tyr. de tribus infusionibus rosarum (quas damascenas vocant) & 3. iiii. diaphinicon. aut 3. 7. diaca. & cum aqua borraginis, & absynthii fiat potio. Verum vbi dolor adhuc vehemens fuerit, neque ex iam dictis remissus sit, iterum ii. quos supra monuimus clysteres ex oleo, & adipe confectos iniciendi sunt adiecta etiam num castorei, & papaueris succi vtriusque fa- be non amplius magnitudine, ex Gal. præcepto eodem 12. meth. med. Tu autem minori quantitate tutius vti poteris, vt pote ciceris magnitudine.

Glandes.

Fomenta.
Loco citato.

Sacculi.

Infessus.

balneum.

Aet. lib. 9. c. 11
Cataplasmata.

Illitiones.

Vomitus.
Lib. 9 c. 30.Aet. loco citato
Purgans medicamentum.

Loco citato.

dat

Si ex spiritu fla-
tuoso fiat.
Curatio.
Cap. 8

Cap. ult.

Coli doloris ex
inflammatione
orti curatio.

Venæ sectio.
Loco curato.

cap. 8.
Clysteres.

dat etenim & eodem loco Gal. medicamentum quod ex castoreo, & pa-
paueris succo conficitur, ad oculorum, dentium, ac etiam aurium dolores, si
idem auribus instilletur, & Paul. ex castoreo pastillum approbat in coli do-
lore ex crassis, ac frigidis, & lentis succis orto. Vbi is vehemens fuerit ne dum
per inferiores partes, ac aluum inditum, sed etiam potum. In quem etiam
vsum in præscriptis clysteribus papaueris capita, folia item solani, aut etiam
hyoscyami simul cum aliis iam dictis decoqui possent, perpetuo tamen (vt
diximus) ea quæ valenter stuporem inducunt cauentes, propter superius assi-
gnatas causas. At si flatulentus spiritus doloris auctor fuerit, eisdem quoque
medicamentis vtendum erit. Nanque similis est eorum omnium curatio tã
scilicet si ex crassis, glutinosive, aut frigidis succis quam si ex flatuoso spiritu
dolores excitentur, vt patet eodem 12. meth. medend. Poteris tamen tam cly-
steribus, quàm reliquis medicamentis extrinsecus adhibitis ea, quæ magis fla-
tum discutiunt, permiscere, ac eorum quantitatem augere, vt cuminum, ani-
sum semen fœniculi, pulegium, origanum, chalamintham, fursur, milium, ca-
reum, daucum, anethum, & similia. Insuper 3. i. dianisi, aut diacumini, seu
diacalamintha cum paucò vino albo præbere poteris. Propriam tamen cu-
rationem quandam sortitus est is dolor, qui spiritum flatuosum comitantur
ex cucurbita scilicet eum lamma copiosa subinde admota, quemadmodum
à Gal eodem 12. meth. med. decretum est, Videbiturque tibi) vt ipse inquit
præsidium hoc in huiusmodi affectibus incantamenti cuiusquam simile quid
efficere, siue intestinis, siue in quavis corporis particula fuerit excitatus, li-
lico enim cucurbita admota, qui spiritu flatuoso cruciantur, tum a dolore li-
beri, tum omnino sani reduntur. Quos vero non spiritus modo flatuosum,
sed etiam humor quispiam, vnde is oritur, male habet, iis illico ad tempus
dolor sedatur, redit tamen vel insequente nocte, vel postridie, vel etiam ter-
tia die similis dolor, ac potissimum vbi in victu aliquid deliquerint, aut im-
portunius particulas excalfeceant. Tibi vero hoc quoque maximum indi-
cium affectus erit, ac curationem pro ratione prosequeris, nec impense par-
ticulas excalfaciens, extenuatoria curationis ratione vtens, vt dictum est, do-
lore tamen prius per cucurbitulam sedato, cum per eam ventosus digeretur
spiritus. Vbi autem inflammatio intestinum exercet, victu tenui vtendum erit
ac febricitantium proprio, quousque inflammatio discutiatur (vt inquit Pau.)
Speciatim vero eo victu vti poterunt egri, quem cap. de ventriculi inflam-
matione instituiimus, ac protinus, vbi vires ægri valentes fuerint, sanguis
mittendus erit, Galen. teste eodem lib. 12. meth. meden. venæque in cubito a-
perienda, ex eiusdem Paul. decreto, præsertim interna. Quod si vrina etiam
propter inflammationis magnitudinem retineatur, ex malleolo quoque san-
guis detrahi debet, eodem auctore. Prædicta item ad moueri possunt præsidij
præter quam quæ acria sunt, & valenter purgant, Magisque lenientibus clyste-
ribus vtendum, cataplasmatibus, ac irrigationibus, vbi dolor per sangui-
nis missionem sedatus non fuerit, sed ad huc persistet: indicat enim profe-
ctò in ægrotante particula impactum esse, quod contristat, nec minus pater,
& quod curatio ipsa per digerentia medicamenta sit molienda, vt liquet præ-
citato lib. 12. meth. meden. Componantur itaque lenientes clysteres, Recipe
foliorum maluarum, althææ, & violarum, singul. manipuli. i. hordei. P. i. s.
fiat decoctum cui adde olei violacei, ne amygdalarum dulcium, seu rosacei
unc. iij. sacchari rubei aut violacei, mellis vnc. ii. pulpæ casæ nouiter extractæ
vnc. i. adipis recentis anseris, vel gallinæ 3. iij. fiat clyster. Procedente vero tẽ-
pore, fœnu græcum, chamæmelum, semen lini aut anethum prædicto de-
cocto adijcies, similiter in vicem olei violacei, vel amygdalarum dulcium,
seu rosacei, chamæmelino, vel athenino vtare. Nominus etiam con-
fert

fert circa initia, si asininum lac cum casia fistula, & oleo amygdalarum dulcium, per sedem infundatur. Quantum vero ad cataplasmata, irrigationes, sacculos, foros, inessus, balnea, ac reliqua topica medicamenta attinet, prædictis uti poteris, ea quæ minus acria, & quæ magis lenientia sunt eligens. Nec minus in oleum descendere conuenit, ut Paul. visum, ac cucurbitulas ipsis defigere. Sin mordens humor est, qui affligit, aduersissima huic sunt quæ extenuant, & calfaciunt, ex Gal. sententia eodem 12. meth. med. Quapropter abstinendum (ut inquit Pau.) ab acribus omnibus cum cibus, tum medicamentis foris, & irrigationibus. Item cataplasmatibus, & vini potione potissimum veteris. Vniuersus autem in summa victus sit humidior, ac frigidior, ut idem Pau. refert. Cibi vero (ex Gal. decreto) exhibendi iis sunt, qui etiam boni sint succi, nec facile corrumpantur (ptisana potissimum) adiectis mali punici granis. Sed quoniam (ut idem Gal. testatur) huius generis affectus postulat, si modo curandus est, ut ea, quæ contristant, vacuentur: Propterea statim per sedem iniicere conuenit, quod eluere huiusmodi humorem sit aptum, id autem deterfuum omnino esse oportet, & cum talium pleraque mordicent, commodissime ex iis, aliquod deligitur, cui mortus absit. Eius generis maxime est ptisanæ cremor, ut liquet præcitato lib. 12. meth. meth. aut idem cremor ptisanæ cum rosaceo, seu succo feminis lini infundatur, ex Paul. testimonio, vel decoctum maluarum, althææ, fenugræci, feminis lini, chamæmeli, & violarum cum recenti adipe anseris, vel gallinæ, ac etiam rosaceo. Poteris item vitellos ovi numero ii. & vnc. i. pulpæ casia nouiter tractæ adiacere, quibus omnibus simul commixtis fiat clyster. Quod si neque hæc sufficiat ut mordens humor vacuetur, propterea quod in ipsis intestini tunicis imbbitus sit, purgans medicamentum exhibendum erit. In quem usum aptissimum medicamentum est amarum, quod ex aloe componitur, vulgo picram appellant, ex Gal. decreto, cum primo de loc. affect. tum 12. meth. meden. quem sectati sunt Paul. & Aetio, eiusque aut semel tantum exhibere, ut hominem iuste purgare possit, viribus consentientibus, aut in quibusdam intervallis paulatim, & moderate purgationem faciens. Poteris autem ipsam hieram cum rorido melle, aut casia fistula, saccharo violaceo, seu syru. ex pluribus infusionibus violarum, vel rosarum permiscere, aut in eundem usum vnc. ii. mellis roridi, seu vnc. i. pulpæ casia fistulæ cum vnc. s. diacath. aut 3. vii. eiusdem cum aqua hordei præbeas. Si autem omnino fieri nequeat, ut ea, quæ contristant vacuentur, affectus hic per epicrasin, hoc est contemperamentum, sanandus est, eodem Galen auctore. Quapropter cum cibus, tum medicamentis, qui temperare infestantem humorem possunt, uti oportet, ut ptisana, intubo, cichorio, endiua lactuca, syru. etiam violaceo, rosaceo, seu ex succo cichorii, vel endiuiæ paratis, similiter & balneis ex dulci aqua utendum, ut Paul. refert. Si vero id quoque fieri non possit, ea, quæ torporem inferunt medicamenta, exhibeantur, ut liquet apud eundem Gal. eodem 12. meth. meden. quæ minus hos affectus, quam alios lædunt, licet sint & reliquorum communia. Nam simul omnino refrigerant, & siccant talia medicamenta. Quæ rationes non solum, ut sensui torporem inducenda salutaria sunt, sed etiam ut humorum tenuitatem cogentia, atque crassantia, præterea vehementem calorem refrigerantia: in quem usum 3. i. philonii perfici, aut romani, scrup. ii. exhibere poteris, aut tantundem eius compositionis, quam tripheram magnâ, seu eius quam requiem magnam nuncupant, tutius tamen erit, ea prius cum iis, quæ per sedem infunduntur, permiscere, & ubi non suffecerint, eadem deuoranda permittas. Reliquum est ut ea conscribamus, quæ indifferenter colicis exhiberi possunt, quorum quædam a tota substantia conducunt, celi lupinum sterus ex vino albo, & tenuis consistentiæ epotum. Interim vero ex aqua

Ex acribus, ac mordacibus succis si coli dolores fiat curatio. Loco citato, Cap. 7. & 8.

Quæ per sedem iniicienda sunt,

cap. ult.

Purgans medicamentum. 1. de loc. af. c. 4. 12. meth. c. 7.

Epicrasis.

Anodyna. Cap. 8.

Quæ indifferenter colicis præberi possint,

idque

Capite proprio
De stercore lupi
no.

Act. lib. 9, c. 31.

Capite proprio,

Act. loco citato

idque non tantum in ipsis paroxysmis, sed etiam in interuallis, potissimum si phlegmone vacent ægri. Horum quosdam ego vidi, inquit Gal. 10. de simpl. medic. facult. non amplius inuadi, & qui erant inuasi, non amplius id grauiter passos, sed nec post paucum temporis: accipiendum est etiam albidius potius stercus, quale ubi ossa comederint, solent excernere, & quod in terram non delabatur, sed in spinis, fruticibus, vepribus, herbisque proceribus. Ea enim est luporum natura, quæ canum, ut suspenso altero posteriorum crurum, & meient, & cacent in eminenti quopiam ex terra. Inuenitur etiam in illorum stercore nonnihil ossium deuorati animalis, quod item ipsum contundens, ac conterens cum iam dicto stercore bibendum præbeto, ut diximus. Poterit & idem stercus, ex eiusdem Gal. sententia, instar amuleti ægroti partibus vacuis, quas græci λυγόνες vocant, alligati vinculo confecto ex lana ouis, quæ à lupo esset laniata. Quod si talis non adesset lana, expelle ceruina lorum confici posset, quo stercus contineatur, ac prædicta loca præcingantur, modum autem illigationis reperies apud Galen. præcitato loco. Aetius galeritam autem, quæ in capite veluti cristam, siue galeam ex pennis sponte naturæ enatam habet, & circa vias reperitur, hyeme præsertim, commendat, si in simplici iure decocta, assidueque vna cum iure accipiat, Verum ante eum 2. de simpl. medic. facult. à Gal. eodem modo si sumatur commendata est. Hanc etiam autem, quæ Alauda dicitur, siue ea assata in cibo sumatur, siue cum plumis combusta, & in cinerem redacta, ac diligentissimè trita, si ex ea, terna cochlearia ex aqua calida potui per triduum exhibeantur summopere commendat Marcellus suo lib. de medicamentis cap. 29. Castoreum item assidue potatum totius affectionis apparatus demolitur, omnibusque medicamentis præstare repertum est, ut Aetius inquit. Datur eius 3. j. in tribus cyathis optimæ aquæ mulæ. Thymi cacumina insuper in aqua ad tertias decoquito, & ad percolatum decoctum mel despumatum adijcito bibendumque præbeto, ex eiusdem testimonio. Adhuc mentham viridem aliquandiu decoquito, ex eodem auctore, decoctumque bibendum ad dies tres adhibeto, & nunquam dolore afficietur. Marrubiū quoque in vino mulso decoctum bibendum præbeto, à quo nēdum æger (ut ipse inquit) liberabitur, sed neque vnquā postea incidet in affectionem. Plinius Secundus li. 2. de re medica cap. 30. tanquam expertum commendat cochleas tres in olla noua clausas, & circumdatas, ac in furno combustas, si earum puluerem in vino, aut ubi volueris dabis. Alex. cap. primo lib. 10. id scriptum reliquit lecur caprillum adustum læuigato, datoque ex vino potui, multum ipsis auxiliatur. Item umbilicum infantis nuper nati præcisi paululum in argentum, aut aurum includito, cum modico sale, qui gestat hoc alligatum, dolore prorsus non corripietur.

περὶ ἐλέου, ἢ χόρδαφος

Idest de ileo, seu voluulo.

Cap. 808

Celsus 1. 4. c. 17.
Ileos seu volu-
lus unde nomē
sumpsit.
2 meth. cap. 2.

SA E P E vero, & in tenuiore intestino (similis quodammodo ei, qui in pleniori) affectus quidam oritur, quem græci ἐλέον, interim χόρδαφον appellant, latini vero voluulum, seu ileum, Celsus tenuioris intestini morbum, Barbaram sectantes medicinam, iliacam passionem nominant à symptomate (ut inquit Gal. 2. meth. med.) nomen sumens, nam ἐλέο uerbum græcum, latine uerto, seu ueluo significat; inde ἐλέος, quasi uersus, seu circumuolutus, quoniam ægris dolor circumuolutus accedat (Aetio teste cap. 18. lib. 9.) Nec minus b χόρδαφος appelletur, & nomen à symptomate sumpsit. Nam χόρδων uerbum græcum idem latine significat, quod in chordo, impli-

to, seu irretio. Quare cum in hoc affectu tumor emineat in tenuium intesti-
 norum parte, vt videatur intestinum ad cordæ similitudinem conuolutum
 (Galen. auct. 6. de loc. affect.) Propterea non ab re ab hoc symptomate si *χορδα*
406 appellatur, nomen sumpsit. Quod vero morbus sit peracutus, qui gra-
 uissimos moueat dolores, liquet a Paulo capit. 44. libr. 3. seu quod affectio sit
 intestinorum letalem dolorem inferens, patet apud Aetium præcitato loco.
 At quod intestina in eo afficiantur, & inter ea, quæ sublimia sunt, atque gra-
 cilia, non autem crassa, liquet apud Gal. com. aph. 44. lib. 6. ac 6. de loc. affect.
 cum dixit. Atque interdum alii quoque dolores, & quidem uehementissimi
 in sublimioribus intestinorum partibus eueniunt grauitè vomitionibus cru-
 ciantes, adeo vt nonnulli sub fine stercus quoque euomere conspiciantur.
 A quo affectu vix vnquam aliquis potuit sanus euadere. Hunc ileon quidam,
 nonnulli chordapsum appellant. Ex uehementissimo itaque dolore in subli-
 mioribus intestinorum partibus eueniente, ac ex tumore apparente in eis-
 dem partibus, ad similitudinem chordæ conuolutæ, ac vomitionibus grauitè
 molestantibus. Eo quia ventriculo intestinum hoc vicinum est. Pars hæc
 intestinorum, quod affecta sit, nobis innoscere potest. Et si quispiam oppu-
 gnauit dolorem hunc, relatione ad eum, qui in colo excitatur, uehementis-
 simum esse non posse, Id quod manifestauit Gale. cum 2. de loc. affect. vbi di-
 xit. Igitur ex huiusmodi doloribus ii, qui uehementissimi sunt, haud ab re in
 crassis intestinis consistere putantur, qui vero mitiores sunt, ex duobus al-
 terum necessarium est, aut quod in his ipsis sunt, sed a leuiori causa, aut quod
 in tenuibus consistant intestinis. Tum eodem 6. de loc. affect. dum asseruit,
 ergo probabile est frigidum, eundemque crassum, aut viscosum humorem, seu
 flatuosum spiritum in corpore crasso, densoq; genitum, sed egredi nequeun-
 tem dolorem excitare, uehementem quidem geminam ob causam, intempe-
 rantiam scilicet, & corporum, quibus continetur, tensionem, longum vero,
 quia difficulter vacuatur. Nam corpora ambientia, tum ob crassitudinem,
 tum ob spissitudinem in ipsam arcere possunt. Tenuium autem intestinorum
 tunica raræ, tenuiq; essentia constant, vt non ita diu huiusmodi causas conti-
 nere possint, neque propterea etiam tendi, & proinde dolor neque tam
 uehemens, neque tam perseverans esse potest, sicuti in color accidit, ex eius-
 dem Gal. sententia: Non propterea tamen in se ipso consideratus dolor, qui
 in uoluulo excitatur, uehementissimus non est, licet non adeo, ut is, qui colum-
 cruciat. Non igitur sibi ipsi contradicit Gal. neque eius sententiæ in præcita-
 tis locis inter se pugnant, se ambæ veræ sunt. Symptomataq; est uoluulus in
 genere noxæ functionum naturalium ipsorum intestinorum, excreticis vi-
 delicet, & proprie ipsius ablaræ, vt lib. de differ. & 3. de caus. symptomatum
 patet. Nanque in eo (vt idem Gal. testatur com. apho. 44. .6. & 10. 7. lib.) ni-
 hil exit inferius, ne quidem si quispiam accerino vtatur clystere. Idque
 proprium est, atque inseparabile huius passionis sinum, seu cibi symptoma, &
 comm. aph. 2. 3. lib. dicebat, quod uoluuli, seu ilei sunt cibi superfluitatum,
 quæ per aluum inferiorem excernitur, retentiones, quæ magna ex parte
 sunt ex alicuius intestinorum partis inflammatione. Vomitus autem non
 semper adest, & si quando exitialis furei uoluulus, stercoris quoque vomit-
 us aduenit, dolores aderunt ad præcordia, porum continere non possunt
 & tormina cum doloribus in ventre: quemadmodum mulier, quæ apud
 Tisamenum decumbebat uoluuloq; detinebatur, euenit, Hippocra teste 3. de
 morb. vulg. Vt uero Aetio uisum est, accedit talibus ægris dolor circumuolu-
 tus, stomachi nimia humectatio, exolutio, ructus inanes nihil leuantes,
 murmura intestinorum, cohibitio perfecta stercoris, & flatuum. Si vero inten-
 datur affectio (ut ipse inquit) omnia sursum feruntur, ob idque & uomitus

6. de loc. af. c. 2.
prope finem.

Pars affecta.
6. de loc. affe.
Loca citato.

Signa.

Dubium.
Caps.

Ca. 2. post me

Resolutio.

De dif. sym. 6. 4.
in fine.

3. de cau. symp.
c. 2. circa med.

Quis affectus
prætar naturam
sit ileos, seu uol-
uulus.

Signa.

3. de morb. vulg.
commentatio 2.
tex. 3.

pituitæ, ac bilis accedit, frigiditas totius corporis, dolorque, plurimis etiam spirandi difficultas. Morituris autem amplius sudor frigidus, urinæ difficultas, podex ita astrictus, ut neque specilli extremum suscipere possit. Aliquando & stercus vomitu reiecitur. Euenit autem id, quoniam intestina media eorum complexione, seu constrictione, quam latis, seu transuersis eorum fibris perficiunt, cum nec pondus, nec acrimoniam excrementorum tolerare valent, ea excernere, expellereque quam longissimè à seipsis nituntur, potissimum id intestinum, in quo affectus hic oritur. Cum vero prohibitum sit id deorsum, & per se non potens se hac viâ exonerare propter factam in partibus inferioribus obstructionem, cogitur contra naturam violenter mouere. & ad loca superiora materiam noxam extrudere, quoniam motus hic constringendi, complectendique infernè incipit. At quem etiam modum & acer succus, & crepitus quoque descendere prohibitus, interim ex tam violenta intestinorum constrictione ad ventrem præter naturam reuertitur, deinde ad exitum properat. Quemadmodum apud Gal. constat commento præcitati apho. 10. 7. lib. 3. de natu. faculta. & 3. de caus. sympt. Quod vero interclusa viâ exitus iam dictorum excrementorum, hæc affectio fiat omnium ferè medicorum consensu testatur Galen. præcitato comm. aph. 44. 6. lib. Et quoniam meatus, seu viâ possunt intercludi, ac aboleri propter coalitum, angustiam, obstructionem, compressionem, at subsidentiam: Propterea quæcunque causæ tales possunt in cavitatibus, seu meatibus intestinorum affectus excitare, possunt etiam, & ileum, seu voluulum gignere. Cunctæ autem reducuntur vel ad intemperiem, vel propter collectiones aliquas non naturales ipsius intestini tumoris, vel propter ipsa, quæ in eo continentur excrementa, eodem Galen. teste 3. de cau. sympt. Quapropter licet idem Gal. in com. præcitati apho. inflammationem, scyrrhum, vel abscessum, ac obstructionem stercoris ficci, & duri in aliquod iam dicti intestini volumen impacti tantum posse facere loci angustationem, ut nihil possit ad inferiora transmitti, & per consequens ileum oriri, fateatur, de reliquis vero causis, ut puta de humoribus crassis, atque tenacibus dubitare videatur: tamen veniam præbet cuique si libeat, hanc inter causas ilei ponere, & etiam si quid aliud dicatur præter hoc: non enim negauit Galen. ex alijs causis, quàm ex inflammatione, vel obstructione aridi stercoris posse voluulum excitari. Sed frequenter, ac sæpenumero, ac magis probabiliter, & à pluribus confirmatum esse quod à prædictis excitetur causis, ita ut 6. de loc. aff. sic scriptum reliquerit. Itaque non ab re visum est medicis antiquioribus, vel ab inflammatione, vel obstructione aridi stercoris huiusmodi tenuium intestinorum affectus oriri, de voluulo, seu chordeo verba faciens. Concludimus itaque cum Gal. quod quamuis prædictæ duæ causæ præcipuè sint ipsius voluuli, inflammatio in quam, & obstructio ficci stercoris: tamen quæcunque alia valet adeo intercludere viam exitus, aut tantam facere loci angustationem, ut nihil possit ad inferiora transmitti, sufficiens quoque est voluulum ipsum excitare, siue dicta interclusio sit per coalitum, siue per angustiam, siue per obstructionem, seu compressionem, aut subsidentiam. Et propterea ab Aetio præcitato loco nonnullæ narrantur voluuli causæ, ut continua ciborum corruptio, præsertim si multi, aut varii accipiantur, & non assueti, maximeque ex pinguibus carnibus, similiter & ex plagis quibusdam, frigore vehementi, & acervata frigida potione, maxime si ab exudantibus accipiantur, affectus hic excitari potest. Item contingit iis quibus intestinum in scrotum vna cum stercore delapsum est, indeque violenter retrusum, ex eoque inflammatum existit. Fit etiam ob veneni porionem, & ob induratum stercus circa tenuia intestina impactum. Singulæ autem prædictæ causæ facile dignosci poterunt; Externæ quidem, ex ægroti, seu astan-

3. de nat. fac. c. 3
ante med.
3. de caus. sympt.
c. 2 collige,
Causæ.

3. de caus. sympt.
Loco citato.

Cap. 2.

tium

tium loquela; internæ autem, ex te ipso propriis signis, ac eorum quæ præ-
 cesserunt, perperensione, & reliquis, quæ subsequuntur. Sic enim inflamma-
 tionem ab obstructione aridi stercoreis proprie secernes, aut si propter eius
 delasplum in scrotum ortus sit voluus, vel etiam quispiam alius redundans
 succus potissimum frigidus, crassus, & lentus, licet non admodum probabi-
 le sit, vt diximus ex Gal. sententia, ex prædictis succis adeo posse fieri prædi-
 cti intestini angustationem, vt nihil valeat ad inferiora transmitti. Quod ve-
 ro ab ileo vomitus, singultus, desipientia, vel conuulsio malum sit decretum
 reliquit Hipp. præcitato apho. 20. 7. lib. Nam vomitus (vt inquit Gal. eodem
 loco) non semper in ileis adest. Sed quando exitiales sunt, & si vehementius
 distorqueantur, (vt ipse ait) stercus eis superiora petit, atque singultus.
 Quidam vero desipiunt, & conuelluntur compariente neruorum principio
 stomachi passioni, vt ipse refert. Si vomitus autem stercoreis contingat, exi-
 tialis erit affectus, a quo uix vnquã quis potuit sanus euadere, vt eodẽ com.
 aph. 44. & 6. de loc. affe. liquet. Quod vero hic voluulus acutissimum sit ma-
 lum, ac quod periculosus sit omnis voluulus, idem Galen. testatur 3. de morb.
 vulg. De quo Paulus sic scriptum reliquit. Quo enim hoc malo sunt oppres-
 si, miserabili tandem morte pereunt, stercus per os reddentes. Familiaris au-
 tem hæc affectio existit ætati puerili, (vt Aetius inquit) euadunt tamẽ bene-
 ficio humiditatis. Senibus vero non valde familiaris est, si tamen ipsi in hanc
 affectionem incidant, fere nunquam conualescunt. Iliacorum vero passio
 acuta est, & sub angusto tempore periculosa, Theodoro Prisciano auctore
 cap. 9. 2. ad Timotheum. Eius autem curatio pro causarum diuersitate va-
 rari contingit. Quod si ab inflammatione ortum ducat, aliis consentienti-
 bus, a venæ sectione exordienda curatio erit, vt omnes consentiunt, & ratio
 dicta, eaq; iteranda, si opus fuerit. Incidatur autem interna cubiti vena, ea-
 dem victu ratione instituta, ac reliquis medicamentis adhibitis, quæ in cu-
 ra coli doloris ex inflammatione præcipimus: Id tamen seruantes, iam in
 ileo orto ab inflammatione, quàm ex quauis alia causa, quod medicamenta,
 quæ per os voranda præbentur, magis competunt, quàm in coli dolore, sum-
 pta a posito indicatione, pro vt capit. de dysenteria recensuimus. Quapropter
 a venæ sectione vno, vel altero leniente clystere adhibito (pro vt præceden-
 te cap. docuimus) confestim medicamentum leniendo purgans exhiberi de-
 bet, ceu est manna, casia fistula, saccharum violaceum, seu syr. ex pluribus in-
 fusionibus violarum, & interdum cum aliquo prædictorum vn. s. vel 3. 7. dia-
 cath. adicere: sæpe etenim id auxilii satis est, vt inquit Celsus, tumore præ-
 sertim in vmbilico existente. At si ex siccorum stercoreum multitudine, facta
 obstructione, ileos excitetur, quæ stercus ipsum emolliunt, atq; humectant.
 & per aluum subducunt, tribuenda esse censeo, veluti estatus pingue gallina-
 rum, seu pullorum, aut phasianorum, aut in eorundem iure decocta ptisana. Pa-
 riter conueniunt lenientes clysteres post prædictorum assumptione, qui sic
 parentur. Recipe foliorum maluarum, violarum, mercurialis, & althææ, cuius
 libet manip. i. florum chamæmeli, sænigræci manip. s. salis communis parum
 bulliant in aliquo prædictorum iurium, cuius decocti per colum transfusi, as-
 sumpta sufficienti quantitate, adicias olei communis, amygdalarum dul-
 cium, aut chamæmelini, aut anethini vnc. iiii. mellis rosacei vnc. ii. quibus si-
 mul cõmistis fiat clyster. Interim poteris butyri recentis, aut adipis anseris
 vnc. s. addere. Nec erit alieni: (potissimum vbi ægri ventriculus valeat) vnc.
 iiii. vel lib. s. olei communis dulcis, aut tantundem olei amygdalarum dulcium
 absorbendum præbere, & vbi hæc non suffecerint, audacter aliquod medica-
 mentum purgans, eorum, quæ modo meminimus, præbeto. Nam obstructio,
 quæ fit a stercore duro quod intersepit intestinorum (vt Gale. testis lib. art.

Prognostica.

Aph. 44. libri. 6
6. de loc. af. c. 2.
3. de morb. vul.
Loco citato.Curatio si ex in-
flammatione
fiat.

Venæ sectio.

Purgatio.

Si fiat ex sterco-
rum multitudine,
curatio.

Cap. 94.

mod.) primum quidem habebit, duritie remedium ex humidis, pinguibusque clysteribus. demum ex acribus euacuationem exposcet, hunc etiam usum (vt pote vtrunque perficiens) confert Ius galli à Mesue descriptum Extrinsecus insuper irrigationes, fomenra, ac cataplasmata, quæ emolliendi vim habeant, ac leniendi, applicetur. Quorum copiam præcedenti capitulo reperies, Commodum est etiam in oleum calidum descendere, aut in balneum desiderare ex aqua, & oleo refertum. In aqua vero prius decoqui possunt malua, aut althæa: Si autem contingat ab humoribus crassis, ac tenacibus voluulum excitari, simili modo curari debebit, quo & curari debere præcepimus, coli dolorem ortum ex eadem causa. At si ex cruditate, seu ex ciborum corruptione voluulus fuerit excitatus, si adhuc crudus, seu corruptus cibus ventri insidere videatur, confestim ager cogendus est, vt vomat, sumpta aqua tepida cum pauco aceto, aut syr. acetoso, aut etiam aqua mulsa, similiter tepida. Verum si nihil ciborum crudorum in ventre contineatur, omni conatu (vt inquit Aetius) enitendum est, quo tum flatus, tum illecora infra trahantur, idque per glandes, illitionesque & clysteres, vt ipse refert, atque magna diligentia in singulis adhibita perficiendum, purgans medicamentum, vbi prædicta non suffecerint, exhibeatur, ex hiera videlicet & confectione de dactylis, aut diacath. cum aliquo prædictorum lenientium medicamentorum compositum. Est etiam usitatum, & accommodatum anethi decoctum potum, ex Pauli, & Aetii, auctoritate. A potu autem panem in aquam freuentem conice, eiusque frustra calida confestim edenda præbe, ut iidem inquirunt Aetius, & Paulus, idque præsertim si ab inflammatione voluulus ortus nos fuerit. Item si anethum ipsum in aqua, oleo decoquantur atque ita bibatur, deinde frustra panis ex aqua frequenti præbeantur mirum in modum egri iunatur, ex Orbanus sententia. Commodum est etiam malum semen tritum, ac potui inspersum eodem Aetio teste. Nec minus opitulabitur chamæmeli decoctum, quo quidem, ut si quis aliud hypochondriis, ac reliquis uisceribus, quæ circa hypochondria sunt, gratum existit condensata corpora rarefaciens, indurata emolliens, ac tensa relaxans dolores quæ sedat, ac mitigat Gal. teste 3. de sim. medic. facule. quin. & tale quoque esse lini semen, uetus sermo prædicat (ut ipse inquit) quamuis minus chamæmelo sit uisceribus gratum, minusque calidum, & præterea essenti crassæ. hæc in aquam medica menta præberi possunt uoluulo ex quauis prædictarum causarum orto, præterquam si ab inflammatione fuerit excitatus. Fouendus insuper & podex erit per spongas calidas indifferenter voluulis ex quauis causa ortis, ne dum eo tempore, quo glandes fuerint appositæ, vt Aetius inquit, Sed in reliquis quoque temporibus, vt ex eis, qui ad imum intestinum positus est musculus, relaxetur, Nec ab ipso constrictionis motus incipiat. Ex foliis itaque maluarum, althææ, chamæmeli, ac seminis lini decoctum in aqua, & oleo paretur, ac per spongas calidum applicetur sæpius, Vel in eodem decocto infideat ager. Doloribus vero adhuc perseverantibus, & maxime quibus infusi clysteres non infra rursus prodeunt etiam ea quæ dolorem leuant, exhibenda sunt. Itemque conuenientes antidoti ante somnum, ex decreto Aetii, Ceu ex viperis theriaca existit Andromachi post eam vero, quæ mithridati nomen habet. Si vero à venenoso pharmacho quis in voluulum incidat, aquam tepidam multam bibendam dabimus vomereque cogemus. Deinde oleum calidum in potu. dandum, aut iura pingua, vt denuo vomant ex moderato eorum potu. Deinde ita parumper quiescant & postea theriacen accipiant cum vino dissolutam, quemadmodum Aetius, & Paulus præcipiunt, & si adhuc perseverauerit, purgante medicamento utare aliquo eorum, quæ supra commemorauimus. Quod si ex intestinis in scrotum per lapsu voluulus contingat, confestim tentandum est, vt decubitu sursum

Capite proprio.

Si ex humorib.
crassis fieri con
tingat uoluulus
curatio.

Si ex cruditate.

cap. 9.

Quibus podex
fouendus sit.

Curatio si fiat
voluulus ex de
uorato veneno
so pharmacho.

sum versus vergente adornato delapsum intestinum ad inguinum partes re-
trudatur, atque post leuiter citra violentiam, ac compressionē ligamento adhi-
bito contineatur, vt patet ex præcimatorum auctorum sententia. Resistit ileo
discerpti vespertilionis sanguis ventri illinitus, Item senectus serpentium de-
cocta. cum rosaceo in vase itanneo, si ventri illiniatur, ceu apud Plinium secun-
dum legitur lib. 2. de re medica cap. 33.

περὶ τῶν ἐλμινθῶν id est de lumbricis. Cap. 81.

Quemadmodum in magno Mundo animalia quædam non ex se-
minibus, sed ex putredine generationem habent, ita quoque pro-
portionabiliter in paruo mundo, eadē putredine parua quædā ani-
malia gigni consueuerunt, quæ græcis ἐλμινθες, latini vero lūbricos ap-
pellare solent, Quamquam apud græcos, præsertim Gale. quod græci ἐλμινθες
nuncupant, modo quid commune intelligitur omnium lumbricorum diffe-
rentiarum, vt liquet primo de loc. affe. Vbi cum a locis ipsis morborum indi-
tia sumere præciperet, dicebat, lumbrici in intestinis gignuntur, vsus verbo
ἐλμινθες. Hoc nanque quod commune sit cunctis lumbricorum differentiis
infra patebit. Illud idem confirmauit Paulus cap. 57. lib. 4. cum dixit, tres esse
vniuersas ἐλμινθες, hoc est lumbricorum differentias, & ab Aristotele quo-
que sic scriptum est lib. 5. de natura animalium cap. 19. ἐλμινθες, hoc est lum-
brici, quorum genera tria sunt, & cætera. Interim vero per ἐλμινθα duas dun-
taxat lumbricorum differentias intelligere videtur idem Galenus, Quemad-
modum patet lib. de differ. morbor. quo loco dinumerans eos affectus, qui
toto genere in numero sunt præter naturam, ait, quemadmodum sunt ἐλμιν-
θες, καὶ ἀσκαρίδες, vbi luce clarius liquet per ἐλμινθες, ne dum teretes lum-
bricos intellexisse, verum etiam & latos, qui nec minus toto genere præter-
naturam sunt veluti & teretes, Quamvis Hippo. aph. 26. 3. lib. illos τρογγύλως
ἐλμινθες appellet, hoc est teretes, & idem Gal. simul cū Hipp. 14. meth. med.
teretes τρογγύλως nuncupauit, latos, autem πλαταίως cum dicebat, αἱ τε ἐλμιν-
θες, αἱ τε τὸν τρογγύλῳ τινὲς εἰσιν, αἱ τε καὶ πλαταίαι, hoc est lumbrici, siue hi
teretes sint, siue etiam lati, Sic etiam Paulus ἐλμινθες, τρογγύλως teretes, &
πλαταίως latos nuncupat, Quemadmodum etiam & Aristot. præcitato loco
quamuis etiam latos alicubi κερίας nominet idem Gal. vt patebit. Non raro
autem Gal. per ἐλμινθα vnam duntaxat lumbricorum differentiam, eorum
videlicet, qui teretes latine dicuntur, subintelligit, ceu liquido constat præci-
tato lib. 14 meth. med. Vbi eorum, qui toto genere præter naturam sunt affe-
ctuum meminit, post enarratas abscessuum tres differentias, ne dum semel, sed
bis dicebat in vno loco ἐλμινθες, καὶ ἀσκαρίδες, καὶ κερίας, & post pauca ite-
rum ἀσκαρίδες τε, καὶ κερίας καὶ ἐλμινθες, quo etiam modo Aetius teretes
lumbricos ἐλαίνας duntaxat appellat, vt liquet lib. 9. cap. 39. Ex quibus om-
nibus liquet Gal. inconstantem haudquaquam fuisse, licet diuersis in locis di-
uersimode de lumbricis verba fecisset, Perpetuo enim in eius doctrina palam
est tres eorum differentias conscripsisse, vt præcitato libro 14. meth. est vide-
re, & comment. aph. 26. 3. lib. Quarum vna ἐλαίς, seu ἐλαίς τρογγύλος, Altera
ἐλαίς πλαταία, seu κερία Reliqua, & tertia ἀσκαρίς dicta est, In hisce ete-
nim locis particulatim, ac distincte magis de eis loqui fas erat, Id quod in
reliquis iam dictis nequaquam necessarium fuisset. Audacter igitur cum
eo, Paulo infimul, ac Aetio tres tenemus esse vniuersas lumbricorum differen-
tias, seu species, Teretum videlicet, Litorum, ac ascaridum, seu tenuium.
Quod si Hipp. apho. præcitato 26. 3. lib. duarum tantum meminit, Teretum
videlicet, & Ascaridum, Non propterea tertiam negauit differentiam, quæ
tenias.

Cap. 5. prope fi.

Cap. 3. in princ.

Cap. ult. in fine.

Cap. 17. & 18.

14. meth. c. 26,
& 18. & 19.

Tres esse lum-
bricorum diffe-
rentias.

4. de morb.
persus finem.

Anic. lib. 3. fen.
16. tract. 5. c. 1

Quod in mate-
ria comunicet.

est Latorum, Quinimo dicens ἀλυσθαι τρυγύλα, aliam ὕμινθον olfecit dif-
ferentiam, quæ est latorum, Alias suffecisset ei dixisse ἔλμινθες καὶ ἀσκαρι-
δες nec addidisset illud τρυγύλα. Adde quod propterea latum lumbricum
subticuit eodem loco, quoniam (vt Gal. inquit in com.) rarior est eius gene-
ratio, tum etiam quod neque eius erat propositum de omnibus agere passio-
nibus, quæ mortalibus accidunt, sed de illis tantum, quæ singulis ætatibus ac-
cidunt: A qui latis lumbrici generatio ea ætate fieri nequaquam poterat.
Nec propterea sibi ipsi aduersatur, etiam si lib. de morb. sit germanus eius-
dem Hipp. & non Polybi, seu alterius cuiusdam; cum lib. 4. eiusdem de tere-
ribus, ac latis duntaxat mentionem fecerit, at caridas subticens, Nam duo
eodem loco differere intendebat de lumbricis, vt cuilibet eius verba recte
intelligenti patere poterit, quorum vnum erat, Nunquid vtraque differen-
tia gigni potuisset in puero adhuc in vtero existente, secundum propositum
erat nunquid laci, veluti rotundi parerent. Cum itaque tenuis lumbricus
ἀσκαρις dictus, nec infantibus oriatur, donec vtero geruntur, vt ex eius ver-
bis colligi potest, nec præ eius tenuitate parere potuisset, Nam ex eo nihil
procreari aliud potest, ex Arist. sententia præcitato cap. 19. lib. 5. de nat. ani-
malium, Iure ascaridas missos fecit, & tantum teretum, & latorum meminit.
Sed quid celso dicendum sit, qui cap. 17. lib. 4. duas tantum lumbricorum
tetigit differentias, latorum videlicet, & teretum, cum dixit, Nonnunquam
autem lumbrici quoque occupant aluum, itq; modo ex inferioribus partibus,
modo foedius ore redduntur, atque interdum latos eos, qui peiores sunt, in-
terdum teretes videmus, An quia, vel ascarides non nouit, vel cum adeo exi-
gui sint, ac tenues, ac in infirma, & ignobiliori parte orti, nullumque ex eis
prauum sequatur symptoma, eos paruifecit, nec in aliorum numero comple-
xus est. Auicennas autem licet obscure, ac confuse (vt eius mos est) de eis lo-
quatur adeo vt quatuor lumbricorum differentias admittere videatur, si quis
eius verba intro inspiciat, tres etiam duntaxat posuit Paulum sectarius. id
quod argui potest ex diuersitate materiæ, ex qua generantur, quam triplicem
esse asserit, ex cuius diuersitate voluit eorum quoque diuersitatem argui
posse. Communicant autem diuersæ eorum differentię in materia generatio-
nis quodammodo, Quoniam (vt inquit Arist.) in excrementis oriuntur, ad-
huc intra animantem contentis, & vt refert. Gal. com. præcitati aph. 16. 3. lib.
ex putredine generationem habent ex corruptis cibis præsertim orta. Hoc
autem excrementum, seu putredo (vt isti asserunt) cruda, crassa, pituitosaque
materia est, putredinique commoda, Paulo auctore, Nec propterea ab Arist.
discrepat, qui neque negauit talia debere esse excrementa, Sed satius ei fuit
vniuersaliori vocabulo uti: Est etenim in excrementorum numero cruda
crassa, ac pituitosa materia, & putredini accomoda in intestinis cõtenta, vel
saltem alui excrementis quodammodo, permixta est. Ex reliquis vero humo-
ribus nullum lumbricorum genus gigni potest. Nam biliosus succus, ne dum
improportionata materia eorum existit, verum eos sua amaritudine, & acri-
monia perimit. vt inquit Paulus, Et si quando flaua bilis vna cum lumbricis
infra, aut etiam vomitu eruperit, ipsos quidem intestina obsidere, humorem
vero biliosum ventriculi os, aut aliam quampiam particulam occupare scito
vt ipse fatetur. Neque ex atra bile oriri possunt cum frigida, & sicca existens,
longinqua ab animalis, tum proportionalitate, tum vita existit. Quapropter
non ab re dicebat Paulus, quod hæ duæ substantię alimenti naturam egressæ
lumbricis procreandis inepitæ redduntur, Nec minus inepta materia eorum
sanguis existit, quoniam substantię proprietatem, ac proportionem habet
pro nutrimento partium hominis, & non pro lumbricorum generationem,
intraq; vasa continetur. Quod si accadat præternaturam ad intestina effundi,

aut

aut in frigidatus in grumos vertitur, aut calfactus suppuratur, Interim autem huiusmodi, aut alio quodammodo corrumpitur, ita ut omnino impossibile sit, ut sanguis permaneat, Gal. auctore commento apho. 20. 6. libr. Quapropter ex sanguine lumbricos procreari impossibile est, Conueniunt etiam in agente, qui calor est non absolute putridus, Etenim sola putredo non est sufficiens ad eos generandos, ut inquit Gal. sed & calore plurimo indiget, naturali inquam, qui materiam obtineat, idoneam siquidem ad talium animalium generationem. Non itaque imbecillus, ac exiguus requiritur calor innatus pro lumbricorum generatione, sed validus, ac plurimus, Quoniam si talis fuerit, ut in valde tenellis existit, nondum poterit tam putridam materiam obtinere, ex eiusdem Gale. sententia. Nam quamuis plurimum habeant ipsi infusum calidum, ut patet 14. aphor. primi libr. ratione ætatis, illud tamen habent cum humiditate permixtum, quoniam plurimum sanguinis habent. Galen. teste 3. prognostic. Nec non propterea quia cibi copiam, aut lactis ingerunt, atque inordinatam magnam quoque crudi, ac pituitosi succi copiam cumulant, quæ cum ab eodem eorundem calore obtineri nequeat ut qui non adeo validus existat, Ea de re in valde tenellis lumbrici generari non possunt: Corrupt, itaque, ac idoneam quodammodo efficit materiam putredinis calor, in cruda, crassa, ac pituitosa materia existens: perficit autem in quantum potest, informat, ac præparata, modo quo potest ipsam obtinens innatus, ut exinde lumbrici procreentur. Nihil etenim putrescens sed concoctum gignitur, ut inquit Arist. 3. de gener. animal. cap. 11. loquens de animalibus quæ sponte oriuntur. Neque ipsi lumbrici ea ratione, qua in vniuerso, generantur, pro eiusdem expurgatione: Nam satis est: pro intestinorum expurgatione, seu abstersione flauæ bilis ad intestina effusio, ut patet 5. de usu partium. Sed potius id, quod melius, natura eligens, putredinem eam haudquaquam derelinquens. nec omnino eam obtinere valens, quod melius est eligit, ipsamque lumbricorum speciebus informat. Arist. quoque 4. mete. dicebat, animalia fieri in iis, quæ putrescunt, propterea quod segregata caliditas naturalis existens: hoc est ab iis, quæ putrescunt propter aduentum aliæne caliditatis: eadem caliditas naturalis relatione ad id quod ex putredine generatur animalis usque adeo materiam putrescentem obtinet, quod constare facit segregata, hoc est putrida excrementa ea concoquens, & exinde ea constituens, ut liquet citato loco de generatio. animalium. Id quod in valde tenellis perficere nequit (ut Gal. visum est) Nec minus & in loco conuenienti conuenientiam habent. Quoniam singulæ iam dictæ tres lumbricorum differentiarum in intestinis generationem obtinent, quem admodum patet apud Galen. lib. primo de loc. affect. ubi morborum inditia sumens à locis ipsis, eo quo quibusdam locis solis morbus hic accidat, Quibusdam vero soli nunquam eueniat, dicebat, quippe soli oculi suffusione laborant, lapis in renibus, & vesica duntaxat nascitur, atque (ut nonnullis placet) & in colo. ^{λμν} id est lumbrici in intestinis gignuntur. Ex quibus patet toto cælo aberrare eos, qui in ventriculo lumbricos generari posse Gal. ascripserunt, male eiusdem verba intelligentes cum aphor. præcitati 26. 3. lib. cum dicebat. Cibus autem puerulis nonnunquam corrumpitur in ventre, & præcipue inferiore. Verum caliditas in valde tenellis nondum materiam obtinet. Nanque (si paucis interpositis verbis) in eodem com. perlegissent Galen. noluisse ventriculum intelligere in præcitatis verbis sed intestina percepissent; dicebat etenim idem Galen. Aliud vero genus lumbricorum est rotundorum seu tereorum, qui in superioribus magis intestinis generantur, adeo quod ad ipsum quandoque ventriculum ascendant. Noluit itaque Galen. per ventrem, eumque inferiorem ventriculum intelligere, sed intestina, ut patet. Est namque, nedum

Quod similiter
in efficiente eorum
causa conueniant.

Com. 28. collige

Cap. 4.

Cap. 1. text. 15.

cap. 5.

Quod in loco
etiam conueniat

Quod in ventriculo,
lumbrici non generantur.

tex. & com. 13.

com. 54

cap. 3. tex. 28.

Quibus inter se
differunt, dicte
tres lumbricorum
differencia,

eius mos, verum etiam & Hip. (quem admodum legitur. 2. progn.) per inferiorem ventrem, ne dum ventriculum ipsum sed ieiunum, atque vniuersa intestina intelligere. Cæterum concessio, quod etiam ventriculum subintelligat Gal. Cum dixit, plerumque in ventre puerulis cibus corrumpitur, quo medio demonstrabis lumbricos voluisse in eo gigni posse? cum possit cibus in eo corrumpi? nec propterea lumbricos in eo gigni, quoniam ab eodem ventriculi proprio calore ita corruptus cibus nequit adeo obtineri, neque corruptus fuisset, si eum euincere, ac obtinere potuisset. sed cum primum ad intestina descenderit, ibi generantur, id confirmavit paulo infra, Cum dixit, in superioribus magis intestinis teretes lumbricos generari, adeo quod quandoque ad ipsum ventriculum ascendunt, & non dixit, quod in ipso generantur: secundo etiam de ratione vict. in morb. acut. sub proritationis nomine morsum comprehendens, quem acris humor in intestinis, siue in ventriculo, & præsertim ipsius ore parit, & vigiliæ, (inquit Gal.) & ira, & mœror, & lumbrici, qui ab intestinis ad ventrem usque ascendunt. Cui ergo in dubium venerit hic aperte Gal. negasse lumbricos in ventriculo oriri posse? Quoniam cum de morsu intestinorum, ventriculi, & præsertim oris eius verba fecisset, ac de eius causis, inter quas lumbricos connumeravit, Non utique dixisset, qui ab intestinis ad ventrem usque ascendunt, sed qui in ipso ventre generantur, aut saltem id addidisset si insufficientiam evitare voluisset. Possent etenim pariter morsum ventriculi causare lumbrici in eo geniti, si generari possent, ceu iidem ab intestinis ad eundem ascendentes. Id etiam confirmavit Aristo. 4. meteor. cum dixit. In coctione animalia non generantur, & cetera: Nam in ea aut Hepsefis fit, cum cibi perfecte concoquuntur: aut Molyngis, hoc est cruditas ei opposita, ex quarum neutra lumbrici gigni possunt; nisi prius excrementa, quæ hepsefim subterfugiant, fuerint segregata atque corrupta: quàm primum autem fuerint segregata, ea intestina excipiunt, ubi putrescentia ut potè destituta à ventriculi calore, idonea lumbricorum materia fiunt, continentium partium calore adeo ea euincente, ut alia generet animalia. Id enim est quod Arist. dicebat Digestum est enim in superiori ventre, putrescit autem inferiori segregatum. Pariter & Paulus, qui de teretibus lumbricis verba faciens ait, eos in gracilibus plerumque intestinis consistere, & superiorem ventriculum subire, Ideoque frequenter per os deiciuntur, quibusdam, & è naribus redduntur. Celsus autem lumbricos aluū occupare dixit, quanquam sæpius interdum ore reddantur. Theodorus vero Priscianus libr. 2. ad Timotheum cap. 17. si lumbricos aliquando stomachum, aliquoties inferiora possidere scriptum reliquit, haud propterea eos in stomacho generari dixit. Quandoquidem tum stomachum possidebunt, cum ad ipsum ascenderint, veluti Gal. & Paulus præcitatis locis scriptum reliquerunt, & non quia in eo geniti sint. Id quod haudquaquam ipse fatetur, qui item tres eorum esse differentias eodem loco asseruit. Cæterum quamuis iam dicte tres lumbricorum differentie in materia efficiente, ac loco communicent vniuersaliter, si quis tamen magis particulariter ea scrutari voluerit, differre inter se inueniet tum materia, quoniam licet ea putredo sit, vnam speciem, quàm alteram à maiori vel minori putredine ortum habere reperiet, sic etiam ex multa, vel pauca materia putrefacta. Nec minus diuersitatem quandam reperiet in egente. Nam quamuis eorum omnium generatio à calore plurimo fiat, tamen idem calor respectu diuersarum differentiarum lumbricorum iam dictarum, quandam habebit in eius magnitudine differentiam. In loco quoque (licet vniuersaliter, ut diximus communicent) quoniam non nisi in intestinis generari possunt, differunt tamen. Quoniam teretes in superioribus magis intestinis generantur, Ascarides in parte maxime inferiori

inferiori crassi intestini. Ipse vero lumbricus latus, qui & longissimus quoque est, saepe per tota extenditur intestina, quamvis rarior sit eius generatio, (vt inquit Galen. præcitato com. apho. 26. libr. 3.) licet in tenuibus præsertim oriri incipiat, Aetio auctore capit. 40. libr. 9. Quo fit vt propterea diuersa sit eorum forma, seu figura. At quicquid tandem sit de eorum conuenientia, ac differencia quod intestina afficiantur, qualiscunque fuerit lumbricus genitus, ex iam dictis liquet, licet in teretibus intestina gracilia præsertim, In ascaribus crassum, seu rectum, & in latis, vbi longius extendantur, tam tenuia quam crassa affecta sint. Patet insuper eos morbos esse in numero, tota substantia præter naturam, quemadmodum Gal. testatur lib. de diff. morb. & 14. meth. med. Ex cuius sententia eorum ruit opinio, qui volunt lumbricos in intestinis genitos aliquem præstare vsum, pro eorum videlicet expurgatione, seu deterfione. Nam cum tota substantia præter naturam sint, Nulla ratione fieri potest, vt actionem aliquam, aut vsum naturalem animantis corporibus præstent, Quinimo eas potius impediunt, atque vitiant, Nonnullos, eosq; non spernendos præter naturam affectus generantes: referuntur etenim & actiones, & vsus secundum naturam, ad partes secundum naturam nostri corporis existentes. Cum itaque neque partes, neque secundum naturam sint, sed toto genere præter naturam (vt diximus) ualeant, qui talia ad pauca respicientes, temerarie effutiunt. Nos vero ad eorum indicia descendemus: Primo teretum, cum inter alios frequentiores fiant, cum febribus, & citra febres, atque speciem habeant omnibus perspicuam, Paulo teste, similes nanque sunt vermibus in terra ortis, quos greci *ἐντερά νη*, hoc est intestina terre appellant, vulgus onisculos vocat. Secundo latorum, & tertio Ascaridum, seu tenuium. Conscribuntur autem teretum non pauca ab Aetio, & Paulo indicia Quauis (vt Paulus inquit) non omnia in omnibus signa inquirere oportet, sed plurima, aut nonnulla eorum. Sequitur autem eos qui rotundos lumbricos continent, incredibilis morsus stomachi, ventris, ac intestinorum, tusses exiguae cum siccitate irritantes, In somno tremunt, & præter rationem exurgunt nonnulli, & cum clamore expergesciunt, & iterum sopiuntur, quosdam comitatur singultus, quidam vero linguam foras protrudunt, oculosq; claudunt, & taciturni sunt excitantesque moleste ferunt, ob imbecillitatem vigilare nequeunt, & dentibus frendent, ac superuacue mandunt, præsertim si infantes fuerint, & quidam eorum neglecti motu pulsus destituuntur ac refrigerantur, atque eorum instar, qui animo linguuntur, tenuem quendam, ac frigidum sudorem exudant, & vt plurimum liuescunt. Contingit autem aliquando faciem eis fieri rubicundam, maxime circa malas, verum color hic rursus in pallorem solito maiorem transit. Quidam etiam pulsum inaequalem habent, obscurum, deficientem, ac recurrentem. Aliis etiam appetitus perditio accedit, febres augescunt inordinatae, quæ cum extremorum perfriktione tertia, interim quarta die, vel nocte accessionem sine ratione habent, Alii instar delirantium peregrina in somnis loquuntur, Interim cum clamore præter rationem exurgunt, citoq; rursus collabunt. Alii decubitus transmutant continue dormientes, angoreq; vexantur, & ex loco ad locum sese vicissim prolestant, atque multi inuocales omnino persistunt, Interim præter id, quod cibum auersantur, si quid ceperint, illi nauseabundi vix deglutire possunt. Plerisque vero aliud descendit corruptos cibos egerens, & tympani modo venter eis inflatur, quidam etiam oculos sanguine suffusos habent. Cuncta vero hæc accidunt, tum ab ipsis animalibus in intestinis obuolutis, seu cum per eadem serpunt, ac rodunt, & morsum inferunt, tum ex febrili calore prauos vapores ad cerebrum transmittente, ex putrida in ventre collecta humiditate exhalantes, vt Paulus refert,

pars affecta quæ sit.

Lib. de differe
morb. c. 8.

14. meth. c. 19.
in fine.

Quis affectus
præter naturam,
sint lumbrici.

teretum libri
eorum signa,

Lib.9.c.39.

Aet.lib.9.c.40.

Pau.lib.4.c.57.

Lati lumbrici
signa.Hippo.lib.4. de
morb. uetus fi-
nem.

1. de loc. af. c.5.

1. de loc. af. c.1.

3. de loc. af. c.3.

Cap.5.

Lib.9.c.40.

Act. lib.9.c.41

refert. Ex ea item, quæ præcessit victus ratione poteris lumbricorum genera-
tionem percipere, Nanque crassiorum nimirum, & quæ difficulter conficiun-
tur, alimentorum usus præcessit, ac eadem largius ingesta fuere, & maxime
frumentacea. eosdem item comperies balneis à cibo usos fuisse, ut testatur
Aetius. Cum vero, qui latus appellatur lumbricus mutatio sit, (si ita dicere
libeat) seu permutatio membranæ intrinsecus tenuia intestina ambientis in
corpus quoddam viuum, ex Aetio, ut autem Paulus inquit, mutatio est adna-
ta in interiori intestino membranæ in materiam animalis modo mobilem,
quæ sæpe tota redditur longitudine incredibili, & in his, qui febre carent
abundat, quandoque in longis ac diuturnis morbis etiam cum febre accidit:
Propterea non ab re continuo stomachi morsus infert, &, ad cibos incorri-
gibilem appetitum. Nam quod animatum euasit (ut Paulus refert) in intesti-
nis obiectum alimentum rapit, alio statim opus sit, & nisi assumpserit, inte-
stina roduntur, Cæterum ea quæ accipiuntur, non subcenturiata, seu copiose
digerunt, sed cito excrementur. ijs occupatos comitatur corporis gracilitas
etiam impotentia seu imbecillitas cum tardire, Nam quod viuificatum est,
in intestinis, ubi recens exhibitum cibum consumpsit, postea ex ipso solido
corpore rodit. At certissimum, & minime fallax indicium eius erit, si cum
recrementis, quædam semini cucurbitæ, seu cucumeris similia excernantur,
auctore Hip. lib. 4. de morb. quem sectati sunt Gal. primo de loc. af. & Paulus,
ac Aetius locis præcitatis. Decipiuntur autem qui talia excrementa eiusdem
lumbrici partus esse dicunt, ab Arist. illud capientes præcitato cap. 19.5. lib. de
nat. animal. cum dixit latum autem illud solum intestino adhærens parit si-
mile cucumeris seminis quo inditio medici id genus lumbrici inesse intelligit
Non enim intellexit Arist. tale excrementum simile cucumeris, seu cucurbitæ
semini esse lati lumbrici partum, tanquam aliud animal, sed veluti quoddam
proprium ipsius excrementum, seu pars eiusdem. Sunt etenim excrementa,
ex quibus medici in affectarum sedium, seu earundem affectuum notitiam de-
ueniant in triplici differentia, ut patet, tum primo, tum 3. de loc. affect. Nam
aliquando partes sunt sedium affectarum, aut ipsorum affectuum, quæ eorum
essentia soluta vel dissecta excernuntur, Interdum ea, quæ in ipsis continentur,
nonnunquam aliquod, quod morbosas dispositiones sequitur, excrementum
excernitur. In primo itaque excrementorum genere continentur recrementa
illa semini cucumeris, seu cucurbitæ similia, si excernantur, quoniam tan-
quam partes latorum uerminum eorundem certissimum, ac minimè fallax in-
ditiū sunt, ut quam dilucidissimè patet apud Galeodum primo de loc. affe.
(ubi de affectum notis, quæ ex excrementis deprehenduntur, verba faciens,
quæ proprie sunt ipsorum affectuum, ut ramentum ulceris inquit) si in vrina
fabulosum residet lapides. Cucurbitæ vero seminibus similia excrementa la-
torum vermium inditia sunt. Inquit itaque Arist. medicos etiam dictorum
excrementorum inditio, intelligere id genus lumbrici inesse, non tanquam ex
fatibus, seu pulis eiusdem, cum ipsum (Hipp. auctoritate) non pariat, sed tan-
quam pars substantiæ, seu essentiæ, ac proprium excrementum eiusdem lati
vermis existens. Ex hoc etenim excrementorum genere non inartificiofam
coniecturam, sed in exactam notitiam deueniemus tum affectus, tum partis af-
fectæ, ut latius eodem primo de loc. affectis est videre: Huius etenim lati lum-
brici quandoque partes concisæ prodeunt, quæ semel sanè ex exolutæ non am-
plius secundo congregantur, Interim & ipsi integri excernuntur, ut incre-
dibilem magnitudinis de se præbeant aspectum, ex Actii testimonio. Sunt quo-
que (ut diximus) Ascarides lumbricorum species una, circa extremas inte-
stini recti, & ani fibulæ initio σφιγκτηρα à græcis appellatum consistentes
(ut liquet ex Aetio, & Paulo) vehementem pruritus iis locis inferrentes

ex quo vehementi huius loci pruritu, ac assidua ad egerendum irritatione & ipsi dignosci poterunt: hi quoque ut plurimum ab excretionē melius se habent: Et plurimi eorum manifeste apparent: in iumentis male cibum concoquentibus, quorum malam coctionem fætor indicat excrementorum, Gal. auctore com. præcitati aphorif. Quapropter & eorumdē inditia, (ut Aetius asserit) potissimum ex graueolentia excrementorum sumuntur, Indicant enim prauos assumptos cibos, ac eorundem corruptiones, & frigiditates, ex quibus species hæc lumbricorum generatur, Velut eidem Aetio, tum etiam Paulo visum est. Omnium vero trium specierum communis, ac vniuersalis causa (ut diximus) putredo est, ex Gal. testimonio. Paulus autem crudam, crassam, pituitosamque materiam, ac putredini accommodam omnium generū originem, ac causam esse scriptum reliquit, ceu supra adnotauimus. Quæ de re cur amplius de eorum causa pertractare debeamus, non inuento. Reliquum est ut ad prognostica veniamus. Quorum primum Hipp. est. 2 progn. cū dixit lumbricos quoque teretes eunte in indicationem morbo descendere idoneum est, magnam autem curam habere conuenit circa eorum curationem; præsertim teretum, Nam multi, nulla lumbricorum cura habita (ut inquit Paulus) exesi ab ipsis sunt, & conuulsi interierunt. Alii produnt se lumbricos vidisse, qui ex inguinibus egri erperiūt, ut ipse refert. Quod autem in infantibus, & pueris, atque iis, qui ad pubertatem accedunt, maxime abundant teretes lumbrici, scriptum reliquit Aetius ex Herodoti auctoritate præcitato, loco. Item quod peiores ex ipsis censentur maiores minoribus, paucis multi & albi rubri, viuentes etiam mortuis deteriores sunt. Circa initia autem morborum, præsertim febrium generari substantiam suam ex subiacente corruptione capiunt. Circa vigorem vero ex malitia morbi: Circa declinationem autem ex permutatione omnium melius, qui sane citius separantur, Natura etenim ipsos reliquorum excrementorum instar foras propellit, ut idem auctor, simul & Paulus fatentur. Inter omnes autem lumbricorum species minus periculosi esse censentur ii, qui ascarides nominantur, quamuis forte ex deteriori gignantur materia, tum quia tenues, & exigui sunt, tum etiam quod in loco generentur a principibus partibus remotissimo, intestino inquam recto, præterea quoniam cum alui deiectionibus facile excernuntur, Nec non adhibita medicamenta statim eos attingunt, Minus vero quam teretes ii in pueris gignantur. Teretes autem ipsis peculiare sunt, ut ex Gal. & Paulo liquet. Inter reliquas autem duas differentias, latos videlicet, & teretes, lati priores sunt, quàm teretes, Celsi auctore. Pro lumbricorum autem curatione, primo uictus rationem instituemus uniuersalem, ac communem cunctis iam dictis tribus speciebus, deinde particularem per medicamenta curationem, pro ut quælibet species exigit, conscribemus, A teretibus exorfi. Aer itaque eligatur ad calidum, & siccum parum uergens, potissimum ubi febris non adfit, Somno mediocri utantur, ac potius nocturno, quam diurno, eoq; non a cibo statim, sed per duas saltem horas. Exercitium confert, ueluti uita desidiosa, seu longum ocium lædit. Id autem prandium præcedat, Alius lenis esse debet, quod si id sponte non fiat, balneo, aut clystere citanda erit, Vitæq; animi affectus omnes immoicos, ueluti iram, tristitiam, timorem, & id genus reliquas perturbationes, potissimum a cibo. Quo uero ad eorum cibos, attinet, probi succi esse debent, & qui facile in membra digerentur, nec lumbricorum effectricem causam foueant, uel adaugeant, nec etiam uires superari permittant, Quamobrem & uinum aquosum exhibebimus pro potu, ut Paulus refert, Liberalius autem ipsos nutrire ob hoc ipsum oportet, ne alimenti expertes lumbrici rofiones pariant. Dabitur autem cibus tum præcipue, cum non omnino inaniti fuerint (ut ipse inquit) Quod si infirmul

Pau. li. 4. c. 19
Ascaridū signa

communis lum-
bricorū causa,

Prognostica,
Tex. 18

Lib. 4. c. 57.

Lib. 9. c. 39.

Lumbricorum
curatio.

Ratio uictus,

Medicamentorum ratio.
cap. ultimo.

Cap. 19
Teretrum lumbricorum medicamenta.

mulalui profluuium adfit, ex quo lumbricos magis abundare sciendum est cibo non distributo, forbiles ægris cibi dari debent, admixtis quibusdam etiã astringentibus, verbi gratia, pyris, forbis aut malis punicis, præcipue acidis, iidem etiam forbiles cibi infancibus præbendi sunt, quemadmodũ iis etiam qui cibum auersantur eodem Paulo auctore, Veluti sunt contusæ pullorum, aut gallinarum carnes seu eorundem iura, in quibus iam dictæ carnes prius liquatæ, sunt, brodia consumata vulgus appellat. Reliquis, prædictorum pullo- rum gallinarum phasianorum, starnarum, columbarum iuuenũ, turdorum, merularum, ac aliarum paruarum auium montanarum carnes exhibeantur. Cappares quoque, & colymbades cum aceto conducunt. Inter olera vtrun- que intubum, sonchus, ac fenetio competunt, præsertim si cum prædictis car- nibus decoquatur, in quibus etiam ea quæ extenuandi vim possident, misce- ri possunt, potissimum si febris non adfit, veluti perpetuo vitari debent, quæ infrigidandi vim habent ac crassam, lentamque pituitam gignere possunt. Ceu legumina sunt pisces, lac, caseus, præsertim vetus, panis non fermentatus, & cuncti cibi qui ex eo parari possunt. Quantitas autem prædictorum cibo- rum multa pro vna vice non sit, sed sæpius exiguo cibo vtendum. Porro cum & ipsi è genere eorum sint, quæ tota substantia præter naturam sunt, Pro- fus quoque eos è corpore expelli conueniet, ex Gal. decreto 14. metho. med. Expelles autem (vt ipse inquit) si prius necaueris, Necabis vero amaris me- dicamentis viuentes. nanque obstitunt intestinis adhærentes; at mortui vna cum stercore expelluntur, expelluntur cum hoc etiam viui, sed stupefacti, & vti quispiam dixerit, semimortui facti. Verum quoniã non ita vehemen- tiora medicamenta desiderant teretes, quemadmodum lati, & ascarices, vt pa- tet eodem 14. meth. med. Propterea de medicamentis, quæ teretibus compe- tunt, primo pertractabimus, quorum primum absynthium est, ab eodem Gal. ibidem descriptum, præsertim si pueri non fuerint. Ipsi autem cremor absumatur, aut etiam abrotani, vt inquit Aetius. Pueris vero myxarum deco- ctum mentha admixta præbeatur, ex eodem auctore, febre non existente, aut si eadem sit exigua. Illud etenim animaduertendum est, quod si febris ad sit, & eorum curatio, cum ea, quæ febricitantibus conuenit, coincadat, mitioribus, ac simplicioribus sane remediis vti oportet. Ab acribus autem febres magis exacuuntur. Potui igitur dabitur (vt Paulo visum est) chamæ- melorum, vel myxariorum decoctum, aut etiam ipsamet myxaria decocta esui præbeantur, vel eorundem decoctum chamæmelorũ cũ modico rosaceo, vt Aetius asserit, Isereos succus, aut coriandri semen cum aqua calida, vel cum posca. Similiter & auriculæ muris decoctum, vel cornu ceruini ra- mentum, ac olei immaturi amarissimi cochlearia duo absorbeant. Nam quæ amarum est (vt idem Paulus fatetur) lumbricos occidit, quæ lubricum, de- trahens ipsos cum stercore reddit; Sunt etenim amara omnia nedum ad inter- ficiendos lumbricos idonea, verum etiam ad foetum viuum enecandum, & mortuum eiiciendum, quemadmodum liquet 8. de simpl. medicamentorum facult. cap. de filice, ac etiam cap. de myrrha, Et propterea idem oleum om- phacium cum ptisana decoctum præberi debet Aetio teste. Cunctis vero tam infantibus, quam adultis febrientibus, vel non febrientibus, ex eiusdem auctoris testimonio confidenter exhiberi possunt, etiam si trimestres fuerint infantes, Vermes terreni cum sapa, si vero sapa non admittant cum hy- dromelite, aut vt libet præbeto, nihil veritus, Neque vilitate contempta, septem numero dato. Nos vero cum syrup. ex acetositate citri infra scripti puluisculi. 3. i. indifferenter infantibus, ac adultis febrientibus, & non febrien- tibus exhibere consueuimus. Qui recipit seminis, quod lumbricorum vo- cant, 3. ii. cornu ceruini vsti, seminis citri, & portulacæ ana 3. i. s. fiant puluis. Item

Item eiusdem acetosiratis citri vnc.i. & vnc.s. succi menthæ affumentes, laborantibus sæpe salubriter tribuimus. Cataplasma insuper (ex Aetii testimonio) confici poterit ex supinorum farina in hydromelite decocta, illudque imponendum. Umbilicus autem felle taurino illiniatur, aut melanthio cum lacte muliebri trito, seu absynthio, aut abrotano pinguibus ficibus admixtis. Insuper vniversa spina ex medulla ceruina inungatur. Humido etiã fotu ex oleo chamæmelino, vino, absynthio, & aloë præcordiis accommodato (vt inquit Paulus) vtare, præsertim si ægotantes inflammationem, seu distentionem in visceribus experiantur. Atqui nos ex theriaca, terra lemnia, luto armeno, aqua rosacea, ac aceto medicamentum parantes temporibus, naribus, iugulo, ac carpis vtrisque applicari præcipimus. Ex vtraq; item mentha, & absynthio ac persicæ foliis insimul contusis adiecto aloës puluere, lupinorum farina, atque torrefactis micis panis cum aceto, & aqua rosacea medicamentum ventriculo imponendum paramus, Interim chiam mastichen, ac cinnamomum adiicientes. Insuper ex absynthii, ac persicæ foliis contusis, felle taurino, aloë ac farina lupinorum adiectis, cum oleo, de absynthio, & amygdalarum amararum cataplasma ex oxymelite paramus, vmbilicoque imponimus. In quem etiam vsum Paulus ceratum probat sumptis aloës absynthii, farinæ lupinorum, seriphii, melanthii, singul. scrup. vi. ceræ vnc. i. s. chamæmelini quod satis est felle taurino arida læuigantur. & ceratum conficitur. Si autem febres non molestant, quinimò, ad integritatem, aut totius morbi declinationem vñtum: est acrioribus, ac efficacioribus medicamentis vtendum erit, præsertim robustis corporibus. In quem vsum seriphii decoctum, vel calaminthæ, seu ptereos vtendum, vel cardamomi semen, vel mali punici acidi radice ius ad tertias redactum præbeto, Vel san tonicum, vel abrotanum, vel etiam ambo simul cum melle in catapotia coacta, vt inquit Paulus, aut brassicæ, seu erucæ semen læuigatur, seu absynthium solum, quod etiam frequenter abunde fuit. Similiter si ternilotæ aloës scrup. præbeantur, Remedium est laudatissimum eodem auctore, Acetum etiam scyllinum præsertim ætate prouectioribus cõfert, vt ipse inquit chamæpithos, marrubii, ac etiam helenii decoctum, thymi & pulegii. At Celsus contritum semen vrticæ, aut brassicæ, aut cumini cum aqua, vel mentha cum eadem, vel absynthium decoctum, vel hyssopum ex aqua mulsâ, vel nasturtii semen cum aceto contritum, & pueris dari iubet. Prodest insuper ab inferioribus partibus mulsam iniicere copiosiore, quo lumbrici mellis dulcedine illecti deorsum descendant, vt idem inquit Paulus. Nos vero in hunc vsum consueuimus cum pauco sale, aut saccharo lac per clysterem iniicere asininum, aut caprillum. Quandoque vero ex gallinarum seu pullorem iure, saccharo, & ouorum linteis clysterem componimus, ac iniiciendum mandamus. Si autem putrefacti lumbrici in alto corporibus, aut per pharmacorum poriones enecati non excernantur, sed potius vapores res sursum mittant, educendi sunt, aut aloës, (vt inquit Paulus) aut medicamento amari ex ea confecti potione. In quem etiam vsum, si febris valida infestet rhabarbarum cum melle rorido in myxarum, ac tamarindorum decocto dissolutum præbere consueuimus. Quandoque etiam, febre valida non existente, agaricum imponimus, ac cum prædictis commixtum exhibemus. Neque enim (vt ipse Paulus refert) (expers præsidii erit mediocris alui euacuatio: & in vniversum omnia, quæ lumbricos educunt, aut per acredinem occidendo, aut per amaritiem subducendo, ad excretionem irritando aut per consequentem ad eam, quæ exhibentur, lumbricitatem efficacia cognoscuntur, vt liquet ex Aetio. At si qui sunt qui i lumbricis cum alui profluvio infestentur, eos fluorem inspissando, & concoctionem, per cibos, rum per cataplasmata in melius permutando curare oportet. In quantum, enim fluxiones

fluxiones inualescunt, tantum etiam lumbricorum generatio augetur, ut idem Aetius testatur. Quae de re praepotationibus utendum erit, inter quas plantaginis succus est praefendus, ipsamque plantaginem aridam absument: Nam ex aequo utriusque & fluori, & lumbricis efficax est. Licebit autem & in hoc casu vermibus terrenis, quemadmodum antea dictum est, uti, Coniicienda item sunt in cataplasmata ad fluxiones sistendas concinnata ea, quae ad lumbricos sunt praedicta, & quae fluorem non exacerbant, velut est absinthium, abrotanum, santonicum, malicorium, acacia, & balauustum, galla, poteris, eis quae similia cum cruda, hordeaceaque farina (ut liquet Ex Aetio, & Paulo.) Insuper per extrinsecus ventri imponatur medicamentum ex aloe, melino, & vino, Hoc etiam appetentiam excitat: saepius autem absynthium cum eisdem misceatur, ut inquit Paulus. Latorum vero lumbricorum curatio licet cum praecedenti concordet, ex Aetij, & Pauli testimonio. Quare iam dictis etiam uti possumus, tamen ut Gal. visum est. 14. method. med. id quod etiam videtur confirmare Celsus praecipito loco, vehementiora medicamenta lati lumbrici desiderant, quam teretes. Huiusmodi est filix (inquit Gale. eodem loco) maxime radix eius ut idem Gal. scriptum reliquit. 8. de simpl. medic. facult. latum enim lumbricum interficit, si quis eam. 3. iij. in melicrato ebibat, ut ipse refert. Ad quem modum mirum non est partum viuum enecare, & mortuum eiicere. Item centaurij decoctum potum, & ab inferioribus partibus inditum, chalaminthae, dictamni, vel pulegij confert, ut ex Paulo liquet. Poterunt etiam & in potu vermes terreni (ut dictum est) exhiberi. Proprie autem ad ipsos facit auriculae muris succus duorum cyathorum mensura cum vno cyatho potatus: celerrime namque ipsos educit, ut liquet ex Aetio. Nec minus aqua potui dari debet in aqua lupini, aut cortex mori decoctus sit, aut cui adiectum sit contritum vel hyssopum, vel piperis acetabulum, vel scamonia paululum, ut Celsus testatur. Vel in hunc modum (ex Aetio) medicamentum paratur. Recipe corticis radices, mali puniceae acidae in suprema parte delibratae, piperis, cuiusque 3. iij. cardamomi. 3. vi. marubij. 3. ij. mellis despumati quantum sufficit praebere ex eo cochlearium, post alij comestionem, (ut ipse praecipit) Id quoque medicamentum Paulus scriptum reliquit. Verum ut ex toto affectus discutatur, ut idem inquit, theriacem quoque exhibebis. Pari modo, & qui ascarides nominantur, vehementiora medicamenta desiderant, ex eiusdem Gal. decreto, minimeque eorum curatio negligenda est, sed citra dilationem perfici (ut inquit Aetius debet. Quare acrimuria infusa, aut absynthij decocto oleo admixto vacuandi sunt, vel centaurij decocto cum nitro, & melle, aut absynthij, aut chamaeleontis, aut hyssopi, pulegij, seu chalamynthe aut lupinorum. Infantes vero glandibus ex melle cum salis momento vacuari debent, ut inquit Paulus. Poteris & tu praedictis glandibus adiacere stercoris murium salis gemmae, agarici, ac pulueris hierae simplicis parum. Vbi vero recrementa prodierint, affectus locus illiniendus est simplicibus quibusdam medicamentis, ut acaciae, hypocistidis, rhoisque succo tum alumine liquido, aut alio eiusdem generis adstringenti medicamento. Coacta etenim ab astringentibus affecta pars corroboratur, aptitudinemque, ad animalculorum generationem amittit, atque ascaridas ipsos excludit, ut liquet ex Aetio. Eadem quoque, ac similia astringentia in aqua maris, aut astringenti vino decoquantur, & eo calido aluus foueatur, ac irrigetur. Ceterum ab eodem Aetio medicamentum pueris, & iis, qui perfectae sunt aetatis conuenientissimum scriptum est. Id vero est. Carnem veterem salitam pinguedine derafa sublongam, & rotundam formabimus, atque ita adaptam podici, ac astrictiori ani parti intrudemus ligamentoque adhibito quandiu, sustinere possint, inditam sinemus, deinde soluemus, praedictaque infundemus atque

Latorum lumbricorum curatio, per medicamenta.
cap. 19.

8. de simpl. fac.
cap. de filice,

Ascaridum medicamenta.
14. meth. in fine
Aet. lib. 9. c. 41.

Lib. 4. c. 59.

atq; illinemus. Idem etiam remedium sæpius tepetentes, inquam etiam figuram casei, præsertim, quod vulgus ficulum nominat, portio quædam si redigatur, mellemq; illinatur, ac sæpius immittatur, confert; ut nos non raro experti sumus. Conducit quoq; ad teretes educendos etiam infantibus.

negi ἡπατικῶν.

id est de Hepaticis, vel ij, qui iocinoris imbecillitate laborant. Cap. 82.

Hic parti, quemadmodum & cæteris omnibus, duplex morborum genus euenire consuevit, Gal. teste. 5. de loc. affect. Quorum vnum a sola intemperie tumorem præternaturam ortum habet. Alterum ubi vna cum intemperie tumor quoque infestas, ut inflammatio, erysipelas, scirrhus, inflatio, aut crassis, & viscosis humoribus obturatio (idque in extremis vasorum partibus) interdum etiam abscessus, aut exulceratio ipsum exercent, ut liquet ex Paulo cap. 46. lib. 3. Nos vero de ijs hepaticis affectibus pertractare hic intendimus. In quibus affectus ipse, iocinoris imbecillitas duntaxat est. Nanque hos solos proprie iocinorosos, seu hepaticos medici nominare consueuerunt, quando videlicet, citra aliquod manifestum in viscere malum in propriis affectionibus debilitatur: Tunc etenim ægrum hepaticum appellant, ut liquet apud Gale. cum 5. de loc. affect. & 8. de compositione medicamentorum secundum locos, tum etiam 3. de caus. sympto. quem postea statim sunt Paulus præcitato loco, Aetius cap. primo lib. 10. & Alexa. cap. 3. lib. 8. quemadmodum etiam celiacos, & stomachicos vocare consueuerunt eos, qui neque inflammationem, neque aliquem alium præternaturam tumorem in visceribus habent, sed tantum imbecillitate laborat ventriculus, seu stomachus. Cum vero viscus hoc non vnam duntaxat, sed plures actionum facultates habeat, contingatq; sæpe vnam ipsarum præcipue lædi Interim duas, & tres, atque etiam omnes quatuor simul, ut liquet apud Gal. præcitatis locis, præsertim eodem 8. de compositione medicamentorum secundum locos. Munus autem vnius est attrahere cibum, & alimentum in sese; alterius vero ipsum attractum obuoluere, continere donec permutans ipsum sui ipsius faciat partem, quæ facultas (permutans scilicet) principalissima, & fere prima ipsius est, quam alteratiuam vocamus: hæc inquam concoquere, permutare, seu alterare, atque assimilare sibi ipsi alimentum debet. At ea, quæ iuxta hanc alterationem remanent recrementa per aliam facultatem, quam excretiuam & expulsores nominamus, expelluntur, Harumq; facultatum quidam omnibus corporis nostri partibus cōes esse dignoscantur, Ceu attractrix, retentrix & expultrix, velut etiam reliqua, quæ generatim alteratrix nūcupatur, speciatim vero huic visceri) quam principalissimum eius nominauimus (sanguifica appellari solet, ut eodem 5. de loc. affect. patet ac 6. de Hipp. & Plato. decretis, Propterea cum iocinoris imbecillitatem dicimus, non eam ex qua facultates illæ, quæ communes sunt singulis corporis partibus, imbecilles redduntur, intelligere volumus. Nam si hoc modo subintelligeretur, non propria esset iocinoris affectio, sed communis singulis corporis partibus, veluti, & tres illæ facultates attractrix videlicet retentrix, ac expultrix communes sunt, sed eiusdem iocinoris propriæ facultatis imbecillitatem subintelligimus. appellamus autem eam propriam, propterea quod nulli alteri corporis parti cōmunis sit, ceu ceteræ modo dictæ: & quamuis ea contineatur sub alteratrice facultate generatim dicta, speciatim tamen sanguifica vocatur, ex propria dicti iocinoris essentia, seu substantia, ac peculiari quadam eiusdem temperie

Cap. 7. in pria.

Hepatici seu iocinorosi qui appellantur.
5. de loc. af. c. 7.
8. de com. med.
sec. loc. c. 6.
3. de caus. symp.
c. 2. post med.

Cap. 6.

5. de loc. affect.
cap. 7.
6. de Hip. & Pl.
sec. c. 4.

6. de Hip. decret.
cap. 8.
4. de usu part.
cap. 3.

cap. 34

5. de loc. aff. c. 7.

8. de com. med.
sec. loc. c. 6.
3. de caus. symp.
cap. 2.

Cap. 6.
Quid sit pro-
prie hepaticus
affectus, seu ieco-
ris imbecillitas.
Lib. 1. de præfag.
expul. cap. 4. in
prim.

rie orta, ex qua substantiæ proprietate, ac specie propriam quoque esse functionem oportet. Veluti in singulis alijs instrumentarijs partibus, ex substantiæ proprietate propria quædam functio consequitur, & propterea redditum à ventre succum sibi ipsi similem efficit, maxime nanque rubrum & ipsum cernitur, per inde ac sanguis. Idcirco carni, substantiæq; suæ (quæ à quibusdam medicis parêchyma nuncupatur) quasi interfusionem dixeris, prædictum succum similem efficit. Nam vnumquodque instrumentarium animalis membrum compositum cum sit ex alijs simplicioribus partibus proprium quiddam in substantia ita adeptum est, ut nihil aliud in vniuerso animalis corpore simile reperitur. Nihil itaque mirandum est, si iecoris corpus ex propria suæ natura functionem propriam consequutum sit, quæ quidem sanguinis generatio existit (Gal. auctore præcitato lib. 6. de Hipp. & Plat. decret. & 4. de usu part.) cum vnumquodque membrum succo substantiæ suæ quam simillimo nutriatur, cumque sibi alterando, & immutando præparet sanguinis igitur generationem nihil aliquid nisi caro iecoris procurabit, quæ quidem caro sicut supra demonstrauimus, proprium corpus iecoris est. Cum itaque hæc ob læsa est propter imbecillitatem dumtaxat ex aliqua intemperie ortam, tum hepaticum affectum peculiariter ipsum nominibus, ac ægrum hepaticum appellabimus. Nec quispiam mirari debet quod affecto iocinore, ac eiusdem propria substantia oblæsa, ceu quauis alia nostri corporis parte, vna dumtaxat eiusdem functio vitetur, reliquis illæsis permanentibus, licet omnes ex proprio temperamento, ac substantia eiusdem oriantur, nec quod omnes eius virtutes simul lædantur, aut aliæ magis, aliæ minus, aliæ illæse in totum sint (ut Gal. scriptum reliquit. 3. de caus. symp.) non enim omnes (ut ipse inquit) similem instrumentis statum requirunt. quo fit, ut licet tota particula secundum eius temperamenti proprietatem agat, tamen in quolibet instrumento alias alia facultas vel fortior, vel imbecillior sit, facta ad actionem relatione ut eodem 5. de loc. affect. liquet. Verum cum functio hæc peculiaris ipsius iocinoris existens trifariam, velut quælibet alia ledi possit, neque etiam si quomodolibet ipsa oblædatur, hepaticum nominabimus. Nam si ablata esset, aut eadem vitata, nequaquam hepaticis affectus dici posset. Sed cum ipsa dumtaxat diminuta fuerit (ut liquet apud Gal. eodem 8. lib. de compositione medicamentorum secundum locos, & 3. de caus. symp.) quo loco similem affectum iocinore incidere in hepaticis dixit, ijs, qui imbecillo ventri accidunt, quando is quidem appetit, sed cibos, quos sibi admouet, cum non concoquat ijsdem grauatur, & semicoctos ad intestina demittat, atque is quidem ad vomitum quoque concitatur. Iecur autem, cum vomitione aliquid ad portionem facit, quod nutrimentum per vasa, quæ in mesenterio sunt, veluti per ora quædam traxit, rursus per eadem semicoctum ablegat. Quo fit, ut hoc symptoma (ut ipse refert) semicoctorum ciborum vomitioni ad portionem se habeat. Verum quanquam id accadat circa initia, non dum magnam debilitatem hepate habente, sed adhuc concoquere, & alimentum alterare, velut in formam sanguinis petente, aucta tamen affectione, distributum alimentum diminutè concoctum ad sanguinem in viscere prius existentè admiscetur, corrumpiturque temporis progressu etiam hic vna cum alimento circa ipsum non concocto, ut præcitato lib. 8. de compositione medicamentorum secundum locos patet, Ex inde fit ut nedum diminutè, sed etiam deprauate functio oblæsa sit. Ex ijs itaque constat affectionem hepaticam, de qua hic verba facimus, nihil aliud esse, quam imbecillitatem actionis propriæ eiusdem iocinoris ex aliqua intemperie ortam, citra aliquod aliud manifestum in viscere malum. Nam omnium facultatum essentiam in peculiaribus partium temperaturis consistere clarum est in Gale. doctrina, præsertim lib. primo de præfagitione

lagitione ex pulſibus, libr. de multitudine, ac quinto de loc. affect. Proinde non ab re, cum iecur ad aliquam octo intemperaturarum labitur, viribus ipsius, ac proprię eius facultati noxa accidit. Quod vero in hac affectione iecur oblaſum ſit, ex eiſdem proprię facultatis noxa liquet. Percipitur autem ea ex ſpecie excretionis (veluti etiam aſſimilarunt, qui ante Gal. fuere) maxime ſimili carniſum loturę, præſertim cruentarum, atque recenter eneſtarum: Quinimo ſi quis id, quod excernitur, aquoſum ſanguinem nominet, clare quoque illud interpretari videtur, quemadmodum ſcriptum eſt ab eodem Galen. præcitat. locis 3. ſcilicet de cauſ. ſympto. octauo de compositione medicamentorum ſecundum locos, & quinto de loc. affect. Nam ſi feci ſanguinis ſimilia per aluum excrementa deliciatur, Ita quod qui excernitur ſanguis & nigrior quā pro natura, & ſplendens apparuerit, utpote ſanguine, & nigra bile commixtis, licet iecur affectum quoque eſſe conſiciendum ſit (ut eodem quinto de locis affect. liquet) indicium tamen eſt ipſius hepatis ſuperaffantis ſanguinem: Quare eius affectio humidę deiectioni ventris eſt aſſimilis, quę ad exactam quidam perducta eſt concoctionem, non tamen diductionem eſt conſequuta. nā ſicuti hanc quoque venter omnino ab ipſa grauatus excernere cupit, ſic iecur ubi aſſatim diducti in ipſum nutrimenti fructū cepit, non patitur id amplius apud ſe morari. cum vero id recta progredi quauis ex cauſa nequeat, neceſſe eſt retro ad ventrem recurrat, & propterea hiſ, quem mox diximus, ſanguis in tali affectione apparet, in qua non in propria eſſentia, veluti in modo dicta affectione iecur affectum eſt, nec peculiaris eius actio oblaſa, ſed propter frustratam ſanguinis diductionem ab eius multitudine grauatum, cum amplius retineri non poſſit, neceſſum eſt retro iterum ad ventrem, ac inteſtina recurrat. Deuenit autem ad dictum ſtatum, qui ex ventre in iecur deductus eſt ſuccus, Cum iſ, propterea quod vltius in corpus non diducitur, inibi diutius moratur. A nonnullis autem talis exertionis ſpecies dysenteria quoque nominatur, ut liquet tertio de cauſ. ſymptomat. ceu prædicta cruenta deiectione, quę ex iocinoris imbecillitate prouenit, appellari conſuevit eodem, Galen. teſte. libr. quarto de artic. Quamuis errent (ut ipſe inquit. quarto de locis affect.) hunc affectum putantes eſſe dysenteriam Alexand. hepaticam dysenteriam appellat. Interim vero contingit, quod pars aliqua cum affecta ſit, viribus ipſius iam factis robuſtioribus, præſertim ob expultricis facultatis robur, per ipſum hepar expurgetur, etiam dum integra conſtat valetudine: ſed tantum ratione plenitudinis affecta, & proinde excretio ſequitur ſynceri ſanguinis, ſimilis ei, qui ab hoſtia interfecta profundi conſuevit, ac per circuitum repetit. Id autem euenire ſolet, vel mutilato aliquo membro, aut ubi quis in exercitatione educatus ad otium ſe conuerterit, vel etiam mulieribus retentis menſtruis, qui etiam affectus a nonnullis cruenta dysenteria vocatur, in qua affectione neque iecur ipſum oblaſum eſt, quamuis per ipſum partium aliqua purgetur, propter aliquam iam dictarum cauſarum. Cum itaque ſanguinolentę excretionis per ſedem (præter eam, quam in propria iam dicta dysenteria euenire diximus) tres ſint differentię, ut eodem tertio de cauſ. ſymptomat. ſcriptum eſt, ea duntaxat iecur in eius propria eſſentia, ac facultate oblaſum eſſe oſtendit, in qua per aluum excernitur ſanguinolentus humor, talis conſiſtentię, vel ſi quis ſanguinem cum aqua confuſiſſet, ſeu velut ſi quis victimę recens maceratę carnes aqua lauiffet (ut diximus.) Nam in aliis duabus, aut iecur oblaſum non eſt, aut ſecundum alium quandam facultatem noxam patitur. In qua item affectione ſenſim homo, moraque temporis leſionem in alimento, & colore contrahit, ceu ſexto de Hippo. & Plato decr. ſcriptum eſt. Ex quo duntaxat colore iecur affectum eſſe nouit Gale: (ut patet. quinto de loc. affect.) Quod vero ex eiſdem proprię facultatis læſionis modo

C c qualitat. is

Lib. de multita.
c. 3. prope prin.
5. de loc. af. c. 7
Pars affecta.
dignotio,

3. de cau. ſymp.
Cap. 2.
8. de com. me.
ſec. loc. af. c. 7.
Loco citato.

Cap. 2.

4. de articulis
comm. 40.
5. de loc. af.
Loco citato.
Alex. h. 8. c. 3.

Sanguinolentę
excretionis dif-
ferentię quot
ſunt.
Cap. citato.

6. de Hip: dec.
cap. 3.
5. de loc. affect.
Loco citato.

- Quis affectus sit.** qualitas affectus percipi potest, nulli in dubium venit. Est autem is sympto. in genere noxæ functionum naturalium, alteratricis scilicet, ac magis speciatim sanguificæ ipsius iocinoris, quæ non ablata, neque deprauata est, sed diminuta, ac imbecilla, Cuius imbecillitatis causa quævis intemperies esse poterit, vt ex iam dictis colligitur. & licet hæc intemperies possit generari circa contentas in ipso iocinore venas, & arterias, & iuxta materias in spatiis ipsarum contentas, nec non iuxta propriam ipsius hepatis substantiam, quam Erasistratus *παρ' ἑχονα* Græce appellat, affusionem, seu perfusionem latine dixeris, vt eodem 8. de comp. medic. secundum locos a Galen. scriptum est, Quoniam factas hæc, quæ sanguifica dicitur, in iocinoris proprie corpore, seu propria substantia consistit (vt 6. de Hipp. & Plat. de cr. liquet) propterea & eadem substantia, seu idem corpus intemperatum reddi oportet, quo affectus hic generationem habeat, non negantes, quod interim primo, interdum vero secundario ipsum oblædi possit, tunicis videlicet vasorum, aut humoribus in eorum cauitatibus contentis, siue vtrisque primario affectis. Calida igitur intemperie circa hepar existente, imbecillitatemque iocinoris generante, colliquationes fiunt primum humorum, deinde etiam carnis ipsius hepatis, & euacuatur per ventrem bilis crassa, graueolens, & abunde colorata, quemadmodum in pestilentibus febribus contingit, astat præterea eadē, & adurit cum contentos in ipso humores, tum eos, qui per mesenterii venas deferuntur, Item in ea inappetentia adest, sitis vehemens, febris insignis, ac vitiosorum humorū vomitus, Galen. teste. 8. de comp. medic. secundum locos, & 5. de loc. affe. Sæpe etiā eruginosa vomunt, ac similes apparent deiectiones, Linguam habent scabram, Corpus siccum, & gracilius videtur tanquam iecore colliquefcente, & in cruentas sanies contabescente, Temporis autem spatio etiam ex ipsa substantia tandem particule longe foetissimæ deferri cernuntur, Alexa. teste præcitato cap. 3. li 8. Cæterum (vt ipse inquit) ex temperamento ægri, ætate, anni tempore, & prægresso victu reliquum licet firmioris cognitionis gratia capere, Nam temperamento calidi sunt, & tenues habitu, pilosque densos habent, curis dediti, & animo iracundi. Qui vero ex frigida iocinoris intemperie laborant, eis, neque assidue excretiones, neque multæ fiunt, durat tamen affectus diutius, & per aliquos dies profluet ipsis venter maiori copia, Cuius neque foetor similis est iis, quæ ex calore sunt, liquefacta, neque calor similis, aut compages, Verum minus graueolentia ab his excernuntur, speciem putrefacti sanguinis, nō colliquatæ carnis habentia, aliquando id, quod excernitur, veluti sanguis niger apparebit, Verum diligenter consideranti neque sanguis niger est, neque grumus, sed velut limus quidam sanguinis crassi, qui prope ad atram bilem accedat, & plures, ac ægre iudicabiles colores circa eiusmodi affectionem in egestionibus apparent, & nonnulli eorum, non solum non perdunt cibi cupiditatem, verum etiam interdum multo magis, quàm antea se appetere aiunt. Contentos autem in iocinore humores crassos, atque ad fluxum, & motum contumaces redunt, Id vero, quod ad ipsum fertur, & pituitosum, & crudum, & semicoctum efficiunt, quemadmodum Gale. præcitatis locis scriptum reliquit, facies in istis non collabatur, febris tamen languidia in eis apparet, reliquum etiam corpus, temperamentumque ad frigidius magis inclinare videtur, adhæc præcedens victus talis deprehenditur, item vita ociosior balnea copiosiora, & intempestiua, eaque post cibum, vt ex Paulo, ac Alex. liquet. Vbi autem sicca fuerit iecoris intemperies, recrementa ficiora erunt, corpus siccus, & tenuius, sitim magis conciliat, & deiectionis alui paucae, & crassiores apparebunt: Quemadmodum, si humida fuerit neque sitim efficiet, neque siccitatem, sed magis etiam linguæ humiditatem, neque vlla sitis vrget, & vultus, totumque corpus diu non collabatur, postea autem deiectionis ventris plurimæ
- cap. 6**
- Cap. 8.**
- Si ex calida intemperie fiat, signa.**
- Locis citatis.**
- Si ex frigida intemperie laborant, signa.**
- Si ex sicca, signa.**
Humide intemperiei signa.

ma apparent, magisq; tenues, & aquosiores reddit humores, vt liquet ex præcitatis auctoribus. Si autem humida, vel sicca intemperies calide, vel frigide fuerit admixta, hæcmet indicia ipsam demonstrabunt insimul permixta, & pro vt uarie permiscantur, varias indicabunt compositas temperaturas. Huius affectionis curatio haudquaquam despicienda est, quoniam nonnulli, propter curantium incertiam (vt Gale. inquit quart. de artic.) perierunt: Quomodo autem causa fuere medici vt ægri morerentur, ibidem declarauit. Ex calida item intemperie, si iocinoris imbecillitas fiat, quam primum rite curari debet, Nam temporis spatium colliquationes ex ea fiunt, primum humorum, deinde etiam carnis ipsius hepatis, quinimo totum corpus absumitur (vt ex Gale. & Paulo liquet.) Nec minus, si ex frigida intemperie ortum duxerit, par uifacienda non erit eius curatio, Nam tractu temporis, corrupto in viscere sanguine, febris superuenire solet, quæ tamen ab imperitis medicis vsque adeo negligitur, vt laborantem interdum nequaquam febricitare putent, quinimo si ultro ea intemperies frigida augeatur, permurabitur ad aquam intercutem, quemadmodum idem Galen. quinto de loc. affec. scriptum reliquit. Scopus autem curationis in huiusmodi affectionibus communis, primus est, iura intemperiei contrarietatem, hoc est vt intemperie ad contrarium deducamus. Peculiaris autem unicuique per cuiusque contrarietatem, Nam calidam dispositionem semper refrigerare oportet, frigidam vero calefacere similiter humidam exicare, & siccam humectare, Galen. & Aetio testibus. Cæterum pro eo scopo perficiendo, quæ a parte affecta sumitur indicatio adicienda est, cum princeps membrum sit iecur, vniuerso corpori dispensans alimenti materiam, qua de re omnibus hepaticis remediis, pro quacunque intemperie curanda, tum quæ per os sumuntur, tum quæ forinsecus imponuntur, aliquid ex adstringentibus admiscere oportet, quo firmitas visceri conseruetur. Id quod scriptum reliquit Galen. decimo tertio method. medend. quem postea sectata sunt Paulus, & Aetius. Si igitur calida fuerit iocinoris intemperies, aer eligendus est id frigidum vergens, somnus moderatus, atque nocturnus, Quies præcipienda, Curareque oportet vt alius humecta sit. Quod si natura perlicæ nequeat, arte perficiatur lenientibus clysteribus. Immodicæ animi perturbationes cauendæ sunt, ira præsertim, curæ, ac sollicitudines. In vniuersum autem cibi erunt, qui mediocriter refrigerant, nec obstruant, vt inquit Paulus atque illi magis deligendi sunt, qui probe distribuuntur, & robur, temperiemque inducunt, & vim abstergendis visceribus, aperiendisque efficaciam habeant, Alexand. teste. Quapropter cremor ptisanæ, atque etiam ipsa ptisana magnopere conducunt, Seris item, & cichorium interim crudum, interim coctum cum coriandro assumptum. Item decoctum ipsius, succusque epotus, denique mulsæ iniectus & calidis, & frigidis iocinoris uitis opitulatur, vt inquit Paulus, eiusdem quoque generis sunt intubus, & sonchus, & cætera, eiusdem Pauli, & Alexand. auctoritate. In hunc etiam usum lactuca quoque dabitur cum apii radice, & betæ percocta, aut idem per se, licet commodior sit, si acetum, intercoquendum recipiat, vt idem refert Alexand. Quandoque eadem, & reliqua modo dicta olera in gallinarum, seu pullorum iure decoquantur, quamuis multa iura, præsertim pingua vitanda sunt, eorundem etiam pullorum, seu gallinarum, perdicum, seu phasianorum, turdorum, aut turturum, & paruarum auium carnes gustare poterunt, tum aliquo prædictorum olerum decoctas, anserum quoque ventres conferunt, quemadmodum anates, ac omnia, quæ in paludibus degunt, nequaquam offerri debent. Saxatiles pisces offerri possunt, & si non admodum magna fuerit calida intemperies, aut obstructio iocinoris, cibos validos offerre conuenit, qui ægre conficiantur. vt patet ex eodem Alexand. Cæterum fructus pomacei, pepones, mala dulcia, & cotonea

Prognostica,
com. 40

Gal. 8. de comp.
med. sec. loc. c. 6
Pauli, li. 3, c. 46

Cap. ult.
Curandi metho-
dus.

Gal 8. de comp.
med. sec. loc. c. 6
Aet. lib. 10, c. 1.

13. metho. c. 16.
& 17.
Victus ratio si
ex calida hepa-
tis intemperie
fiat hepaticus
affectus.

bene matura præberi possunt, item malorum punicorum, grana & ante cibum modicum, & cum pane dare conuenit; Nam iecur admodum imbecille, & stomachum collapsum firmare possunt, ut idem inquit Alexan. maxime si eger ingentis siti crucietur. Præberi insuper possunt cerasia, & pyra astringentia, sorba, vel mespila, non tamen sæpius adhibita. Castaneæ quoque tuto sumuntur, nam boni succi sunt, & non cito a calidis incomptis corrumpuntur præsertim decoctæ. Verum nihil adeo hepaticis opitulatur, ut vua passa, quæ licet contemptilis uideri possit, ob familiarem eius usum, ut Galen. inquit octauo de compositio. medicament. secundum locos: hoc ipsum tamen (ut ipse refert) eam facit utiliorem. nam cum familiaris nobis sit, in tantum astringens est, quantum opus habet viscus affectum. habet autem & vim concoctoriam crudorum humorum, & vim coercendi maligna, estque ipsa haud facile putredini obnoxia, & ultra hæc secundum totam substantiam visceri ipsi familiaris est, & propria. Nuces, autem, pistachia, & nuces pineas vitare oportet ut inimica (eodem Alexan. auctore,) Pro potu vinum omnino circumcidatur, nisi alteram ob causam, (nempe stomachi imbecillitatem) illud requirant, tunc etenim tenue, & quod Græci *ἐλγυρόρον* vocant & dilutum aliquod exhibeatur, ut Paulus precipit, Verum pro eo utantur succo malorum punicorum acidorum, aut aqua hordei, seu aqua, in qua cichorium fuerit decoctum, aut seris siue sonchus, adiectis coriandri seminibus præparatis, Asclepiadis auctoritate. Galen. octauo de compositione medicamentorum secundum locos, nonnulla medicamenta pro huius affectionis curatione approbavit, Inter quæ primum est, Si succi cichorii cyathum vnum cum aquæ calidæ cyathis tribus dabis, mellis attici cochleario addito, quod medicamentum, Asclepiades Antonii Musæ esse dicebat; aut picridis recentis, seu seridis recentis succi cyathum vnum cum aquæ mullæ calidæ cyathis tribus: Est namque prædictorum olerum, præsertim cichorii, & seridis facultas subfrigida, & subamara, ac moderate astringens & propter has qualitates optima pharmaca calidis intemperaturis ipsius hepatis existunt, ultra hoc enim quod moderate refrigerant, amplius & robur visceri addunt per astringentiam facultatem, insuperque commissuras osculorum venarum in sima visceris parte ad eas, quæ in gibba sunt, extergunt, neque frigidas intemperies magnopere sædunt, quem admodum quæ frigidam humiditatem absque astrictione, aut amaritudine possident facere solent. Utilis autem non solum succus ipsorum est tum recens tum exiccatus, sed & ipsa olera exiccata, tusaque, ac trita potui inspersa, & eorum decoctum in potu acceptum, similiter & radices ipsorum præsertim cichorii. eiusdem quoque Asclepiadis auctoritate medicamentum approbat ex radicis chamæpithyos drac. viii. radicis cichorii drac. iiii. contusis, & melle cocto exceptis, si eiusdem nucis ponticæ magnitudinem præbeas, & aquæ calidæ cyathos tres insuper bibendos. At qui melius forte esset radicis chamæpithyos drac. iiii. radicis cichorii drac. viii. assumere. ex Archigene autem trifolij acidi, decoctum ad tertias, & per triduum bibendum, datum pro vice cyathum vnum commendat, aut radicis rubi corticis heminam vnam, cum aquæ congio vno in nouo vasculo ad residuum quartæ partis coquito, & ad succum per noctem subdio expositum mellis cyathos sex admisceto, & ieiunis ad triduum bibendum dato. Similiter senecionis decoctum, tanquam valde commodum approbat: Aetius quoque præter seridis, ac intubi succum, senecionis etiam succum, aut decoctum, seu etiam perdicij succum commendabat. Quinetiam Philonis antidotus semel tamen exhibita (ut ipse refert) omnem aliquando calidam intemperiem mirabiliter sanauit. Id quod prius scriptum reliquerat Gale. eodem octauo de compositione medicamentorum secundum locos. Nec mirum si semel tantum exhiberi debeat, quoniam (ut idem Galen. testatur) nullum hepaticum phar-

macum

cap. 7.

cap. 8.
Medicamentorum ratio.8. de ecom. med.
sec. loc.

Cap. 9.

Cap. 7.

macum vehementer refrigerans esse debet. Nos vero ex cichorii succo, seu hortulanæ endiuix (quam scariolam vocant) syr. parari præcipimus, ac prædictis exhibemus. Interim oxysaccharum, aut syr. ex succo, vel infusione rosarum adiicentes. Item in morsulis medicamentum componimus, quod recipit tria santalorum drac. i. diarhodon abbatis scrup. i. seminis cichorii scrup. s. vuarum passarum drac. iij. seminum melonum drac. iiii. sacchari dissoluti in aqua rosarum, & cichorii quantum satis sit formentur morsuli, quorum quilibet sit ponderis vnc. i. exhibeaturque cum pauca aqua, in qua folia, & radices cychorii, vel ortulanæ endiuix fuerint decoctæ. Extrinsicus aut epithemata adhiberi possunt, Vt Recipe succi cychorii, & hortulanæ endiuix, & lactucæ, seu solani, singul. vn. iiii. aquæ rosarum rubearum, & cychorii, seu endiuix, an. lib. i. santalorum, corallorum rubeorum, cuiuslibet 3. iiii. aceti albi vnc. ii. misceantur & fiant epithemata, æstate sub frigida, hyeme vero actu calida. Poteris insuper hoc unguento uti, Recipe olei rosacei, de absynthio, myrtini, & de papauere, seu nympha ana vnc. i. sandalorum omnium, & corallorum rubeorum ana drac. ii. succi cychorii, & lactucæ, singul. unc. s. aceti parum, & cere quantum sufficit, fiat unguentum. Insuper ex foliis plantaginis, & cychorii, ac malo cotoneo in aqua, & oleo rosaceo decoctis, ac contulis, adiecta hordeacea farina, & exiguo croco cum pauco aceto, fiat cataplasma, & vtere. At vbi frigida intemperie iecur laboret, contrariis pugnandum est. Quapropter uniuersa victus ratio ad calidum uergere opus est: Cibi, qui pronte concoquantur, ac boni nutrimenti sint, offerendi, hinc panis cum vino recte assumitur. Alexand. & Paulo testibus. Ex oleribus brasicabis, teræ incocta potius conuenit in gallinarum, pullorum seu perdicum iure, phasianorum, aut starnarum, item carnes prædictarum gallinarum, perdicum, phasianorum, pullorum, starnarum, aut turdorum, aliarumque paruorum autum gustare, atque anserum ventriculos (vt inquit Alexand.) In quarum carniū iure serpillum, satureia, hisopum, fœniculus, samfucus, oreoselinum, ac similia decoqui poterunt, Condiendaque iura sunt cinnamomo, aut garyophyllis, interim quoque sed raro, prædictas carnes assas edant, præsertim cum alios cibos ægri fastidat. Inter pisces maxime omnium mullus, etiam si assetur conducit. Insuper castanæ mediocriter assæ iuuant, si non admodum crebro edantur. Conueniunt quoque & vix passæ. Pittachia autem, & amygdalæ cauere debent, eo quod facile corrumpantur, & oleosa sint, prompteque in bilem mutantur, & recrementum asperius reddant, Vt hinc venter magis, crebriusque irritetur, vt ex eodem Tralliano lib. octauo cap. quarto liquet. Pro potu vino vrantur, præsertim tenui, & odorifero, Nam ipsum conuenientissimum existit, quoniam nutrit, concoquit roborat, & putrefactioni resistit. Et intemperies ex humiditate facta sit, & frigiditate, Eam citra omnem molestiam, ac securè sanat, Gale. teste eodem octauo de compositione medicamentorum secundum locos. Quo ad medicamentorum rationem attinet, calfacientia adhibeantur. Verum magis minusue calfacientia, pro frigiditatis obtinentis magnitudine accommodare oportet, vt idem inquit Trallianus. In quem vsum filicis, vel anethi succi cyathum vnum cum aquæ mulsæ cyathis tribus dato, ex Asclepiadis auctoritate, Item nardi celticæ partes tres, absynthii partem unam, tusa, & cribrata melle cocto excipito, & mistum deligendum dato. Vel Recipe anisi, seminis apii, asari, amygdalarum amararum mundatarum singul. drac. iiii. præpara cum aqua, & reduc in pastillos, ac exhibe drac. i. cum vini diluti cyathis tribus. Febrientibus autem cum aqua mulsæ, aut costi triti cochlearium præbe cum aquæ mulsæ calidæ cyathis tribus. Insuper fœniculi recipe drac. i. petroselyni drac. ii. anisi, amygdalarum amararum absynthii, singul. drac. i. croci, myrrhæ utriusque obolos tres, excipe aqua, ac redige in pastillos, & dato drac. i. supra dictum est, hæc ex

Topica.

Si ex frigida in
temperie iecur
laboret, Curatio

Victus ratio,

Medicamentorum
ratio.
Cap 7Gal. lib. citato
cap. 8.

8 de eor. med.
sec. loc. c. 7

Purgans medi-
camentum quan-
do exhibendum
sit.

Alic. lib. 3. sen-
74. tract. 2. c. 3
Topica.

Asclepiade, Verum eorum medicamentorum quædam magis, quædam minus
excalfaciunt, ut liquet ex componentibus ipsa, Propterea eisdem utare, pro
ut intemperies exigit. Similis quoque ratio habeatur omnium, quæ infra con-
scribentur intus, & extra adhibita. Atqui idem Galen. præcitato loco antido-
tum Cyphoidem, ex Andromachi auctoritate magnopere comendant, ac
cuncta, quæ eius compositiones ingreditur accurare examinat, Eius autem
descriptio talis est Recipe vix passæ carnis drac. xxv. alias centum. croci 3. i.
alias obolos iii. calami 3. ii. s. bdelli drac. ii. s. casia sesquidrachmam, cinnamo-
mi obolos ii. spicæ nardi drac. iii. floris iunci odorati drac. ii. s. myrrhæ 3. iiii.
terebinthinæ 3. iiii. ramentorum aspalathi drac. ii. mellis drac. xvi. vini, quod
satis est. Acrius calefacientibus. ac firmitatem addentibus utendum esse præ-
cipit, velut est, Nardi spica, capnium, semen pelecini & quæ his similia exi-
sunt, In quem etiam usum miro quodam modo conducit compositus Gale-
ni ex malorū cotoneorū succo medicamentum, in fine sexti libri de sanita-
te tuenda descriptum, Non magis salutare (ut ipse refert) iis, quibus ventricu-
lus imbecillus est, quam iis quibus invalidum iecur existit, Ceu ipse in non-
nullis, præsertim in primogenito filio Illustris Ducis Thermularum expertus
fui qui ex iocinoris intemperie frigida hepatica dysenteria (ut dicunt) labora-
bat, quibusdam tunc temporis medicis inuitis, Corpore tamen prius purga-
to, ut Capite diarrhæa scriptum est. Eius autem compositionem, ac assu-
mendi modum cap. de dysenteria studiosi requirant. Poteris etiam in eundem
usum præbere syrup. ex absynthio, ex fumaris succo aut de byzantiis cum ad-
ditione, seu de eupatorio, ac nonnulla antidota calefacientia, ceu aromaticum
rosaceum, dianisum diacinnamomum, diarrhodon Abbatis, diacalamyntham
& reliqua huiusmodi, vel hoc nostro efficacissimo medicamento utare, Re-
cipe seminis anisi, fœniculi, apii, & plantaginis singul. grana iiii. costi, glycyrr-
hizæ ana scrup. i. casilignæ, cinnamomi veriusque scrup. s. marum paltarum
drac. iii. croci, spicæ, calami aromatici, & schæuu anthus, ana grana ii. cornu
cerui vñi, & amygdalarum amararum cuiuslibet drac. i. seminum melonum
drac. iiii. sacchari dissoluti in aqua rosacea quantum satis sit, fermentur passil-
liquorum vnum vice qualibet assumat cum exiguo vino albo odorifero: Si ve-
ro tractu temporis, ob frigidam intemperiem humor etiam pituitosus sangui-
ni permixtus in viscere putrescat, seu corrumpatur, retineaturque in ipso ioci-
nore aut veni circa ipsum, ac febris superueniat, ipsum euacuare oportet his
medicamentis, quæ nedum educendi pituitam facultatem habent, sed etiam
viscus ipsum roborandi, cuius farinæ agaricum est (Paulo auctore) quem secta-
tus est Arabum princeps, Id quod nedum ratio, & auctoritas, sed experientia
comprobat, Nanque prædicto egro, reliquis medicis omnino pugnantibus au-
dacter exhibui, exigua quantitate myrobalanorum chebularum, ac rhabarba-
ri adiecta, nedum semel, sed bis, ac feliciter successit, Ceu in nonnullis aliis
& ante, & post eum expertus fui, quemadmodum cap. de diarrhæa fusius con-
scripsimus. Nec minus si circa ipsum iecur biliosus retineatur succus, Medi-
camento ipsum educente purgandus erit, quod vim etiam habeat ipsum cor-
roborant, Veluti rhabarbarum est, ac reliqua, quæ eodem cap. de diarrhæa,
ac dysenteria recensuimus, Nanque in hunc usum (ut Paulus refert) idonea me-
dicamenta, quæ ad cæliacos, & dysentericos scripta sunt, deligi debent. Ex-
trinsecus vero illiciones faciendæ sunt ex oleo chamæmelino, nardino, ane-
thino, sampsucino, & lentiscino, seu de absynthio, Vel in hunc modum vnguen-
tum paretur, Recipe succi eupatorii, marrubii, & fumaris ana drac. iii. assari,
spicæ nardi, & celticæ ana scrup. i. cinnamomi iunci odorati, & ligni aloes
ana scrup. s. olei rosacei, chamæmelini, & de absynthio ana vñi. i. ceræ quod
satis sit, & aceti parum, misceantur, & fiat vnguentum, Item ex fœnu græci ta-
rina,

rina, hordeacea, feminis lini, ac lupinorum ana drac. iiii. florum chamæmeli, eupatorii, absynthis, melilori, & iunci odorati, singulorum scrup. j. myrrhe, mastiches, & corticum thuris, cuiuslibet drac. s. olei anethini, nardini, rosacei, ac de absynthio, cuiuslibet vnc. i. ceræ, quod satis sit, fiat ceratum, & vtare. Nec minus & epithemata quoque conueniunt, quæ in hunc modum paratur, Recipe succi eupatorii, marrubii fumarie, ac cichorii ana libr. s. deinde Recipe radicis capparorum, silicis, & cichorii, cuiuslibet drac. iiii. absynthii, florum chamæmelini, ac foliorum plantaginis ana P. s. chamædryos, chamæpityos drac. iiii. feminis dauci, anisi, & fœniculi ana drac. i. spicæ stœcadis drac. i. s. fiat decoctum secundum artem in aquæ pluuiæ sufficienti quantitate, de quo Recipe libr. ii. miscetoque cum prædictis succis, ac aceti vnc. ii. adlicito, & vtare. At quoniam humidæ huius visceris affectiones exolutum, & imbecille ipsum facere solent, Veluti sunt articuli laxati, siue cum frigiditate, siue cum caliditate, siue sine his laxatis ipsius sola constiterit, penitus astringentibus pharmacis opus habent (Galen. auctore octauo de compositione medicamentorum secundum locos.) Verum hoc (vt ipse inquit) aut cum calfacientium mixtura, si frigida qualitas prædominetur, aut cum refrigerantium, si calida. Actius vero in humida intemperie, iisdem oleis discutienda, ac resiccantia in coquenda præcipiebat, Veluti est iris, cuminum, ac ruta, Olea autem, quæ ipse conscripserat, erant chamæmelinum, lentiscinum, nardinum, absynthinum, ac rosaceum. Similiter vbi sicca iecur laborauerit intemperie, per contraria curanda erit, atque (vt inquit Aetius) humectans victus ratio commoda existit, ac balnea sufficiunt dulcium aquarum, quâquam cerata, epithemata, ac fomenta extra (quæ humectare possunt) adhibere non erit alienum, Nûquam tamē ab his, quæ vim adstringendi habent, absolueda erunt. Vnum tandem restat medicamentum conscribendum, quod indifferenter cuilibet hepatis imbecillitati a quacunque causa ortæ præberi poterit. Nanque a proprietate totius substantiæ efficax existit, nō autem secundum vnam, aut alteram qualitatem, cuius abunde experimentum habuisse fatetur Galen. præcitato loco, quem sequuti sunt Aetius, & Paulus, Id autem lupinum iecur existit, cuius diligenter trieti pondere drac. i. cum vino aliquo dulci præbetur, quamuis febricitantibus manifesta febre, aut non obscure, melius sit ex aqua calida pharmacum præbere, Aut ex aliquo prædictorum succorū, Veluti est seridis, aut cichorii, eiusdem Galen. præcitato, Quamquam idem meth. i. de simplic. medicament. facult. de supino iecore sic scriptum reliquit, Iecur supinam sæpenumero in medicamen indidi hepaticum, quod ex eupatorio conficitur, Nec tamē, quod mentione dignum sit amplius præstare comperi, ad illud videlicet comparas quod sine ipso componitur, forte quoniam per se solum eximeri debet, quæ admodum præcitato lib. 8. & 6. de comp. medic. secundum locos scriptum reliquit, & non aliis commixtum, quæ manifestis qualitatibus operantur. Nam ipsum a totius substantiæ proprietate efficax est, vt diximus; aut Asclepidis verba sunt, dum dixit cuius abunde experimentum habemus: cuius etiam auctori ratē hoc medicamentum etiam a tota substantia efficax comendauit, videlicet: Cochlearum triū carnem valde probe terito, & affusis vini nigri cyathis tribus calfacito, & bibendum dato.

Si humida fuerit iocinoris intemperies, curatio. cap. 8.

Siccæ intemperiei curatio.

8. de comp. me. sec. loc. c. 8.

8. de comp. med. sec. loc. c. 8.
6. de comp. me. sec. loc. c. 2.

απὸ τῶν ἀνθρώπων ὑποφασίαι.

id est de hepatis obstructione.

Cap. 17.

Cap. 17

c. 7. post prin.

cap. 17.

Cap. 6

Cap. 7

Iecoris obstru-
ctio quid sit.

Cap. 7

Vide Auic. lib.
3. fen. 14.

Tract. 2. cap. 4.

INTER alios instrumentales affectus, quibus crebro iecur laborare con-
tingit, potissimum his est, qui à græci ὑποφασίαι, à latinis obturatio, op-
pilato seu obstructio dicitur, Idque geminam ob causam, ob eius videli-
cet constitutionem, ac eiusdem actionem (Galen. auctore libr. de constit.
artis medicæ) ob constitutionem inquam, Nā venæ, quæ à portis in sima præ-
dicti visceris uniuersa finduntur, ac in tenuissimas extremitates finiuntur,
quod quidem haud obscure apparet, oscillis quæ in gibbo sunt distributæ, à
caua vena ortæ sensu obscuro committuntur. Nam quomodo per sua ora ip-
se inter se coniungantur, uidere nequaquam possumus, Nemo tamen dubitat,
(vt liquet ex eodem Galen. quinto de loc. affect.) sed omnes fere medici ex
vno ore enūciant, quod cibus vniuerso corpori distributus, ex omnibus si-
marum partium venis exiens, ad gibbas partes per dictas extremitates tran-
sumitur. Alimentum etenim omne sursum ex ventriculo ad locum vnum af-
fertur iecoris, quem ab hoc ipso, quod nunc dictum est, portam nominant,
cum neque vrbes introire quis potest, antequam in portas peruaserit, neque
prius penetrare in iecur alimentum, quàm ad id loci peruenerit, Inde autem
in sima uniuersa distribuitur iecoris, postea per quos diximus fines in gibbum
transumitur. Ob dictorum ergo vasorum angustiam nil mirum, si crebris ob-
structionibus iecur laborat. Additur & secunda causa, quæ est eius actio α-
ιμάτωσις, inquam hoc est sanguificatio, Est nanque sanguinis officina (vt di-
ximus) uniuerso corpori eum pro alimento suppeditans. Quo fit, vt ob co-
piam permeantis substantiæ adhuc crebro viscus obstructione corripiatur,
quemadmodum à Galen. eodem libr. de constit. art. medic. scriptum est. Ve-
rum cum in eo non vna tantum adsit cauitas, quæ viciatam humiditatem su-
scipere possit. Veluti venter, & intestina, sed tot sint numero, quot sunt arte-
riæ & venæ & hæ omnes angustia oscula habeant qua parte similia huius vi-
sceris cum gibbis coeunt, ac committuntur: Propterea eisdem partibus toti-
dem etiam obstructions, seu oppilationes generari contingit, vt ab eodem
Galen. octauo de compositione medicamentorum secundum locos decretum
est. Cæterum cum partium cauitates multifariam lædantur, vt propterea quæ-
dam coalescant, interim constipentur, seu constringantur, aut in se se resi-
deant, aut obstruantur, quandoque vero ipsarum oscula aperiantur, vt liquet
lib. de caus. morb. apertione hac relictæ, simul & coalescentia, constipatione,
residentia, ac constrictione: Hoc loco nos de obstructione earum duntaxat uer-
ba facere intendimus, Pro vt vnus duntaxat ipsius visceris affectus existit nō
cum altero morbo compositus, veluti phlegmone est, erysipellæ, aut reliqua
huiusmodi. Est autem ea læsio, seu amissio prædictarum iecinoris cauitatum,
ex infractu alicuius substantiæ, humoris videlicet seu flatuosi spiritus, Quæ-
admodum ex Galen. colligitur quinto de loc. affect. ac aliis plerisque locis. Ex
quibus, error patet eorum, Arabum præsertim, qui volunt interim iecur ipsū
in eius propria substantia quæ παρυχία dicitur obstructione laborare. Nan-
que perpetuo in extremis iam dictis vasorum partibus fieri consuevit veluti
præcitatis locis apud Galen. scriptum reperitur: Nec in eadem visceris substā-
tia cauitates, aut viæ adeo sensiles sunt, ut eisdem obstrui possint quanquam
spatia quædam, tanto ratione contemplabilia, in ipso, uelut in reliquis parti-
bus, reperiuntur, iuxta quæ et iam si oppleta sint præter naturam obstructio,
seu

seu oppilatio non dicitur, vt libr. de differ. & de caus. morb. scriptum est. Afficitur itaque iecur in hoc affectu non vt similis pars, sed vt instrumentum secundum prædictas partes, venas scilicet, & arterias, per quas α'νδύσις, seu distributio alimenti efficitur. Dignoscimus autem ipsum obstructione laborare, vt ex Galen. percipitur. 2. & 5. de loc. affect. tum ex dolore cum positu, tum etiā ex qualitate prædicti doloris, Nam in dextra hypochondriorum parte dolorem sentiunt laborantes, eumque grauatiū, & præcordia etiam veluti suspensa, quanquam dolor hic interim sit obtusus, aliquando vero vehemens (vt inquit Aetius cap. 2. lib. 10.) qui iterum asserit quandoque absque febre, quandoque cum febre esse, quanquam Galen. præcitato lib. 2. de loc. affect. (quem sectati sunt Paulus cap. 46. lib. 3. & Alex. cap. 2. lib. 8.) velit hunc sensum doloris grauatiui in dextra præcordiorum parte citra febrem euenire, cum in obstructione. (vt ipse refert) tum etiā cum hepar dura dispositione laborat, Vnum non propterea condemnandus venit Aetius, Nam idemmet Gal. de cōstit. art. medic. febrem superuenire iocinoris obstructioni, cum ea multiplex fuerit, testatum reliquit. Quæ de re nō ex propria obstructionis natura febris consequitur, sed cum ea multiplex fuerit: & propterea bene dicebat Aetius, quandoque sine febre esse, & quandoque cum febre. In recenti nanque, ac exigua, & non multa existente iocinoris obstructione febris non excitatur, In diutina vero, ac multa non mirum, si ea consequatur, magnitudinis tamen, & diuturnitatis ratione quinimo idem Gale. octauo method. med. dicebat obstructionis magnitudinē discerni ex ipsa magnitudine febris, vt quæ ex maiore obstructione, maior, ex minore, minor fiat. Similiter si ea inueterata sit, ne dum in hepate, sed in omni membro putrefactionem operatur, febremq; accedit, Aetio auctore, breui etenim tempore putrefactio consequitur ab obstructione ex vitiis humoribus in frigidis intemperaturis, In calidis vero non cito, sed temporis progressu accedit, vt liquet ex Gale. octauo de compositione medic. secund. loc. & consequenter ad putredinem febris. Affectus hic morbus existit non intemperie, sed instrumentalis in via, seu cavitare. Nec in eo viæ seu cavitates hepatis apertæ, seu dilatatæ sunt (vt diximus) sed obstructæ, ac infarctæ, vt propterea alimenti, seu sanguinis distributio per totū corpus, aut non fiat, aut diminute fiat. Hæc nanque est illa actio, quam per se primo iocinoris obstructio lædit (Galen. auctore libr. de differ. morb.) Nec per alias diuersas notas quisquam inuestigare tentabit affectum nunc, quam per easdem, per quas iecur ipsum hoc morbo affectum esse nouimus, Quanquam de hac obstructio non admodum certè habeantur coniecturæ, vt patet eodem. quinto de loc. affect. Est vero obstructio ex eodem genere ægritudinum, quæ quidem ex lentis, ac crassis humoribus fiunt (eodem Gale. teste libr. art. medic.) quanquam præcitato libr. quinto de loc. affect. nedum a crassis, & viscosis humoribus iocinoris obstructionem fieri fassus est, sed halituoso quoque spiritu ibi concluso, cui nō pateat exitus. Confirmauit idem Aetius præcitato loco, Cum dixit iocinoris oppilationes fieri a flatibus nebulosis, & coctu difficilibus, aliquando autem & a crassis humoribus, viscosisque in finibus venarum ex sima hepatis parte naturam, per quas ex vêtre, ac intestinis alimenti digestio ad hepar contingit. Nec propterea quispiam audeat de insufficientia Galen. condemnare, vt qui libr. art. medic. vnam duntaxat meminerit obstructionis causam, Cum & præcipuam scripserit, & reliquam ibidem non negauerit. Dignoscitur autem cum vaporosi, & crassi flatus multitudo coaceruetur, quæ exitum non habet, quoniam non grauitatis solum, sed etiam distensionis sensum sentiunt laborantes, vt liquet ex eodem Gale. & Aetio. Cum vero obstructiones a crassis, viscidisque humoribus ortum habent, grauitatis duntaxat sensus percipitur circa dextrum illud. Fiunt item & iocino-

Pars affecta.
De d. f. morb.
cap. 7.
De caus. morb.
Cap. 7.
Eiusdem partis
affecte signa.
2. de loc. affect.
cap. 8.
5. de loc. af. c. 7
post prin.
7. de loc. affe.
Cap. 8.
Nam semper ic
coris obstructio
nē febris sequa
tur.
Li. de const. ar.
med. cap. 17.
8. meth. cap. 4.
circa med.

Quis affectus
præter naturam
sit obstructio.
Cap. 6

cap. 7.

Loco citato.
Causæ.
Lib. artis med.
Cap. 94
5. de loc. af.
Loco citato.

Cap. 94.

Si ex halituoso
spiritu fiat, si
gna,
Gal. 5. de loc. af.
Loco citato.
Si ex crassis, ac

viscidis humo-
ribus.

1. de const. art.
med. c. 17.
8. meth. c. 4.

8. meth. c. 4.

11. de cap. 4.

Prognostica.

Cap. 6.

Loco citato.

Curandi metho-
dus.

Cap. 94.

Cap. 17.

Ratio victus.

Cap. 14.

ris, velut etiam reliquarum partium obstructions ex aliorum calidorum hu-
morum multitudine, Nam ob copiam permeantis substantiæ ipsum crebro
obstructione corripitur, pro vna præcipua causa Galen. præcitato libr. de consti-
tut. art. medic. testatus est. 8. item method. medend. Cernimus (dicebat) ali-
quando etiam quod multum est, cum simul totum confluit obstruendo here-
re, infigique non minus, quam ea quæ glutinosa sunt, & crassa. Quod si per
meatus angustos est transitus, multo profecto magis retineri, propterea quia,
quod multum est, quamuis tenax, & crassum non fit. obstructionem parere po-
test, vt eodem. 8. & 11. metho. medend. scriptum reperietur. Verum quoniam
non admodum crebro id euenit, & si venerit cum febribus copulantur obstru-
ctiones ex humorum copia ortæ, putredine eas consequente, quemadmodum
præcitatis locis apud Galen. liquet. Nos vero de ea obstructione tractare pro-
posuimus quæ per se sola citra alium complicatum morbum iecur exerceat,
Propterea fit. quod græcos sectantes auctores, Gal. inquam, Paulum, Aetium,
ac Alexan. duarum duntaxat prædicta obstructionis causarum meminerunt
Spiritus videlicet flatuosi, ac crassorum, viscosorumque humorum, Ex hisce
nanque causis iocinoris obstructio, per se sola, & circa initia, cum multiplex
non fuerit, etiam sine febre excitari consuevit, Reliquas, quæ mox à principio
cum febre inuadunt, à calidiorum humorum multitudine, ac putredine ortas,
cum de febribus verba faciemus postponentes. Nam si ex crassitie prædicto-
rum calidorum succorum etiam obstructions iocinoris generentur, haud dif-
ficile erit eas dignoscere. Nec alium requirunt curationis modum quam re-
liquæ, nisi quod non adeo calidiora attenuantia exigunt, vt dicemus, Verum
quoniam opilatio omnis inueterata, non tantum in hepate, sed in omni mem-
bro putrefactionem operatur, ac febrem accendit, vt Aetius inquit, Pro-
pterea celerrimè eas curare oportet, citius autem, ac breui tempore infrigi-
dis consequitur intemperaturis, In calidis vero non ita citius sed temporis
progressu, si ex vitiolis humoribus contingant (Galen. auctore octauo de com-
positione medicamentorum secundum locos) nec minus & aqua intercus con-
sequi poterit viscosis, frigidis, ac crassis humoribus diu in iocinoris vasis con-
sistentibus, ex quibus vasa ipsa primo infrigidentur, & demum ipsius iocino-
ris propria substantia, ad cuius infrigidationem perpetuo sequitur aqua inter-
cus (vt liquet. quinto de loc. affect.) Quod uero totius etiam corporis extenua-
tio, ex eius diuturnitate necessario consequatur propterea alimenti penuriâ,
quam græci ἀτροφία dicunt, Cuilibet patere poterit, nec alia indiget ratio-
ne, seu auctoritate. Pro huius obstructionis curatione vnica habetur indicatio
morbo contraria, Ea autem apertio est. Galen. teste. libr. art. medic. Causæ ve-
ro salubres sunt abstergentia, atque incidentia medicamina, vt ipse inquit,
Quamobrem erit ipsius medela priusquam fiat obstructio multiplex, & homo
febricitet, in gestio tenuantium ciborum, ac medicaminum: vt apud eundem
Gal. liquet libr. de const. art. medicæ. Hoc idem confirmauit Aetius, dum dixit,
quare attenuantium, & oppilationem dissoluentium quam celerrimus requi-
ritur vsus, & Alex. huic se subscripsit sententiæ, dum asseruit, Cum igitur ob-
structionem esse animaduertis. cum fiducia medicamenti utior, quæ inci-
dunt, & extenuant. Aer itaque eligatur ad calidum vergens, somno vtantur
moderato, ac nocturno potius. Nam vigiliæ quoque moderate conferunt.
Quies vitanda erit, Nam exercitatio maxime idonea existit, vt liquet primo
de sanit. tuenda, eamque magis confert, quam medicamenta dissoluentia, & dis-
secantia, propter causas ibi traditas. Alui excrementa, si non natura, arte sal-
tem clysteribus, aut lenibus glandibus expurgentur singulis diebus, animique
affectus immodici omnino vitandi, Cibi eisdem dandi sunt calidiores, & qui
re serandi facultatem habeant ex Pauli auctoritate, Cuius farinæ sunt aspa-
ragus

fragus, cappares, fœniculum, Carnes item gustari poterunt pullorum gallinarum, turdorum, merularum, phasianorum, perdicum, ac aliarum paruarum avium montanarum, quæ item decoquantur cum fœniculo, hyssopo, oreoselinio, satureia, pulegio, apio, sampfuchio, cychorio, intabo, aut reliquis huiusmodi, Nec negligenda erit ptisana, præsertim ubi ad calidum vergant crassi redundantes, succi, Ipsa nanque inter omnia, quæ ut medicamenta, seu ut nutrimenta exhibentur, principatum obtinet, inter ea, quæ modicæ attenuant, ac incidunt cum corporis madefactione, ac optima nutritione, ut a Galen. decretum est lib. de ptisana. Vitandaque sunt omnia alimenta, quæ crassum succum generant, balnea crebra, & ea potissimum a cibo, eodem Paulo auctore, Vinum autem tenue, & vetus utile est pro potu, eidem Paulo visum est, Præter hæc quàm celerrimus requiritur usus attenuantium, & oppilationem dissolventium medicamentorum (ut diximus) ex Aetii sententia, inter quæ magnopere confert iecur lupi aridum, tritum, & cochleario datum ex uino dulci (Paulo teste.) Similiter plantaginis radix, & semen, foliaque sicca, trita, siue per se vnumquodque, siue simul exhibeantur. Item anagallidis, quæ cæruleum florem habet, succus, ac radices dulcis decoctum, pelicini item, qui in frumentis nascitur, semen tritum cochleari mensura cum vino, aut aqua mulsæ in potu acceptum præclare, & citra molestiam ab oppilatione liberat, simulque firmitatem, tum hepati, tum stomacho addit. Capnium, quod fumariam appellant, succo eius expresso, & deficcato, si reponatur, & in pastillos redigatur semel exhibitus, dolorem omnem adimit, Ter autem præbitus in totum ab affectione liberat, ultra hoc quod & firmitatem visceribus addit. decoctum quoque huius herbe potatum similem efficaciam habet, etiam si valde febricitent ægri. Aliquando autem herba ipsa exiccatur, contusque, & cribrata cochlearis mensura præbetur, ex Aetii testimonio. Quod si crassiores glutinosioresque sint humores, ex quibus obstructio orta fuerit, præsertim in hepatis gibbæ, validiora tribuenda erunt medicamenta, Et propterea eupatorium tribuendum erit ex oxymelite. Similiter quoque stœcas tum cocta, tum trita data, spica nardi, ac chamæmelum, marubium, lauri cortex tritus, ac potatus, amygdalæ amaræ, ac acori radix, & asarum, apium, absynthium, casia lignea, rhaponticum, anisum, fœniculi semen, viticis, ac dauci semen, similiter & centaurei decoctum, ac lupinorum, flos iunci odorati, item galli veteris decoctum, ac etiam ciceris decoctum, quæ omnia tum ab Aetio, tum a Paulo, & Alexa. commendantur. Ex quibus licebit varia medicamēta componere, & potissimum decocta. In quem etiam usum (ubi ad calidum vergant crassi obstruentes succi) syrup. ex succo cychorii aut endiuie. quam scariolam vocant, oxysacharo, seu acetoso simplici, ac vulgato ex tribus radicibus Gentilis cum aceto, seu e fumaria uti poteris. Et si frigidiores sint, ac viscosi: qui redundant succi, syrup. ex absynthio, ex hyssopo, marrubio, de byzantiis. de quinque radicibus Mesuæ, de eupatorio, oxymelle, tum simplici, tum composito, ac etiam scyllino vtare. Poteris etiam eos præbere cum aliquo prædictorum medicamentorum decocto. Nec minus exhibere licebit quandoque pastillos ex medicamento, quod ex tribus generibus sandalorum componitur, & ex semine melonum cum sacharo formatos, aut ex diarhodon Abbatis, ac prædictis melonum seminibus, Interim trociscis de eupatorio, de absynthio, seu de rhabarbaro. Reliqua vero, quæ extrinsecus admoueri possent, epithemata scilicet, vnguenta, ac cerata studio si præcedenti cap. requirant. Quod loco frigide iocinoris intemperiei curationem instituiamus: Si vero multæ fuerint iocinoris obstructions, non solum tenuantium ciborum, ac medicaminum ingestio sufficiens erit pro earum curatione, sed etiam euacuatio est necessaria (Gal. teste præcitato lib. de

In fine.

Medicamentorum ratio.

Quando nent
sectione, & pur
gate medicamē
tum sit.
Cap. 17

const.

const. art. medicæ.) Id quod nec etiam negauit Paulus vbi morbus in vetustatem inciderit, Cum dicebat, si morbus in vetustatem incidit, etiam venæ sectio, purgatioque adhibenda, si nihil prohibet. Qua de re venæ sectio fiat vbi reliqua non prohibeant, Humoribus præsertim ad calidum vergentibus, ac eorum quoque copia molestantibus, potissimum vbi eadē obstructio adhuc quoque fiat, Ex interna dextri cubiti vena. Nam curabitur, quod obstructionis iā factum est per ea, quæ obstructa liberant, propulsabitur quod futurum est, si affluxum confluentium humorum compescas, Quemadmodum 1. 1. met. med. à Gal. scriptum est. Propulsabitur itaque quod futurum est ipsius obstructionis, saltem ex iam dicta venæ sectione, quoniam defluxum obstruentium succorum per eam inhibebis, Vel si inueterata eadem sit cum putrefactione operetur, ac febrem accendat. Huic quoque non nihil præsidii afferret, reliquis consentientibus ex Pauli testimonio. Quomodo autem purgatio facienda sit si ea quoque fuerit necessaria pro multæ, seu diuturnæ iocinoris obstructionis curatione, cum figura, seu formatio, cum etiam situs eiusdem visceris indicabit, per quæ scilicet loca eam facere oporteat, Nam que in simis iecoris sunt excrementa, ad intestinum: quæ vero in gibbis, per vrinas euacuabimus, eodem Gal. auctore præcitato lib. de constit. art. medicæ, Quanquam etiam eadē iocinoris gibba, si multo vitioso succo sin referta, per deiectiones, & pharmaca deiectioniora καθαρτικά Græci vocant, expurgari debeant, Si vero mediocri, per vrinarios meatus, ex decreto eiusdem Galen. 7. method. medend. Qua de re sic intelligi debent eiusdem Galen. verba 2 de arte curat. ad Glauc. 13. metho. medend. ac reliquis in locis, vbi dixit, Et quidem laborantibus gibbis partibus hepatis, quod per vrinam trahere oporteat, concauis autem per excretionem inferiorem, situs, ipse visceris indicat, Nanque quando mediocriter vitioso succo sunt referta, & nō quando multo exponi debent, quoniam tunc etiam per deiectiones eadem gibba expurgantur, vt eodem 7. meth. med. decretum est, Neque prius ad detergendas obstructiones accedere debemus nisi vitiosi succi maiore parte emissa, alioquin metus est, si obstructionibus liberatis priusquam vacuaueris, studeas, ne ipsas magis impingas, ex eiusdem Gal. præcepto 8. meth. med. etiam lib. 11. eiusdem sic dicebat. Ostensum enim in prioribus libris est, si his auxiliis, quæ obstructiones eximant, vti, non vacuata prius abundantia, velimus; fore vt non modo nihil proficiamus, sed etiam affectum maiorem reddamus, pugnantis scilicet inter se indicationibus, At si vacuata prius multitudine ad curandam obstructionem accedamus, medicamentis his quæ obstructiones expediant, erit opus. Cum igitur ex vitiosorum succorum abundantia iocinoris obstructiones fiunt multæ cum febre, seu diutina, priusquam prædictis obstructionem liberantibus vtaris, purgans medicamentum pro diuersitate redundantis succi exhiberi debet, quod quidem per aluum expurget, potissimum, si in eiusmodi hepatis sima ortæ fuerint, aut licet in gibbis generationē habent, eadem sit multo vitioso succo referta; Nam si mediocri, per vrinales meatus expurgare oportet, ea quæ vrinam ciunt exhibendo. Vbi itaque ad calidum vergant obstruentes succi, nec nimiam crassitudinem habeant, hoc purgante medicamento vtare, Recipe rhabbari optimi cum spica, ac squinanto vigorati scrup. iiii. vel 3. i. s. maceretur per decem, vel 12. horas in aqua cychorii, seu intubi, demum per colum transfundatur, & adlice, vel pulpæ casæe recenter extractæ vnc. i. s. vel mellis roridi vnc. ii. diacatho. 3. vii. misceantur, & fiat potio cum aqua intubi, aut cychorii. Poteris item potissimum vbi crassiores fuerint redundantes succi, in vicem rhabbari, agarico trochiscato vti vel decoctum in prædicta aqua cychorii, vel intubi drac. i. agarici fiat, quo demum expresso, ac per colum transuso, vnc. ii. mellis roridi adiciantur, ac scrup. iiii. rhabbar. vt supra macerati, & 3. iiii. vel vnc. s. diacatho.

Catapo-

Cap. 10

Cap. 17.

καθαρτικά.

7 met. h. c. ult.

2. ad Glauc. c. 2.

13, meth. c. 15.

In fine,

8. meth. c. 4.

11, meth. c. 10.

Catapotia item formari poterunt ex eodem agarico, & rhabarbaro 3. i. vtriufque accipientes, & cum succo cychorii, intubi, vel fumarie, vel syr. ex eisdem paratis formentur catapotia. Post quæ per aliquod tempus vnc. ii. mellis roridi vel iii. syr. de cychorea Nicoli præbeantur, quanquam hicmet. syr. cum mel le rorido, ac rhabarbaro vt supra parato, calidis redundantibus succis commo de exhiberi poterit, quemadmodum si magis crassi, ac lentius fuerint redundan tes succi catapotia de rhabarbaro, vel de agarico, aut pilulas agregatiuas exhi bere conuenit, quibus semper adicere poteris agaricam, seu rhabarbarum, prout vnum magis quam alterum redundans succus exigit 3. i. assumens ex ali quo prædictorum catapotiorum, seu scrup. iiii. & scrup. ii. seu 3. i. prædicti aga rici trochiscati aut rhabarbari cum spica, seu squinanto, & cum syr. ex succo cy chorii, fumarie, aut intubi composito catapotia figurentur, demum corpore va cuato, quæ supra conscripsimus medicamenta obstructions eximentia, pro pinari debent. nam vitiosi succi maiori parte emissa, ad detergendas obstru ctiones accedere debemus: extrinsecus quoque adhibeantur, quæ præceden ti capite, pro frigida iocinoris intemperiei curatione, annotauimus.

πυρὶ φλεγμονῆς τῆς ἡπατος

id est de inflammatione hepatis. Cap. 84.

NON raro autem, & idem iecur inflammatione laborare contingit, quæ haud aliter in ipso, quam cæteris nostri corporis partibus gigni consue uit, Nec etiam ab alia causa, Nam cõmunis omnium phlegmonarum generationes (Gal. auctore 10. 13. & 14. method. medend. libr. de tum. præter naturam, & de inæquali intemperie, ac cæteris plerisque locis) ex san guinis influxu est copiosioris, quam pars postulet. Hic vero sanguis cum in ali quam animalis partem procubuit maiora eius uasa protinus distenduntur, vt pote abundantie continendæ non sufficientia, ab his deinceps, quæ minora sunt mox ubi nec in iis satis continetur, exudat foras in ea ampla spatia, quæ inter vasa sunt. sic etiam vt omnia, quæ in carne habentur, loca occupet. Est enim visceribus quoque sua quædam caro, quam quidam Græce *παρίχυμα* vocant, in quam sanguis ex refertis vasis halitus specie exudans inflammatio nem gignit, vt patet eodem decimo quarto meth. medend. Inluit autem co piosior hic sanguis alia quapiam, aliisque particulis eum aliquando mittenti bus, ac ea, quæ phlegmone laborare incipit, recipiente, aliquando particula, quæ affligitur, hunc ad se trahente. Vtpote cum morbofo calore, aut dolore excruciat. Partes autem quæ mittunt aut copia, aut qualitate, aut vtroque nomine molestata transmittunt, vt liquet eodem 13. metho. medend. & sex centis aliis in locis. De qua inflammatione cum nonnulla fuerint in præcedē ribus è nobis dicta, præsertim cap. de pleuritide: hic quoque de ea protelare sermonem non libuit, sed tantum de ea dixisse satis sit: quod per inflamma tionem, eam, quæ proprie sic appellatur, & à copia optimi sanguinis gene ratione habet, subintelligere volumus. Et propterea ad dignotionem affectæ partis descendentes dicimus, iecur ipsum deprehendi quod inflammatione la borex ex dolore cum positu, quoniam in dextro latere ad nothas costas dolor à laborantibus sentitur, & cum magnam trahunt spirationem, vehementius excruciat, sentiuntque in eadem dextra præcordiorum parte grauitatem, & in terim ingulum ad infernas partes detrahi, (Nam id non omnibus commune est, sed iis tantum, quibus iecur costis alligatur) atque sic dolor ad succingen tem costas membranam peruenit: Ex longis quoque interuallis tussis exigua arida, & aqua nihil expuunt, molestare solet, atque spiratio parua, & crebra, quem-

10. meth. c. 6
in fine.

13. meth. cap. 3,
14. met. c. 2. & 1.
De tumor, præ
ter nat. cap. 2, in
prin.

De ineq. intem
perie cap. 3.
Inflamatio quo
modo genere
tur.

Causæ genera
tionis eiusdem
Cap. 2.

13. meth. c. 3.

Quid per infla
mationem intel
ligatur.

Quibus signis
dignoscamus ie
cur inflamatio
ne laborare.

3. de loc. affect.
c. 8. & 9
5. de loc. af. c. 7
Alia inflammacionis signa.

5. de loc. af.
Loco citato.

Quod non semper
hecoris inflā
mationē comite
tur febris acuta.
2. de loc. af. c. 8.
5. de loc. af.
cap. citato.
2. prorrheticor.
com. 21.

Alex. lib. 8. c. 1

4. caus. de puls.
cap. 7
2. de loc. af. c. 8

4. de caus. puls.
cap. 7.
4. de præsag. ex
puls. c. 4
Quibus inditiis
distinguitur he
coris inflamma
tio ab ea que
musculorum ab
dominis.

quem admodum secundo, & quinto de loc. affect. à Galen. scriptum est. Quod autem inflammatio sit quæ iecur exerceat, tum ex eisdem quibusdam signis, tum & reliquis dicendis percipi poterit, Nam & linguæ color inprimis quidem ruber, deinde niger apparebit, aderitque cibi vehemens fastidium, sitis inexhausta, vomitus tum syncere bilis, tum eius, quæ ouorum vitellis similatur, quæ postea æruginis aliquando colorem referre cōspicitur: aliud quoque constringitur, nisi una cum visceris huius imbecillitate inflammationem excitari contingat, ut liquet eodem quinto de loc. affect. à Galen. ab Aetio cap. 3. lib. 10. & Paulo cap. 46. lib. tertii. Color corporis subuertitur in aruati morbi specie permutatus, & singultus quoque consequuntur, ac accessionis tempore quidam delirio apprehenduntur, ac acre lotium excernunt, (ut liquet ex Aetio.) qui etiam fateatur, quod febris adest acuta inæqualis, quæ plerumque ad vesperam, & noctem exacerbat. Quod vero febrem ad iocinoris inflā mationem comitare necesse sit, à Gale. decretum est eodem secundo de loc. affect. Verum quod ea acuta sit, nequaquam fassus est, nisi præcitato 4. lib. de loc. affect. Vbi de erysipelate verba faciens scriptum reliquit, ardentes febres, ac uehementissimas euenire, cum ipsum in iocinore, ventriculo, aut pulmone fuerit ortum, vel inflā matione erysipilatis particeps fuerit, quin imo lib. prorrhetic. 2. phlegmone in iocinore, vel uentre orta quod non continuo, ac perpetuo maligna, nec acuta consequatur febris decretum reliquit; Nam inflā mationū magnitudinē perpetuo febris ex proportionē sequitur. Et propterea nisi ualenter iecur inflammari contingat, licet febris excitetur, quoniam princeps uiscus est, tamen ea acuta non erit, nisi eadem inflammatio magna sit. Pro cuius magnitudinis proportionē ipsa quoque & maior, & uehementior excitabitur, de qua forte Aetius intelligere uoluit, Cum dixit, febris adest acuta, inæqualis. Sic quoque Alexand. verba intelligi debent, cum dixit, exigua hepatis inflammationem non statim febrem inducere, scilicet, uehementem, & acutam, aliter falsum esset, nam orta inflammatione in eo, cum princeps membrum sit, uniuerso corpori impertit & tensionem, & calorem immodicū, qui febris est, eodem Galen. teste quarto de caus. pulsuum, & propterea necessario (ut ipse secundo de loc. affect. scriptum reliquit) ipsam iecoris inflammationem febris comitatur. Pulsus uelut in ceteris inflammationibus, durus aderit inæqualis quodammodo, ac ueluti ferrans tactum, licet non adeo, ac si neruo sæ partes inflammate essent, quinimo & maior, erit ac celerior, cum & in parte consistat uenis: & arteriis confita, ut liquet eodē quarto de caus. pulsuum, & quatuor de præsagitione ex pulsibus, quod inditio potissimū iocinoris inflā matione ab ea quæ in succingente membrana exorta est, secernitur, licet & alia quædam sint, quæ cap. de pleuritide annotauimus quo fit, ut eadem hic transcribere superuacaneum sit. At quia interdum musculis hepatis in cubentibus inflammatis quidam decepti, eiusdem visceris eam inflammationem esse suspicati sunt, Propterea visum est, quo pacto distinguendæ sint prædictæ affectiones, conscribere, Etenim iocinore inflammato tumor secundum lineamēta, rotundus, figuræ, uidelicet ipsius hepatis, succumbit, ut Aetius fateatur, qui etiam ad corporis decubitus simul conformatur, maior enim apparet corpore ad sinistram rursus ad dextram reuoluto, minor autem rursus ad dextram reuoluto, ni mirum hepate sub nothascedente costas, neque visui, neque tactui similiter succumbente. Amplius autem (ut idem inquit Aetius) in hepatis inflammatione, incubens cuticula naturali modo habere cōspicitur; musculis autem inflammatis cutis circumtenditur, ut si quis digitis apprehensam attrahere uelit, ea minimè sequatur. Propriissimè autem tactus discernet siue in alto, siue in superficie inflammatio ipsa consistat, rectorum denique musculorum tumores præter naturam oblongi, atque per totum ventrem extensi videntur, Vmbilicum

bilicum (veluti hæc quoque musculorum coniugatio) comprehendentes .
 Quapropter aut obscura est eorum dignotio, utpote quos & positus, & figura
 de clarat, accedente ad hæc, quod ipsi a nullo exteriori musculos conteguntur
 Gale. auctore præcitato libr. quinto de loc. affect. Hæc autem obliquis quo- **Loco citato.**
 que musculis, qui a thorace descendunt, sunt communia, ut ipse inquit, sed
 multo difficilior est notitia musculorum, qui iis subiecti sunt difficillima ve-
 ro transeorum. Cum ergo iecur intra hos musculos sub peritoneo posi-
 tum sit, tum cum tribus contegatur musculis, fieri non potest, ut tactus aliquā
 ipsius notiam præstet, nisi vel magna in ipso oriatur inflammatio, vel incum-
 bentes ei muscoli extenuentur, ut liquet ex Galen. eodem loco: Et propte-
 rea si in gibba parte consistat inflammatio, præcipue si ingens ea fuerit per-
 facile vel solo tactu dignosci potest. Ea nanque hanc propriam a musculorum
 tumoribus sortitur differētiā, quod moles sub manibus ad coaceruatam cir-
 cumscriptionem desinit: quippe soli iocinori proprium est, ut tumoris cumu-
 lum vniuersum habeat circumscriptum, sed musculus quilibet, cum totus si-
 bi continuus sit inflammationis ipsius moles sensim diminui consuevit: sima
 rum autem partium inflammationes per alia potius symptomata quam per ta-
 ctum inuestigare oportet, ut liquet eodem quinto de loc. aff. Num vero in ea
 dem sima hepatis parte inflammatio sit orta, an in eius gibba interstingues.
 Nam quæ in simis eueniunt magis, quam illæ, quæ in gibbo fiunt, fastidium
 nauseam, vomitum biliosum, sitimque ingentem inducunt: quæ vero in gib-
 ba parte oriuntur, maiori quam illæ intus spirandum dolore laborantem ex-
 cruciant, magisque tussim excitant, atque dolorem vsque ad dextræ partis iu-
 gulum, adeo ut detrahi vi deatur, extendunt, (ut ibidem à Galen. scriptum
 est.) Quamuis (ut idem testatur) in neutra prædictarum partium exquisite
 distructa inflammatio possit consistere. Nam omnium eius partium carnes in-
 ter sese continuantur. Quis vero, ac quotuplex morbus sit inflammatio, in **Causa,**
 præcedentibus sæpius dictum est. Quod autem eius causa sanguis optimus sit,
 mediocremque crassitudinem obtinens, Ex nullo alio inditio clarius patere
 poterit, quam ex eadem morbi specie, ex qua necessario eius causa arguitur **Prognostica,**
 ut liquet aphor. secundo primi lib. Reliquum est ut ad eis prognostica tran-
 seamus, quorum primum Hippoc. est aphor. 17. libr. septimi. Cum dixit,
 In hepatis inflammatione singultus malum. Nam non semper singultus io-
 cinoris inflammationem comitatur, sed quando ea in magnitudinem attol-
 litur, ac feruescit, In quo feruore stomachus ad compassionem trahitur, non-
 nunquam propter neuorum communicationem. Quare (ut Gale. commen.
 eiusdem apho. dicebat) tunc solum compassio fit stomacho cum hepate, quan-
 do inflammatio & maxima, & pessima fuerit, nonnunquam etiam bile mul-
 tum calida, & multa in huius visceris inflammationibus genita, ac confluenta
 ad intestinorum principium, qua superfluitante, atque ad ventriculum recur-
 rente, contingit os eius morderi atque ideo singultire. quidam autem arbi-
 trantur magnitudine inflammationis ventriculum premere ac singultum fa-
 cere, non habente exitum spiritu. Verum fiat ex quauis causa singultus pro-
 pter hepatis inflammationem, semper malum est, quoniam eam maximam,
 atque pessimam esse significat, Gal. auctoritate præcitato aphor. & comm. aph.
 58. 5. libr. Si vero iocinoris inflammationem vehemens atque acuta febris
 comitetur, malum quoque est. Nam valenter idem viscus inflammatum esse
 ostendit, quemadmodum si eadem febris exigua, & non acuta fuerit, minus
 malum portendit, quia exiguam quoque esse inflammationem significat pro
 pterea quod inflammationum magnitudinem perpetuo febris acutissima, **com. 21.**
 consequitur, Galen. teste secundo prorrhети. At si eadem febris acutissimam,
 vehementissimamque fuerit, ac vehementissima quoque siti laborantes exeru-
 ciet,

8. de loc. affect.
Cap. ult.

Curatio.

13. meth. c. 13.
Victus ratio,
Cap. 14.

Medicamentorum
ratio.
11. de const. art.
med. cap. 17.
13. meth. c. 2. & 9.
Venæ sectio.

ciet, pessimum erit inditium: quoniam inflammationem erysipilatis participem, aut ipsum met erysipelas in iocinore ortum significabit, quæ febres magna ex parte (vt liquet quinto de loc. affect.) in tabem transmutantur. Idem met Galen. decimo method. med. de iocinoris inflammatione sic scriptum reliquit. Quod si in abunde calido, & sicco corpore generetur, potissimum si notatu digna fuerit omnino æger morietur, propterea quod imbecillis sit viribus, atque vna salus tum iis, tum etiam pleuriticis, & peripneumonicis, & qui angina, seu ventriculi inflammatione laborant, est ipsum virium robur, (ut ipse inquit) & nos in præcedentibus cap. adnotauimus. Quantum ad eius curationem spectat, exquisitissimo victu est opus, æque ac si ventriculus sic laboret, (vt eodem cap. scriptum est) quoniam munus eius visceris toti animali est commune, acceditque omnibus animalis partibus maximum incommodum, vbi non probè concoctum alimentum sit, siue non in sanguinem rite fuerit conuersum, vt ab eodem Galeno decimo tertio method. medend. decretum est: cibi propterea eligantur, qui tenui sint consistentia, recrementorum, ac mordentis qualitatibus expertes, sed tamen citra morsum detergant, huiusmodi esset mulsa, nisi esset quod (vt Galenus eodem decimo tertio method. medend. fatetur) omnibus dulcibus tum iecur, tum lien maximè intumescit: superest igitur vt quæ culpa vacet in cibo, ptisana sit, quippe quæ sine morsu detergit, eodem Galeno teste. Præterea & ipsius ptisanæ cremor his idoneus est, ut qui uim habeat aperiendi, & abstergendi, præter quam quod affectas partes non affligit, aut calefacit, vt liquet ex Alexan. Eadem quoque ptisana in gallinaceorum pullorum iure, viribus præsertim existentibus imbecillis parari poterit. Similiter & phasianorum, starnarum, iuuenum columbarum, perdicum, turdorum, merularum, ac aliarum paruularum auium, quarum etiam carnes quandoque gustare poterunt, & etiam eas contusas, si vires exigunt, Nec minus in earum carnum iure olera quoque decocta interim assumant, præsertim vbi inflammatio feruens fuerit, seu erysipilatis particeps, veluti est intubum, cichorium, senicum, sonchus, & reliqua huiusmodi, quæ vim habent detergendi, & digestionis vias ab obturatione vindicandi cum leuicula quadam iocinoris refrigeratione, ac astringentia, Nam a vehementer refrigerantibus, ac astringentibus cauendum est, quoniam iocinoris phlegmonis sunt incommoda, præsertim si in cauo visceris consistent, arctant enim os meatus bilis, ac bilem ipsam excerni prohibent, præter eas angustias, quas facit ipsa phlegmone, & (vt inquit Alexand.) propterea quod constringunt, contrahuntque tumores, & ad discutiendum difficiles ipsos reddunt. Ob quod neque malum punicum exhiberi debet, (ut eidem Galeno ac Alexan. visum est) Sic etiam vinum pro potu magnopere vitandum, vt quod omni feruenti inflammationi in totum sit aduersarium (eodem Alexan. auctore.) Sed pro potu aqua hordei vtendum, aut aqua, in qua prius cichorium, aut intubum fuerit decoctum, vel etiam parum radices glycyrrhizæ. Confert iam, ubi eiusdem visceris gibba fuerint inflammata, pro cibo ptisanam, aut eius cremorem cum apii decocto exhibere, quoniam modice vrinam mouet. Reliqua vero, quæ ad victus rationem pertinent, si ad caput de ventriculi inflammatione confugas, scripta reperiēs. Ceterum quoniam omnium phlegmonarum primus scopus est euacuatio humoris, qui in partem phlegmone conflitam grassatur, ut libr. de const. art. medicæ, & eodem decimo tertio method. medend. liquet, licet quo pacto ipsum educere conueniat ex positu, ac formatione desumitur; Propterea vbi totum corpus inanitione indigeat (ipsa inflammatione adhuc in generatione existente) si vires tollerant, ac etiam ætas, ad sanguinis missionem confestim confugiendum erit, per quam tum reuellendus, tum educendus, qui ad iecur fluit, sanguis est interna dextri cubiti vena secta, propterea quod

quod & è regione, seu directo, & ampla via cum vena, quæ caua dicitur societatem habet hac nõ apparente, media secanda est. Quod si nec ea se ostenderit, reliqua, ac tertia est incidenda, quæ humeralis dicitur, ex Galen. decreto eodem 13. meth. meden. quem demum sectati sunt Aetius, Paulus, & Ale. Modum vero vacuationis, tum ex redundantia modo, tum ex ætate, natura, tempore anni, regione, consuetudine, & ante hæc ipsa laborantis virtute, inuenies, vt eidem Gale. visum est. Quoniam si id ferre queunt, semel quantum satis est, detrahendum. Si vero non, per vices partitum Aetio teste. hæc autem venę incisio opportune in prima, & secunda die contingit: Si vero dolores yrgeant, & adsint vires, etiam septima venę incisionem facimus, vt ipse inquit. A venę sectione, vbi totum corpus plenum fuerit, (vt supposuimus) ad topica remedia confugiendum est, quibus vacuari possit id quod in phlegmone obfessa parte continetur. Hæc nanque communis est indicatio curationis omnium phlegmonarum (ut diximus). Nam antea priusquam totum corpus à recrementis liberum fecerimus, cauendum est ne ea applicemus, (ut Alex. inquit) In quorum adhibitione duo perpetuo seruanda sunt, quorum primum est, ne frigida admoueas, etiam si inter initia adhibeantur, aliàs magis noxæ, quàm vtilitatis causæ erunt: secundum est, quod eadem medicamenta nunquam absolui debent ab his, quæ mediocriter astringendi vini habent, indicacione sumpta a parte affecta, propterea quod animalibus astringentis facultatis principium sit, & venosum ab hoc oritur genus, vt ideo eius robur seruandum sit, Quo fit vt etiam eo tempore, quo quicquam amplius non influit, nec repelli quod in laborante particula continetur, possit. Adhuc mixtæ facultatis esse debent medicamenta, vt ex eodem Gale. liquet præcitato lib. 13. method. medend. Nam coeontibus vnâ contrariis indicationibus, compositum quoque esse medicamentum oportet (quo etiam tempore clysteres, iidemque leues iniici debent, maxime si non sponte egerat aluus.) fiat itaque illinitio extrinsecus in hepatis regione ex oleo rosaceo, aut lentiscino, aut melino, aut cœnanthino (ut ait Aetius) pariter, & ex myrtino, aut eodem oleo rosaceo cum oleo amygdalarum dulcium, vel amararum permixto, seu absynthite. Et procedente tempore eodem oleo rosaceo, myrtino, seu cydoniorum cum mastichino, chamæmelino, seu anethino permixto vtare. Et sumpta a situ visceris indicatione parum aceti, aut vini albi misceto. Quod si libeat cataplasmatibus vti ex farina hordeacea fœnugræci, & seminis lini cum palmulis, vel malis cotoneis, meliloti flore, absynthio, & chamæmelo conficiantur, (Paulo auctore) pauco etiam aceto, vel vino albo addito. Insuper ex seminibus lini, fœnugræci, hordeaceaque farina, aut triticea, his, vel omnibus, vel vno aliquo ex eis, aut quibusdam in aqua mulla decoctis, ad mixtis absynthio, mastiche, ac meliloto fiat cataplasma, ex Aetii sententia, Cui etiam, veluti & cunctis reliquis medicamentis aceti, aut vini albi parum iniicito. Quod si vehementior fuerit ardor, mala cotonea, aut oleum rosaceum, vel cydoniorum adduntur, item plantaginis, cychorii, aut intubi folia contusa. Epithemata quoque hunc in modum parabis. Recipe rosarum rubearum, foliorum plantaginis, & cychorij, seu hortulanæ endiuie, ana P. i. florum chamæmeli, meliloti, absynthii, & anethi ana P. s. bulliant in aqua pluuiali, demum adde succi cychorij, & endiuie, singul. lib. i. aceti vnc. ii. misceantur, & fiant epithemata. Poterunt item ex prædictis cum cerata, tum etiam emplastra formari, ac eisdem vti: Illud perpetuo animaduertens, quod quantum inflammatio ab eius principio recedit, in tantum relaxantia, seu digerentia vires præsidiorum astringentium vincere debent, licet semper (vt diximus) ea mixte facultatis esse necessum sit procedente vero tempore, si in gibba visceris parte phlegmone consistat, vbi phlegmone iam concoquitur nedum

13. meth. c. 11.
circa principium

Topica.

Quæ animaduertenda sunt circa Topica medicamenta.

Cap. 16.

Gal. 13. met. c.
15. post med.

Cap. 15.
De purgante
medicamento
quid sciendū
sit.

Loco citato.

eis quæ modice vrinas mouent, sed etiam valētoribus vti licebit, a saro, inquā nardo tellica, phu, hoc est valeriana, petroselino, smyrnio, & meo, ex Galen. auctoritate, & insuper & oxymel ipsis dandum est, vt Paulus refert, Item syr. de byzantiis cum additione, de tribus radicibus, ac de eupatorio, nonnulla etiam decocta tum eorum, quæ diximus, tum etiam & aliorum medicamentorum, quæ vrinam ciunt concinnari poterunt, ac eisdem præberi. Verum si cauum eisdem visceris inflammatione afficiatur, procedente (vt diximus) tēpore per vētrem eos vacuare licebit, ex eiusdem Gal. sententia præcitato lib. 13. meth. med. quem sectatus est Paulus, licet ea eandem per alium purgationem, cum iecur phlegmone laborare incipit, tanquam valde nocuam, cum maximam excitaret phlegmonem, eodem loco prohibuerit, quæ vacuatio cum videlicet phlegmone iam concoquitur, vel inclinauerit, partim per clysteres fieri potest, partim per ea medicamenta, quæ per os sumuntur, vt eisdē auctoribus vitum est, quos primum quidem ex aqua mulsā cum sale fieri præcipiunt, postea vero in remissione videlicet hyssopum, vel origanum, vel minus centaurium, aut gnicum, seu colocynthidam imponi iubent. Sed tutius hunc in modum parari potuerunt. Recipe foliorum maluarum, althææ, & betæ ana p. i. mercurialis, & centaurii minoris cuiuslibet p. s. salis communis parum, fiat decoctum, cuius recipe li. i. aut lib. s. & adiectis vnc. iii. vel iiii. olei communis, amygdalarum dulcium vel chamæmelini, & vnc. ii. mellis rosacei, ac vnc. i. casia fistulæ, nec nō 3. vii. diacath. fiat clyster. Vbi vero per clysteres phlegmone curari non valeat, purgans medicamentum audacter exhibere licebit, eo cibis admixto, quemadmodum a Gal. eodē 13. met. med. decretum est, veluti vrtica est, mercurialis, epithymum, ac filicula, seu polypodium, & reliqua, quæ ipse dicit quod modice aluum deiciunt. Verum in remissionibus tum iis ipsis audacius, quam antea vtendum, tum vero quæ iis sunt valentiora partim in ptisana coctis, partim tuis, ac in mollissimum puluerem redactis, quæ vel ex ptisana, vel ex aqua exhibeantur. Et idem quoque Gale. filiculæ aliquid in ptisana, ac nigri verati corticem aliquando incoxit, ac præbuit. Atqui nostris temporibus mitiora, ac rutiora medicamenta comperiuntur, quibus vti poterimus, vt puta, mel aereum, casia fistula, syr. ex pluribus infusionibus rosarum tum purpurearum, tum persicarum, diacath. triphera persica, ac etiam rhabarbarum: Ex quibus etiam simul mixtis hunc in modum purgantia medicamenta parari poterunt, Recipe mellis aerei vnc. ii. vel iii. aut tantundem prædictorum syr. diacath. 3. vi. triphera persica 3. iiii. cum aqua cychorii fiat potio. In vicem quoq; mellis aerei vnc. i. s. casia fistulæ, aut vnc. ii. cum prædictis exhibeatur vel rhabbarbari cum spica recipe 3. i. seu scr. iiii. maceretur in vnc. ii. per noctē succi rosarum, demū per colū transfusi vnc. ii. s. mellis aerei adiectis, & vnc. s. diacath. aut 3. iiii. triphera persica, fiat potio cum aqua intubi, aut cychorii, & si maior pro melle aereo tantundem prædictorum syr. aut vnc. i. casia fistulæ commisceas. Verum vbi neq; eisdem inflammatio conquieuerit, sed ad suppurationem permutetur, adiuuare naturam oportet, vt quam celerrime puris generatio fiat. Cui autem perfecta suppuratio fuerit abscessus quoque rupturam adiuuare licebit, & post eius eruptionem per eandem viam per quam puris transmutatio contingit, iuuanda quoque natura erit, siue per sedem, aut vrinam, aut etiam os transmissio fiat: quibus vero medicamentis eadem perficere, oporteat copiosissime ab Actio cap. 4. lib. 10. conscripta sunt, ac etiam a Paulo præcitato loco, & propterea nos breuitati indulgentes ea hic non transtulimus. Si vero in scyrri naturam prædicta inflammatio vergat, eius curationem sequenti cap. requiras. Quod si fluxionis ad ipsum iecur causa ex ipsomet oriatur, adeo vt propterea ad ipsum multum confluat sanguinis ac phlegmone generetur, ne amplius phlegmone increseat

increſcat, auferri hæc quoque cauſa debet primo, & quia hoc bifariam eſſe poterit, aut propter aliquem calorem, præter naturam in ipſo iocinore exiſtentem, aut propter eiſdem dolorem, inuenta quæ ipſarum cauſarum phlegmonem excitat, eam prius pro eius curatione auferre tentabis vt eodem 13. Cap. 6. method. med. à Gal. ſcriptum eſt, & deinceps ad prædicta topica medicamenta te conuertas.

περί σκλήρως καὶ σκληρώματος τῆς ἡπατος.

id eſt de ſcirrho ſeu tumore ſcirrhoſo hepatis. Cap. 85.

NEc minus & eadem iocinoris ſubſtãtia, vtpote quæ naturaliter lutoſum quidpiam continet, (veluti medicus quidam Gal. tempore per locũ dicebat) maxime oportuna eſt duris tumoribus, quos græci σκλήρως καὶ σκληρῶς & quandoque σκληρώματα appellant, nos vero ſcirrhos, ſeu tumores ſcirrhosos nuncupamus. Eſt autem affectus hic, quem ſcirrhum nominamus, tumor durus, qui ſine dolore eſt non tamen omnino ſine ſenſu. Quanquam ſi quis velit quod tumor ſit præter naturam durus, & omnino inſenſilis, Is vero affectus qui σκληρώματι à græcis dicitur, latine ſcirrhofus tumor ſit non omnino durus, neque omnino inſenſilis, non reclamabimus cum de nominibus alteratio ſit quemadmodum Galen. 14. method. medend. decretum reliquit, Illud ramen animaduertentes, quod duplex eiſdem ſcirrhi differentia ſit, vt habetur à Galen. 2. de art. curat. ad Glauc. Quarum vna exquisitus ſcirrhus dicitur, tumor præter naturam exiſtens ſenſu priuatus durusq;. Reliqua non exquisitus appellatur, qui non omnino inſenſibilis eſt, difficulter tamen ſentitur, vt ipſe inquit, qui dupliciter à medicis vocantur, vt patet. 14. meth. med. Nempe vel ſcirrhus propterea quod ex ſcirrhorum genere ſit vel ſcirrhofus tumor. Nam & quod græci σκληρώματι vocant, ſub ſcirrhorum genere comprehenditur, Paulo auctore cap. 68. libr. 3. Sunt nanque inter eos ſcirrhos quidam, qui vbi plurimum increuerint, ſimulatque indurati fuerint, non modo dolore carent (vt Gal. inquit. 5. de ſimpl. medic. facult.) verum etiam ſenſum exiguum, aut etiam nullum habent reliquum. Dignoscitur autem cum iecur tali laborat affectu maniſteſtius, quam ſi inflammatum eſſet, ac multo euidentius, eo quod eius moles durior ſit, & in huiusmodi diſpoſitione extenuata ſunt corpora, quæ ei incumbunt, Verum tractus tempori quamuis magis increſcat ſcirrhi cumulus, non tamen æque facile fuerit per tactum ipſam cognoscere, intercipi ente ſcilicet iudicium aqua intercutem, quæ illico ſcirrhum ſequi conſuevit (eodem Gale. auctore. 5. de loc. affect.) Multo etiam minore dolore iecur vexatur in ſcirrho, quàm in inflammatione, Aetio teſte cap. 6. libr. 16. Color etiam vniuerſi corporis (vt ipſe refert) in nigredinem pullore permixtam permutatur, venter, & pedes intumelſcunt, ſupernæ corporis partes gracileſcunt, & corpus ipſum repeſcit. Aliquando autem alius multa, & tenuia excernit, propterea quod his ſufficienter anguſtata ſunt ora vaſorum, per quæ tranſmittitur cibus ex ſimis hepatis partibus in conuexas (vt Gal. refert eodem. 2. libr. de art. curat. ad Glau.) Vrinę vero à principio quidem multę, verum vbi iam ad aquam intercutem dilapſi ſunt, omnino paucę (vt patet ex eodem Aetio.) Quod vero affectus hic morbus ſit in quantitate primo, (quoniam in genere tumorum præter naturam exiſtit) ſextentis in locis liquet in Galen. doctrina, præſertim 13. & 14. meth. med. Secundæ in intemperie. quoniam frigidus affectus eſt vt 5. de ſimpl. medic. facult. legitur, Et tertio in ſoluta contiuitate, quoniam

Vide 13. meth. c. 16. in prin. Quid ſit ſcirrhus.

Cap. 6. ſcirrhi differentia duplex, cap. 4

cap. 6.

5. de ſymp. me di. fac. c. 13 Iecoris ſcirrho laborantis inditia.

cap. 7. poſt prin.

cap. 5.

Quis affectus præter naturā ſit ſcirrhus. 13. met. c. 4. & 14 met. c. 6 5. de ſimp. facu, cap. 7.

Causæ.

Cap. 4.

Cap. 10

5. de simp. fac.

Cap. 7

14. meth. cap. 4

cap. 4.

Cap. 8.

Quo modo di-
uerſi ſcirrhi cõ
ſi dignoſcenda,
Cap. 10.

Cap. ultimo.

Prognostica.

14. meth. c. 6.

2. ad glau. ca. 4.

2. ad glau. ca. 5.

Cap. 9

(ut diximus) ex genere est tumorum præter naturam. Cuius affectus inditicia non alia requiras, quam ea, quæ supra narrauimus, pro dignotione partis affectæ, præsertim ex tumore, duro quidem existente cum exiguo, aut nullo dolore interim sensu priuato, quandoque non omnino insensibili. Eius autem causa est humor lentus, & crassus in solubiliter partibus induratis infixus, (ut liquet eodem lib. 2. de art. curat. ad Glauc.) qui interdum statim à principio congregatur, & paulatim augetur: Crebrius vero medicorum imperitia paratur cum vehementer erysipelata, & inflammationes astringunt, & infrigidant. Id vero commune est omnibus scirrhis à quacunque causa ortum habent, ut lib. de tum. præter naturam scriptum est. Perpetuo tamen ex humore crasso, & frigido ortum dicunt, quales sunt in animalium corporibus, bilis atra, & super exiccata pituita, & proinde scirrhi tumores omnino, aut pituitosæ sunt substantiæ, aut atrabiliaria, aut ex vtraque mixti, ut eodem 5. de simpl. medic. facult. liquet, & 14. meth. med. Et propterea etiam duri sunt. Nam cum omnia dura fiant, aut resicatione, concretione, aut nimia impletione, vel harum quapiam coniugatione, eodem Gal. teste præcitato li. 5. de simpl. medic. facult. Scirrhi seu scirrhi tumores ex frigidi humoris impletione, simulatque congelati, seu concreti à uehementi frigore generantur propter quod aut insensiles omnino sunt, aut exigui sensus particeps, cum exiguo etiam aut nullo dolore consistentes, ut præcitato li. 5. de simpl. medic. facult. decretum est. Verum nunquid à crasso, & glutinoso humore, ac pituitoso originem ducant, an ex ea nigra bile, quæ veluti fæx sanguinis existit, differens ab ea, quæ propriè atrabilis nuncupatur, aqua non scirrhi tumores, sed canceri gignuntur, Ex colore inquit Galen. præcitato lib. de tumor. præter naturam interſtinguere valebis. Sed cum scirrhi tumores, de quibus hic verba facimus, eorum colore dignoſci non ualeant, Dicimus nos quod ex vniuerſi corporis colore ſecerni poſſunt. Namque ſi ex nigra bile orti fuerint, color totius corporis ad nigrius declinabit. Si vero ex crassa, lentaque pituita originem traxerint, ad albidius aliquando veluti plumbi colorem habent. Nam pro diuerſa natura redundantium in iocinore humorum ex quibus prædicti affectus fuerint excitati, quod totum corpus simili colore inficiatur nemini in dubium venit: cum viscus sit princeps toti corpori alimenti materiam suppeditans. Proinde Galen. faſſus eſt 5. de loc. affect. sæpenumero ſolo colore comprehendiffe, modo iecur, modo ſplenem eſſe affectum: Insuper ex ætate temperamento, regione anni tempore, ac præcedenti victus ratione illud confirmare poteris. Et vbi prædicti ſucci permixti fuerint, idem color, ac eadem, quæ ſumuntur ex modo dictis initia permixta erunt. Cæteram ex quacunque cauſa in iocinore exquisiti ſcirrhi fuerint orti, omnino ſine ſenſu perſiſtentes, omnino quoque inſanabiles ſunt, velut in cæteris etiam partibus (ut liquet apud Gal. 14. meth. med. & 2. de art. cura. ad Glau.) Quamquam neque is, qui diſſiciliter ſentitur, facile curationem admittat (ut ipſe inquit) eodem quoque 2. de art. curat. ad Glauc. de hepatis ſcirrho ſic ſcriptum reliquit, quod ab initio quidem sæpius ipſum ſanauerit: Vbi vero ad plures dies forte fuerit extenſus, neque ipſe potuit ſanare, neque alium vidit, qui poſſet, Nam omnibus iis qui ita affecti ſunt ex neceſſitate ſubſequitur aqua intercuſ. Pereunt autem quam plurimi in tempore longo: quidam etiam breui, qui ventris proſſuo laborant. Propterea Paulus præcitato loco dicebat ſi vero iecur induratum fuerit, parum in medicina ſpei eſt, affectu in aquam ſubtercutem decidente. Qui autem iocinoris ſcirrhi tumores, præſertim circa eorum initia curari poterunt, Ea curationis ratio, quæ muſculoſarum partium ſcirrhis competit, ſanare eos conſueuerit, Gal. teſte eodem 2. de art. curat. ad Glauc. Quoniam viscus hoc fortia medicamenta non perfert

fert, veluti splen (ut ipse inquit.) Communis autem curandi scirrhorum indicatio est, vt quod præter naturam in particula continetur, totum vacuetur, ut 14. metho. med. scriptum est; Id uero perficitur nedum medicamentis extrinsecus adhibitis, verum eis, quæ in potu sumuntur vim habentibus aperiendi atque extergendi eum, qui in viscere continetur, humorem, ac etiam victus ratione conuenienti adhibita. Et propterea ex his scirrhosus tumor in hepate factus sanari poterit, ex eiusdem Galeni testimonio præcitato libro secundo de art. curat. ad Glauc. Ea de re nos primo victus rationem conuenientem præcipientur, secundo quæ in potu medicamenta sumuntur, & tertio, quæ foras adhibentur, conscribemus. Verum quantum ad victus rationem spectat cum eadem victus ratione vtendum sit, quia in obstructionibus liberandis utimur, breuissimis verbis eam absoluemus. Nam cibi, qui facile concoquuntur eis exhibendi sunt, quique & in cisoriam vim, & repurgantem complectuntur, vt inquit Aetius, Neque etiam ineptæ eis acrium rerum comestiones sunt, si per interualla, & post exercitia, ac gestationes sumantur. Pro ratione etiam morum, & exercitiorum tum quantitatem, tum qualitatem ciborum augere oportet, Viranda sunt crassa, & viscosa edulia, atque ea, quæ difficiliter concoquuntur, sic etiam & dulcia omnia: quoniam (vt diximus) hepatis affecto nocentissima sunt. Vinum pro potu competit tenue, odorum, moderata quantitate acceptum. Reliqua vero, quæ ad victus rationem spectant, supra cap. de obstruc. requiras. In potu autem sumantur cuncta ea, quæ in renibus contentos lapides comminuere apta sunt, quibus admiscere oportet aliquid ex iis, quæ urinam mouere possunt, Galeno auctore præcitato libro secundo de art. curat. ad Glauc. quem sectatus est Paulus, cum dixit, Potiones expediunt, quæ angustias visceris recludunt, absterguntque: Huiusmodi sunt quæ urinam citant, & calculos confringunt, Ad hæc ea, quæ nuper ad iecoris obstructionem dicta à nobis sunt. Non est igitur cur hic speciatim de eis mentionem facere debeamus, Cum infra locupletissimè de his, quæ calculum confringunt, atq; urinam citant, pertractaturi simus & fusius uero pertractauerimus de his, quæ iecoris obstructionem liberant: Eisdem igitur locis studiosi ea requirant. Vnum tamen ex Aetio non prætermittam, utpote anagallidis, quæ cæruleum florem habet succum, qui exiccatus, itemque liquidus ex aqua mulsa, in moderatis autem febribus ex aceto mulso, potatus confert. Similiter etiam si viticis torrefacti, aut radicis eupatorii 3. i. eodem modo exhibeatur. Cæterum cum affectus hic ex superfluo humore simul cum frigidityte trahat originem, iccirco compositam esse eius medelam oportet, ob refrigerationem scilicet, ex calfacientia poscente affectu, ob alienam uero, & superuacaneam humiditatem, euacuantia. Attamen vitanda ea sunt, quæ immodice uim habent calfaciendi, ac validè exiccandi, nedum intus assumpta, verum etiam deforis admota: Nanque (vt Galenus inquit quinto de simpli. medicamentorum facult.) nullus scirrhosus tumor curari valet neque à valide exiccantibus, neque à fortiter ex calfacientibus, neque ab iis, quæ vtraque hæc præstare possunt, propter causas ab eo ibidem traditas. Et propterea sola ea, quæ calfaciunt, sed non admodum, unaque exiccant non magno opere eiusmodi affectus sanare possunt: vocantur græcè μαλακτικά, latine emollentia, eodem simul tempore utranque agentia: Nempe quod congelatum est fundentia, & sensim per halitum digerentia: Peculiariter etenim medicamentum emolliens non de omnibus induratis, ex qua uis causa dicitur sed de iis, qui congelatione induruerunt, magisq; si in eis contentus sit humor præter naturam: Veluti in hisce scirrhosis tumoribus: quemadmodum idem Galenus testis est præcitato libro quinto de simplicium medicamentorum facult. Cuius farine sunt ea medicamenta (ut diximus) quæ calorem habent tepidū.

Metho. de cur. rã.
di scirrhor.
cap. 4.

Victus ratio.
cap. 5.

Medicamentorum ratio.

cap. 5.

Cap. 6.

Emolliens medicamentū quod dicatur.

cap. 4.

ad glauc. c. 4.
14. meth. c. 4.

14. meth. cap. 5.

ad glauc. c. 5.
14. meth. c. 5.

Topica.

humiditatem vero nec multam, nec omnino minimam & propterea modice exiccantia. Nanque oportet induratum corpus à medicamento, quod auxilio futurum sit, simile quid pati ijs, quæ sub sole funduntur, alias si quis medicamenta, quæ vehementer dissoluunt, trahunt, ac digerunt, induratis corporibus adhibuerit, eisq; vacuare tentet nec ijs vtatur, quæ ex calfaciendo molliunt, ac liquant: huic licet paucis primis diebus egregie processisse curatio videbitur: quod de affectu tamen restabit tantum insanabile erit: Si quidem toto quod in eo tenuium partium erat digestio: quod reliquum est veluti lapidiosa cōcretio liquetur (Gal. auctore eodem 2. de art. cur. ad Glau. & 14. meth. med.) Hac igitur de causa ad scirrhosos affectus (vt diximus) nullum vehementer exalfaciens, siccanque medicamentum aptum: sed ea tantum, quæ cum molliendo digere possunt ex eiusdem Gal. sententia. Quanquam eisdem indicatione sūpta à parte affecta, quæ sēper (vt Gal. inquit eodem 14. meth. med. in omnibus tum morbis, tum symptomatibus in memoria habenda erit) ea, quæ astringendi vim habent, admiscenda sunt, Ita tamen, vt semper, quæ digerendi, dissoluendi, ac molliendi vim habent, astringentiam superent. Qua propter augere oportet ea, quæ ratione inflammationis ipsius apponuntur cum cataplasmata, tum etiam & fomenta, ex Galen. & Aerii sententia, & fortiora quedam annectenda sunt. Ea autem constabunt ex absyntii coma, nardo cum inda, tum celtica, croco, ænanthe, mastichæ chia nardino, ac lentiscino vnguento, adhuc autem & mastichino, & melino (vt ipsi inquirunt.) His igitur ammoniacum, thymiana, & bdellium, altææque radicem, ceruinam, seu vitulinam medullam, ac anseris, seu gallinæ adipem miscere oportet. Nec minus & aliud eorum, quæ incidere possunt admiscendum est, vt eodem secundo de art. curat. ad Glau. & 14. meth. med. liquet. Hæc etenim incipiente in hepate scirrhum sanare poterunt conuenienti simul adhibita diæta, simulq; medicamentis aperientibus, atque abstergentibus humorem, qui in uiscere continetur. Poterunt autem hunc in modum medicamenta parari, Recipe absyntii. P. s. foliorum, & radicum althææ ana manip. i. bulliant in oleo communi, quo sæpius per spongas supra hepar fomentum admoueat, dein Recipe olei de absinthio, & mastichini, singul. vnc. i. nardini, & cytoniorum cuiuslibet unc. s. spicæ nardi, inditæ, vel celticæ ana 3. s. croci scrup. s. adipis anseris, seu gallinæ, & medullæ ceruinæ seu vitulinæ ana vnc. i. caræ quantum satis sit, & acetiparum; fiat vnguentum, quod mane, vespere applicetur, præcedentibus semper prædictis fortibus. Procedente vero tempore addere poteris prædicto vnguento unc. s. vel unc. i. ammoniaci, aut bdelli humentioris existentis, siue sty racis similiter humentioris, quæ prius aceto dissoluantur; & si maui in cataplasmatibus formam redigere, folia excipe, simulq; radices maluarum, ac althææ quantitate cuiuslibet manip. i. & cum modicè prius fuerint decocta contundantur, adiceq; adipis anseris, seu gallinæ unc. ii. lenti cremoris fœnugræci, seminis lini, & althææ ana 3. iii. olei mastichini lentiscini, & de absinthio ana. vnc. i. ammoniaci, seu bdelli in aceto dissoluti vnc. iii. misceantur & fiat cataplasma cum oxymelite, quod item præcedente semper fomento adhibeantur. Interim addere poteris nardi spicam, indicam, aut celticā cuiuslibet 3. i. assumens & croci scrup. s. Illud tamen perpetuo seruandum erit, ne admodum fortibus medicamentis vtare, Cum ea viscus hoc non perferat, vt diximus ex Gal. auctoritate. Et proinde non audeas quæso supra medicamenta, quæ vehementer discutunt, trahunt, ac digerentur, nisi eorum exigua sumatur quantitas, ad misceaturque lenibus semper medicamentis nuper conscriptis. Nec eadem unquam omnino ab astringentibus absoluantur: qua habita methodo, poteris ex connumeratis medicamentis varios (vt vsus requirit) potus, diuersaque cataplasmata, ac vnguenta componere tum lenia, à quibus semper incipias,

tum

tum valida, tum mediocria: Et proinde huic cap. finem imponimus. Illud tamen animaduertentes, quod ubi multo sanguine abundauerit laborantes, priusquam modo dictis medicamentis utaris, vena secanda erit interna dextri cubiti: Et si copia adfit pituitosi, vel melancholici succi, ii quoque prius purgandi sunt, Sæpius autem talia pharmaca fuerunt adnotata, præsertim cap. de melancholia, & de obstructione iocinoris.

περί ίκτερος.

id est de ictero seu morbo regio. Cap. 86.

IN excrementorum separatione omnino ea non peracta, vel non rite, symptomata quædam fiunt aliqua nomine proprio vacantia, alia vero uulgo nominata, ueluti *ίκτερος* à græcis dictum quem admodum Galen. testatur lib. de differ. & tertio de caus. sympt. Hunc affectum latini quandoque icterum interim auriginosum nominant: Celsus autem & arquatum, & interdum regium morbum appellat, ut liquet c. 14. lib. 3. Medicorum vulgus ictericiam nuncupat. Cur autem morbis regius nominentur hic affectus, ab eodem Cornelio præcitato loco ostenditur. Verum cum græci affectum hunc *ίκτερος* nuncupent, ab Aetio cap. 17. lib. 10. declaratur, Ait enim *ίκτερος* à similitudine ad animalculum, quod *ίκτις* id est iuerra appellatur, nominatus: Est autem id animalculum mustella syluestris, quæ auricolores oculos habet: sed quicquid sit de eius nomine, hoc pacto ipsum describit eodem loco, quod biliosi humoris circum corpus effusio est, ob secernentis eum facultatis debilitatem quæ eum segregare, & ad proprios excretionis locos demittere non valet. Paulus quoque cap. 50. lib. 3. dicebat, Regium morbum esse bilis per totum corpus effusionem, modo atræ, de qua in lienosis dictum est, modo flauæ Atqui nos de eo ictero verba facimus, qui effusio est flauæ bilis per totum corpus, Hæc tamen effusio vere & proprie icteros dicitur. Nam de atræ bilis effusione in sequentibus pertractabimus. Et cum dixerimus affectum hunc vitio segregationis excrementorum prouenire, de eo excremento intelligimus, quod flaua bilis appellatur. Hæc inquam cum non omnino, vel non rite segregatur, ac expurgatur, per totum corpus cum sanguine diffusa, huius mali auctor est, Verum cum ex triplici causa id prouenire possit, ut 3. de caus. sympt. à Gal. scriptum est, Nanque vel vitio particulæ, quæ excrementum ipsum expurgat, vel ratione viuarum, per quas expurgat, vel vitio ipsiusmet excrementi, quo fit, ut non perpetuo in morbo regio idem locus affectus, sit, Neque etiam iecur (ut à Gal. demonstratum est. 5. de loc. affect.) quamuis interdum ipsum afficiatur, Item neque ipsa vesicabilis semper afficitur (ut eodem lib. scriptum est, similiter à Paulo, & Aetio præcitatis locis.) Propterea nos cum numerosæ sint morbi regii differentiæ (eodem Paulo auctore) Pro earum diuersitate conabimur affectas partes inuenire cum aliæ partes afficiantur, si eiusdem excrementi vitio morbus regius proueniat, aliæ si propter viarum angustiam, vel propter ipsius particulæ expurgantis imbecillitatem. Quod vero biliosum hoc excrementum vesica, quæ iocinori subest, expurget, liquet apud Gal. præcitato lib. 3. de caus. sympt. quarto de usu part. ac 5. de loc. affect. & secutis aliis in locis. Cum itaque non vnus locus perpetuo in morbo regio afficiatur, Erauerint que qui hepatis affectionem in omnibus ictericis adesse putauerunt (ut inquit Aetius) Iure indagandum putauimus quot partes in eo affici possunt ac commodo, & quibus notis inrerstingui poterunt. Atqui compertum est in Gal. Pauli, atque Aetii doctrina in quouis morbo regio aut iecur, aut vesicam bilis, vel vniuersum corpus affectum esse. Qua propter ubi

Lib. de dif. sym.
c. 4. in prin.
3. de cau. sym.
capite ultimo
in prin.

Morbus regius
quid sit.

Quod flaua bilis ut non rite expurgetur, trifariam contingit.
Ca. 2. post prin.

Cap. 7.

3. de cau. sympt.
Ca. 2. post prin.
4. de usu part.
cap. 12. circa medium.
5. de loc. af. c. 7.
Quot partes affici possunt in morbo regio.
Si iecur sit affectum signa.

Cap. 7.

Si nefica bilis,

Si vnuerſi cor-
poris vitio pro-
ueniat morbus
Regius, ſigna,Quis affectus
præter naturam
ſit morbus re-
gius.Cap. 5. in princ.
Signa eiufdem,

Cauſæ,

iecur affectum ſit, excrementa alui flaua bile vehementer colorata, ſimiliter & vrinæ videbuntur. pariter & ſudores, ſi ii quoque effundantur. Excremen-
torum nanque proprietatem in morbo regio conſiderare per quam neceſſa-
rium eſt, vt 5. de loc. affect. decretum eſt, præſertim ſi cum eis eorum, quæ præ-
ceſſerunt memoriam habuerimus. Interim febris quoque aderit, ac præcor-
diorum in dextra parte dolor, quandoque vero citra dolorem, ac grauitatem,
& febrem, feruorem ea parte ſentient. aderitque ſitis, ac corporis exiccatio,
ac eiufdem coloris varia mutatio: manifeſte etenim quandoque videmus (eo-
dem Gal. teſte præcitato loco) iocinoris ſecundum naturam temperie muta-
ta, vniuerſum corpus herbis candenti pallore infectis ſimilari: Interdum plū-
beum, aut etiam magis fuscum referre colorem. Interdum etiam alias quaſ-
dam ineffabiles colorem proprietates, quæ iocinore ſuo munere non recte fu-
gente, accidere ſolent. At vbi citra febrem morbus regius accidat, vrgente
in dextra præcordiorum parte grauitatis cuiuſdam ſenſu, & alba ſint, quæ per
aluum deiciuntur, ac ſtatim vrinæ bilioſiſſimæ, & affatim excernantur, veſicæ
bilis vitio talem morbum regium fieri haudquaquam verendum eſt. Verum
ſi non vniuerſim, ſed paulatim morbus regius procreetur, ſic vt nullum fe-
re ex commemoratis adſit, (vt Paulus teſtatur) Sintque alui excrementa pro-
xima conſuetis ſimiliter & vrinæ, fiatque cutis proriginioſior, ac magis arida
vitio vniuerſi corporis, ſeu ſolidis partibus nimio calore intemperatis, hunc
procreari morbum regium manifeſtum erit. Cæterum quæuis pars in eo af-
ficiatur, perpetuo icterus ſymptoma eſt, eorum genere, quæ in corporis af-
fectibus conſiſtunt, Et cum primæ eorum differentiæ numero quatuor ſint;
ſub viſibilibus comprehenditur, quæ in coloribus, qui præter naturam ſunt,
conſiſtunt, idq; non alicuius, vel aliquorum partium, ſed vniuerſi corporis
(Gleno auctore lib. de differ. ſympt.) Communiter autem omnibus ictericis
pigrities, & tumor grauans ad motum corporis contingit, ad dulces cibos
animum habent alienatum, amaros vero non admodum auerſantur, & varijs
imaginationibus vexantur. pruritus etiam vniuerſi corporis comitatur: ac
difficulter exudant: alba oculorum, & partes faciei temporibus propinquæ,
itemque malæ pallorem oſtendunt. venæ etiam ſub lingua repletæ reperiuntur,
& abūdantem humorem ſignificant, (Aetio auctore.) At (vt inquit Celfus) co-
lor eam morbum detegit, maxime oculorum, in quibus quod album eſſe de-
ber, ſit luteum, ſoletque accedere & ſitis, & dolor capitis, & frequens ſin-
gultus, & præcordiorum dextra parte durities: & vbi corporis vehemens
motus eſt, ſpiritus difficultas, membrorumque reſolutio. Atqui vbi durities
manet morbus tum corpus cum pallore quodam inalbeſcit. Verum licet,
morbus regius (quomodocunque fuerit ortus) perpetuo ſympt. ſub eodem ge-
nere ſit, ac bilioſi excrementi ſeparatione frustrata fiat, (vt dictum eſt) quæ-
cunque etiam pars in eo primo affecta ſit, ramen non ſemper in eo ſegrega-
trix facultas oblæſa eſt, neque ad functionum noxam ſequitur, Veſica bilis
imbecilla exiſtente in ſeipſa, ita vt non valeat aut ipſam bilem attrahere, vel
eandem expellere, Sed interim viarum anguſtiam conſequitur. quandoque
vero ex ipſius met excrementi vitio ſit (vt diximus.) Id quod etiam forte in-
nuere voluit Aetius, quamuis eius verba videantur aſſerere, ſemper icterum
ob ſecernentis bilem facultatis debilitatem oriri, Nanque ſubdit demum,
quæ eadem ſegregare, & ad proprios excretionis locos demittere non valet,
quod nedum ob facultatis imbecillitatem, verum etiam ob viarum anguſtiā,
ac excrementi vitium fieri poteſt. Propterea id perfecte dignoſcere, atque
exacte interſtinguere opere pretium duxi: Ex quibus inſimul patebit eiuf-
dem morbi regii cauſarum diuerſitas. Oritur itaque interdum morbus re-
gius ex iocinoris inflammatione, propter quam ſanguis omnino a bile ip-
ſa

sa expurgari nequit, immò vnà cum ipso sanguine bilis per totum corpus defertur, Et hinc morbus regius generatur, propterea quod & eiusdem bilis copia ob eandem causam in eodem viscere gignitur, & constipatio quædam fit, seu angustia locorum, per quos ipsa bilis ex venis transfertur ad canales vesicæ bilem recipientis, vt Gal. inquit com. apho. 64. 4. lib. Cuius quidem morbi regii indicia sunt præcordiorum dextra parte dolor, biliosæ deiectiones, & febris (vt inquit Paulus) Nanque ii omnino febricitant, Galen. teste. 9. de comp. medic. secundum locos. Similiter & vrinæ flaua bile vehementer coloratæ videbuntur. At si citra grauitatem feruor in ipso existat, ex sola iecoris calida intemperie vitium gignitur, vt idem Paulus testatur. Ex qua calida intemperie cum multa copia bilis progignatur, quæ præ multitudine expurgari nequit, eadem per totum corpus diffusa, propter eiusdem excrementi copiam, icterus excitatur, Nec minus & ex obstructione, non siquidem partium vasorum, per substantiam iocinoris distributorum, per quæ alimentum, ac sanguinis digestio in vniuersum corpus fit, sed eorum locorum, per quos transfertur bilis ad canales ipsam recipientes ex eadem vesica bilis ortos, ac per iocinoris substantiam extentos, vt patet com. præcitati aphorif. excitatur morbus regius: propter viarum vitium: hoc est ipsarum obstructionem. qua etiam ratione angustatis videlicet iam dictis viis ex eiusdem visceris scirrhus, morbus regius generari poterit: Verum si scirrhus fuerit causa, eiusdem indicia præcedenti cap. de scirrhus requiras. Si vero ex obstructione ortus fuerit, sine febre permanebunt ægri (eodem Galen. teste præcitato lib. de comp. medic. secundum locos) Nec non & grauitas quædam in eadem dextra præcordiorum parte aderit, præsertim inter vehementer respirandum, Nullum que aderit scirrhi inditium. Quod si absque febre alba deiciantur alui excrementa; vesicæ fellis (vt diximus) malum ostenditur: Verum id bifariâ esse poterit, Nanque vel ob eius imbecillitatem, propterea quia biliosum humorem veluti consuevit in se ex hepate non attrahit: & ob id impurum sanguinem reliquit. Quanquam etiam contingat eandem nimis repleti, & propter repletionis multitudinem idem excrementum expelli ad intestina nequeat: & excretrice infimul facultate existente imbecillitate. Poterit & secundo morbus regius vitio viarum ex ipsa vesica ortarum oriri, vtpote cum ipsæ obstructæ fuerint: & hoc, vel cum obstructæ fuerint viæ, per quas ex iocinore ad ipsam vesicam biliosum excrementum trahitur: vel ex, per quas ab eadem vesica ad intestina propellitur: quippe omnibus prædictis modis non expurgatus a bile sanguis in totum corpus diffunditur, ac morbus aquatus efficitur. Ex viarum vitio, si propter earum obstructionem fieri contingat. Ex imbecillitate vero separatricis facultatis, si eadem vesica bilis in attrahendo, seu excernendo prædictum succum propter aliquam eius intemperiem fuerit debilis. Nanque fellis felliculus, cum inter naturam instrumenta connumeretur, vnicum habet veluti reliqua imbecillitatis principium a partis intemperie ortum, vt eodem. 5. de loc. affect. in fine Gal. visum est. Atqui inter stinguens, si ob meatuum ipsius obstructionem fiat morbus regius: Nanque cum albis excrementis grauitatis cuiusdam sensus circa dextrum hypochondrium vrgebit citra febrim. At si propter eius imbecillitatem fiat, talia excrementa citra grauitatem deiciuntur, vtrisque tamen statim vrinæ biliosissimæ affatim excernuntur (vt inquit Paulus.) Cæterum, si hoc vitium febriente ægro repente, ac cumulatim superueniens febrem finierit, crisin testatur, materia ex alto foras prorumpente, proriente nimirum ad cutem bilioso humore ratione bonæ iudicationis, vt ex Paulo, & Gal. liquet: qui morbus regius, ex excrementi vitio quoque generationem habet eo siquidem crassiori existente, potius quam multo. Nam si tenuis eadem fuisset, vtrique & in billis eadem

Si ob hepatis inflammationem fiat morbus regius signa.

9. de comp. med. sec. loc. c. i in prin.

Si ex eiusdem iecoris intemperie calida fiat signa.

si ex obstructione, seu iocinoris scirrhus fiat morbus regius signa

Cap. 2

si vitio vesicæ fellis oriatur, signa.

signa morbi regii ex crisi. Loc. citatis.

si ab aliqua cau-
sa externa fiat,
signa.
5. de loc. af. 6. 7
ante med.

si uniuersi cor-
poris vitio fiat,
signa.

Prognostica.

3. de mor. vulg.
commentario 1.
comment. 5. in
fine.

Tex. 18

crisi foras propulsata fuisset. Id quoque confirmabunt alui excrementa, & vrina, quoniam vtraque secundum naturam se habebunt, & ob eam causam nullum visceris affectum declarabunt. Contingit etiam citra febrem aliquando sanguine in bilem exagitato, propter corruptionem aliquam peregrinam ortam ex noxii medicamenti potione, aut venatarum bestiarum morfu, quod propterea morbus regius fiat, Aetio, & Paulo testibus. Quod vero ex ferarum morfu fieri soleat, exemplo probat Gal. quinto. de locis affect. cuiusdam imperialis, serui, qui viperarum venationi deputatus erat, cum a vipera morsus esset. Huic vniuersi corporis color fuit mutatus, adeo vt porri colorem referet. Ex multitudine quoque biliosi excrementi & hic morbus regius ortus, propterea quod sanguis extranea quadam corruptione in bilem fuit versus. Neque etiam difficulter is dignosci poterit, si ab aliqua predictarum duarum causarum fuerit ortus, egrotantis, aut astantium interrogatione percepta, quae earundem praecesserit causa. Si vero non vniuersus, sed paulatim procreetur morbus regius, nullumque ex commemoratis adsit, ita vt neque dolor, neque grauitas circa alia infestet, neque febris praecesserit, plurimam in vniuerso corpore procreari bilem perpendere debemus. Idque bifariam esse poterit, vel propter solidarum partium colorem immodicum, vel ratione alimentum, quod ipsis distribuitur. Ex vtraque tamen causa propter excrementi multitudinem icterus oritur, quoniam cum expurgari nequit, vna cum sanguine per totum corpus defertur. Vna autem ab altera causa distinguitur, interrogatione facta eorum, quae praecesserunt. Nam si multo tempore calidioribus cibis, ac potibus vsus fuerit aeger, ciborum vitio tribuenda erit occasio. Vbi vero haec non praecesserint, ex calida vniuersi corporis intemperie, audacter morbum regium excitari censeto. Tot itaque sunt morbi regii differentiae a diuersis causis ortae: quae iam dictis signis facile dignosci, ac inter se distingui poterunt. Reliquum est, vt eiusdem prognostica enunciemus: quorum primum Hip. est apho. 62. 4. lib. dum inquit, Quibus in febribus morbus regius ante diem septimum accidit, malum. Nanque cum iudicatorius esse non possit, sed symptomaticus potius, iocinoris male se habente (vt in com. Gal. asserit) nec propter aliud malum ipsius hepatis ante septimum oriri possit morbus regius, quam ex inflammatione, vel obstructione eiusdem visceris, cum citius non possit iudicatorie bilis perducere in corpus: quoduis praedictorum affectuum consequatur, semper malum est, nec post septimum, si propter eosdem affectus iocinoris exciteretur, periculo vacabit, vt liquet ex eodem Gal. ibidem. Hoc idem confirmauit tertio de morb. vulg. Galen. cum dixit, Reduc item ad memoriam ante concoctum morbum crebro re audiuisse nullum quemlibet abscessum proficere, nedum auriginosum, is enim impediri significat bilem, quo minus ex viscere expurgetur, & per ventrem effundatur, vel propter oppilationem eius, vel propter inflammationem. Verum morbum iam concocto decretorie interim natura ad cutem excrementum effundit, cum quorundam aliorum humorum, tum flaua bilis. At huius Hip. sententiae contrarium, quarto de ratione vict. scriptum reperitur. Ait enim auctor, in biliosa febre morbus regius cum rigore ante septimum diem enatus, morbum soluit. Si vero absque rigore praeter occasionem superuenerit, pestiferum. Nisi esset quod (vt Gal. refert in expositione praedictae sententiae) neque ante septimum diem, neque post septimum cum rigore enatus morbus regius febrem soluit. Sed ita distinguere oportet, quod febrientibus morbus regius superuenit, interdum quidem tanquam affectionis hepatis symptoma, quod malum est (vt diximus ex eius sententia) Interdum quoque, natura post coctionem per cutem excernere contendere, sed nequeunte, veluti in abscessibus omnibus fieri consuevit: quod nequaquam malum est, immo si cum rigore fiat, morbum

morbum soluit in biliosa febre: quoniam & natura vehementiori motu mo-
 uetur ad expellendam bilem, eam, quæ mordacior, ac acrior est, id quod per
 rigorem significatur. Et licet ipsa eadem bilis ante septimum iudicatorie ef-
 ferri sit impossibile, (vt patet com. eiusdem aph. 62. quarto libro) bene ta-
 men decretorie ad cutem effundi poterit, (vt eodem 3. de morb. vulg. inquit.)
 In biliosa scilicet febre, citra aliquem iocinoris affectum, vtputa inflamma-
 tionem, seu obstructionem, (vt diximus) morbo iam concocto, & potissimum
 vbi per aliam viam natura eandem postea bilem excernere ualeat, per aluum
 videlicet, aut vesicam, vel largum sanguinis profluuium, quemadmodum
 Hippoc. & Galenus primo de morb. vulg. scriptum reliquerunt. Idem quoque
 Hip. aph. 64. eiusdem libri quarti dicebat. Quibus in febribus morbus regius
 septimo, vel nono vel vndecimo vel decimo quarto superuenerit, bonum, ni-
 si dextrum hypocondrium obduruerit: si vero non, non bonum, & aph. 42. li-
 bri sexti sic de morbo regio scriptum reliquit, Morbo regio laborantibus, si
 fiat hepar durum, malum. Celsus vero Dioclis auctoritate testatur, quod si
 morbus regius febrem oriatur, ex toto proderit, si post hunc febris, occi-
 det. Quantum vero ad curationis rationem spectat, si icterici fiant ratione bo-
 næ iudicationis in febribus, facile hi curantur (Galeno teste nono de compo-
 sitione medicamentorum secundum locos, & Aetio cap. 18. lib. 10.) ex aqua-
 rum potabilium balneis, ac olei discussorii affricu, & omnibus cutem rarefa-
 cientibus, quale est anethinum oleum, & chamæmelinum, irinum, & amaraci-
 num. Similiter, si (vt inquit Aetius) rosmarinus herba oleo incocta ipsum plu-
 rimum discussorium facit; cum his præterea victus adhibendum est humidior
 qui humorum crassitudinem moderate extenuare possit, vt eidem Gal. visum
 est 5. de loc. affect. & Aetio præcitato loco, quanquam idem Gal. eodem loco
 præceperit taliter laborantibus, vt aqua suapte etiam natura calida, & cui di-
 scutiendi vis esse, vterentur. Ex his nanq; quidam bonam valetudinem con-
 sequutus fuit, vt ipse inquit: Si vero ex lætalis veneni potione, aut ex virulen-
 torum animalium moribus quispiam ictero corripitur, iis vtendum erit ale-
 xipharmacis, quæ aduersus talia suo loco conscribentur: quanquam Gal. impe-
 rialem seruum viperarum venationi deputarum, cū à vipera morsus esset, per
 theriacæ potionem curauerit, vt eodem 5. de loc. affect. testatur, & propterea
 eadem vti poteris. At vbi ex solidarum partium calore immodico in regiū
 morbum inciderint, ad sanitatem reducentur (Paulo auctore) cibis humidis,
 & mediocriter refrigerantibus, prisana scilicet, intubo, feri, cychorio, piscibus-
 que, & vino tenui aquoso, nec non simplici frictione, exercitiis moderatis, vn-
 ctione, ac balneis (vt ipse inquit) quæ ex potabili aqua tepida fiant, in qua de-
 coquantur medicamenta frigida, & humida: qua etiam ratione curabitur, si ra-
 tione alimenti, quod ipsis partibus distribuitur, fuerit excitatus morbus re-
 gius. Verū si non vniuerso corpore primario affectio, sed iocinore male se ha-
 bente morbus regius exciteretur, quiuis fuerit eius affectus, siue calida intempe-
 ries, siue inflammatio: vel obstructio. seu scirrhus, non alia ratione indigebit,
 quam ea, quæ à nobis prius instituta est pro eorundē affectuū curatione: qua-
 re non est cur iterum hic eandem repetamus, sed illam in hoc caput transfer-
 re oportet. Restat itaque, vt eius morbi regii curationem præcipiamus, qui vi-
 tio vesicæ bilis excitatur. Hic omnino his, quæ obstructiones aperiunt, cibis,
 potibus & medicamentis extenuantibus, deinde his, quæ bilem ducere pos-
 sunt, curari desiderat, Galeno auctore quinto de locis affectis. Propterea
 aer temperatus eligatur, aut parum ad calidum vergens: somno item mode-
 rate vtantur, nocturno potissimum, lecto etiam, & conclauis cultiore clauso
 loco ludis, lasciuia, per quæ mens exhilaretur (vt Celsus inquit) Conueniunt
 item exercitationes, & gestationes (vt Aetius refert) Per omne etenim tem-
 pus,

3. de mor. vulg.
Loco citato.

1. de mor. vulg.
comment. 2.
Tex. & com. 55

Curatio morbi
regii si etis ra-
tione fiat.
Cap. 1.

5. de loc. affect.
Cap. ult.

Si ab aliqua ex-
terna, & ueneno-
sa causa fiat.
Curatio.

Loco citato.
Si ex immodi-
co calore partiū
solidarum.

si iocinore male
se habente ori-
atur, curatio.

si vesicæ bilis
vicio sit ortus
morbus regius
curandi ratio.
In fine.
Ratio uisus,

pus vtendum est exercitatione frictione, si hyems est balneo: si æstas, frigidis natationibus, ex eiusdem Celsi sententia. Alui excrementa quotidie expurgari debent: quæ si non natura excernantur clysteres adhiberi debent, Clyster enim (eodem Aetio teste) propter stercoreum euacuationem spirandi facilitatem inducit, intestinaque irritando, ac mordendo humores ad cutis superficiem delatos ad ipsa retrahit, & reuellit, præsertim vbi acrior fuerit.

Animi affectus immodicos vitent, vtantur tamen animi laxamento, ac iucunditate; Nam maximum adiutorium, & magis vtilis est ægrotantibus animi purissima laxatio, siue serenitas (Celio Aureliano teste capit. 5. libr. 3.) Cibi eligantur faciles concoctu, simulque incisorii, & attenuatori (vt patet ex eodem Aetio.) Ex volucrum quidem genere maxime montanæ, vt starnæ, phasiani turdi, merulæ ac reliquæ aues paruæ. In earum vero penuria gallinis, ac gallinaceis pullis vtantur, cum quibus olera ea decoqui poterunt, quæ vim extenuandi, ac vrinam ciendi habeant, veluti seris, intubum, asparagus, oreo, selinum, fœniculum, serpyllum, smyrnium, carduus, & eryngium, daucus, ac reliqua huiusmodi. Inter quadrupedum etiam carnes, ferinæ mansuetis magis sunt aptæ: quibus etiam interim vti poterunt capreolorum præsertim, & fructibus abstinendum est: amygdalæ modice sumi possunt. Pro potu vinum conuenit album, subastringens, neque valde vetustum, vt eidem Aetio visum est. Vbique tamen mediocritas optima censetur, vt ipse inquit. Verum vbi

Venæ sectio.

meatus vesicæ bilis vtrique sunt obstipati, vel alter duntaxat, vt Paulus testatur, Consilium est venam in dextro cubito secare, Nanque duo maxima remedia in huiusmodi ictericis principatum obtinent, (vt inquit Aetius) sectio videlicet venæ, & purgatio, potissimum vbi multitudo sanguinis vna cum bile in toto corpore abundat. In his nanque nihil venæ incisione commodius fieri poterit, si nihil impediat. Sanguis autem particulatim, & per vices detrahendus erit, ne per coaceruatam euacuationem vires ægri proster-

Purgationis, ac aliorum medicamentorum ratio.

nantur. At purgationes magis propriæ, & familiares huic morbo existunt (vt idem Aetius testatur Rufi auctoritate) Propterea tutius eis vti debemus, potissimum vel sanguinis multitudo vna cum bile in toto corpore non redundet, neque circa iecur dolor, aut distensio infestet. Et propterea Galen.

Cap. 7

5. de loc. affect. prætermisit venæ sectionem, & purgationem comendauit: Quanquam neque his vti debeamus, ni prius humores eduliis, ac potionibus itemque pharmacis prius fuerint attenuati, atque obturationes deoppilatæ, præcepto Gal præcitato lib. 5. de loc. affect. & Aetii præcitato loco. Purga-

Locis citatis,

tionem nanque in principio datæ, priusquam bilis fuerit attenuata, ac vasa fuerint reserata maximi mali causam præbuerunt. Ex quibus eligi potest bilem interim præparatione, ac attenuatione, indigere; quemadmodum in nostra methodo. Vt vero attenuetur humor, referenturq; viæ, ictericis dari poterit apii, vel adianti, vel lapathi decoctum ad tertias, Vtilis quoque est absynthii cremor per se, & cychorii succi cyathi bini, aut terni per se, aut cum vino poti. Similiter & verbenacæ rectæ, aut oxalidis decoctum, vt liquet ex Aetio, & Paulo. Si quis autem velit eos, quibus vtimur prædictorum loco syr. adhibere pro extenuatione, & reseratione perficienda, caput consulat de iocinoris obstructione. qua reseratione, ac extenuatione peracta, medicamentum, quod bilem ducere possit, exhibe, iuxta Gale. sententiam. Sic autem forte pharmacum purgatiuum, vt iubet Aetius, Nam ictericis purgationes, exhibendæ sortiores sunt, Etenim ob ventris siccitatem imbecilliores, inefficaces ipsis cognoscuntur, vt ipse inquit. Adde & secundo, quod parum quidem habemus in tali purgatione naturam adminiculantem, Nanque vel at trahere, uel expellere ob copiam, seu obstructionem bilem nequit ipsa vesica bilis (ut diximus) in prædictis ictericis, imbecilla siquidem existit eius se-

paratrice

paratrice, ac expultrice facultate. Vt autem noxij humoris prompte fiat euacuatio, vtriusque indigemus, natura siquidē expellente & medicamento attrahente, quemadmodum ipse Gal. com. aph. 22. primi lib. scriptum reliquit. Poterit autem purgans pharmacum ex calia fistula seu melle rorido, rhabarbaro, seu agarico, diacath. & triphera componi hunc in modum Recipe mellis roridi vnc. ii. s. vel casia fistule unc. i. s. rhabarbari cum spica vnc. i. s. succi rosarum macerati, & per colū transfusi scrup. iiii. diacath. 3. vii. triphera per sicā 3. iiii. cum aqua cichori, vel lupulorum, in qua prius 3. i. agarici, seu scrup. iiii. fuerint, decocti, fiat potio. At si neque dicta purgatione liberari potuerint, iis rursus valentioribus ad aperiendum datis potionibus, medicamentum, quod vehementius purget, exhibendum erit, ita ut etiam ad finem purgationis vna cū vehementissima mordacitate bilis excernantur, quæ cærulea magis sit quam flaua, vt inquit Aetius ex Ruffi auctoritate, & Gal. præcitato loc. Propterea cum cremore absynthii nardus indica, ac iunci rotundi odorati flores adiciantur. Item conuenit pulegii, aut calminthæ decoctum. Prodest etiam tum ex satiuus, anchusæ radix rubeæ tinctorum radix, chamæpithios, roris-marini, & aristolochiæ, Item serpyllum, hypericum, & eius generis plurima alia singula in aqua ad tertias decocta cum vino dulci bibenda præbeto, aut contundito, & cribrato, ac singul. 3. idato vt inquit Aetius. Datur item valde commode cornu ceruini ramentum cholearii mensura, petroselinum, anisum, asarum, leucanthemos & buphthalmos Gal. Archigenis auctoritate eo dem 9. de compositione medicamentorum secundum locos coagulum leporis commendat, si cum meraco ad dies quinque, vel sex præbeatur: quibus sæpius adhibitis, aut vice eorum exhibitis syr. qui validiorem vim habent extenuandi, incidendi, ac referandi, seu vrinam ciendi præcitato capite ad notatis, validius, quàm nuper dictum medicamentum purgans præbendum erit adiiciens 3. iiii. eclegmatis de succo rosarum, aut diaprunis solutiui vel catapotia, formabis, sumens pilularum aggregatiuarum 3. i. aut scrup. iiii. cum altera 3. rhabarbari cum spica, seu agarici trochiscati, quæ oxymelite excipiantur, & catapotia formentur; post quæ potionem exhibebis ex mellis aerei unc. ii. aut sacchari violacei tantundem cum aqua cychorii, aut borraginis, & in robustis corporibus cum prædictis catapotis grana iiii. aut v. dyacridii permiscebis. Verum vitandum probamus frequentem, & variam medicaminum potationē qua fella deducere promittuntur, siue ventrisflua, siue vrinalia fuerint (vt Celsus Aurelianus inquit) propter causas ab eodem ibidem traditas. Quod si circa oculos, & faciem vitiatas duntaxat color relinquatur, naribus infusis vtendum erit, a nagallidis videlicet succo aut succo radice betæ, & si fortiori indigeant, cyclamini succo, aut melancholicum aceto, ex Aetii auctoritate. Acetum vero acerrimum, si naribus attrahunt in folio desidens, contineatq; etiam præssis naribus paulisper mirifice conducit, Paulo auctore.

Cap. 1.

περί μέλανος ἰκτέρου.

id est de nigro ictero.

Cap. 87.

Cum triplex sit in uenarum concoctione excrementum (Gal. auctore 3. de caus. sym.) Quorum unum (vt diximus) amarabilis est, atque ab ea vesica, quæ iocinori subest, expurgatur. Alterum nigrabilis seu melancholicum excrementū appellatur, quod lien expurgat (eodem Gale. teste præcitato loco 2. de natur. facul. ac 4. de usu part.) Tertium serosum existit excrementum, quo renes expurgant, Non ab re eum eiusdem nigræ bilis

c. 2. post princ.

2. de nat. facul.
c. 9. ante med.
4. de usu part.
cap. 15.

De dif. sympt.
cap. 4.
3. de cau. symp.
cap. ult.

Quid fit icterus
niger, seu Ater
morbus regius,

2. de nat. fac. 6. 9
4. de usu part.
cap. 15.
Lib. de atra bi-
le. cap. 6.
Lienis actio,

Lienis usus uni-
uerso corpore.
Cap. 15.
Cap. 2. in prin.

In principio,

Cap. 9. circa me-
dium.
Quod si lien af-
ficiatur, signa,

Cap. 6

lis separatio, seu segregatio, vel omnino peracta non fuerit, vel non rite, sym-
quoddam sit nomine proprio vacans, quemadmodum idem Gal. scriptum re-
liquit lib. de diff. & 3. de caus. sympt. Nanque separationis excrementorum à
sanguine frustratio necessario coloris symptomata inducit, vt ipse inquit.
Verum id symp. quod melancholico excremento succedit, proprio nomine
caret. A Paulo vero cap. 49. libr. 3. *μελας ἰκτερος*: hoc est niger icterus, seu ater
morbus regius appellatur, Qui nihil aliud est, (vt ex eodem auctore colligi-
tur) quam delatio quædam sanguinis impuri inexpurgata ab eo nigra bile in
uniuersum corpus. Parum autem commode, veluti & reliqua excrementa iam
dicta purgabitur, vel proprii instrumenti ex purgantis imbecillitate, vel viis,
per quas expurgatur, quomocunque obstructis: vel ratione ipsiusmet ex-
crementi, cum immodica fuerit eius quantitas. Aliqui constat ne dum Hip.
& Plat. auctoritate, verum etiam tum medicorum, tum philosophorum non-
nullorum, vt liquet ex eodem Gal. eodem 2. de natur. facult. 4. de usu part. &
lib. de atra bile (quanquam Erasistratus aliter senserit) lienem vnum esse vi-
scus ex his, quæ sanguinem purgant, atque iecur, quoniam ad se quicquid in
sanguine limosum, crassum, ac melancholicum est (veluti in vino fœx aut in
oleo amurca.) trahit per uas venosum, tanquam per stomachum quendam. Id
autem non protinus in ventriculum per aliud vas excernit, sed prius per mul-
tum ocium conficit, atque immutat: ita vt quicquid in succum huic misceri ma-
xime conuenientem fuerit elaboratum, alimentum eidem efficiatur, quod ve-
ro ab ea quæ in splene fit elaboratione, excidit, tanquam omnino in utile ad nu-
triendum, per alium quendam modo dictum venosum stomachum lien ipse
ad ventriculum eructat. Verum quanquam plures partes instrumentum hoc
constituant, facultas tamen hæc, quam habet ad se ipsum trahendi succos me-
lancholicos, in eius proprio corpore (quod nonnulli parenchyma id est affu-
sionem vocant) consistit. Quapropter rarum admodum, ac laxum, instat spon-
gia cuiusdam effectum ex viscus hoc vt crassos facile attrahat, & excipiat, eo-
dem Gal. teste 4. de usu part. Quo fit vt præter eius quatuor facultates, quas
sue conseruationis gratia habet veluti reliquæ omnes particule, ex earum ge-
nere sit, quæ per accidens magnopere habent totum corpus iuuare (vt 9. de
compositione medicamentorum secundum locos à Galen. scriptum est) tra-
hens in se ipsum ex hepate (vt diximus) velut faciem sanguinis: per quam
actionem vniuerso corpori ad humorum bonitatem confert. Quare vbi im-
becillitate affectus est, præsertim attrahendi facultate facta imbecilliore, vni-
uersum corpus colore nigrius euadit; quoniam sanguis ex iecore in ipsum
impurus transmittitur: & propterea inter alia symptomata, quæ cum hepate
communia habet (sunt autem & ea multa, nisi quod quædam magis quædam
vero minus euenire solent, vt 6. de loc. affect. habetur.) Id quoque symptoma,
quod ad coloris rationem pertinet, cum eodem commune obtinuit: Quan-
quam in hoc vniuersum corpus (vt ipse Gal. inquit) magis nigricare videtur,
Etenim regii morbi, qui à liene agrotante ortum habent, nigriores sunt.
Itemque vlcera cicatrices nigra, vt 2. de natur. facult. liquet: Quod itaque
affectus præter naturam lien, atrum morbum regium constituat, luce clarius
pater in Gal. & Pauli doctrina. At quod idem affectus sit præter naturam,
coniectari poterit ex eo, quod vbi suo munere vitiose fungitur, coloris vi-
tia magis, ac magis ad nigrum declinando toti corpori impartit, vt libro
de atra bile scriptum est. Item quod manifeste quandoque videbitur vni-
uersum corpus herbis cadenti pallore infectis, similari, interdum plum-
beum, aut etiam magis fuscum referte colorem, interdum etiam alias quas-
dam ineffabiles colorum proprietates: quæ licet iocinore suo munere non
recte fungente, accidere soleant, tamen ob splenis quoque vitia huiusmodi
quæque

quoque colores eueniunt, verum multo nigriores quàm ab hepate, ex Gale. sententia. 5. de loc. affect. Indicat etiam lienem affectum esse dolor sub sinistro hypocondrio, (Aetio teste cap. 7. lib. 10.) aut distensio, aut grauitas, seu tumor, qui in eadem parte subiaceret, & dum conuertuntur, veluti aliquid ex illis locis conuellatur, imaginatio contingit (ut ipse refert.) Quod vero affectus hic similiter symptoma existat in genere affectus corporis, & in eorum numero, quæ visibilia dicuntur, ac totius corporis, lib. de differen & 3. de cau. symp. liquet. Eius autem indicia sunt, nam hoc vitio affectos consequitur tristitia præter rationem, & mordacitas eorum, quæ circa ventrem sunt, difficultasque spirandi: cibos auersantur, & nigra lotia excernunt: aliquando autem & per intervalla quædam corpora ipsorum repescunt: stercore vero calcanthi colorem referunt, & aluus resiccatur, vt liquet ex Aetio cap. 17. lib. 10. inter omnia vero signa, id præcipuum existit, Ater videlicet vniuersi corporis color: Verum non diuersa ratione ab ea, quam præceden. capitu. conscripsimus frustratio separationis huius excrementi a sanguine, aut ex eiusdem lienis imbecillitate facultate attractrice existente infirma, vel meatus per quem illud attrahit, obstructione, prouenire poterit. At vbi meatus obstructio adsit, grauitas, & distensio, vel etiam dolor lienem excercebit: Si vero nihil eorum euenerit, attrahendi potentia imbecillitas indicabitur: prout scriptum reliquit Paulus præcitato loco. Eius vero imbecillitatis causa cuncte intemperantiæ esse poterunt, cum simplices, tum compositæ: quæ quomodo dignoscendæ ac inter se distinguendæ sint, Aetius fulissime docuit præcitato cap. 7. lib. 10. Et inter reliqua signa, tanquam certum, & compendiosum intemperiei splenis est id, quod sumitur ab his, quæ eduntur, ac bibuntur, ac ex eis, quæ forinsecus cuticulæ iuxta sinistram hypochondrium accedunt, nunquid conferant vel lædant, calida, seu frigida fuerint, quæ eduntur, ac bibuntur, aut quæ foris admouentur. Nam frigida intemperies omnibus cibis, ac potibus, qui efficaciter refrigerare possunt, augebitur, ac manifeste magis splenem lædant, sic ab iis, quæ foris admouentur: Eandem vero intemperiem omnia calida iuuabunt: Sic quoque de calida splenis intemperie, ac reliquis sentiendum erit, vt liquet ab Aetio ibidem. Quod si forte fortuna ex lienis inflammatione, seu scirrho ater morbus regius fuerit excitatus, ex eorundem propriis signis iudicari poterit, de quibus in sequentibus pertractabimus Sed quoniam eiusdem excrementi vitio, non minus potest affectus hic gigni, quam morbus regius proprie dictus, Cum ipsum fuerit multum, nullo proprio affectu liene laborante, propterea hoc quoque dignoscere non erit inutile. Prompte autem id percipies quoniam nullum aderit ex prædictis signis lienem affectum indicantibus. præterea neque idem totius corporis color adeo nigricantior erit. Cæterum cum hæc excrementi multitudo a geminis causis oriri possit, quarum vna est ipsa iocinoris intemperies, & reliqua est ciborum vitium, id interstinguere poteris ex iis, quæ præcesserunt, Nunquid vsus præcesserit eorum ciborum, ac potuum, qui melancholicæ naturæ fuerint nec ne? Nam vbi talis præcesserit victus assumptis cibis, ac potibus, qui crassum & faculentum humorem procreare natura apti sunt, ex vitio victus rationis prouenire atrum morbum regiū iudicabis. Vbi vero talis non præcesserit victus ratio, aderuntque signa frigidi, ac sicci hepatis, a Galen. lib. art. medic. adnotata, ac reliqua, quæ ipsum affectum esse indicabunt, vitio hepatis, quod ad generandum huiusmodi excrementum sit aptum, prouenire putabis. Quandoque etiam utroque viscere laborante regius morbus euenire poterit, nigriore, quàm pro consuetudine veri morbi regiū subsequente colore, ita vt putaretur flaua bilis fuliginis esse permixta, vt Gale. inquit 6. de loc. affect. aderuntq; indicia alia iam

Quis affectus
præter naturam
sitisterus niger
signa eiusdem.
De dif. sympt.
Cap. 5.
3. de caus. symp.
Cap. ult.
Causæ.

Cap. 44

dicta

In prin.

Prognostica.

Curandi metho-
dus.Venæ sectio.
cap. 16.

Purgatio.

Cap. 10.

Cap. 5

dicta differenter affecti tum hepatis, tum lienis: Quod vero omnino grauius afficiatur ii, in quibus atræ bilis humor vna cum sanguine ad cutem est delatus, quam in quibus pallida, seu flaua bilis ab Aetio scriptum est ca. 17. libr. 10. Idem quoque ater morbus regius, si diu perseuerauerit, nec obsequatur medicamentis rite adhibitis, accedat, malum est, Nam consentiente iocinore, aqua inter succedet, vt liquet ex eodem Aetio. Vrina vero si suam serauerit naturalem dispositionem in atro morbo regio, salubre erit indicium; exigua nanque indicabit lienis affectionem, nec adhuc eidem iecur consentire. In vniuersum autem quantum ad eius curationem spectat, Si ex lienis intemperantiis ortum duxerit, eas tum per cibos, ac potus, tum per simplicissima pharmaca, ac fomentorum irrigationes, quæ intemperiei contraria sunt corrigere oportet, Aetio auctore. Et quoniam (vt inquit Paulus) lienis intemperies eandem cum iocinore curationem postulant, & si quis velit, particulatim earum curationem inueniet apud Aetium cap. 8. libr. 10. Propterea breuitati indulgentes, eandem particulariter conscribere recusauimus. Poterunt tamen studiosi caput de iocinoris imbecillitate consulere. Vnum tamen non prætermittam; quod vbi accidat per aliquam eiusdem lienis intemperiem, aut viarum obstructionem, seu etiam iocinoris intemperaturam; quod per vniuersum corpus vna cum sanguine multa copia nigræ bilis fuerit coaceruata: aliis consentientibus, secunda primo vena erit cubiti interna sinistri, liene affecto obstructione, vel intemperie: dextri autem, si iecur fuerit affectum, haud tamen multa copia sanguinis extrahenda erit, sed potius, si opus fuerit iterari debet. Nam, quod perpetuo per venæ sectionem ingentem conspexerit vtilitatem in lienis affectibus, à Galen. scriptum est libr. de curandi ratione per venæ sectionem: multum etenim (vt ipse inquit) iuuat afflictum lienem sanguinis ex sinistro brachio detractio: nec minus hepatis opem feret, si ex dextro cubito sanguis auferatur. Si vero non cum sanguine permixta nigra bilis redundauerit per vniuersum corpus, aut quidpiâ aliud venæ sectionem impedierit, eadem succi melancholici copia, seu multitudo ex quacunque causa fuerit orta, purgatione exhaurienda erit, eodem humore prius concocto, ac præparato. Nam in redundantia humoris melancholici sanguinem mittere præstat; aut certe omnino medicamento vti atram bilem expurgante, vt liquet eodem lib. de curandi ratione per venæ sectionem. Verum quibus præparari, ac purgari debeat, cap. de melancholia studiosi requirant. gratia autem exempli pro neotericis ex syr. succi fumaris, aut de pomis cum oxymelite, & aqua lupulorum, ac scolopendrii, concocto, ac parato humore eisdem sæpius assumptis, hoc purgans medicamentum præberi poterit, Recipe scolopendrii, lupul. & borrag. ana. 3. iiii. vna passæ decorticata 3. iiii. senæ, epithimi cuiuslibet 3. ii. s. myrobalanorum indarum 3. i. s. fiat decoctum in aqua fontis, & in eo per colum transfuso dissolue casia fistulæ vac. i. s. aut mellis roridi unc. ii. s. diacath. 3. vii. confectiois hamech, aut eclegmatis indi 3. ii. vel diasenæ 3. iiii. fiat potio: euacuato tandem vitioso redundante succo in toto, vel in parte, si propter obstructionem meatus, per quem lien ad se limosum sanguinem attrahit, excitatus fuerit ater morbus regius, eadem victus ratione extenuante, ac eisdem quoque medicamentis vtendum erit; quibus vti præcepimus pro curatione obstructionis iocinoris, validiora tamen inter ea eligenda, nanque lien sine molestia validiora medicamenta tolerat, vt liquet apud Gale. 2. de arte curat. ad Glauc. Cum eisdem tamen semper aliquid ex adstringentium genere admisceatur. Id autem ne dum in obstructione curanda, sed in cunctis aliis lienis affectibus seruandum erit. opus nanque est ipsius naturalem firmitatem custodire. quo conueniens ipsi alimentum attrahat, quoniam per hanc actionem vniuerso corpori ad humorum

morum bonitatem confert, (vt diximus ex Gal. auctoritate. 9. de com. medic. secundum locos) Ea autem potissimum, quæ extenuandi vim habent pharma-
 ca citra manifestam calfactionem eligantur. inter quæ magnopere, tanquam
 huic visceri commoda, sunt acetum & acetum mulsum; præsertim vbi idem
 viscus, ne dum obstructione laboret, sed induratum, fuerit, vt patet ex Gal. ibi
 dem. Verum cum eisdem exhiberi poterit decoctum corticum radicum cap-
 parorum, aut scolopendrii, vel radicis, seu germinum myricæ: Nam quale me-
 dicamentum iocinori est absynthium, tale est lienii capparidis cortex: & quale
 rursus iocinori eupatorium, tale est lienii scolopendrium (vt liquet. 13. mech.
 med.) Si quidem similia genere medicamenta ambo viscera postulant, Cap. 2.
 rum tanto valentiora lienis, quanto crassiori vtitur alimento, vt ipse Gale. re-
 fert: Ex quibus, cum liqueat qua methodo curari debeant lienis tum intempe-
 rantia, tum obstructions, non est cur seorsum de eis, iterum mentionem fa-
 ciamus. Vbi autem ater morbus regius ex lienis inflammatione, seu scirr-
 ho fuerit excitatus eadem inflammatione curata, seu scirr-
 ho, & ipse quoque cura-
 tionem recipiet: Nos vero in sequentibus eorundem affectuum curationem
 præcipient. Ex intemperie autem iocinoris ortus, præcedente prius venæ
 sectione, aut purgatione, vel vtrisque (vt diximus) in toto vel in maiori parte
 melancholici succi redundantis facta euacuatione, vbi eius copia adsit, per cō-
 traria eiusdem iocinoris intemperiem corrigere oportet, tam cibos, quam po-
 tus, quam etiam medicamenta, eo non neglecto, quod perpetuo ea, quæ astrin-
 gūt, permiscere oporteat: quibus autem particulatim eadem intemperies cor-
 rigenda sit, Cap. 7.
 cap. de imbecillitate iocinoris studiosi reperient: Nec minus, si vi-
 tio alimentorum, ac potuum vim habentium succum melancholicum gignen-
 di, ortus fuerit ater morbus regius, Contraria etiam victus ratio adhibenda
 erit, quam locupletissime conscripsimus cap. de melancholia. Ea igitur huc
 transferenda sunt pro optima victus ratione prædictis instituenda: Si vero
 vtrisque simul visceribus laborantibus regius morbus euenerit, stāte redundā-
 tia vtriusque bilis cū sanguine, vena secanda erit vtriusque cubiti interna; &
 pro ratione maioris redundantia alterius bilis, ac magnitudine affectus alte-
 rius visceris, maior, ex vno, quam altero cubito quantitas sanguinis ex hauria-
 tur: quanquam semper eadem venæ sectio moderata esse debeat. Victus ratio
 quoque communis esse debet, vtriq; visceribus conducens, Similiter & purga-
 tio, vbi adhuc facta venæ sectione vtrique succi per vniuersum corpus redun-
 dent. In quem vsu præparatis eisdem succis ex syr. ex succo fumarie, & cy-
 chorii, atq; oxymelite, & aqua borraginis, & lupulorum, & hortulanæ endiuie
 hoc medicamentum purgans præbeatur; Recipe florum borraginis, lupulorū
 fumarie ana 3. iiii. vna passe decorticata vnc. s. senæ, epithymi an. 3. ii. eup-
 torii, absynthii, scolopendrii, & radicum capparorum ana 3. i. s. fiat decoctum
 in aqua fontis, & in eo per colum transfuso dissolue cassiæ fistulæ vnc. i. s. aut
 mellis roridi vnc. ii. rhabarbari optimi cum spice præmacerati in parte prædi-
 cti decocti per diem, aut noctem, & deinde per colum transfusi 3. i. aut scrup.
 iiii. diacath. 3. vi. diasenæ, vel eclegmatis indi 3. ii. uel iii. misceantur, & fiat po-
 tus. Apurgatione utriq; misceri consulendum, magis autem, aut minus uni
 uel alteri, prout unus visceris affectus, uel alter magis urgebit, nunquam ta-
 men altero derelicto.

περὶ τῆς φλεγμονῆς τῆς σπληνός.

id est de inflammatione lienis. Cap. 88.

6. de loc. affect.
in prin.
13. meth. ca. 17.

Inflammati lie-
nis signa.
Pau. li. 3. c. 49
Alex. loco cita.

Cur lienis infla-
matio durior sit

Causa,

Prognostica,

Cap. 25

Curatio,

Ratio victus.

Ordo curatiōis.

Venæ sectio,

Quamuis rarius (vt Alex. inquit cap. 10 libro octauo) quam alia uisce-
ra lien inflammatione conflictetur, interim tamen & ipsum inflam-
mari contingit, vt liquet apud Galenum sexto de loc. affe. 13. meth.
med. & aliis plerisque locis. Cuius inflammationes facile ob duritiē,
tāgendoprehendūtur, vt ipse inquit, Insuper & ex iis quæ de iocinore dixi-
mus, facile etiam inueniuntur notæ quibus lienis affectus discernantur. Qua
propter cum nonnulla in præcedentibus, ne dū de iocinore, verum etiā & de
ipsa inflammatione dicta sunt, non opus est hic eadem repetere, sed ad traden-
da indicia inflammati lienis deueniam. Sunt autem ea dolor sinistri hypochon-
drii, ac etiam feruor, distensio, tumor, & multa grauitas vehementer vrgens,
Paulo, & Alex. testibus. qui tumor ob duritiem facile tangendo prehendi-
tur, vt diximus ex Gal. sententia, præsertim processu temporis, Nanque im-
primis dum scilicet humor adhuc fluit, lienis tumor apparet humidior (ut te-
statur Alex.) Nec mirum si lienis inflammationes durioresprehendantur,
Nam sanguis, qui ad eum pro nutrimento deuenit limosus, fœculētes, ac cras-
sus existit. Ex quo cum inflammationes fiant, necessum est eas duriores fieri:
Ex his itaque notis facile quispiam, tum partem ipsam affectam tum affectum
ipsum dignoscere poterit. Quis autem affectus sit inflammatio, sexcenties in
præcedentibus dictum est. Verum hic per inflammationem non proprie di-
ctam intelligere oportet. Nanque rarius ex sanguine optimo, ac mediocrem
crassitudinem habente ipsam in liene oriri contingit, sed sæpius (vt mox di-
ximus) ex sanguine crassiori excitatur. quo fit, vt neque laborandum sit in in-
uestigandi signis pro dignotione causæ eiusdem inflammationis, cum semper
fere ex iam dicto sanguine fœculento, limoso, ac crasso generationem habeat;
facileque possit dignosci (vbi forte fortuna a sanguine optimo vel bilioso exi-
stente) ipsa inflammatio fuerit excitata, præsertim ex iis, quæ præcesserunt
temperamento, ætate, habitu, anni, tempore, victus ratione, ac reliquis. Cogno-
scis autem (ut inquit Aetius ca. decimo libro decimo) irruentis humoris ma-
gnitudinem ex magnitudine, & velocitate generationis ipsius inflammationis.
Inflammato autem liene si ex sinistra nare sanguis erumpat, magnam fert uti-
litatem. Nam quibuscunque *αἰτὶς* eruptio sanguis accidit, summum id
commodum laborantibus affert: quemadmodum Hippocr. memoriæ pro-
dedit: quibus vero contra euenit, nihil iuuat, aut etiam interdum nocet, quod
uires scilicet citra morbi leuamen deiciat, atque exoluat, vt libro de curand.
rat. per venæ sectionem a Galeno scriptum est. Insuper quamuis rarius,
quam cetera viscera lien inflammatione tentetur, tamen si in eo exciteretur,
magna cum diligentia curanda erit, alias nedum praua consequentur sym-
ptomata, Verum etiam temporis processu perniciem causabit, potissimum si
eadem in scirrhum vertatur. Pro eius itaque curatione ratio victus similis
institueda erit ei, quam in ceteris visceris inflammationibus præcepimus,
solo prorsus cremore ægrum nutriendes, potissimum circa initia illius vero
penuria aqua, & solo pane, atque interim vinum tenue, albumque exhibea-
tur, Alexandro teste, præsertim vbi inflammatio diutius proteletur, quo tē-
pore etiam auicularum carnes montanarum, pullorumq; , ac gallinarum con-
cedendę sunt. Quo vero ad reliqua attinet, primum sanguis detrahendus est
deinde purgationes adhiberi, postea medicamenta extrinsecus imponi de-
bent, vt liquet ex eodem Alex. Nam si venæ sectio omnibus visceribus inflam-
matis

matis præsentissimum est remedium, maxime certe in lienis inflammatione
 adhibenda est si nihil contra suadeat, nempe ætas, aut vires, aut locus, aut
 consuetudo, aut aeris constitutio, aut præcedens ciborum cruditas, aut magnū
 ventris profluuium, vt ipse inquit. Secunda autem vena est sinistri cubiti vt
 liquet. 13. meth. med. Multum nanque iuuat afflictum lienem sanguinis ex si-
 nistro brachio detractio, vt liquet eodem lib. de curat. ratione per venæ sectio-
 nem, & nos præcedenti cap. adnotauimus, atque eodem interna; quod si ea
 non appareat, media ferienda est, si ne ipsa quidem in conspectum proueniat,
 humeraria incidenda erit, Quod si nec ipsa quoque conspiciatur ea, quæ mini-
 mo digito vicina est, aperiri debet ex decreto eiusdem Tralliani. Quod
 vero huius venæ in extrema manu existentis, sectio conferat pro lienis in-
 flammatione confirmauit, Paulus præcitato loco. Id quod fortè innue-
 re voluit Gale. eodem lib. de cur. ratione per uenæ sectionem. Quanquam qui-
 dam negatiuè literam legant. præstat autem non semel quantum conueniat
 extraxisse, sed in duos dies id partiri satius est, ut idem Gale. refert. Sic nan-
 que extrahendus sanguis est, ne vitalis facultas deficiat (vt Alex. asserit) post
 sanguinis missionem ea dari oportet: quæ aluum solēt ducere. Sunt tamē inter
 ea medicamenta, quæ alui ducendæ idonea sunt, lenia eligenda; ex eiusdem
 Alex. testimonio, præsertim per initia. Lien etenim per initia purgari potest,
 tamen processu temporis validiores purgationes exhiberi possunt, vt ipse re-
 fert. Hac nanque via duntaxat lienis superflua vacuari debent. Nam ea, quæ
 per renes agitur nulla huic visceri vacuanda via patet: proinde vbi phlegmo-
 ne præmitur, deiectionis id medicamentis, tum detergemus, tum laceessimus,
 quo dimittat, deponatque superuacua, atque id potissimum medicamentum
 deiectionum superne exhibendum erit, à situ, societateque sumpta indicatio-
 ne, quemadmodum à Gale. eodem 13. meth. medend. decretum est, quamuis
 venter etiam per clysterem assidui elui debeat, & maxime si venæ incidendæ
 medela relinquatur, ex Aetii sententia, & præcipuè in morbi initio, vel in-
 cremento, vt inquit Alex. Verum priusquam purgans medicamentum exhi-
 beat, parari humor debet ex oxymelice, serapio è succo fumaricæ seu bor-
 raginis cum aquis melissæ, & lupulorum. deinde hunc in modum purgetur
 æger. Primo recipe florum fumaricæ lupulorum, borraginis, violarum, & hor-
 dei, singul. 3. iiii. senæ, epithymi, singul. 3. ij. vix passæ decorticatæ unc. s. fiat de-
 coctum in aqua fontis, in quo per colum transfuso dissolue melis roridi unc.
 iiii. s. aut casicæ fistulæ vnc. i. s. & diacath. 3. vi. vel. vij. & fiat potio. At vbi neque
 huic purgationi cesserit inflammatio procedente tempore, si opus fuerit, va-
 lidius exhibebis purgans medicamentum, quantitatem senæ, & epithymi in
 decocto adaugens, adiiciensque polypodium; ac cnicum, & in vicem diacath.
 eclegmatis indi 3. iiii. aut diasenæ tantundem apponens. A purgatione medi-
 camēta extrinsecus imponi debent, quæ citra euidentem calorem extenuent
 admixtis quidam etiam astringentibus, iuxta Pauli doctrinam. Nam ea mix-
 tæ facultatis esse debent, nedum in generatione phlegmones, sed etiam cum
 nec affluat amplius quicquam; quanquam si quis in principio repellētibus tā-
 tum vtatur, non peccet, Gal. auctore 13. meth. medend. Communis tamen in-
 dicatio (vt ipse inquit) omnibus his partibus, quarum munus eiusmodi est, ut
 toti corpori sint ex usu, vt medicamenta exigant, quæ mixtæ facultatis sint.
 Ea propterea nec lienem tantum relaxantibus curare oportet, cum hic quo-
 que ex iocinore quicquid limosi, & melancholici, est expurget. Propterea
 scilicet, quod ex eo humore nutritur, quinimo semper eius robori consulen-
 dum ex relaxantibus, quæ astringunt medicamenta adiacendo, eodem Gal.
 & Alex. testibus. Sint autem astringentia medicamenta robusta, vbi fluoris
 impetus fortis contingat; moderata vero vbi mediocris. Qua propter si mo-

13. meth. c. 11
 in fine.
 Lib. de cur. rat.
 per uenæ sectio.
 Cap. 16

Cap. 16.

Loco citato.

Purgatio.

Cap. 17.

Topica medica-
 menta qualia es-
 se debeant.

Cap. 16

Gal. 13. metho-
 cap. 17
 Alex. li. 8. c. 107

derata fuerit inflammatio splenis: ex vino veteri, ac austero, tenuiumque partium, oleo dulci permixto focus adhiberi debent, lana succida excepto medicamento, (vt inquit Aetius) vel linteis, & vbi maior sit caliditas, oleum sit rosaceum, aut omphacinum. In cuius penuria eiusdem oliuæ folia, aut rubi, aut mali arboris, atque etiam ipsa mala in oleo decoquantur: & quædam tenuium partium addantur, velut est absynthium, & pulegium, item lentiscinum, & melinum oleum prædicto vino admixtum super linire confert, aut cum prædictis linteis lineis sepius sinistrum hypocondrium fouere, vel ex olei anethini, vel chamemelini vnc. i. & rosacei, seu cytoniorum, & mirtini, sing. vnc. i. s. paucio vino, ac cera vnguentum parabis. Verum vbi fortiori impetu fluxus feratur, acetum pro vino effundendum est: Similiter si nimis calor infestet (vt liquet ex Aetio, & Alex.) post fomenta autem cataplasmata imponi debent. quorum primum ex Aetio ex ordeacea, & loliacea farina cum posca, & mellis ac olei omnino paucissima mensura, in quibus absynthium, ac pulegium sint decocta, formari potest. Vel hunc in modum ipsum componas, farinæ fœnugræci, seminis lini, hac ordeaceæ excipe, cuiuslibet unc. i. s. caricarum aceto quam accerrimo maceratarum unc. i. adipis anseris, & butyri recentis singul. 3. iiii. olei anethini, chamemelini. & rosacei, singul. unc. i. omnibus prius tuis, ac simul commixtis cum paucio oxymelite, fiat cataplasma. Vei-mur etiam aliquando, ex eiusdem Aetii sententia, ob cataplasmatum penuriam ad splenem inflammatum furfuribus in vino, aut posca, & oleo decoctis: quibus etiam absynthium, & pulegium, aut thymum, aut origanum, aut lauri folia, aut arthemisiā, & reliqua incidēdi, ac attenuādi ui prædicta, adiciamus non feruente videlicet inflammatione, & corpore præuacuato. Nam si quispiam corpore nō euacuato calidioribus vtatur medicamentis, ipse sibi scirrhi auctor fiet, eodē Aetio teste. Paulus vero stercus caprillum cum cruda polenta coctum ex posca illicitum commendat. Tu quoque ex prædictis diuersa etiam medicamēta parare poteris, pro vt usus exposulabit, methodū semper seruas, vt relaxantibus ac digerentibus medicamētis quædā ex astringētibus permisceas.

περί σκίρρῃς ᾤληνός.

id est de scirrho lienis

Cap. 89.

Cap. 16

Qui proprie
splenis appu-
lantur.

Cap. 2.
In principio.

Pauli. li. 3. c. 49.
Scirrhus si lienis
signa,

Rarius quàm alia viscera lienem inflammatione confictari præcedenti cap. ex Alex. testimonio notauimus oportunissimum autem eum esse ad scirrhum, veluti & iecur (quanquam ipse propterea quod rationis sit substantiæ, crebrius, quàm iecur scirrholis vitiis affligatur propter nutrimenti, quo vitur, speciem) à Gal. decretum est lib. 13. methodi medendi. Nutritur etenim crasso sanguine, vt monstratum est; qui veluti limus purioris existit. Propterea de hoc affectu pertractare intendimus. Consueuerunt autem eos, qui induratum splenis affectionem habent proprie medici spleni eos appellare vt nono de compositione medicamentorum secundum locos à Gale. scriptum est. Summatim uero de eo verba faciemus cum fufissimè verba, fecerimus cap. de iocinosis scirrho, & ex iis, quæ de iocinore diximus facile inueniantur notæ, (vt. 6. de locis affect. scriptum est.) quibus lienis affectus discernantur, & splen ipse multa etiam habet accidentia cum hepate communia. Ea de re ad tradenda eius indicia accedamus; Sunt autem tumor cum duritie sub sinistro hypocondrio; os foetet; gingiuarum exeduntur, vlcera in cruribus cicatricem non recipiunt, vt testatur Paulus. Celsus vero ait cap. nono lib. quarto quod lien vbi affectus est, intumescit, simulque cum eo pars sinistra eaque dura est, & prementi renititur; venter intentus est, aliquis etiam cruribus

eruribus est tumor, vlcera, aut omnino non sanescunt, aut certe cicatricem vix recipiunt. In intensa ambulatione, cursuque dolor, & quædam difficultas est: Idem fere confirmavit Aetius cap. 11. lib. 10. cum dixit, immedicabilis enim vlcera hoc modo affecti habebunt, & maxime circa crura; addidit tamen, & colorem corporis vitiatum ad nigredinem vergentem; nec putandum est ab aliis causis oriri posse lienis scirrhum, quam ex eis, à quibus hepatis scirrhus generatur. Communes quoque habet cum eo, & generationis geminos modos: Nanque vel à principio paulatim congregatur, & augetur, ac in magnum tumorem attollitur, vel medicorum imperitia paratur. id quod crebrius accidere consuevit, vbi vehementer inflammationes, & erysipelata astringunt, & refrigerant. Sed quoniam ex flatuoso quoque spiritu indurati quodammodo quandoque splen videtur, atque renitens esse: propterea à vero scirrho id interstingues. Nanque si flatus causa fuerit, tactui tumor non pertinaciter resisteret, immo imposita manu ad tactum cedit, & lien punctionem tensionemque experietur, citra tamen pondus duritiem: ac grauitatem. Verum vbi cum renitentia, tumore, ac diuturne grauitas cum pondere in sinistro hypochondrio percipiatur, ex humore lento, & crasso lieni indurato infixio, tumorem durum ortum esse iudicabis: quem proprie scirrhum, seu scirrhosum tumorem appellamus. Et hoc quod consentiente iocinore, potissimum, vbi diutius fuerit, aqua intercutem generari possit liquet apud Galen. 5. & 6. de loc. affect. At quod fuerit exquisitus, omnino incurabilis sit, ab eodem Gal. scriptum est 2. de arte curat. ad Glauc. Reliqua scirrhi prognostica cap. de scirrho iocinoris requiras. Quantum vero ad eius curationem attinet, pro victus ratione laborantibus ipsis conuenientia nutrimenta sunt genere quidem eadem, quæ scirrho iocinoris laborantibus competunt, maioris, minorisque duntaxat ratione differentia, vt idem Galen. testis est. 13. metho. med. Itaque & si capparum ex oxymelite edatur, vtilis sane est vtrique visceri. Cæterum nec ipsa pari modo, nec similiter mixtum habeat oxymel, Nam & ipsa copiosior, & ex minus dilutio oxymelite lieni erit vtilior, atque hæc differentia est, quæ ex maioris, minorisque ratione accepta est, vt ipse inquit. Cauenda tamen sunt dulcia omnia; Nam ex his tum iecur, tum lien maxime intumescere consuevit. Similiter glutinosi cibi vitandi, atque ij exhibendi sunt, qui concoctu sint faciles, & bonum, ac tenuem succum generent, simulque cum ijs offerantur, quæ extenuant obstructions eximunt, ac deterunt; acida vero maxime conueniunt. Celso auctore. Vino autem vtantur non valde veteri quod aque permisceatur; in qua ferrum sæpe ignitum sit extinctum, vt refert Aetius. Et quoniam hoc vitium quies auget: propterea exercitatione, & labore opus est: habita tamen ratione, ne febre mixta, si nimium processerit, excitetur. Vnctiones, frictionesque, & sudores necessarii sunt, eodem Celso auctore. Plurimum nanque fiducia in exercitiis ponendum: quibus ante cibum vti conuenit corpore superfluitatibus non abundante: ex eorum autem genere ex superabundanti faciunt deambulationes, & cursus: & noui sane aliquos, qui ex his solis ab omni affectione sint liberati, vt idem Aetius testatur cap. 13. lib. 10. Reliquam victus rationem particularim studiosi cap. de scirrho iocinoris requirant. Cæterum vbi laborantes prædicti multo sanguine abundant, internam in sinistro cubito venam secare commodum est, vt liquet ex Aetio: Neque tamen multa sanguinis copia auferenda erit. A venæ sectione, si multus redundarit crassus, seu lentus succus: eo prius præparato ex aceto mulso, ac syr. e succo fumarie, seu acetoso simplici, & melle rosaceo, Nanque acetum & acetum mulsum huic visceri comoda sunt, vt pote secare, & attenuare crassos humores potentia citra calefactionem, vt inquit Galen. 9. de comp. medic. secundum locos.

Causæ.

Si ex flatuoso
spiritu lien induratur signa,Prognostica.
5. de loc. affect. 7
6. de loc. affect. in
prin.
2. ad glau. c. 4
Curatio.Cap. 17
Ratio victus,Venæ sectio.
Li. 10. cap. 11.

Cap. 2

Purgatio.

cap. 5

Qualia præben-
da medicamen-
ta sint post pur-
gationem.
Cap. 2

Loco citato.

Lib. 10. c. 11

Loco citato.

Citato loco

Purgans medicamentum exhibendum erit, pro ratione redundantis succi. Nam pituita redundante, quæ eandem expurgant medicamenta, exhibean-
tur: Si vero melancholicus succus: quæ ipsum expurgant, præbeto, deinde
potiones quasdam, ac topica medicamenta, quæ induratum splenem curare
valent, adhibeas. Sint autem & potiones ipsæ fortissimæ: Similiter & quæ
de foris medicamenta applicantur: Nam eas sine molestia splen tolerat, vt 2.
de arte curat. ad Glauc. a Gal. decretum est. E quorum numero primas partes
sibi vendicant cortices radicum capparis, & scolopendrium, & myrticæ radix,
atque germina: omnibus huiuscemodi in aceto, vel oxymelite coctis, vt ipse
inquit. Attenuantibus itaque opus habet induratus lien pharmaci citra ma-
nifestam caliditatem, cuius gratia valde amara medicamenta ipsi offerimus,
ac quædam ipsis ex austeris miscemus, vt eodem 9. de compositione medi-
camentorum secundum locos scriptum est. Potui denique ieiuno dari debet
absinthium incoctum, at post cibum aqua a ferrario fabro, in qua candens
ferrum subinde extinctum sit: Hæc enim vel præcipue lienem coercet: quod
animaduersum est in his animalibus, quæ apud hos fabros educata exiguos
lienes habent, vt liquet ex Celso. Hæc aqua, in qua ignitum ferre sæpe sit
extinctum, febricitantibus sola; non febrientibus vero cum vino, auctoritate
Archigenis, a Gal. 9. de comp. medic. secundum locos commendatur. Con-
uenientissimum etenim spleni in scirrhum indurato remedium existit, fer-
rum, aqua, aut vino, aut posca extinctum. Ea ipsa enim aqua, aut vinum aut
posca in principio exhibita iucunda, & vtilissima existit, & per plures ex or-
dine dies datur, Aetio teste. Datur autem per se aqua cyathis tribus: febrī
vero carentibus, cum vini, vel aceti cyatho vno, vt inquit Paulus. Cæterum
eis, qui corpora natura habent calidiora, præsertim scirrhus non inueterato,
citra molestiam myricæ folia dantur, virgultaque, & radix, scolopendrium
item, & rumicis syluestris, maxime vero acuti semen, foliaque, & radix: pro-
be etiam facit anchusa, si radicis eius 3. i. detur. Item polytricon, & capni
decoctum ad tertias redactum, folia salicis, & cortex, item & radix limonij,
quod & cynoglossum vocatur, hisce vtendum esse præcipit Aetius in prædi-
ctis naturis, & in principio affectionis, Nanque a mitioribus auspicari oportet,
vt ipse inquit. Verum in inueteratis scirrhis, & corporibus agrestioribus,
atque eis, qui omnem corporis habitum habent frigidiores, exhiberi pos-
sunt triflago. gentianæ radix, calamintha, pulegium, cyclamini radix, scor-
dium, trifolij bitumen olentis semen, hyperici coma, acori, asari, & eryngij
radix, vicicis semen torrefactum, centaury minoris succus, etiam si sit exic-
catus, chamæpithys, polium, ac anagallidis, quæ cæruleum habet florem, suc-
cus. Item dracunculi radix, tum viridis, tum sicca: Omnia vero iam dicta me-
dicamenta simplicia in principio cum posca diluta coquantur; postea vero
meraciores, progressu autem temporis etiam ipsa contusa, & cribrata cum
aceto, aut aceto mulso exhibentur. Certam autem vniscuiusque horum
mensuram definire difficile, & periculosum est, Cum diuersæ eorum, qui ea
accipiunt, sint nature. Quare in principio parum quid ex vnoquoque exhi-
bendum, & pro ratione deinde exhibitionis mensura augenda, iuxta ipsius
pharmaci, atque etiam ægri vires, ex eiusdem Aetii sententia. Licebit item,
ne dum singulis prædictis simplicibus pharmacis per se uti; verum & duo
item, vel tria, aut quatuor permixta equaliter, vel inæqualiter præbere. Præ-
ter iam dicta medicamenta, serpillum cum aceto, aut panacis radicem viri-
dem cum aqua mulsa, vel semen, aut corticis radicis periclymeni, & feminis
eius quantum tribus digitis apprehendi potest, in vino albo meraco calido
ieiunis bibendum ad dies quadraginta exhibitum: aut vulpis hepar siccum
cum aceto mulso similiter bibendum exhibitum commendauit Galen. 9. de
comp.

comp. medic. secundum locos ex Archigenis auctoritate. In adhibendis autem topicis medicamentis eadem seruanda methodus erit, quam seruari præcepimus cap. de scirrho iocinoris: semper etenim emollientem, & discussoriam medicamentorum facultatem præcellere oportet. quibus parum quiddam eorum, quæ astringendi vim habent, admiscendum est Gal. auctore. 2. aceti in lienis scirrho, etiam à principio, cum naturaliter rarus sit, nec est quod metuas, ne quis nervus eius vi lædatur quemadmodum in tendonibus ac nervosi musculi partibus, vt liquet. 14. meth. med. In hunc vsum capparidis cortex ex aceto contritus, illiusq; item & salicis cortex consimiliter illicitus: nec non & centaurii succus, ac cinis fabrorum cum cruda polenta ex oxyme lite illicitus, aut etiam lupinorum farina magnopere conferunt, ex Pauli auctoritate; nec minus & ammoniacum (vt ipse inquit) cum aceto applicatum lienis sæpe profuit. Possunt item & foris hoc modo parari; Recipe centaurii minoris, & scolopendrii ana manip. i. corticum radicum capparorum vnc. s. radicum, & foliorum althææ ana manip. s. bulliant in aceti, & olei partibus æqualibus, & cum spongiis fiant foris; quibus sæpius admotis, infra scriptum adhibeto vnguentum; Recipe olei amygdalarum amararum, liliacei, irini, & de capparibus, sing. vnc. i. succi scolopendrii, & centaurii minoris, cuiuslibet 3. iiii. corticum radicum capparorum, & myricæ, cuiuslibet 3. ii. adipis anserini, seu gallinæ 3. iiii. medullæ ceruinæ, seu vitulinæ 3. ii. s. ammoniaci in aceto dissoluti vnc. s. aceti, & ceræ quantum satis sit, fiat vnguentum processu tamen temporis in vicem vitulinæ medullæ seuum tum hircinum, tum taurinum, ac etiam caprillum adiaci poterit, augerique quantitas ammoniaci, ac adiciendum bdellium, & galbanum: quæ prius in aceto dissoluantur; Similiter, & styrax, seu opopanax, cyclamini, ac cynoglossi succus, lentus cremor seu farina seminis lini; fœnugræci. ac althææ: ex quibus poterunt varia medicamenta componi, & prout affectus exigit, tum addere, adimere ea, quæ emolliunt, attenuant, discutunt, & robor addunt. Terum capparidis cortex (vt inquit Aetius) admixtus ultra hoc, quod diffecat, & repurgat, etiam splenem corroborat, multisque modis huic rei capparidis aptus est. Nam & ipsum cum cibo assumere, & muriam eius cum aceto sorbere commodum est: quinetiam extrinsecus radicem contritam, vel corticem eius cum furfuribus, aut ipsum cappari cum melle cortitum imponere expedit, vt Celsus inquit. Quemadmodum etiam ammoniacum cum aceto ad luti crassitudinem redactum non pauci lienis quidam imponentes, eius scirrhum curarunt; idq; solum si curando sæpe satis fuit, vt liquet ex Gal. eodem. 13. meth. meden.

Topica qualia esse debeant.

2. ad glau. c. 5

Ca. 5. post prin.

cap. 5. post med.

περί καχεξίας.

id est de malo corporis habitu. Cap. 90.

Cum vniuersus corporis habitus in aquositate diffunditur, affectus quidam oritur, qui à græcis καχεξία à latinis malus corporis habitus nuncupatur: principium si quidem existens hydropicarum passionum, vt inquit Paulus cap. 47. lib. 3. In qua affectione (Aetio teste ca. 19. lib. 10.) vniuersa corporis miscella laxior fit, ac emollescit: Ex cuius verbis liquet, quod non vna duntaxat pars, sed totius corporis habitus oblatus sit in hac affectione. Per totius autem corporis habitum nunc intelligentes partes maxime, quæ primæ oculis subiiciuntur; sunt autem eæ, muscoli, qui omnia ossa ambiunt, Gal. teste lib. artis medic. cutem quoque ab eis non secludentes, Nanque & ipsa quoque coafficitur. vt liquet, Nec non & partes internæ

Quod totius corporis habitus afficiatur.

Cap. 50

Ec 4 quæ

Signa huius affectionis.

cap. 9
Dubium est, quis affectus præter naturam sit,

Cōcluditur quis affectus præter naturam sit,

Ca. 6. post med. colligitur,

Causa generationis huius affectus,

Lib. 10. cap. 19

quæ oculis non subiiciuntur: Vniuersum etenim corpus in hac affectione cum virore albicans redditur, ac inualidum: ita vt crura inter eundem vacillent vt refert Aetius, & in principio quidem concoctiones impediuntur manente etiamdum appetitu, postea vero & fastidium accedit. & respiratio ipsis fit rara, ac debilis: quæ motibus, & actionibus condensatur: alius etiam inæqualia recrementa excernit (vt ipse refert); At in quo genere affectuum præter naturam reponatur, adhuc nec in Gal. doctrina, nec in aliorum græcorum, quos legerim, reperi, nisi quod lib. primo meth. meden. aduersus Olympicum, qui non rite pathos, ac symptoma finiuerat, pathos etiam cum morbo confundens: Vbi concluderat aduersus eum, non omnem mutationem ab eo, quod secundum naturam se habet (etiam si permanentia illi adsit) ad id, quod præter naturam est, morbum esse inquit coloris vitium, atque atrophiam in sympto. & nequaquam morbum numero connumerari; quemadmodum etiam κακοχυμία, & καχεξία: quamuis præter naturam sint, & permanentia ipsis accedat, adhuc inter morbos non numerabuntur, nisi illud adiciatur, quod ab eisdem aliqua actio lædatur. Videtur itaque in his verbis Gal. uelle καχεξίαν inter symptomata numerari, quamuis & præter naturam sit, & permanentia ei accedat, quoad ab ea non dum actio aliqua lædatur. Nam quoad illæ sæseruantur omnes actiones, etiam si millies corpus fuerit alteratum, mutatumq;: nullus tamen eorum affectuum adhuc morbus est, vt ipse Gal. inquit Quod enim curationem desiderat, aliud planè non est, quam affectus qui vitiat actionem. Verum vbi καχεξία, seu malus corporis habitus, ne dum permanentiam habeat, sed actiones vitiat, Negandum non erit morbum esse (vt ex eiusdem Gal. verbis patere potest, ac etiam liquido constat ex Aetio, qui vult, ne dum naturales actiones, sed etiam animales, motrices videlicet, oblati ab hoc affectu.) Concludamus itaque, aut malum corporis habitum sympt. esse in genere affectuum corporis, & proprie visibillum, frustram totius corporis cōctionem, seu nutritionem insequens propter frigidam ac humidam vniuersi habitus intemperaturam, Vel eundem morbum esse, si sumatur pro hac eadem intemperantia frigida, & humida totius corporis, quoniam ab ea, & propter eam iam dictæ actiones oblatæ sunt, & totius corporis color vitiat existit cum virore albicans, vt ex sententia Aetii dictum est, idq; non ab re. Nam licet quæ in corpore animalis sunt, omnia gubernentur calido frigido, humido, & sicco quemadmodum lib. 2. de natur. facul. à Gal. omnium philosophorum optimum auctoritate decretum est, tamen calidum in iis, (vt ipse refert) tum ad alia actiones, tum vero præcipue ad succorum generationem plurimum valet; Vel si mauis, dicas hoc vitium totius habitus considerari, vel respectu coloris ipsius, & sic erit sympt. affectus corporis; Vel respectu essentiae eiusdem, quæ in eius temperamento cōsistit, & tunc erit morbus, quoniam hoc vitium temperamenti, erit intemperies frigida, & humida quam necessario sequitur vitiosus color, seu decoloratio totius. Verum hæc eadem totius corporis habitus immodica refrigeratio, ac mollities ex nulla alia re, quam ex sanguificationis defectu provenire poterit, quæ vbi immodice amplius augeatur, generandi hydropis causa erit, vt dicemus, Et propterea Paulus principium aquæ intercutem appellauit hanc affectionem, & Arabum princeps dispositionem antecedentem hydropisim: quo fit, vt neque generari idem malus corporis habitus possit, nisi & iecur ipsum siue primario, siue per consensum fuerit affectum, ac imbecillum redditum propter frigidam eius intemperaturam, ob quam sanguinem optimum generare nequit, ac pro nutrimento vniuerso corpori eum supeditare, sed ipsum frigidiores, serosiores, & (vt ita dixerim) magis pituitosum generat, ac distribuit. Et propterea (vt inquit Aetius) vt plurimum hæc

hæc affectio ex longo morbo cōgregatur, aut ex viscere quopiam in scirrhuū indurato consequitur, maxime hepate, & splene, neque raro in dysenteria diurna, & affectionibus cæliacis contingit; item ob consuetam aliquam cohibitam excretionem. Sæpenumero ex immodica sanguinis profusione, in viris præsertim per hæmorrhoides, aut in mulieribus per menstruas purgationes; quemadmodum & aqua intercus generari consuevit; & (vt in vniuersum dicam) quęcunque causæ iecur ipsam, ac vniuersum habitum infrigidare valent, siue internæ, siue externæ fuerint, huiusmodi affectionem generare poterunt: quas dignoscere haud difficile erit, tum ex te ipso, tum etiam ex laborantium, seu altantium loquela. Capiantur autem hac affectione maxime senes (vt inquit Aetius) qui etiam maxime liberantur, immo & pueri, qui facile perunt propter vitalis firmatis debilitatem, & quod ob cutis raritatem succi in eis facile transpirant. At qui in vigore sunt, raro incidunt, & facile se inde extricant. Non negligenda autem erit huius affectus curatio. Nam si diutius protelabitur, in aquam intercutem transit, eodem Aetio auctore, Quod vero ad eius curationem attinet, Aer eligendus est ad calidum, & siccum vergens: somnus moderatus sit, nocturnus longus autem, atque diurnus omnino vitetur: moderatis deambulationibus, gestationibus, vociferationibus, & frictionibus siccis per lintheola ex lino crudo vtendum. Post quæ, & exercitamenta moderata conducunt (eodem Aetio teste.) Alius humecta sit natura, vel arte cum clysteribus, ac glandibus. Cibi eis offerantur simplices, & qui facile conqui possint, optimumque sanguinem gignere: vitanda sunt omnia bellaria, item nidrosa, graueolentia, humoris crassi, viscosa, & quę difficulter concoquuntur. Vinum autem conuenit eis album, tenue, & odoratum, vt liquet ex eodem Aetio. At aquę potus omnino vitandus erit, & in vniuersum victus sit tenuis, & siccus, vt inquit Paulus. Verum diætā vniuersā viribus reparandis sit apta: per quam (vt refert Aetius) spes est, eos, qui huic malo sunt impliciti, ad restitutionem in integrum p̄uenturos. Verum si ex consuetæ excretionis cohibitione affectio contingat, prouocare, ac irritare eam ipsam excretionem oportet, ut liquet ex eodem Aetio: aut uenam incidere in cubito, si nihil sit, quod id fieri prohibeat, paulatim, ac partitis uicibus per triduum sanguinem detrahendo, eodem Aetio, ac Paulo testibus. At si venę incisio impeditur, aut uitiosorum humorum copia laborant ægrotautes, ipsos purgare oportet (relicta venę sectione, quę eisdem noxia est) non semel duntaxat, sed sæpius, ac paulatim, ubi usus postulabit. Purgans autem medicamentum ex hiera, rhabarbaro, agarico, ac myrobalanis parari poterit. Particulatim autem conferentia medicamenta purgantia sequenti capit. de aqua intercutem conscripta studiosi reperient: post quę mirifice quoque iuuat ipsos absynthii potio assidua; aut syr. eius ac aquarum naturalium usus; primū aluminosorum, nitrosorumq; mox sulphureosorum, ut inquit Paulus. Hæc nanque aquę naturales calidæ robori, ac uiribus reparandis conducunt ex Aetij sententiam. Conferunt item eis theriacæ, ac mitridati antidotus: similiter diacurcuma, seu dialacca, si 3. j. separatim eorum cuiuslibet cum uino albo tenui, ac odorato tribuitur, seu cum absynthii cremore: nec minus, & eisdem utendum erit antidotis theriaca uidelicet, & mitridato, si ex immodico sanguinis profluvio excitatus fuerit malus corporis habitus, præcipue tamen eis confert vniuersa victus ratio, quę uiribus reparandis sit apta: Perpetuo autem ex quacunque causa ortum duxerit, hepati succurrendum erit, ipsumque roborare oportet, cum sanguificationis instrumentum sit, ac sanguinis officina, ut in præcedentibus dictum est. Vberius autem sequenti capi. de aqua intercutem idonea medicamenta pro curatione mali habitus reperies, propterea huic cap. finem imponimus. Vbi autem ex scirrhu, aut alio quopiam

Prognostica.

Curatio.

Ratio uictus.

Paul. li. 3. c. 47
Venę sectio.

Purgatio.

Quæ a purgatione conferant.

piam proprio affectu iocinoris, aut splenis, seu alterius cuiusquam visceris, malus corporis habitus fuerit ortus, Pro ratione affectus, medelam iplis adhibere conuenit (prout in præcedentibus docuimus) per auxilia ad singulos ipsorum supra conscripta,

καὶ ὕδρωπις, ὕδρωπις καὶ ὕδρωπις.

Id est de aqua intercutem, seu hydropico morbo

Cap. 91.

Non quemadmodum Erasistrato visum est propterea viarum angustia impedita sanguinis distributione per iecur ad vniuersas corporis partes, tantum eo, qui magis tenuis, atque aquosus est transumpto, ita ut is duntaxat per vniuersum corpus vehatur: syncerus autem sanguis in visceris substantia permaneat, sed sanguificandi facultate vitiata, ex Galen. sententia non raro is gignitur affectus, quem græci quandoque ὕδρωπις, interim ὕδρωπις, sæpius vero ὕδρωπις nuncupant: latini autem aquam intercutem, seu hydropicum morbum ut liquet apud Celsum cap. 21. lib. 3. a symptomate nomen sumens, siquidem aquosus humor hanc passionem necessario comitatur (Cœlio Aureliano teste cap. 8. lib. 3. ac Plinio secundo lib. 3. cap. 12.) Cuius differentia a quibusdam due duntaxat connumerantur, quidam autem quatuor esse hydropum differentias affirmant, ut 4. de rat. victus scriptum est, Veruntamen, nedum Gal. præcitato loco prædictorum opiniones tanquam erroneas condemnauit, sed tres hydropum statuit esse differentias, id quod etiam confirmauit lib. 5. de loc. affect. & 4. de caus. pulsuum. Eundem autem sectati sunt Aetius cap. 20. lib. 10. Paulus cap. 48. lib. 3. Alex. cap. 1. lib. 9. & Celsus præcitato loco. Nos vero cum de earundem causis pertrahimus, quod neque plures, neque pauciores esse poterunt, demonstrabimus. Quarum una τυμπανίτης, altera ἀσκήτης, & ἀσκήτης, ἢ ὑποσκήτης, ἢ κατασκήτης, ἢ λευκαφλεγματίας, ἢ σαρκίτης, ἢ ἐπισαρκιδίον, ἢ ὑποσάρκιδιον appellatur. Tympanites quidem à tympano sic appellata, quoniam in tali affectione imus venter percussus talem sonum edic, qualem tympanum. Galen. teste com. aphor. 11. 4. Hippo. ξηρον ὕδρωπις nuncupauit quemadmodum ἀσκήτης sic dicta est, quod ἀσκή, hoc est vtris modo in peritonæo humor continetur, ut liquet eodem loco, Et tertia differentia sic appellata est, quoniam per carnem, vel sub carne, vel iuxta carnem, seu secundum carnem, vel supra, seu infra carnem humor continetur, aut propterea ipsam λευκαφλεγματίαν nominant, ut quæ picuita liuida constet. vel sui quidem ratione semper alba, sed quæ propter mixtionem quorundam aliorum humorum verum mutet colorem, ut liquet apud Gal. com. apho. 29. 7. lib. Communis autem omnium (ut inquit Celsus) est humoris nimia abundantia, ob quam ne vlcera quidem in his ægris facile sanescunt, ut patet etiam apud Hipp. & Gal. apho. 8. 6. lib. At quoniam cuiusvis aquæ intercutem communis generis est ubi sanguificationis officium intercidat (ut liquet apud Gal. 2. progn.) Ea de re necessum est (quoniam iecur eius facultatis, quæ sanguinē gignit instrumentum existit) ut ipsum vitietur in huiusmodi affectibus, quinimo nisi hepar afficiatur, ut 5. de loc. affect. scriptum est, haudquaquam aqua intercutem fieri potest, & si non semper ob primariam eius affectionem excitetur, licet hoc quoque sit quam frequentissimum, sed interim iecur ipsum per cōsensū afficitur aliarum partium, quæ aut eidem vicina sunt, aut societatem, seu consortium quoddam cum eo habent mediis conceptaculis, venis videlicet, quem admodum ab eodem Gal. tum. 5. de loc. affect. tum 2. prog. decretum est. Quod autem interim primario iecur, interim lege cōsortij, quod cum alijs partibus habet, iā dictis aquæ intercutē speciebus afficiatur, ab Alex. & Paulo præcitat

tis

5. de loc. affect. 7

6. de loc. af. in prin.

2. d. nat. fac. c. 8. in prin.

Aqua intercutem unde nomen sumpsit.

4. de rat. victus. Com. 3

5. de loc. af. c. 7

4. de caus. puls. cap. 24.

Quot sint eius differentia.

Huius differentia cur sic appellentur.

Communis causa generationis omnium trium differentiarum.

Com. 1. in med.

Cap. 7.

Quæ pars afficitur, quare iecur semper.

6. de loc. affect.

Cap. 7

2. prognost.

Com. 3

tis locis confirmatum est . Atqui dignosces num ipsum primo affectum sit, ex Hipp. & Gal. testimonio eodem 2. progn. ex cupiditate quadam, seu propensione, quam ægrotantes ad tussendum obtinent . Nam incitari ipsi ad tussim tanquam ad accidens, statim ab hoc desistunt, tantummodo tentantes initiū tussendi, etenim iecoris moles incidens præcordiis, facit angustiam in pulmone, ob quam ad tussim ægri veniunt frustra, ceu auxiliaturam affectui naturalis facultatis, nequaquam habentes ministerium, continuo desinunt . Ob hæc itaque propensiores ita affecti ad tussim redduntur, sed eis cito tale deficit munus, propterea quod nihil dignum commentatione excreant. Dignoscitur etiam ex paucitate, ac ariditate deiectionum, Nam venter non deiecit nisi dura, ac pro necessitate imperpeffis existentibus intestinis, vel lactib; (vt Gal. inquit) nec uitiato alimento, neque grauatis ab eo partibus, etenim bene valent, nec alui fluor infestat, manentque diutius inibi reliquæ alimenti, quæ partim mittuntur ad intimam peritonæi sedem, partim inflammatione iecoris torrentur, præsertim si ad acutum morbum consequatur aqua intercus : adderunt quoque & reliqua signa, quæ ipsum primario affectum indicabunt aliquo prædictorum affectuum, quorum indicia propriis eorum capitibus requiras . Vbi autem nullum tale præcesserit signum primario affecti iocinoris, ac venter magis profluuiis infestetur, sitque alui fluor diutinus, neque dolorem exoluens, neque molliens ventrem, ventriculi, vel intestinorum, maximeque ieiuni vitio (mesentericis venis mediis) iecur ipsum per consensum oblesum erit . Nanque ex prædictis partibus affectis potissimum venæ debiles fiunt, quas iecur ad se trahit alimentum: ita fit, vt nequaquam deferuiant visceri ad diductionem: & cum in tenuioribus intestinis maneat, grauata ab eo, vt pote debilia, statim id omne pellunt deorsum : atque hæc alui floris in huiusmodi aqua intercutem causa est, eodem Gale. teste præcitato 2 progn. Altera causa est, quoniam & alimentum corrumpitur, ac bilis copia in intestinis colligitur, & ob eam rem eadem admodum mordentur, proindeque incitantur ad excernendum contenta ibi excrementa, idq; potissimum accidit, vbi inflammatione vexentur, & propterea fluor hic alui neque dolorem sedat, neque ventrem molliat, cum per eum aquæ intercutis causa non vacuetur : At si indurato liene, seu infrigidato aut quomodolibet aliter affecto, eique consentiente iocinore aqua intercutem genita fuerit, ex prædictis signis indurati, aut aliter affecti patebit . Sic etiam, si vel pulmonis, vel septi transtuerfi, aut renum occasione iecur affectum fuerit : eorundem viscerum affectorum signa præcedent : qualitas autem affectus ipsius iocinoris frigida perpetuo intemperies existit, Nanque nisi ipsum primario frigidatum sit, aut ad ipsum frigus impertiatur à reliquis iam dictis partibus primario refrigeratis aqua intercutem subsequi potest minime, vt ab eodem Gale. 5. & 6. de loc. affec. decretum est: quæ frigida intemperies, ne dum ad omnes eiusdem iecoris venas peruenire debet, verum quoque ad eius corpus, quod *σπῆν* *χρῆμα*, græci dicunt : nanque secundum hoc propriæ eius facultatis, quæ sanguinem gignit. instrumentum est, Et propterea ubi vitiatum sit, actionem quoque eius vitari oportet, adeo vt non amplius cibos in sanguinem, sed in aliam qualitatem transmutet serosam, ac tenuem inquam superfluitatem, aut pituitorum humorem seu flatum, & proinde fit, vt trifariam duntaxat aqua intercutem constitui possit. Nec obstat ea aqua intercutem, quæ ad acutos morbos sequitur . Nanque ab iis quoque iecur tam grauiter afficitur calida & sæpenumero sicca quoque intemperie, vt cibum in sanguinem, transmutare nequeat, vt liquet eodem 6. de loc. affec. ita vt valeamus absque controuersia asserere, hanc etiam aquam intercutem ex frigida iocinoris intemperatura ortū habere, priuatim saltem, admodum imbecillo eius insito calore red

Alex. li. 9. c. 2
 Pau. l. 3. c. 48
 Si iecur primario afficiatur, signa.
 Tex. & com. 3

Si per consensum iecur afficiatur signa.

Com. 2

Ad quem iecoris affectum aqua intercutem consequatur.
 5. de loc. aff. c. 74
 6. de loc. affec. in prin.

Quod non nisi tres aquæ intercutem differentie esse possint.

1. de ratione vi-
dus com. 3. in
prin.

lib. 10. c. 20

Quid sit anasar-
ca.
Loco citato.

Ascites quid sit.

5. de loc. af. c. 7
Aer. lib. 10. c. 20
Tympanites
quid sit.

Quis affectus
præter naturam
sit aqua inter cu-
tem.
Lib. de tumor.
cap. 20
14 meth. c. 13.
Li. de diff. symp.
cap. 4

Aquæ intercutē
cōmunia signa.

Com. 2. & 3
Affectus quibus
signis dignosca-
tur.
Quibus Tympa-
nites.
Li. 2. c. 2

dito, quo medio sanguinem gignit, ex iam dicta præternaturam eiusdem caliditate in eo genita: At qui frigida hæc iocinoris intemperies haud æque in gignendis iam dictis aquæ intercutem speciebus se habet. Namque a maiore frigiditate generatur aquosus hydrops, quem ascitim vocant: a minore autem tympanites. Etenim humida substantia in flatuosum aerem sine aliquo calore transmutari nequit, ut inquit Galen. præcitato com. aph. 114. libr. Sed quemadmodum ascites a maiori frigiditate, quam tympanites excitatur (ut diximus) pari ratione & anasarca, seu leucophlegmatia a frigidiori iocinoris intemperie, quam ascites, ortum ducit, quoniam totum habitum pituitæ plenum habent laborantes, Gale. auctore 4. de rat. vict. quanto etenim pituitosum excrementum seroso, ac tenui humore frigidius existit, tanto anasarca, quæ ex iam dicto pituitoso excremento excitatur, a frigidiori intemperie generationem habebit, quam ascites, qui ex seroso excremento producitur: Accedit item, quod (ut fatetur Aetius) talis humor tenuis, & serosus, qui ascitis causa existit, salsus est, & putrefactus, ut propterea largiore potum appetant, qui ascite laborant, quam reliqui hydropici. Est itaque anasarca, seu leucophlegmatia pituitosi humoris in toto corpore collectio seu per omnem corporis miscellam disseminatio (ut inquit Aetius) ita ut instar spongiarum, aut papyri vniuersa caro perinadefacta appareat, atque ob id totum corporis similiter, ut hypochondria, intumescit, ac mortuo simile euadit. Ascites autem collectio aquosi humoris existit plurima inter membranam peritonæum appellatam, & intestina, ut vere vtrius modo membrana ipsa repleta esse videatur, Spatium etenim, quod inter peritonæum, & partes ei subiacentes est, aquoso humore impletur, Galen. teste 5. de loc. affect. Aliquando vero ubi peius habent egri vsque ad fœmora tumor producitur, ut idem Aetius asserit. Tympanites autem plurima collectio est superflui flatus ære repleti in iisdem ventris incumbens locis, ut in principio sola inflatio esse videatur, postea tamē flatus inspissatur, & veluti nubilus redditur, atque ita vna cum flatu, quasi nebulosus humor consistit, atque congregatur, ut liquet ex eodem Aetio. Ex quibus liquet quamlibet aquæ intercutem differentiam, seu speciem morbum esse in quantitate, seu magnitudine. Namque ex genere præter naturam tumorum existunt, ut liquet li. de tum. præter naturam circa finem, id quod confirmavit idem Gal. de ascite li. 14 meth. med. quo loco eam in numero eorum tumorum, qui præternaturam consistunt, connumeravit, qui etiam toto genere præternaturam sunt; Nec obstat, quod idem Galen. lib. de differ. sympto. inter ea symptomata, quæ incidunt in sanguinis generatione frustrata, hydropis vitia connumeravit, Nam vel symptoma vniuersaliter dictum voluit intelligere, vel per vitia aquæ intercutis, eius causam immediatam intellexit, quæ quidem symptoma est incidens in sanguinis generatione (ut ipse inquit) non peracta vel non rite peracta: Communiter autem omnis aqua intercutem spirandi difficultatem, tumorem, & grauitatem, ac vitiatum colorem inducit, ex virore nimirum albicantibus ægris, fastidiunt & cibum, potum autem largiorem plurimi appetunt, maxime qui ex ascite laborant, etenim humor, qui in locis detinetur, salsus est, & putrefactus; quare, & sitis, & febris augebit: fere enim in totum plurimi ex hydropicis febriunt, ut ab eodem Aetio scriptum est. Commune item omnis aquæ intercutem est pedes intumescere, quippe cum procul a calidissimis partibus absint, ut liquet ex Gale. 2. progn. Particulatim autem Ascites inde internosci debet, quod fluctuationes excitentur ex humore, qui veluti in vtre quodam contentus circumuoluatur. Tympanites autem, quod ubi nos ferimus ventrem tympani modo strepitum quendam elidere videatur, ut inquit Alex. Et propterea in huiusmodi aquis intercutem humor sit, an spiritus, qui

in regionibus uentris continetur tactu explorare non ualemus, nisi cauata pressu cute, Etenim frequenter non cauari conspicias in synceris ascitis, & aqua intercutem, quam tympanitem uocant. Sed ad ueram notitiam comparandam pulsare cogimur abdomen, ut attendamus, si ueluti tympanum resonet. Secundo loco aliter componere hominem, & in latera conuertere, quo fluctuationem aliquam exaudiamus, ac nobis strepitus in modum tympani spiritum annuntiat, fluctuatio humorum: uno uero admoto tactu distentum abdomen non deprehendas ex aere sit, an ex aqua, tametsi cutis his, & quicquid carnosum erat secundum peritonæum, & crassa cute tectum contabuit, quemadmodum à Gal. lib. quarto de dignos. pulsibus scriptum est: Anasarca uero hinc deprehenditur, quod eger carnes habeat emortuo corpori similes, & totum corpus intumescat, ac ubi nos digito id imprimimus, cauitas oboritur, cumq; imprimere desierimus, non statim in pristinum reuertatur, ut apud eundem Alex. legitur. Cæterum quæuis prædictarum specierum aquæ intercutem ad iocinoris refrigerationem (ut iam dictum est) consequitur: etenim citra eiusdem refrigerationem impossibile est aliquem in hydropem incidere Gal. & Aetio testibus. Hæc autem refrigeratio, aut per se, aut per consensum fieri, potest, ut diximus, Ex propterea ex nonnullis causis iecur ipsum refrigerantibus aqua intercus oriri porerit, utpote ex immodica hæmorrhoidum profusione, aut ex eisdem diuturnis suppressus, similiter ex menstruæ purgationis omnimoda cessatione, aut immodica vacuatione, aut ex immodico muliebri profluuiio, ut liquet ex Gal. secundo de nat. facult. & 5 de loc. affect. Pariter ex intempestiua, ac immodica aquæ frigida potione iecur assatim refrigerari potest, ac statim aquam intercutem induci, quanquam sic affecti (ut Gal. eodem 5. de locis affectis asserit) ob refrigeratum os ventriculi, vehementi ciborum desiderio teneantur, opposito modo quam cæteri hydropici. Si similiter si ipsum iecur scirrhus afficiatur, vel ipsum, splene indurato, seu refrigerato, coafficiatur, aut ieiunio, seu reliquis intestinis iuxta ipsum, aut mesenterio, vel pulmone, vel renibus, seu septo transuerso, simili ratione primario affectis: Multi autem & à podagra, & à coxendicum dolore vexati aquam intercutem incidunt: frequentissime etiam eos, qui cibum non sentiunt, & malo corporis habitu præditi sunt, itemq; ab arquato infestatos hydrops corripit, item quosdam eorum, qui non nisi recta ceruice spirant, cœliaca affectione laborant, ac dysenteria, in aquam intercutem deduci nouimus (ut inquit Aetius) sæpe etiam febribus longis superuenit (ut inquit Paulus) & interdum ad morbos acutos consequitur, ex Hip. sententia 2. prognostic. cum ex eis sanguificationis officium intercidit, adeo ut iecur cibum in sanguinem transmutare nequeat: quæ omnia & dignoscere, haudq; ægrè interstinguere licebit, ex prædictarum partium affectarum, ac prædictorum affectuum dignotione, per enarrata in propriis locis, ac capitibus signa. & propterea eadem breuitatis causa scribere recusauimus: quædam autem ex infirmorum, seu astantium loquela promptè percipies: Huic autem affectioni non minus foemine, quam viri sunt obnoxii: pueri uero ut plurimum ab hydropse sarcite apprehenduntur: quæ quandoque curabilis fit: Est tamen tympanites omnino periculosus, minus eo ascites: sarcites quoque aliquando curabilis fit, per ea quæ cuti adhibentur humorem detrahentia ac resiccantia pharmaca (ut idem Aetius inquit.) Omnes autem inueterati hydropes, & qui iam habitum corrumpunt, sunt periculosi (ut ipse fatetur.) Sæpe uero hoc malum per se incipit, sæpe alteri uetusto morbo, maximeq; quartanæ superuenit, Inter initia tamen non difficillima curatio est: At si malum inueterauerit, non sine magna molestia discutitur. Celso auctore, faciliusque in feruis, quam in liberis tollitur, quia cum desideret famen, hinc, mille alia tædia, longamque

Cap. 3 : post
princ.

Anasarca signa

Loco citato.

Gal. 5. de loc. : 9

Cap. 7.

Aet. li. 10. c. 20.

Aquæ intercutē
causæ.

2. de nat. fac. c. 8

5. de loc. aff. c. 7

Loco citato.

2. prog. tex. 1

Prognostica.

1. prog. tex. 1

Aet. li. 10. ca. 21
Curatio.

Alex. li. 9. c. 3

Vicius ratio cō
munis singulis
aque intercūtē
speciebus.

Aet. li. 10. in fin.

1 loco citato,

12. meth. c. 2

Tral. li. 9. c. 3

Loco citato,

Sudatorium
Trituli.

Aet. li. 10. c. 32

4. de rat. u. iet.

com. 3

Lib. 9. c. citato.

gamq; patientiam, promptius his succurritur, qui facile coguntur, quam qui
bus inutilis liberata est. Sed ue hi quidem, qui sub alio sunt, si ex toto sibi
temperare non possunt, ad salutem perducuntur, ut idem refert Cornelius.
Omnis item aqua intercūtem, si ex acuto morbo existit, mala est, ut liquet
apud Hipp. eodem 2. prognostic. non enim sedat febrem, sed dolorem admo-
dum infert, ac mortem ut ipse inquit. Quod vero aqua intercūtem laboranti-
bus vlcera in corpore facta difficulter, sanentur, idem scriptum reliquit aph. 8.
lib. 6. aph. 14. eiusdem, Hydrope correpto, (inquit) si aqua è venis in uentrem
defluerit, soluitur morbus, quemadmodum, si eisdem tustis superuenerit.
quod malum sit, decretum est ab eo aph. 35. 6 Vel quod desperati sint (ut li-
quet aph. 47. 7.) Si quis autem leucophlegmatia detineatur, & fortis ventris
fluxio superuenerit, à morbo liberatur, ut patet aph. 29. 7. libr. Nanque (ut
Gal. inquit) ex forti, seu diuturno alui profluvio, soluitur albę pituitę super-
abundantia. Verum licet difficilis sit aquosę affectionis curatio, & plurimo
artis auxilio opus habeat (ut inquit Aetius) Inter initia tamen non difficil-
lima curatio est, Celso auctore, Cuius prima, & principalissima pars ratio
victus existit ne dum in aqua intercūtem, verum etiam in omnibus affecti-
bus, & potissimum periculosis (Alex. teste:) Ea de re communem omnibus
speciebus aquę intercūtem victus rationem instituemus, deinceps particula-
rem aggredimur cuiusque curationem. Aer itaque eligatur ad calidum, & sic
cum vrgens, moderate autem sit, & probe temperata ipsa domus secundum
anni tempus (ut inquit Aetius) Lectus non valde mollis sit, iis præsertim, qui
anasarca laborant, Substernantur etiam arundinum folia, & herbę resiccā-
tes, velut est, vitex, pulegium, calamintha, & similia, opercula etiam ipsa, qui-
bus teguntur, apparentur duriora: mirum est etenim quantum huiusmodi per
somnia resiccent, ut constat iā quosdam frumenti aceruis obuolutos, & ab-
sconditos a somno surrexisse firmos, ac resiccatos, ut liquet ex eodem Aetio,
qui item somnus eisdem competit moderatus, aut paulo breuior consuetor:
Nanque vigilię moderatę non minus conferunt: digerunt etenim (ut liquet
ex Galen. 12. meth. med.) motus insuper, si quid aliud (ut Trallianus refert)
hydropicis conducit, præcipue, qui sit per mare, equum, & lecticam: Iis au-
tem, qui viribus constant etiam ambulatio est utilissima: Pariter frictiones
hydropicis adhiberi debent. Nanque externos corporis meatus rarefaciunt:
humores extenuant, ac discutunt (eodem Alexan. teste) Celsus quoque mul-
tum ambulandum, currendumque aliquando esse præcipit, quanquam inter
initia idem, quietem, sitim, ac inedia, pro huius affectus curatione pro-
bauerit. Addidit etiam, quod superiore maximè partes sic perfricandę sunt
ut spiritum ipse contineat, euocandus est sudor, non exercitatione tantum-
modo, sed etiam in arena calida, vel laconico, vel clibano, similibusque alijs:
maximeque vtilis naturales, siccę sudationes sunt, quales super Baias habe-
mus in myrtetis, (ut ipse refert) modo autem vulgo sudatorium Trituli for-
te appellatur: Alius quoque in singulis hydropicis seruanda lenis est, si non
nature, saltem arte clysteribus senientibus, aut glandibus vtens. Cibus autem
esse debet ex media materia, sed tamen generis durioris (ut refert Celsus) Sit
autem vniuersus facilis concoctu, & sufficienter coactus, exolutus enim
apertus est, ut in aquo sitatem commutetur (Aetio auctore.) Melius nanque ita
affectis est dare (Gale. teste 4. de ratione vict.) quę probe concoquere possint.
Prospectiendum etenim est, ut alimentum, quod ad iecur peruenit, facile sit
ad distribuendum, & nequaquam impediatur, quo minus in corporis partes
disi enseatur, ut facietur Alex. Quare optimum alimentum ipsis est panis fur-
naceus probe fermentatus, qui semina flatibus discutiendis apta contineat,
ut anisi, aut cumini, aut fœniculi, Cuius etiam copia vitari debet, ut liquet.

ex eodem Alexan. vel panis sit optimus clibanites, qui salem, ammiū, & fœniculum habeat admixtum, vt refert Aetius. Ex auibus conueniunt perdices turtures, phasianī, turdi, merulæ, & starne, & reliqui minuti passeruli: qui pingues non sint. Interim gallinæ, ac gallinacei pulli, quanquam ferè mansuetis præponi debeant, vt testatur idem Trallianus. Ex quadrupedum item carnibus moderate comedant, & eas potius, quæ non sunt pingues, præcipue ferinas, vt ceruinās, aprinas, & caprearum, ac leporum, quarum ius cum extenuante cibo paretur, apio videlicet, petroselino, dauco, eruca, pulegio, rapa, caucalide, coronopo, ei yngio, pastinaca, porro capitato, ac aliis, præsertim hominibus ruralibus, has easdem maxime assas, si gratæ sunt, assumere ipsos alienum non est. Verum tam assatis, quàm elixatis semper aromatica quædā redolentia adicias, præsertim cinnamomum, aut gariophyllos. Ex piscibus gustari poterunt cancri, locustæ, & erinacei recentes. A leguminibus vero abstineant in totum; Inter bellaria concedendæ sunt palmulæ, nuces, amygdalæ, vua pensilis, ac vua passia, mala punica, pyra cocta, ac carycæ: omnia tamen moderate, neque omnia quotidie. In uniuersum tamen maximam ciborum partem in cœna accipiant, quandoque etiam assatas cochleas, atque oua insuper assata gustare poterunt, vt Actio visum est. Pro potu vt vinum tenue, præsertim vetus. Item & quod vrinam ciet. Aqua in vniuersum vitanda est, Verum quoniam incommodus est eis plurimus potu, tantum præbendum erit, quantum ad infringendam aliquo modo sitim, sufficit, Nanque potio non vltra danda est, quàm vt vitam sustineat, optimaq; est, quæ vrinā mouet, vt a Celso scriptum est. Si tamen intensa sitis inflet, quarum quod de libandum dabimus, solatii tamen gratia, & leniendæ sitis: dulcia vero vina, & vinum mulsū vitanda sunt. Nanque ex his sitis non sedatur, epotum tamen acetum optima eisdem medela est, vt liquet primo de simplicium medicamentorum facult. Quod si velint factitiis vinis vti, id sit absynthites, præcipue quod spicam nardi copiosorem recipit, vel apiatum, aliis autem abstineant, ex Alex. testimonio & vt summatim dicam cum Gale. 4. de rat. vict. in morb. acutis: quàm minimum bibere, & quàm plurimum laborare prædictis confert, Nempe talis viuendi modus calfacit, & sicca. Hæc quo ad communem victus rationem attinet, dicta sint satis. Quantum vero ad medicamentorum rationem attinet, Communis etiam omnium curatio ab euacuatione incipienda est, Paulo, & Alex. testibus, Quanquam Ascites, & Tympanites purgans medicamentum duntaxat quod aquam educat, requirunt: Anasarca vero interdum venæ sectione, vt ipsi referunt: quinimo hic solus hydrops, cum incipit, Galen. teste 4. de rat. vict. interdum sanguinis detractione indiget, cum scilicet ex retentione, vel hæmorrhoidarū, vel muliebrum, vel ex quapiam, quæ ita plethorica sit causa inceperit. Tympanum vero, & Ascitem (vt ipse inquit) nullus per sanguinis missionem sanare est ausus, Huius itaque speciei aquæ intercutem propriam medicamentorum rationem aggredientes dicimus cum Gale. circa initia venam secandam esse, præsertim cum ex modo dictis causis fuerit orta. Nam licet ex sanguine frigidiore nascatur, & frigiditatis ratione illa non indigeat, tamen quoniam copiar detrahitio naturam leuat, vt hæc minorem illam effectam facile superet, non alienum, sed rationi consentaneum est venæ sectione vti, Alex. teste. Nam prope ad extinctionem accedente naturali caliditate, vt igni contingit in hac affectione, etenim quemadmodum ignis prope extinguitur immixtis lignis, tū humidis, tum multis, nisi quis multitudinem sustulerit, sic & in frigidiore ob copiam sanguine, vbi calor natiuus prope extinguitur præsentissimum est remedium sanguinis missio: quo tempore periculum ita prehenderit, vt liquet ex eodem Gal. præcitato lib. 4. de rat. vict. in morb. acutis. Ante omnem

Loco citato.
Loco citato.

cap. 30

Com. 3. in fine.

Communis medicamentorum ratio.
Pau. l. 1. c. 4.
Alex. l. 1. c. 2.

Com. 3. post prin.

Anasarca curatio propria.

Venæ sectio.

Loco citato. D

Com. 3

itaque

Com. 24. & 3.

Purgatio.
Lib. 9. cap. 2Vrinam cientia
Vomitibus.
Quæ extrinse-
cus admouenda
sunt.

Lib. 10. c. 18.

Cap. de pyrite.

itaque aliam curationem venæ sectio adhibenda est, si vires ac reliqua per-
miserint, secundaque interna cubiti dextri vena erit. Ea nanque vena velo-
cissime, & plurimum ex ijs, quæ principes sunt, partibus corpus vacuat, ex Ga-
leni sententia eodem quarto de rat. vict. in morb. acutis. Nec vnica vice mul-
ta sanguinis copia exhaurienda est, ne vires deiciantur, sed satius erit. vbi
oporteat, ipsam iterare, ac paulatim, & tuto magis euacuare, quam festinādo
vna cum morbo etiam ægrum è medio tollere. Verum vbi vires non permise-
rint, sed imbecillæ sint, aut ex quauis alia causa, quam ex iam dictis, Anasarca
originem duxerit, sanguinis missio vitari debet: sed copia pituitosi excre-
menti per vniuersum corpus redundantis purgante medicamento vacuari de-
bet. Sic etiam vbi opus fuerit, facta venæ sectione eadem purgatione vtare,
quæ iterum per vices tentanda erit, ex sententia eiusdem Alex. a lenioribus
inchoando, & demum ad ea, quæ paulo valentius purgare queunt, transire,
prius tamen humore ipso præparato, ac viis referatis per ea medicamenta,
quæ extenuandi, incidendi, ac meatus aperiendi vim habentia sunt sy. ex ab-
synthio, eupatorio, de byzantiis, oxymel simplex, ac scyllinum, seu sy. ex hyf-
sopo, qui exhibeantur cum aliquo etiam extenuantium, ac aperiētium medi-
camentorum decocto, quorum copiam cap. de iocinoris obstruktionem requi-
ras, pariter capitu. de eiusdem iocinoris imbecillitate: quibus sepius adhibitis
purgans medicamentum tribuendum erit, quod conficiatur, vt infra. Recipe
pulueris hieræ simplicis Galen. 3. agarici trochiscati, ac rhabarbari vigorati,
singulorum scrup. ii. formentur pilulæ cum oxymelite. A quibus per aliquod
tempus exhibeantur vnc. ii. vel. iii. syr. è pluribus infusionibus rosarum cum
qua cychorii. At ubi hæc purgatio satis non sit, iterum quæ maiorem vim ha-
bent extenuandi, ac aperiendi medicamenta exhibeto (eorum, quæ modo re-
censuimus) post quorum vsum ad ea, quæ paulo valentius purgare queunt,
transito: ueluti sunt catapota ex rhabarbaro, seu ex agarico, Idque non una
vice faciendum erit, sed pluribus, prout usus urgebit. Semper tamen a mitio-
ribus ad ualentiora transeundum. Nec non cum eisdem medicamentis perpe-
tuo ea misceri debent, quæ vim habent adiiciendi iecori robur, quemadmo-
dum rhabarbarum est, ac myrobalani, præsertim chebulæ. In hunc etiam
vsum conferunt pastilli de rhabarbaro, de absynthio, seu eupatorio, si per vi-
ces exhibeantur: Quo etiam tempore, vbi ab his purgantibus medicamentis
se abstinerint ægri, vti poterunt aromatico rosaceo, antidoto diarhodon, dia-
lacca, vel diacurcuma eorundem 3. i. deuorantes cum exiguo vino albo aut
aqua ex absynthij decocto, In quem adhuc vsu, si tantundem mithridati, seu
theriacæ assumpserint, non parum confert. Præbenda etiam erunt ea, quæ vri-
nam cient, velut est daucus, fefeli, cardamomum, radicem asparagi, aut trifolij
decoctum, aut etiam triflaginis, similiter etiam si 3. j. eiusdem radicis trifolij,
aut eryngij sicca, vel seminis viticis tantundem cum vini cyathis tribus exhi-
beatur, commode vrinam cient, vt liquet ex Aetio ca. 31. li. 10. Maximam ite-
eisdem auxilium præstat vomitus, vt eodem Aetio liquet. Extrinsecus vero
ea adhiberi medicamenta licebit, quæ vim immodicum humorē exiccandi ha-
beāt: Quapropter & in puluere volutationibus vtendū est. Aliquando etiā &
arena probe a sole ignita, aut pellibus similiter a sole feruefactis ægrum occu-
lere oportet; capite tantum velato, & facie cum spongia assidue extersa, eodē
Aetio auctore: fluuiatiles etenim, ac marinæ arenæ communem vim possi-
dent omnium lapidum, siquidem excitant tumentum ab aqua intercutem
carnem, egroto videlicet in eis excalfactis decumbente, ex Gale. auctoritate.
9. de simpl. medic. facult. Post hæc aqua marina, aut aluminosa, aut sulphurea
lauentur ægri, etenim aliquibus, qui ad huiusmodi lauacra assueuerunt, ea
ipsa, tum ad delendum morbum, tum ad habitum valentiorē reddendum
suffic

uffecerunt: optime etiam conuenit & his cataplasmatum admotio, eorum præsertim, quæ resiccare simul, & visceribus firmitatem addere possunt: quemadmodum stercus bubulum est conuenienter resiccatum, non inepte cum posca, aut aceto mulso impositum, infarcta sulphuris quarta parte, similiter & cochleæ crudæ tritæ, & impositæ, agglutinantur etenim, neque discedunt, priusquam vniuersus humor resiccetur (eodem Aetio teste) quanquam ante eum Gal. I. I. de simpl. medic. facult. illud scriptum reliquerit, cum dixit, Porro cochleæ, quæ vitionem non sunt expertæ; si tritæ vna cum testis imponantur, & toti ventri aqua intercutem laborantium, & in arthriticis, articulorum tumoribus ægre quidem diuelli poterunt: Cæterum impense desiccant, & sane in hæerere sinere oportet, quo ad sponte decidunt: fermentum etiam sale multo permixtum commodè adhibetur, aut panis eum puluere hyssopi; aut fabacea farina, aqua marina, & melle coacta, pari absynthii modo adiecto. Vel sic cataplasmata conficies, Recipe caricarum, & fermenti, cuiuslibet unc. i. farinæ hordeaceæ, loliaceæ, fabaceæ, fœnu græci, & seminis lini, ana manip. s. radicum, & foliorum ebuli. & absynthii, ana manip. i. s. hyssopi, & origani, ana drac. iiii. sulphuris drac. iiii. misceantur, & cum posca, aut oxymelite fiat cataplasma. Si vero corpora teneriora sint, quemadmodum puerorum, & aliorum, qui mellem carnem habent: quæ reprimunt cataplasmata magis adhibere oportet, qualia sunt malicorium, rhus culinaris, mala cotonea, myrti baccæ, & vitis pampini, aliquando quidem per se, aliquando inuicem permixta cum quibusdam eorum medicamentorum resiccantium, quorum supra mentionem fecimus. Verum ubi prædictis affectio non cesserit, efficacius auxilium adhibere oportet, quod chirurgia præstat, fissuras inquam circa internum talum infligere oportet, in loco quatuor digitorum spatio, supra talum eminente, ea profunditate, qua quis in venæ sectione utatur, Ita ut per aliquod dies, per easdem humor frequens feratur, quemadmodum Celso, & Aetio visum est. neque periculum vllum hic verendum est, veluti in hydropis ascite pertusione, nõ enim coaceruatim, quemadmodum illis euacuentur: & si quis velit excretionem plurima facta eam cohibere, nihil vetuerit ipsas in talis fissuras linamentis obturare, ligamentisque cõstringere: atque ubi rursus prodire quid velimus, laxatis ligamentis, & ablatis linamentis, gestatoque, ac moto ægro excretionem irritabis, ut idem inquit Aetius. Ea autem species aquæ intercutem, quæ ascites appellatur, non minus (ut diximus) ab euacuatione initium curationis exigit, quanquam non venæ sectionem sed purgans medicamentum requirat. A tenui nanque, ac seroso humore originem ducere superius conclusum est, & a Galen. decretum tertio de caus. sympto. Is itaque primo præparari debet syrupus è corticibus citri melle, rosaceo aut oxymelite, & demum infra scripto medicamento purgante expurgari: quod recipit pulueris hieræ simplicis Gale. 3. i. agarici trochiscati, & rhabbarbari vigorati ana. 3. s. formentur pilulæ cum oxymelite: a quarum assumptione per aliquod tempus infra scripta potio exhibetur, quæ recipit corticum myrobalanorum chebularum drac. iiii. citrinarum 3. i. fiat decoctum in aqua cichorii, & absynthii, in quo vnc. ii. syr. domini Augustini, ac tantundem syrup. est pluribus infusionibus rosarum dissoluas, deinceps iterum adhibitis syrupis magis extenuantibus, ut eo qui ex tribus radicibus conficitur, aut ex duabus, vel quinque radicibus Meluæ, oxymelle simplicis, aut scyllino, seu syrup. de byzantiis, vel de eupatorio cum syrup. de absynthio & aquis fœniculi, & melissæ, iterum purgans medicamentum exhibetur, quod parari poterit ex pilulis de agarico vel de rhabbarbaro eiusdem Meluæ cum pulueribus hieræ simplicis, vel pilulas nostras tribuas: quarum sæpius experientiam habuimus, & citra noxam pluries singulis septem, vel decem diebus exhiberi poterunt; mirabiliter etenim serolosos purgant humores.

F f citra

Aet. li. 10. c. 29.
Gal. 10. de sim.
facul. cap. de co
chleis.

Cels. li. 3. c. 27
Aet. li. 10. c. 30.

Ascites quomodo curari debeat.

cap. 2

Purgatio.

Diosc. l. 4. c. 153
 Pilulæ proprie
 experit.

Diosc. l. 4. c. 155.
 Paul. li. 3. c. 48
 Alex. li. 6. c. 2

Lib. 10. c. 16

Loco citato.

Citato loco.

Ibidem.

Clysteres.

citra aliquod nocumentum notatu dignum: Conficiuntur autem hoc modo, Recipe foliorum plantæ, quam communiter seplasiarii mezereon appellant & proprie eius quam nuncupat Dioscorides chamæleam, vnc. ii. vel iii. infundantur per vigintiquatuor horas in sufficienti quantitate aceti vini albi, In quo prius mala cydonia fuerint decocta, demum in umbra exiccantur, iterum parato decocto ex pomis dulcibus, & acetosis in eodem aceto vini albi prædicta folia infundantur, vt supra, ac exiccantur. Contundantur, & eisdem adice hieræ picræ simplicis tantundem, & cum succo radicis iridis fiant pastilli, & seruentur, quorum dosis est 3. i. vel scrup. ii. pro qualibet vice: Interim vero 3. s. agarici trochiscati, aut rhabarbari vigorati, & tantundem trochiscorum ex myrobalanis chebulis adicere poteris: eisdem nanque catapotiiis (Deum testor) me nonnullis hac specie aquæ intercutem laborantes sæpius, per intervalla eis exhibitis, perfecte curasse. Nec etiam parum conferunt pro curatione aliarum aquæ intercutem specierum, vbi eadem purgatione indigeant: quemadmodum hoc in anno 1557. observauimus in illustrissimo Petro Antonio Sanseuerino Bisignani principe, qui cum a scite simulatque Anasarca laboraret adeo, vt fere a cunctis pro deplorato haberetur, vbi ter, aut quater dicta catapotia per intervalla deuorauit, liber euasit: testes sunt nonnulli cum medici, tum magnates, qui ipsum aqua intercutem laborantem, ac demum ab ea solutum, & liberatum inspexerunt, quanquam non exiguam etiam huic opem tulerit sudatorium Trituli hodie vocatum, cuius supra meminimus. Cæterum mirifice confert pro educenda hydropicorum aqua, seu humore seroso decoctum radicis sambuci, seu ebuli in vino. Nanque eadem vtrisque vis est, & cutem subeuntibus aquis auxiliantur, Dioscoride auctore; licet & a Paulo; & Alex. succus corticis radicis sambuci commendetur, si in vino potui exhibeatur: quidam etiam ex iunioribus succum marinæ brassicæ cum vino, aut sapa, seu aqua lactis approbant: (hodie vulgus medicorum soldanam, seu soldanellam appellat.) Cuius vsum non valde admittō: Nanque ventriculo mirifice aduersatur, & ipse pluries experientia vidi noxam inferre, & potius quam auxilium aliquod hydropicis præstare, imo quosdam citius periisse observauit: Verum (vt Aetio visum est) per intervalla longiora pharmacis aquam ducentibus omnibus vti conuenit. Nam in commodus est eorum vsus, vrpote qui vires ipsas dissoluit, vt ipse inquit. Tutiùs propterea erit per intervalla, ac eadem non longiora (vt diximus) nostris pilulis vti: quæ cum hoc, quod aquam ducit, vires haudquaquam dissolunt. His verò, quæ vrinam ciunt per modica interstitia vtendum est, eodem Aetio teste, Ea sunt trifolium, bitumen olens, si eiusdem 3. i. ex vino præbeatur, aut iunci odorati, nardi, seu asari similiter ex vino decoctum; vel si seminis viticis 3. j. ex vino tribuas. Conducit item anagallidis cæruleæ succos per se, aut cerum decoctum, seu seminis hyperici 3. i. ex vino, similiter si polium, aut samfuchum ex vino decoctum bibendum præbeatur. Præter etiam opinionem faciunt vermes terreni cocti, triti ex vino potati, vt liquet ex eodem Aetio: vel erinaceum terrestrem ex coriato, eiusq; carnem in sole exiccato, ac 3. j. ex vino tritam præbeto. Toto itaque curationis tempore aliquo istorum potuum vtendum erit, ex sententia eiusdem Aetij, qui etiam non parum approbauit succum solam hortensis expressum, si quotidie, donec perfecte curentur, cyathum vnum bibendum præbebis, multam etenim aquam per aluum ducit. Paulus vero scriptum reliquit, quod stercoris bubuli vsti cochlear ex vino potum quotidie strenue auxiliatur: Poteris insuper & eisdem vt medicamentis, quæ pro curatione anasarce commemorauimus, Clysteres etiam adhibendi sunt acres, nisi venter sua sponte humescat: Tunc enim exiccare ipsum magis conuenit, vt inquit Paulus. fiat itaque ex mercuriali, polypodi, floribus

bus chamæmeli, carycis, & ebuli, tum follis, tum radicibus decoctum; cuius recipe lib. i. aut lib. i. s. & in eo dissolue mellis despumati aut mellis rosacei unc. ii. olei anethini, rutacei, uel chamæmelini vnc. iiii. hieræ picæ simplicis 3. vij. aut diacath. tantundem, vel confectionis de dactylis, seu antidoti indi vel benedictæ laxatiuæ 3. iiii. salis communis 3. iiii. commisceantur omnia, & fiat clyster, Interim quoque agarici 3. i. aut 3. i s. adijcere poteris. Extrinsicus vero præter ea, quæ pro curatione anasaræ conscripsimus, quibus etiam omnibus tuto uti poteris, cataplasmata adhiberi poterunt circa initia ex farina hordeacea, althæa, ac carycis cum aceto mulso composita. Post principium autem efficaciora sunt cataplasmata adhibenda, ex farina fabacea, lupinorum & fœnugræci, ac loliacæ cum carycis absynthij hyssopo, origano, ac aceto mulso, ex Aetii auctoritate aliudque admirandum, & minime prætereundum (ut ipse inquit) ex armentariæ bouis stercore posca, siue aceto mulso quarta parte sulphuris viui inspersa conficiendum præcipit. Similiter si stercoris columbini partem unam accipias, & caprini tantundem, & buphtalmi, seu leucanthemi similiter tantundem, & tusa in acerimo aceto, ac melle coquantur optimum erit (ut ipse refert) ad ascitem medicamentum. Aliud cui testimonium præbet Oribasius (ut ipse dicit) est, Recipe fœnugræci trientem, farinæ hordæacæ quadrantem, stercoris columbini trientem, resinæ pinus sicæ lib. i. picis lib. i. ceræ lib. i. axungia veteris lib. ii. quæ eliquari possunt eliquato, & ad alia in mortario confusa, & cum aceto trita affundito. Si vero neque prædictis cesserit remediis, cute computa (quam græci *σάρκινος* dicunt) perniciosus humor elici debet, modo, quo Paulus scriptum reliquit capit. 50. lib. 6. caueri tamen debet tanquam valde periculoso vniuersa eiusdem euacuatio, quemadmodum ab Hip. & Gal. decretum est aph. 27. 6. li. Ipsa quoque aquæ intercutem differentia, quæ tympanites vocatur purgantia medicamenta, & quæ uniuersum corpus emaciant, atque etiam, quæ vrinam ciunt, exigit. Similiter & quæ extenuare, & digerere spiritus flatuosos possunt, tum intrinsecos, tum extrinsecus adhibere oportet, Paulo auctore, Etenim verendum non est simul cum flatuoso spiritu in hac aquæ intercutem differentia serofos quosdam, ac tenues humores redundare, qui in flatuosum acrem à diminuto calore transmutantur: quinimo vanum est, ac intellectu carens, sine vilo humore superfluo laborantem hydropem vocare, Cælio Aureliano teste: Et propterea eisdem purgantibus medicamentis pro eius curatione vtare, quæ pro ascitis curatione præcepimus; eisdemque redundan- tem humorem præparantibus, atque etiam vrinam ciuntibus. Perpetuo tamen prædictis adiciantur, ea quæ flatum disputant, ut semen fœniculi anisi, cumini, & ammi. similiter & prædictis antidotis diacuminum, aut dianisum commisceatur. Non temere etiam & conscriptis clysteribus, in eorum decocto cuminu m, etiam anisum, fœniculi semen, ac rutæ folia, origani, pulegii, seu calaminthæ permiscebis, ac fursur: Glandes item magnopere auxiliantur, si ex foliis rutæ, comino, ac carycis, exiguoque sale figurentur, vel in hunc modum, Recipe mellis despumari ad sufficientiam, seminis anisi, fœniculi, & cumini ana 3. i. agarici, salis gemmæ, & pulueris hieræ, singul. scrup. iiii. misceatur, & fiant balani. Capite vero de coli dolore studiosi reliquos clysteres, seu balanos requirent, Et pro curatione istius affectus vtantur. Venter etiam quotidie foueatur ex saccellis, qui sic componantur, Recipe millii, salis, & fursuris, singul. manip. i. seminis anisi, apii, fœniculi, dauci, & cumini ana 3. iiii. florum chamæmeli, meliloti, & fœnugræci ana 3. iiii. foliorum rutæ, lauri, & pulegii, cuiuslibet manip. s. contundantur contundenda, & fiant saccelli, qui calfacti in latere ignito, vino albo insperso, applicentur, ac sæpius iterentur. Cucurbitulæ quoque leues crebro toti ventri affigantur, Paulo auctore, Po-

Topica.

Lib. 10. c. 12.

Lib. 10. c. 22

Tympanitæ curationis propria.

Purgatio.

Topica.

Lib. 10. c. 12

A quæ intercu-
tem cum febre
curatio.
Lib. 9. cap. 3.

Loco citato.

Cap. 2.

teris item salubriter vti commemoratis cataplasmatibus, potissimum, si eisdem quædam ex seminibus flatus discutientibus commisceas, vel in hunc modum ipsum componas, Recipe farinæ fœnugræci, loliaceæ, & hordeaceæ ana manip. i. absynthii, & foliorum rutæ cuiuslibet P. i. seminis apii, fœniculi, & cumini ana 3. iiii. seminis anisi, ammeos, & dauci ana 3. iiii. cum melle, vino, & oleo quantum satis sit, fiat cataplasma. Vel iuxta Aetii sententiam hūc in modum cataplasma componas, stercoreis caprini recipe sextantem, tantundemque stercoreis bubuli, & columbini, farinæ fabaceæ sesquiunciam, calamint hæ, salis nitri, seminis apii, seminis dauci, seminis fœniculi, & cumini cuiusque vnc. i. panis aridi quadrantem, mellis sesquiunciam, terebinthinæ quadrantem, misce, & vti tor. At si cum aqua intercutem febris quoque complicetur, admodum calidis auxiliis vtendum non est, neque in visceribus neque in cibis, aut potibus, aut antidotis, aut purgationibus vt inquit Alex. E tenim nullum valde calfaciens ipsos iuuare potest. Nam huiusmodi medicamenta sitim ipsorum augent, & febrem incendunt, & causas inflammantes magis adhuc exurunt, intenduntque malum (vt ipse inquit), Cum igitur ab aqua simul intercutem, & igne laborantes corripiantur, vnde quaque dubia curatio est, siue calfacere, siue refrigerare quidpiam velis. Nanque necesse est, vt refrigerantia omnino aquam intercutem adaugeant, Calfacientia rursum febrim: Satiū itaque est in huiusmodi mixtam curationem adhibere, & ei, quod magis vrget, quatenus licet, insistere, vt liquet ex eodem Alexā. Nec metuendum est, vbi febres uehementiores apparuerint, refrigerantia potius tunc exhibere. Nam vbi inuicem copulentur morbi, eatenus habebunt communem curationis indicationem, quatenus copulabuntur, vel nobis scilicet ad id quod magis vrget obuiantibus, non tamen alterius cura omnino posthabita, vel omnibus pari studio auxiliantibus, quemadmodum Galen. com. aph. 16. primi lib. (de eadem aqua intercutem cum febre complicata verba faciens) scriptum reliquit. Ea colliuatione item, seu resolutione succorum, qui in venis continentur eisdem in serosam saniem solutis, vbi renes eisdem trahere non valeant subitanei hydropum status oriri consueuerunt, venis eiusmodi serum in ventrem mittentibus, aut toti corpori id partientibus, vt liquet 3. de caus. sympt. Verum de hac ne dum sanguinis, sed etiam carnis, seu totius corporis colliuatione alias pertractabimus.

περὶ διαβῆτος. id est de diabete. Cap. 92.

5. de usu par. c. 5
in prin.
1. de fac. nat. c.
15. 16. & 17.

Quoniam triplex erat (vt diximus) in venarum concoctione excrementū, ac triplicia quoque instrumenta, quæ ipsa expurgant à natura fabricata. Cum de duobus iam verba, fecerimus, bilioso in quā ac melancholico, pertractauerimus quæ de cunctis vitiis, quæ eorum secretionem, ac instrumenta ipsa expurgantia deueniunt, Reliquum est de eo, quod adhuc superest excremento verba facere, quod quidem tenue, atque aquosum existit, græci οὐρον nos vrinam appellamus, cuncta symptomata, quæ circa eius separationem contingunt, ac omnia vitia, quæ instrumentis; pro eius segregatione fabricatis, euenire solent, conscribentes. Construxit etenim natura, quo id à sanguine secerneret renes quorum vi vrinæ à sanguine segregantur, atque illinc per vteretas ad vesicam emittuntur, indeque excernuntur, quo scilicet tempore ratio ipsa insulerit (Galen. auctore 5. de usu part.) quanquam Erasistratus, Asclepiades, ac Lycus aliter, sed falso senserint, vt liquet primo de facul. natur. Circa quam renum facultatem nonnulli affectus præter naturam oriri possunt ipsam impediētes, aut deprahantes in quorum numero (quamuis rarissime euenire soleat, vt apud eundem Gal. liquet

liquet 6. de loc. affect. nanque non nisi bis ipsum videre potuit (vnus est, qui à græcis διαβήτης quandoque διακός, interim ὕδρωψ ἐς ἀμύδα, quandoque vero διαγῆλαια ἐς ἕρα appellatur, Gal. teste lib. 6. de loc. affect. primo de crisi- bus, & lib. de diff. symptom. Latini vero diabete[m], vel aqua intercutem, seu hydropem in vas vrinale, interim vero diarrhœam in vrina vocant, etenim prout diuersimode affectio hæc considerabitur, diuersa quoque nomina for- tietur. Nam si celerem vrinæ transitum, seu traductionem, diabete[m] nomina- bimus, è verbo διαβαίνω, quod latine traicio, pertransseo, seu traduco so- nat, sicut nominabitur. Quidam vero ingentem, ac inexplabilem, quæ hunc affectum consequitur, sitim animaduertentes, διακόν ipsum appellatur, à verbo διαίνω, quod idem est quod sitis, Vnde διακόν quasi vehementer si- tiens dicitur. Alii magnam vrinæ copiam inspicientes, aquam intercutem ad matellam, seu vrinæ profluuium nominarunt. Verum quicquid sit de eius nomine: Nam neque vt idoneum ei nomen imponamus, id scrutari animus est, sed vt curationis vim tum ex loco affecto, tum ex ipsa dispositione inue- niamus, vt Gal. inquit: Quapropter diabetes nihil aliud est) Aetio teste cap. 1. lib. 11.) quàm affectio diuturna circa renes consistens multum potum indu- cens, vna cum hoc quod quicquid bibitur simul vt acceptum est, per vrinas reiicitur: Vt vero Paulo visum cap. 45 lib. 3. potionis transmissio est proti- nus qualis fuerit assumpta. Ex Gal. autem auctoritate eodem libr. 6. de loc. affect. Velox exitus existit per vrinam, ac exuberanter eius quod potatum est, eodem, à sua qualitate non mutato. Propterea tum eodem loco, tum etiā primo de cris. similem dixit esse effectum hunc ventriculi, intestinorumq; le- uitati, quo ad transitus celeritatem pertinet, potissimum ei, in qua vehemē- tissima quoque excitatur ciborum cupiditas, ac etiam caninæ appetentiæ; Nam quemadmodum in his, qui canina vocata appetentia vexantur, in ore ventriculi cupiditate existente, videmus vt affatim impleti, Paulo post aut euomant, aut alui fluore deiciant, non potente uentriculo ipso deuoratorum pondus sustinere, Ita renibus quoque accidit feruæ humiditatis cupiditas vna cum virium imbecillitatem, vnde, & humiditatem affatim attrahere, ac cā deinde in vesicam impellere coguntur. Verum non propterea quod affatim, celeriterque ad vesicam vrina defertur ventriculi aut intestinorum præsertim tenuium imbecillitati causa referenda est. Nam si ob id, quod horum susti- nere non possunt ad excretionem properant, quid obstat, quo minus per se- dem excernatur, quemadmodum in leuitatibus intestinorum fieri videmus: transmigrationem item a totius ventriculi partibus ad hepar, non propter hepatis, aut venarum, in lactibus, aut ventre aut earum quæ ab hepate exor- tæ ad renes tendunt, imbecillitatem fieri didicimus: quinimo iecur ex ven- triculo per mesenterii venas (veluti arbores a terra per radices) cibum ad se se allicit, eis veluti manibus quibusdam vtens, quemadmodum ab eodem Gal. lib. 5. de loc. affect. & de natur. facul. scriptum est. Et propterea abso- num est affectum hunc referre ventriculi, intestinorum, hepatis, aut venarū, quæ in mesenterio sunt, seu earum, quæ ab hepate exortæ ad renes tendunt imbecillitati, neque etiam vesicæ, Nam neque ea a renibus vrinam trahit sed ipsi per vterque excernendo in vesicam mittunt, quemadmodum neque intestina a ventriculo attrahunt, vt patet eodem 6. de loc. affect. Reliquum itaque est postquam renes ipsi, id quod aquosum in sanguine, est, ad se allici- unt in hac affectione eorum potius imbecillitas accusanda, sit & non aliarum partium, per quas potus transire solet, ex eiusdem Gal. testimonio præcitato lib. 6. de loc. affect. Modus autem generationis eius est, quoniam imprimis re- nes trahunt sanguinis serum ex venis, que cum totum attraxerint, videaturq; sanguis in venis huiusmodi humiditate spoliatus, exiccata, tum vasa humo-

Cur diuersimode de affectio nun cupetur.

6. de loc. af. c. 2 & 3.

1. de cris. ca. 12. post prin.

Lib. de diff. sym- pto. c. ult.

Lib. 6. de loc. affect. c. 2. & 3. Diabetes quid sit.

Ca. 2. & 3.

1. de cris. c. 12

5. de loc. af. c. 7. 3. de nat. facu. c. 13.

Cap. 2

Quæ pars affe- cta sit in diabe- te.

Loco citato.

Modus genera- tionis eius.

rem trahunt ex hepate, deinde hoc ex intestinis, & ventriculo. Cum vero exiccata fuerint venæ, quæ in ore ventriculi sunt, porum desiderant homo deinde exhibita portione, venæ ex hepate ad ventriculum venientes, utpote aride totam rapiunt, atque ex his aliæ deinceps, donec ad renes perveniat transumptio per eorundem attractionem facta. Est itaque diabetes proprius renum affectus, qui canine in ore ventriculi cupiditati proportionem respondet, accedente præterea retentricis facultatis imbecillitate, utpote quæ continere diutius urinam non valeat, quemadmodum eodem 6. de loc. affect. à Gal. decretum est. Atqui obiiciet quispiam, cum infirmi fuerint renes, quomodo fieri potest, ut tam celeriter urinam ad sese attrahant? An dicere possumus ex Gal. quod quemadmodum in ventriculo quibusdam lentericis vehementissima excitatur ciborum cupiditas, ita in renibus quoque cupiditatem simul oriri, atque hanc ob causam eos urinam per concauam venam ad sese trahere, sed illico ab attractionis impetu grauari censendum est. Vnde licet infirmi fuerint renes, propter ingentem, quam habent serosæ humiditatis cupiditatem, cum assatim attrahunt, ac deinde cum eandem continere non valeant, in vesicam impellere coguntur. Est itaque affectus hic symptoma in genere excretorum immodice, ut liquet lib. de differ. sympt. excedens à naturali statu, nedum quantitate, sed qualitate: idque noxam functionum consequitur ipsorum renum. Nanque ad eos pertinere affectionem hanc supra demonstrauimus. Verum cuius nam eorundem renum facultatis læsio fuerit inquirendum est. Nanque Gal. præcitato lib. 8. de loc. affect. asserere videtur, tum attracticem, cum etiam retentricem eorum facultatem oblesam esse. Lib. vero primo de Cris. virtutem retentricem simul, atque etiam alteratricem eorundem renum extinctas, seu ablatas esse in hac affectione asserit, dum dixit: Verum hæc passio talis est, qualis circa aluum leuitas intestinorum, extinctio, ut diceret quispiam vtriusque virtutis, & retentricis, & alteratricis. Deinde post pauca concludit; Id circo pessimum esse affectum urinæ profluvium, quando duplex est vitium: At si fas est verum fateri, ubique locorum Gal. veritatem conscripsit, Nam ut hæc generetur affectio, necessum est, ut ipsi renes assatim humiditatem serosam attrahant, eorum vehementi cupiditate præcedente, aliàs nullo omnino insignis urinæ copia ad renes perveniret. Accedit præterea retentricis facultatis imbecillitas, quoniam citra hanc non tanta celeritate sequeretur urinæ profluvium, quamuis multa copia eiusdem ad renes perveniant, propter cuius facultatis imbecillitatem, cum ea detinere non valeat tanto tempore, quanto indigeret, alteratrix facultas pro eius alteratione, ex consequenti sequitur & eiusdem alterationis ablatio; quo fit, ut id, quod biberunt laborantes, exuberanter reddant, eo a sua qualitate non mutato. Tres denique facultates offensa sunt in urinæ profluvio, Attractrix videlicet, Retentrix, & Alteratrix ipsorum renum. Verum attractrix primo, & deprauata, quoniam immoderate attrahit: & propterea similit Gal. hanc renum appetentiam, propter quam attrahunt, cupiditati in ore ventriculi, cum canina molestatur appetentia. Subsequitur deinceps retentricis facultatis noxa, quæ adeo imbecilla existit, ut ablata dici possit: Hanc eandem consequitur & alteratricis ipsorum, ablatio, seu extinctio, Cuius licet non meminerit lib. 6. de loc. affect. In eius tamen verbis comprehenditur, cum dixit, quod infirmi in hac affectione exuberanter id, quod biberunt reddunt, eo a sua qualitate non mutato. Si quis autem inficias ibit, Pauli verba in medium ducens, ubi habet, Origo ipsius ex retentricis renum facultatis impotentia contrahitur, attractricis autem tanto robore ut totum corpus ob immodicum calorem exhauriat, volens per hæc verba, quod attractrix renū facultas non fuerit in hac affectione oblesæ, propterea quod eam robustam esse

Loco citato,
Dubium,
Solutio.

Quis affectus
præter naturam
sit diabetes,
Cap. ult.

6. de loc. aff. c. 3
1. de cris. c. 12
Quæ renum facultas in diabete oblesæ sit.

Conciliantur di
versæ Gal. senten
tiæ.

Quod tres diuer
sæ renum facultates oblesantur
in diabete con
cluditur.
6. de loc. aff. c. 3

Loco citato,

Dubium.

se Paulus asserat. Dicimus non propterea in offensam esse eandem facultatem, quia immoderate attrahat: Nec propterea facultas simpliciter robusta appellanda erit, cum immoderate operetur, Nanque sanitas in commode ratione consistit, Nec Paulus simpliciter eam robustam, ac sanam esse fateatur, immò egram, & oblesam esse, dum dixit, tanto robore, ut totum corpus ob immodicum calorem exhauriat. Id quod etiam declarauit Aetius, dum ait, ceterum proprius renum affectus diabetes existit, qui videlicet immoderate humorem appetunt, Nec minus & Alex. idem confirmauit cap. 8. lib. 9. inquit, Fit autem ob retentricis renum facultatis imbecillitatem, & propter attractricis robur, quæ ob caliditatem, non humore solum venarum sed etiam totius corporis immoderatus attrahere compellitur. Concomitatur autem eos, qui prædicta affectione laborant, pertinax sitis, adeo ut neque vlla satietas ex alicuius liquoris exhibitione contingat, aliquando & sitis supra sitim inexplebiliter egros vrget, hoc est, ut assidue potum assumere cogantur, Neque tamen satiantur, propterea quod citissime per lotium expellitur potatum, idem inquit Aetius. quod vero subinde bibentes egri exuberanter quoque reddunt id, quod biberunt, eo a sua qualitate non mutato, liquet apud Gal. eodem 6. de loc. affect. Viscera quoque ipsis vri videntur, anxii sunt, ac animo dubii, & non longe post moriuntur: igne amplius ardere se putant, acceditque sitis, & mictio festina, & quamuis aliquando parum per vrinam retineant, intumescunt lumbi: testes, & coxæ. Quod si adhuc amplius mordens caliditas in visceribus augeatur, superior venter corrugatur, & venter in ipso eleuantur: vniuersum habitum gracilem habent, & tabes totius corporis grauis accedit, quemadmodum idem Aetius, ex Aretei auctoritate scriptum reliquit, præcitato loco. Hæc autem functionum noxa ob immodicam ipsorum renum caliditatem exoritur, quemadmodum ab Alex. a. & Paulo decretum est. Quapropter aduersus hanc vtrique pugnandum esse scriptum reliquerunt. Aetius vero viciosos humores in ipso renum corpore imbibitos affectionem hanc inducere testatur: Ut vero hi concilientur, asserendum est interim atque viciosorum succorum redundantia ob calidam renum immodicam intemperiem affectionem ipsam oriri, velut Paulus, & Alex. testantur: quandoque vero cum eorundem humorum præsentia, vbi in renu corpore fuerint imbibiti (ut Aetio visum est) qui, aut biliosi, aut pituitosi falsi erunt. At si calida duntaxat aderit intemperies, haud ægre dignosci poterit. Similiter, si iam dicti humores in renibus, aut in vniuerso corpore redundant, ex his quæ in præcedentibus sæpius conscripsimus. Reliquum est, ut ad eiusdem prognostica transeamus, quorum primum ex Alex. colligitur quod magnopere attendendum est pro eiusdem curatione, Nam ob immodicam renum caliditatem, non solum humores venarum, verum etiam totius corporis immoderatus attrahere compellitur, ut ipse inquit, & propterea totius corporis siccitas, & tabes diuturnitate temporis necessario consequitur, potissimum quia hæc affectio paulatim, cum inceperit, increscit, ut eius principium, & incrementum vix percipiantur, sed dum ad statum peruenerit, adeo ut videatur subito aduenire, Gal. teste 6. de loc. aff. propterea quod renum desiderium non animale, veluti ventriculi est, sed naturale. Quod vero pessimum sit vitium vri neque profluium, quoniam duplex est, ex Gal. constat li. 1. de cris. etenim quanto plures instrumentorum cuiusque generis actiones, & vires impeditæ fuerint aut ex toto perierint, tanto deterior est morbus, ut ipse refert. Pro cuius curatione, (ut liquet ex eodem Paulo, & Alex.) aduersus immodicum renu calorem purgandum est, refrigerando quidem partem, & confirmando, ceterum perando autem totum corpus, & humectando, quoniam id necessario siccum ob largam vrinam excretionem deprehenditur. At Aetius qui non nudam

Solatio.

Quibus indole
diabetes digno
scatur.

cap. 3. circa me

Causæ.

Prognostica.

Cap. 3

cap. 12.
Curandi metho
dus.

Ratio uictus,

voluit esse calidam renum intemperiem diabetis causam, inquit. Scopus igitur in curationibus nobis sit, ut humorum acrimoniam deleamus, sanguinemque, ac cum eo permixtum serosum humorem ad motum tardiores redamus, & renum intemperiem corrigamus. Vtunque tamen sit, Aer eligatur ad frigidum, & humidum vergens. Somnus præcipiatur solito longior. Exercitium, & immodicus motus vitetur, sed quies iniungatur, Alius sit lenis natura, vel arte, Nam iecur calidius euadens in hac affectione ventrem ficciorem efficit dum ciborum humiditatem attrahit, & exhaurit. Vident animi affectus immoderatos, cibi eliguntur, qui difficulter conficiuntur, nec liquidi sint (ut ait Paulus) nec facile in urinam conuertantur, attenuenturque, Alex. teste, sintque crassi, bonique succi, mordacitate carentes, & qui acrimoniam obtundere possint, ac frigidi, ex sententia Aetii, In quantitate etiam necessario copiosiores exhibeantur, & crassi, ut perdurare possint, ex Alex. decreto. Propterea inter carnes, suillæ macræ, & probe coctæ conueniunt, potissimum pedes, & rostra, item leporum, & capreolorum, pedes item vitulini, hædorum, ac castratorum: caseus recens compactus citra salem, & lac per filices aut ferrum ignitum scissum, seroso humore adempto: oua etiam sorbilia: & ex oleis intubum, seris, portulaca, aut lactuca. Inter pisces saxatiles eligantur. Inter fructus pyra, poma, mala punica: similiter castaneas comedere alienum non est, Alex. teste. Vitanda sunt salsa omnia, & acris, nemoque in iuscula iniciat aut anisum, aut cuminum, aut huiusmodi aliquod semel, vel ea, quæ urinas prouocant, ex Alexen. decreto. Potio quoque his solita amplior dari debet, ut neque in totum sitim fieri permittamus, sitque eadem frigida, eligaturque vinum rufum, crassum, frigida amplius dilutum: Nanque vinum corporis miscellam ad dulcorem permutat, (Aetio teste) & omnes humores optimos reddit, ex Gal. com. aph. 5 6 7. lib. Poterit insuper pro potu exhiberi aqua hordei, ex tosto hordeo confecta, aut succus malorum punicorum cum frigida permixtus, vel decoctum myrtillorum pomorum, seu pyrorum astringentium, & pro sorbitione prisanæ succus frigidus, similago, & alica ad sorbitionis formam apparatus probantur, ex auctoritate eiusdem Aetii. Cæterum mox, ubi occeperit malum, nondum ad perfectionem progressum, optimum est cubiti venam secare, & moderate sanguinem auferre, ex eiusdem Aetii, & Pauli sententia; Et ubi in renum corpore vitiosi fuerint imbibiti humores, utendum est etiam mediocriter urinam cientibus, quæ vitiatum in renes imbibitum humorem repurgare possint. Verum si inueteratum sit malum: neque venæ sectio adhiberi debet, nec quicquam exhiberi, quod urinam cit, Concidunt enim in inueteratis vires, & ex venæ incisione totum corpus acius redditur, & urinam cientia in ipsis multiplicat malum, quemadmodum maximum huic affectioni remedium est, ut statim potatum renouatur: sit autem perquam frigidus ipse potus, ut liquet ab Aetio, & Paulo. At ubi vitiosi in toto redundarint succi, quod purgante medicamento utendum sit, nemini in dubium venit, eis prius concoctis, ac præparatis ex syr. rosaceo, myrtino, & nymphæa, violaceo, aut eo, qui ex succo borraginis paratur, seu oxalidis: Sit autem purgans medicamentum lene, quod bilem, aut salsam pituitam cum quapiam alteratione, ac astrictione expurgare valet: veluti est mel rosidum, casia fistula, tamarindi, myrobalani tum citrinæ, tum chebulæ, sy. ex pluribus infusionibus rosarum, saccharum, violaceum, & interm diacatah. Ex his itaque poterit purgans medicamentum parari, quibusdam eorum simul permixtis, pro ut usus postulat: materia etiam ipsa ad exudationem diuertenda est: optima vero erit (ut inquit Areteus) in dolio facta euaporatio ad exudandum, eo modo, ut caput extra dolium promineat, frigidumque aerem attrahat. Reliquum vero corpus omne calefiat. in cuius vicem non parum confert

Venæ sectio,

Purgatio,

Balnea,

confert naturale balneum, quod apud Puteolos reperitur, (balneolum appellatum) Nam ex eo, nedum materia ipsa ad exudationem diuertitur, verum renes ipsi corroborantur. Ab ipso autem, & ante ipsum ex aliquo infra scriptorum medicamentorum illiniri poterunt renes. A balneo item vnc. i. vel. i. sacchari rosacei cum lib. s. aut lib. i. aquæ hordei prius torrefacti, & oxalidis tribuatur, quæ curationis via huc vsque reliquis ritè adhibitis diuersis in temporibus duos perfecte curari, Excellentem videlicet Ioannem Franciscum Carrafam, & magnificum Vicentium Marcellum. At vbi hæc non suffecerint, aut ex calida dūtaxat renum intemperie ortum fuerit vrinæ profluvium sanguinariæ succus ex vino nigro assidue præbeatur, sententia Pauli. & Aetii. Similiter palmularum, aut baccarum myrti dilutum, & etiam pyrorum ac symphiti cremor. Nec minus conferunt vermes terreni ex aliquo prædictorum succorum decocti: syr. item ex omphacio, è ribes, myrtinus, ex infusione rosarum, & oxalidis succo, seu plantaginis, vel portulacæ exhiberi poterunt. Similiter pastilli de spodio, vel terra lemnia, seu de succino. Quod si prædicta auxilia frustra adhibeantur, affectioque ipsa augeat, non absurdum fuerit etiam stuporem inducentibus vti, ex Aetii decreto. In quem usum scruii. ii. vel 3. i. Philonii perfici, seu romani, vel nouellæ theriacæ cum polygoni succo, seu decocto, ac paucio vino nigro præbeto. Extrinsecus autem ad lumbos seu renes pectinem, & hyrocondrium præsertim dextrum illitiones, vnguenta, ac cataplasmata refrigerantia adhibenda sunt, eodem Paulo, & Aetio testibus, In quem usum ex oleo rosaceo omphacino, præcipue cytoniorum, & myrtino, adhuc etiam ex oleo de papauere, seu de nymphæa cum paucio aceto, ac cera illinitio confert. Vel hunc in modum vnguentum componas iecori adhibendum: Sandalorum omnium excipe 3. ii. succi plantaginis, & cichorii, cuiuslibet vnc. i. olei rosacei, & myrtini an. vnc. i. s. ceræ, & aceti parum, fiat vnguentum. Renibus autem, & pectini infra scriptum adhibeatur, quod recipit succi lactucæ, & portulacæ, ac foliorum pampinorum vitis, seu solani, seu vmbilici veneris, singul. vnc. i. farinæ hordei vnc. s. gummi draganti infusi in aqua rosacea 3. iii. cremoris seminum cytoniorum 3. iii. olei rosacei myrtini, & de nymphæa ana vnc. i. hypocistidis, balaustiorum, corallorum rubeorum & rhu obsoniorum ana scrup. ii. aceti, & ceræ parum, fiat vnguentum. Pro cessu etiam temporis adici poterit papaueris succus, seu hyosciini, cremor etiam seminum papaueris, & oleum eiusdem. Et si maior cataplasmatibus magis vti, folia recipe hyosciami, & papaueris, solani, ac rosarum singul. manip. i. portulacæ vmbilici veneris cuiuslibet manip. s. cremor, seminum papaueris & cotoneorum 3. iii. farinæ hordeaceæ P. i. s. sandalorum, & corallorum rubeorum, ac balaustiorum, singul. 3. i. olei rosacei, myrtini, & cytoniorum ana vnc. i. quæ contundenda sunt, contundantur, misceantur, & cum succo solani, seu foliorum vitis cataplasma fiat paucio aceto addito, quibus etiam adiacere poteris, ubi hæc non suffecerint ea, quæ magis torporem inducunt, pariter & quæ ualidius astringunt. Nec minus, si libeat, poteris ex eiusdem emplastra conficere. Infunditur etiam utiliter eisdem oleum, in quo uermes terreni sint decocti, aut aliquod ex soporiferis medicamentis, ex sententia Aetii.

Quæ demum de uoranda sint.

Anodyna,

Topica,

περί αἱμορραγίας νεφρῶν.

id est de sanguinis renum profluvio. Cap. 93.

Cum trifariam sint alimenti instrumenta, ut liquet 4. de usu part. Nam quædam sunt prima, & principalissima, quæ scilicet concoquunt, utiq; alimentū aliis transmittunt; quædam & Secunda, quæ expurgat quæ deducunt, & quæ excrementum excipiunt: & Tertia sunt, quæ excernē
dis

Ca. 14. in primis

Cap. 6. & 7

Quod renes in
hac affectioe ob
stantur, signa.
6. de loc. affect.
cap. 2
3. de cau. symp.
6. 2. circa finem

Affectu: prae
naturā quis sit
affectio hac.
De dif. sympt.
Cap. ultimo.
3. de cau. symp.
cap. 2
Si tenuis sanies
sanguinis minga
tur, causae
Cap. 2. & 3.

dis excrementis sunt destinata, adhuc genere duplicia existentia, ut ibidem patet inter ea, quae secundo loco connumerauimus, renes quod contineantur, palam est: sunt etenim instrumenta sanguinem purgantia id, quod aquosum in eo, est, secernentes ut diximus. Verum cum id non per admodum tenuia, atque prorsus, angusta vasa, velut vtraque vesica, attrahant, sed per duo admodum magna, ac ampla: quorum alterum oritur ab arteria, quae spinæ incubat: Alterum à vena caua. Iure putandum est id excrementum non purum, atque exacte syncerum trahere, sed diuersi cuiusdam alterius generis admixtione adulteratum, atque permixtum. Nam multum quidem bilis flauæ, ac multum, sanguinis præsertim quod in eo humidius est, ac tenuius attrahunt. Verum biliosi excrementi, quicquid non admodum crassum fuerit, cum vrinis permeat. sanguis vero carni ipsi renum aspergitur, instar facis cuiusdam. Inde iam paulatim vaporis modo in totam ipsam inspergitur, adhærescit, vnitur, atque demum alimentum fit renibus. Et propterea, ne cum urinis per aliquod foraminum, quæ in dictis renibus habentur, quemadmodum tenue biliosum, ita & sanguis elaberetur, præstitit eorum corpus densum esse: licet id quoque ad facilem huius humidi attractionem conferat, quæ admodum ab eodem Gal. præcitato lib. 5. de usu part. scriptum est. Accidit autem interdum simul cum ipsis vrinis propter eorundem renum imbecillitatem, aut aliam quampiam causam, ut idemmet tenuis sanguis elabatur: & propterea tenuis quædam sanguinis sanies mingatur, similis excrementis, quæ in hepaticorum affectuum initio excernuntur: Nisi quod magis videtur cruenta. Hanc affectionem græci αἱμορροαίαν νεφρῶν, latini sanguinis renum profluum nuncupant, Quamquam ubi per circuitum quendam, quemadmodum ora venarum in ano extantium αἱμορροΐδας dicunt, renes sanguinis profluuio laborent, sic etiam appellent, ut patet ex Paulo cap. 45. lib. 3. & Aetio cap. 2 & 3. lib. 1. 1. quinimo, si propter rupturam, vel erosionem venarum in renibus consistentium eueniat tale sanguinis profluum, haud aliter nominandus erit talis affectus, ex eiusdem Aetii testimonio, ita ut quomolibet, qualiscunque sanguis à renibus cum vrinis excernatur, eorundem sanguinis profluum nominare licebit. Quod vero renes afficiantur, cum tenuis sanies sanguinis mingitur, ac ad eos attineat hæc affectio, liquet apud Gal. 6. de loc. affect. & 3. de caus. sympt. Horum nanque (ut diximus) munus existit, hanc tenuem sanguinis saniem secernere, eaq; nutriri: quod si ea non nutrantur, eosdem lãsos esse palam existit. Nec minus, si per circuitus quosdam sanguis profluat, manifestum erit, tum è renibus excerni, eo quod ipsi ægri excreari sanguinis transitum iuxta renum locum sæpe sensu percipiunt, & maxime cum vrinæ admixtus sanguis reperitur, Aetio teste præcitato cap. 3. lib. 1. 1. Quod si contingat propter vasorum rupturam à renibus sanguinem mingi, ex eo, quod repente profluat, renes affectos esse diiudicabis, Hipp. auctore aph. 78. 4. lib. cum dixit. Quicunque sponte sanguinem mingunt, iis à renibus venula rupta significatur. Ab erosionem vero profluens, ex dolore cum posito liquido renes affectos esse argui poterit. Cunctæ autem iam dictæ differentię quatuor symptomata sunt in genere excretorum immodice toto genere præter naturam, ut liquet lib. de differ. & 3. de caus. symp. quamquam ob diuersas renum dispositiones consequantur. Nanque si sanguis nolentum serum mingatur, eius causa erit dispositio haud ab similibis ei, qualem in iecore diximus imbecillitatem esse. Insuper cum ora, aut meatus, ut cunque nominare voluerit, per quos ex concaua vena in renes vrina percolatur, supramodum dilatantur, Gal. auctore eodem 6. de loc. affect. admodum tamen tenuis. & aquosus erit sanguis. Si propter renum imbecillitatem excernatur, similis excrementis, quæ in hepaticorum affectuum initio excernuntur

nuntur, nisi quod tenuis hæc sanies sanguinis magis cruenta videtur, vt 6. Cap. 7. de loc. affect. scriptum est. Eritq; cum noxa functionis, tum retentricis, tum etiam alteratricis ipsorum renum: quæ ex aliqua intemperie ortum habebit. Ad morbum itaque in intemperie consequitur tale sanguinis profluuiū. At si propter amplitudinem osculorum vasorum fiat, vrinam ad renes excolantium: Erit iam dicti symptomatis causa morbus in via, eaque dilatata. idque percipies, quoniam ne dum tenuis sanies sanguinis meietur, sed quidam etiam ex sanguine venæ laxatum emittunt, & alia itidem crassa adeo, vt postquam ea, quæ mixta sunt, constiterint, subsidencia quædam in vase reperiantur, & superne quædam concreta, maxime pulmonem similitudine referentia: concocto, ac distributo cibo in venas, & nihil, aut omnino parum dolent egri, eiectionq; lotio leuati melius habent, vt Aetio visum est. Lib. 11. c. 2. neque vniuersum ora vasorum aperta sanguinem effundunt, præsertim cum apertio parua fuerit, sed paulatim, atque tenui ore percolatum, eodem Gale. Dubium, teste præcitato com. apho. 78. 4. lib. Sed mox non ab re quæret quispiam, Nam inter sanguinis profluvia contineatur hæc serosi sanguinis excretio. Item cū ex vasis sanguis profluat, propter eorum rupturam, seu erosionem, vel propter refectionem vel διαρρηξιν, quo nam istorum modorum hæc tenuis sanguinis sanies profluat? An quoniam diapedesis bifariam oriri contingit tunica siquidem ipsa vasorum rarefacta, & sanguine tenuato, vel ex gracilium vasorum ore adaperto, vt liquet 5. metho. mede. Dicimus nos, quod vbi fiat ex exiguum vasorum adapertione, tale serosi sanguinis profluuium sub anastomasi continetur. Vbi vero propter debilitatem ipsorum renum prædictū sanguinis serum meitur, improprie sanguinis, proprie vero seri profluuium dicitur, Nanque sanguinolentum serum est, quod excernitur, ex Gal. sententia 3. de caus. sympto. quo loco, propter iam dictam causam, sanguinis diapedesin. tanquam quartum genus excretionis omnino excipit, quemadmodum etiam ca. de cruenta spuitione adnotauimus. Sanguis vero per circuitum excretus ab ipsis renibus, non minus symptoma est in genere excretorum immodice, ac ad eorundem vasorum refectionem consequitur: nec circa initia aderit noxa alicuius facultatis dictorum renum, sed ab excretice facultate (quemadmodum per hæmorrhoidas fieri contingit) sanguis excernitur. Quapropter circa initia citra vllum aliquem dolorem expellitur: leuantur ægri propter eius excretionem, & fortiores fiunt. Vbi vero diuturnior fuerit affectio, absque læsione retentricis eorum facultatis fieri non poterit. Dignosces autem affectionem hanc, quoniam excreti sanguinis ipsi ægri transitum iuxta renū locum sæpe percipiunt. Item quoniam vrinæ admixtus sanguis reperitur, præcessitq; victus ratio multum sanguinem generans, aut consueti alicuius exercitij omisio, seu cuiusdam membri mutilatio, aut quæpiam alia naturalis cruenta excretio præter naturam retenta est. Similiter si propter rupturam in renibus sanguinis profluuiū fiat, symptoma erit, vt reliqua solutionem continui consequens: Eritque is affatim purus, & multus excretus, ac repente, vt superius dictum est, seruabitq; naturalem sanguinis colorem. Cuius causa, & ipsius sanguinis copia erit, aut propterea quod graue onus leuauit quispiam, seu valde saltarit, aut ex alto ceciderit, vel aliud quidquam tale violentum pertulerit, vt liquet ex Gal. com. præcitati apho. 78. 4. lib. & Aetio præcitato loco. Idem quoque symptoma erit, si per erosionem vasorum renum, sanguis excernatur, insequiturque dictorum vasorum continui solutionem, quoniam exulcerationem, seu erosionem. Is tamen sanguis sensim, & paulatim excernetur: dolor renes excruciet, aderuntque alia erosionis, siue exulcerationis inditia. Causam habebit acres succos ex supernis defluentes, vt susius declarabimus sequenti cap. de vlcere renum. Qui autem propter renum imbecil-

Lib. 11. c. 2

Dubium,

Resolutio,

Cap. 2.

Cap. 2

Causæ si per circuitum sanguis mingatur, & signa,

Si propter rupturam,

Aet. lib. 11. c. 3
Si per erosionem

- Prognostica,** imbecillitatem, aut eorundem vasorum refectionem, tenuis sanguinis serum mingunt, non negligenter tractandi sunt, sed magna cum diligentia circa initia eos curare oportet: Nam temporis progressu extenuantur, & emaciantur omnes, & magis adhuc ii, qui plus sanguinis mictu excernunt, Aetio auctore. Neque etiam despiciendi sunt, qui per circuitus sanguinem è renibus excernunt. Nam licet in principio, propterea quod citra vllum aliquem dolorem excernitur, Nihil in totum mali formicent egri, Vbi tamen diuturnior fuerit affectio, & aliquando cohibeatur, quod pro more excerni consuevit, grauitatem inducit, aliorumque pessimorum morborum causa existit, sanguine nimirum ad alias particulas dilabente: qua ratione articulares affectiones in aliquibus accidunt, aut vertigines, aut deliria, & insanix, aut oculorum cæcitates, vt plurimum vero in malum corporis habitum, & hydropem, delatendi aptitudo inde oboritur, eodem Aetio teste. Si vero ob venam ruptam sanguis profluat, quam celerrime etiam præsidia adhibere oportet, Nam verendum est, ne ob nimiam sanguinis copiam excretam, corpus totum inaniatur, ac infrigidetur, & propterea in lypothymiam, syncopen, & demum in mortem incidant, aut propter concretum sanguinem, & in grumum versum, si in vesica detineatur, timor est, ne omnino vrina supprimatur, consequaturque etiam animi defectio, & color pallidus, ac reliqua praua symptomata, quæ ad grumos vocatos sequi solent, vt apud Gale. 6. de loc. affect. At is, qui per erosionem sanguis meitur, quam celerrime circa initia curari debet. Nam temporis processu difficilioris curationis existet, quemadmodum cap. de renum exulceratione dicemus. Quantum vero ad curationem spectat, similis victus ratio instituenda erit, quam cap. de cruenta spuitione præcipimus.
- Lib. 11, c. 2** Quo vero ad medicamentorum rationem attinet: ea primo conscribemus, quæ cruentæ excretioni per vrinam conferunt ortæ propter renum debilitatem, aut amplitudinem osculorum vrinas ad renes excolantium, licet ex Pauli auctoritate, eis quoque medicamentis vti possimus, quæ ad sanguinis sputum inscribuntur. Qua ratione a principio his conuenit quies, cibi astringentes, & vinum nigrum in potu, potissimum vbi vires imbeciles fuerint. Ab iis vero, quæ vrinam ciunt, & a coitu omnino abstinendum, vt inquit Aetius. maxime vero confert sanguinariæ succus, & radice symphiti decoctum: adhæc tragacanthus in vino nigro macerata, eodem auctore, Item cornu ceruini vti 3. i. ex vino, aut lapidis hæmaritæ 3. i. Nec non folia salicis trita cum vino, ramentorum loci arboris cremor, & radice spinæ albæ decoctum, vt eidem Aetio visum est. Paulus vero præter symphiti radicem, & tragacanthum vino maceratam, polygoni, & plantaginis succum cum posca commendauit. Ex quibus item succis cum saccharo syr. parari poterunt, pauco aceto addito, ac exhiberi, vel in eorum vicem syr. myrtinus, & de infusione rosarum siccarum præbeantur, eisdem insuper addere poteris 3. i. radice symphiti, cornu cerui vti, aut lapidis hæmatitæ, seu boli armenie præparatæ pauco aceto addito, aut prædictis pulueres cum oxysaccharo adhibeantur, & vbi non suffecerint cum prædictis syr. 3. i. ex pastillis de spodio, seu terræ leminæ vel de succino addere poteris, Nec minus confert, si cum posca exhibeantur. Extrinsecus autem renibus, & lumbis imponi poterunt ea, quæ ad sanguinis per sputum reiectiones sunt descripta, & quæcunque vna cum eo. quod astringunt, & resiccant, etiam robur addere possunt, vt inquit Aetius, Cuius farinæ sunt rubi folia, myrti, ac quercus, item myrti bacca, malicorum, & balaustrum, & perdicii folia, & similia (vt eidem Aetio visum est) cum posca, aut vino astringenti imposita. Ex quibus, ac aliis similibus simul permixtis omnibus, vel quibusdam poterunt etiam topica medicamenta hunc in modum
- Lib. citato, c. 3.**
- Cap. 3**
- Curatio si tenuis sanies sanguinis mingatur,**
- Potiones.**
Lib. citato c. 2.
- Aet. loco citato**
- Topici.**
- Loco citato.**

dum parari. Recipe foliorum rubi, myrtini, & quercus, singul. manip. s. malicorii, & balauſtiorum ana. 3. iii. farinæ hordei P. i. olei roſacei vnc. ii. cum poſca fiat cataplaſma: Aut recipe palmularum in vino aſtringenti, aut poſca decoctarum vnc. iii. foliorum plantaginis manip. i. gummi. tragacanthæ, & ſucci ſemperuini ana vnc. i. aluminis, acatiæ, hypociftidis, ſingul. 3. ij. olei myrtini, & roſacei ana vnc. i. s. farinæ hordei P. s. fiat cataplaſma: Si vero per circuitus quoſdam, aut propter venę repturam in renibus factam ſanguis excernatur, Conâdum eſt ſtatim in principio, vt ſanguinis impetus cohibeatur, Itaque venę ſectio in cubito commoda eſt eis, quibus ob venam ruptam ſanguis promanat ſtatim in principio. Is vero, qui per circuitum ſanguinem excernunt paulo ante circuitum adhibita, Aetio teſte: niſi etiam ſanguinis impetus vrgeat, accogat, vt cohibeatur. Nanque tunc etiam ipſo circuitu vena ſecanda erit. Cæterum ſanguinis detractiōem partiri melius erit, vt paulatim eius reuulſio, & diuerſo fiat, eodem Aetio auctore. Potiones item conueniunt hæmoptoicis aptæ, & quædam ex prædictis. Loci autem circa renes ſpongiis poſca imbutis irrigentur, aut linteis cum roſaceo, & aceto, ex eiſdem Aetii auctoritate. poſthæc vnguentis, emplaſtris, ac medicamentis reliquis tum ſuperius, tum ca. de cruenta ſputione de ſcriptis vtendum erit. Et vbi ſanguinis excretio ceſſauerit, diætā vtendum eſt. vnde non multus ſanguinis gignatur, maxime in his qui per circuitum excreuerunt, ſuntq; ſupernæ corporis partes aſidue exercendæ. In his vero, qui ob venâ ruptā ſanguinē mingūt, ſi exulceratio in locis relinquatur aut eadē exulceratio ob acres deſtuentes humores fuerit orta, & ſic ab eroſione venarum fuerit ortū ſanguinis profluuium, ipſā eroſionem, ſeu exulcerationem, poſt ſanguinis ſuppreſſionē curabimus per ea, quæ capite de exulceratione dicentur. Reliquum eſt, vt priuſquam huic capiti ſinem imponam, emplaſtrum optimū, ex Aetio conſcribam, quod recipit ceræ unc. i. s. vitellorum ouorum numero. ii. palmarum numero. 10. croci 3. i. (quanquam Aetius plus croci appoſuerit) aceti, & roſacei quantum ſatis eſt, miſceantur, & fiat emplaſtrum.

Si per circuitū,
aut propter ue-
næ rupturā ſan-
guis mingatur
Curatio.
Venę ſectio.
Lib. citato, 6, 3

Loco citato.
Reliqua medi-
camenta quę cō-
petant.
Eodem loco.

Eodem loco,

περὶ λιθιάσεως νεφρῶν.

id eſt de lapide renum.

Cap. 94.

NON raro autem accidit, vt renes ipſi, ſiue ſecundum eorum cauitatem ſiue ſubſtantiam, affectu quodam laborent, quem proprie græci νεφρῆτιν, ſiue λιθιάσιν appellant, quanquam νεφρῆτιν quoque nominare conſueuerunt, affectum omnem renum, ſiue ſimiliaris ſit, ſiue inſtrumētalis, ſiue communis proprie tamē ipſam intelligendo, nil aliud νεφρῆτις ſignificat, quam λιθίασιν, vt patet libr. de renum affectuum dignitione, ac curatione Galen. ſcripto, Latine autem calculi, ſiue lapidis morbum appellamus, quo morbo ex natura loci præter ipſos, non niſi veſica laborare ſolet, & vt quibuſdam viſum eſt, etiam colon: (Gale. auctore primo de loc. affect.) Affectus vero hic nil aliud eſt, quàm corpuſculum quoddam durum toto genere præter naturam inſtar lapidis, ſeu tophi, in ſubſtantia ſeu, ſinibus ipſorum renum genitum. Percipes autem in eo renes affectos eſſe ex dolore cum poſitu, qui iugiter in renum loco fixus, ac ſtabilis inſteſtabit in dextra parte, ſi dexter, In ſiniſtra vero, ſi ſiniſter fuerit affectus: Similiter è regione affecti renis ſtupor femoris aderit. Nam ſi dextrum femur ſtupor occupauerit, dexter renem, Si læuum, ſiniſter ægrotabit. Nec minus affectum renem coniicere poterimus ex retracto teſte, Nam ſi dexter teſticulus retrahatur, dextrum renem, ſi ſiniſter, ſiniſtrum pati argumento eſt. Idemque teſtis indolebit, Paulo auctore

In principio.

Ca. 5. circa fin.
Quid ſit affectus hic.
Quod renes afficiantur ſigna,

Pan. 13. c. 48

6. de mor. vulg.
commentario 1.
com. 5Lib. de renum
affectuum di-
gnot. paulo post
principium.
Cap. 8Quis affectus
præter naturā
sit, & quibus si-
gnis cognosca-
tur calculus.
6. de mor. vulg.
Loco citato.

2. de loc. affect.

Cap. 5

6. de loc. affect. 2

Loco citato.

Citato loco

Lib. 11. c. 4.

auctore. Id vero non nisi propter consensum vasorum dorso incumbentium caux scilicet venæ, ac magnæ arteriæ, quibus mediis tum crura, cum testes renibus consentiunt, ut in dissectionibus videre licet, ac liquet ex Gale. 6. de morb. vulg. & lib. de renum affectuum dignotione, ac curatione eidem ascripto. Reliqua vero inditia (quoniam & affectum ipsum indicabunt) id circo & in eiusdem cognitione eadem enarrabimus. Est namque affectus hic morbus in numero, proprie in excessu, toto genere præter naturam, Gal. auctore lib. de differ. morb. qui ex qualitate doloris primo percipi potest. Nam grauem in renibus laborantes dolorem, aculeique infixi instar sentiunt, ut liquet ex eodem Paulo. Hipp. vero quod in renem dolor adsit grauis, potissimum cum cibo impleti sunt 6. de morb. vulg. scriptum reliquit, per quem dolorem duo intelligi posse Gal. asserit, aut grauem, tanquam ali cuius grauis loco incumbens sensum inferentem, aut acerbum, etenim vtrumque verum est in renibus fieri, diuersis tamen temporibus. In calculorum namque creatione, atque exitu grauissime dolent, reliquo autem tempore, ut rei cuiuspiam grauis loco incumbentis dolorem percipiunt cum per exiguis nervis præditi sint, quamquam à doloris qualitate renum calculus cum impactus fuerit à coli dolore plane discerni non possit, nisi quis accidentia, quæ postea consequuntur expectauerit, ut liquet 2. & 6. de loc. affect. Ex citatur autem dolor hic in renibus, ut Hip. visum est, eo potissimum tempore, quo ægri cibo replentur, quod cunque per cibum significetur, cum duo in eius doctrina significare possit, assumpta videlicet cibaria, ex quibus sanguinis multitudo creatur: & alimenti recrementa, quæ in intestinis colliguntur, Gal. auctore, eodem 6. de morb. vulg. Inter initia quoque pituitosi vomitus sunt per peritonæum ipsis copulato ventriculo, in quo huiusmodi succus creatur, potissimum si crassi, naturaque pituitosiores extiterint laborantes. Verum ubi increuerit, perseveraueritque affectus ita patientibus vomitus æruginosus superuenit, ob dolores, ac vigilias corrupto sanguine. (ut Gal. inquit) idque maxime cum vna febris citauerint, & inedia macerati fuerint. A quibus vomitibus leuiiores ægri euadunt cum cibi euacuati sunt, & ab accessionibus quidem liberantur, sed non ab affectu, eodem Gal. teste, arenulæque; rubæ subsident, & cruentum meiunt: hæc ex Hipp. Cruentum autem meiunt, nedum propterea quod cum angulo sus sit egrediens calculus proximas particulas vulnerat, & cruorem euocat, Verum etiam quoniam si patentior fiat meatus ex vena caua in renem pertinens, ut præcedenti cap. docuimus, sanguis autem liquidus sit, neque multus, neque viscidus, cruentum, quoque ita lotium reddetur, ut eodem 6. de morb. vulg. Gal. scriptum reliquit, quamquam nephritici ab initio dilutas, purasque reddunt vrinas, deinde sequentibus diebus crassum aliquid in ipsis subsidere videtur, demum omnino arenosæ minguntur, ut 6. de loc. affect. 2. Gal. scriptum est, lapide vero cum vrina exeunte, & à dolore liberantur, & simul locus affectus manifestabitur, nullusque relinquetur quæstioni locus, ut idem Gal. inquit, nunquid videlicet coli, vel renum partes affectæ fuerint. Ut vero Aetio. visum est in prædicto affectu accedit ægris loci dolor, tumore nusquam foris apparente, nisi inflammatio per lapillos producat, spina ægre flecti potest, & totum corpus admodum pigrum est, crura torpent, & maxime crus reni affecto propinquum: vrinæ circa obturationis principium pauca, aquosæ minguntur, postea vero perfecta earum suppressio contingit; alius nihil excernit, verum promptitudines multas ad egerendum facit; excernitur etiam aliquando sanguis propter violentiam calculorum, præsertim asperorum. Cæterum ubi lapis à renibus fuerit emotus, & ad vesicam delatus vrinæ multæ prodeunt arenosam subsidentiam habentes, & alius similiter large egerit. Sensum autem æger percipit veluti calculo à renibus ad vesicam transiente:

transeunte: Quibus vero inditijs renum dolor à colli dolore secernendus sit, à Gal. præcitato lib. 6. de loc. affect. decretum est, & nos cap. de colli dolore suis conscripsimus. Reliquum est ut eiusdem calculi causas, materialem potissimum, ac efficientem reperiamus. A materiali exordientes, hanc crassum, terreumque humorem esse a Paulo præcitato cap. 45. li. decretum est. Quod vero calculi originem ducant ex materia crassa ac tenaci, modo crassitudinem maiorem, modo tenacitatem, ac modo vtrunque partibus portionibus habente eodem 6. de morb. vulg. testatur Galen. & lib. de renum affectorum dignitione, ac curatione: quanquam etiam ex purulento humore aut ex purulento, pituitosioreque composito, (quem admodum & in articularum morbis euenire consuevit) nonnunquam tophi in animalis corpore creari possint ac similiter in renibus lapides concrevere, vt idem Gal. testatur. Vbi autem ex sola pituita crassa, & viscida calculus fuerit ortis, vrinarum subsidentia similis colorum aliorum tophorum, qui in aquis sponte calidis multis in regionibus lapidibus ad nasci, accrescereque cernuntur, cinerei erit coloris: Verum vbi parum sanguinis cum pituita crassa, & lenta mixtum sit, vrinarum subsidentie color pro succi maiori copia euadet: nonnunquam veluti ex pallido, alboque mixtus aut ex rubro, & albo, aut ex flauro, & albo: nunquam vero & rufus erit, pariter quoque & arenulæ, quæ in vrinis subsident, ipso siquidem sanguinis colore ad colorum differentias faciente, qui neque hominibus exquisitè ruber semper est, sed interdum quidem ad atrius, interdum ad flauius, & rufius vergit, eodem Gal. teste: quo sicut & ipsi etiam lapides inter se colore reperiantur differentes, similiter & arenulæ in vrinis subsidentes ob diuersam materiam, ex quibus fiunt: nigri enim, & subalbidi, & pallidi reperiuntur, vt inquit Aetius, quandoque etiam & rufi reuera, id quod sæpius accidit: & propterea Hip. arenulas rufas in vrinis subsidere asseruit, tanquam eo sæpius contingente: Quanquam per rufum colorem potuit omnes iam dictus intelligere præter cinereum, ut testatur Gale. Non ab re itaque Aetius materialem causam generationis calculorum assiduas esse cruditas inquit, Vnde materie incoctæ, ac crudæ multitudo congregatur, & Alex. simul cum Gal. humores crassos, ac lenros esse fatetur, cap. 4. lib. 9. quandoque solos existentes, interim exiguo sanguini permixtos. Effectrix vero eorum causa est ignea renum caliditas, vt inquit Alexan. & Paulus seu ardor circa renes, vt fatetur Aetius. A frigore autem ipsi generari non valent, nanque fieri non potest vt viuo corpori tantum frigus accideret, quo concrevere valeat in homine lapidis quemadmodum fieri in externis videmus, ut liquet eodem lib. de renum affectorum dignitione, ac curatione: quanquam non semper ex eodem calore, sed quandoque vehementi, interim autem non ita vehementi procreentur, prout eorum materia magis apta est vt induretur, ob quam etiam caliditatis diuersitatem lapides quoque colore differunt. Locus autem generationis eorum renes sunt, ac (vt quibusdam vsus est) in eorum duntaxat cavitatibus concrevunt: Verum nos cū Hip. & Gal. tum. li. 2. de nat. humana, tum 6. de morb. vulg. ac lib. de renum affectorum dignotione, ac curatione absque controuersia tenemus eos, nedum in renum sinibus posse concrevere, verum etiam & in eorum, carnibus procreari. Et quod quocunque loco generationem habeant, in renem adlit grauis dolor, siue per grauem acerbis significetur, siue tanquam alicuius grauis loco incumbentis sensum inferentem intelligamus, diuersis tamen temporibus. Nam si in renem cauis fuerint orti, in solo per vrinarios meatus transitu grauidissime dolent laborantes. Si vero in ipsa renum carne fuerint creati, non solum inter exeundem, verum etiam creationis tempore dolorem inferunt. Pariter & quando in renum sinus peruadunt. Modus autem generationis talis existit

Cap. 7

Materialis causa calculi.

6. de mor. vulg.
Loco citato.
Lib. de ren. aff.
dig. in prin.

Loco citato.

Effectrix causa calculi.

Loco citato.

Qua parte renū calculi generantur.
2. de nat. hum.
tex. 18
6. de morb. vulg.
& li. de ren. aff.
dign. locis citatis.

Modus genera-
tionis calculi
in renibus.

Locus citatis.

Paulo post prin-
cipium.

Prognostica.

6. de morb. vulg.
Loco citato.

commentario 3.
com. 15
Aet. loco citato

Curatio.

Ratio uictus.

Commentar. 1
com. citato.

Aet. li. 11. c. 6

existit, Nam cum renes quicquid serosi, tenuisque cum sanguine in vasis per mixtum est, ad seipsos attrahunt, (vt superius demonstrauimus) meatibus id in renum ventriculos percolantibus latius patefactis, aliquid etiam ex crassioribus succis simul illabatur. quando igitur istud calefactum in renis cauis, ad topi consistentiam redactum fuerit, si renum vis expulsoia omne id vna cum lotio extruxerit arenosæ in ipso subsidentie fiunt. Quod si renis cauo impa-ctum tenacius inhærescat aliquid aliud eiusdem materiæ ex uena caua susci-piens, sibi que apponens, plus augetur: semper enim quod recens influit, prio-ri circundatur, atque ita insigni magnitudine topus grandescit, exusto, arefa-cto que crasso, & viscido humore, atque ad topi corpulentiam redacto. Cum vero in renum carnibus generantur proportione topis in articulorum mor-bo genitus correspondet, vt liquet ex Galen. Hippocratis auctoritate secun-do de natur. humana, & sexto de morb. vulg. Nam si idem sanguis, qui in re-nes deriuatur crassior, ac pituitosior seipso existens, seu etiam ad atram bilem vergens per uenas, & arterias in renum substantiam feratur quantitate, uel qualitate, aut consistentia excedens, astringitur, detentusque concipit calidi-tatem præter naturam, quæ amplius eum densat, agglutinat, & assat, assatumq; ipsum in terram, & lapidem commutat, quemadmodum si in cavitatē eorum delatus esset vtroque etenim modo lapides fieri posse in renibus clarum est, cum succus tenax, & crassus temperie aliquo assatur in iis, atque exiccatur, vt eodem lib. de renum affectorum dign. ac curatione scriptum est. Talis itaque est calculi in renibus generatio ex humoribus crassis, & viscosis, tanquam ex materia & ignea eorum caliditate tanquam efficientem, veluti etiam in ex-ternis videmus. Nam ex igne, & tali materia idonea Figuli omnia vasa cōfi-ciunt, ita vt ne ab aqua quidem vnquam dissolui possint, vt inquit Alexa. Af-fectus hic inter initia magna cum diligentia curari debet, nanque vbi perse-uerauerit, ac magnopere increuit ob dolores, ac vigilias sanguis corrumpitur, & eruginosus vomitus superuenit (Galen. auctore.) Vel magnum imminet pe-riculum, ne vires à vigiliis, & constanti dolore deiciantur, vt inquit Alexan. Quod vero in adultis, ac in declinante potius ætate magis, quam pueris re-num hic affectus contingat, idem Galen. testatur sexto de morb. vulg. quemad-modum vesicæ calculis pueri frequentius quam ætate prouecti, vt fatetur Ae-tius: idque non nisi ob diuersitatem caloris, qui in adultis crassos succos co-git, atque inspissat, in pueris vero fundit, atque dissoluit, quemadmodum fu-sius cap. de lapide vesicæ declarabimus. In renibus vero consistunt lapides aut parui, aut maiores, & aliquando quidem pauciores, aliquando plures magni-tudine, & forma, colore, & asperitate, & multitudine inter se differentes. Ex eorum autem numero rotundi, & leues facile excernuntur. Non item qui alia quacunque forma prædicti sunt, maxime tamen oblongi, & asperi difficulter excernuntur, Aetio teste. Pro curatione aer eligatur purus, ac temperatus: Somnus quoad fieri potest conciliandus parum consueto longior: quies vitan-da: Est enim desidia valde noxia: deambulationes autem, & exercitia medio-cria conueniunt: quæ pro ætatis, habitus, roborisque ægrotantis ratione cor-pus exercere valeant, Nam magnæ exercitationes non cōueniunt, veluti equi-tationes, aut armis, aut lucta aut pancratio certare, aut humum fodere, aut id genus aliud facere, Galen. teste eodem sexto de morb. vulg. Sit alius soluta assidue, modo ne instet aliud quidpiam, Cum nanque hæc probe exernit, vri-næ profluent libere. Ab immodicis animi affectibus caueant, præterquam quod irascantur interdum: Moderatus autem cibus, & bonæ concoctiones præ-cipiantur: satietates enim, & cruditates non solum exasperant morbum, sed etiam (cum non adsit) generant, vt liquet ex eodem Aetio: etenim non im-pleri cuiusque ætatis & corporis habitus commune documentum est, Galen. teste

teste, Cibi itaque eligantur, è quibus neque satietates, neque cruditates contingant. Cauendum propter ea ab his, qui duram substantiam habent, ac ægrè concoquuntur: à caseo præsertim: Nam qui frequentius eo vescuntur, lapides in renibus eis suboriuntur, Galen. auctore sexto de morb. vulgar. Similiter etiam abstinendum est, & ab omnibus acribus, dulcibus, crassiss, tenacibus, ac pinguibus. Quapropter pristinam, vel eius cremorem adhibere conuenit, vel gallinarum, seu pullorum, starnarum, vel phasianorum ius: aut in eorum iure panis maceratus tribuatur: & ubi uires requireret, confusa caro gallinarum, seu pullorum præbeatur: Vinum autem sit admodum tenue, & album non valde vetus: dulcia vero, & nigra uina vitanda sunt, tanquam calculosis inepta: sit autem aqua lymphatum purissima, & purgata, atque decocta: Et ubi renum hic affectus subito inuadat, & qui laborat, cibo nuper reffectus sit, cibique adhuc sint incocti, aut semicocti, ante omnem aliam curationem pro doloris mignitione, (nisi quicquam impedimento sit) uomitum prouocare expedit, ut eodem lib. de dign. & curat renum affectorum scriptum est. Nam leuiore quidem a uomitibus euadunt ægrotantes, Hippocr. & Gal. testibus præcitato lib. sexto de morb. vul. quoniam ab accessionibus, sed non ab affectu liberantur, cum cibis vacui sunt, ut Gal. asserit: (qua item ratione, ex eiusdem Galen. sententia, & alimenti recrementa quæ in intestinis colliguntur, sub cibi nomine comprehenduntur) cōfestim euacuari debent per idoneos clysteres, modo nihil obstat: idque omnibus calculosis commune est, etiā si dolores paulatim irruant, & non repente incidant: qui ex furfurum decocto, carycarum, fœnugræci, ac aristolochiæ parari debent, ut inquit Aetius: & si quidem decenter, euacuentur, sinere: Si vero non etiam bis, aut ter infundere: quibus adicere poteris olei communis vnc. iiii. mellis rosacei unc. ii. ac salis communis parum, Vel ex maluarum althææ, mercurialis, ac betæ foliis, carycis, ac fursure decoctum paretur pauco sale, addito. Cui adicias olei communis, anethini, vel chamæmeli unc. iiii. mellis. rosacei unc. ii. s. pulpe casæ nouiter extractæ unc. i. Et si ex his alius non sufficienter excreuerit unc. s. diacath. aut hieræ picræ simplicis, vel drac. iiii. confectionis de dactylis, seu electarii indi adicias, nec minus & unc. i. butyri recentis, aut adipis anserini. Cæterum ubi venter sufficienter excreuerit, quædam infundere oportet, ex eiusdem Aetii præcepto, quæ corpusculorum circa lapidem sitorum inflammatio nes lenite, & laxare possunt id ipsum verum oleum anethinum facere poterit adipe gallinaceo recenti in eo eliquato, seu anserino, aut etiam butyro; quæ si non adsint etiam fenugræcum, & althææ radicem oleo decoctam infundemus: Et ubi lapis in renibus adeo fuerit obturatus, ut vehementissimo obtulerit dolores, siquid aliud non prohibeat, vena cubiti propinquæ manus in corpore ex repletione affecto secanda est, ex Aetii testimonio. Nanque eis, qui sanguinis multitudinem congregarunt, hæc vena sectio commoda existit, ut ipse inquit. Hippo. vero lib. 6. de morb. vulg. cum opus fuerit iuuenibus, præsertim popliti venam incidere iubet, ubi sanguis multus aut crassius in venis abundet, ut Gal. inquit, Nā (ut ipse asserit) membrana supra iecur cubiti venæ sectione postulat, infra uero crurum in poplitibus videlicet, aut omnino saltem iuxta malleolos. Lib. autem de renum affectorum dign. accurat hæ oppositæ sententiæ conciliantur. Scriptum nanque ibidem est, quod ubi valida fuerit virtus, venam, quæ in poplite est aperimus, vel quæ ad malleolos; sin imbecillis, venam, quæ est in cubito. Nam si virtute debili infra euacuabimus, retientrix facultas, quæ est imbecillis non retinebit, sed uniuersa in præceps rapietur, & partem assiduo defluxu impetet, succus videlicet in locum imbecillum perpetuo procumbentibus: sed cum perpetuo venæ sectio in Hippo. & Gale. doctrina virium robur exigar, non uideo eisdem imbecillis existentibus cur vena se

Loco citato.

Commentar. 3
tom. 15Vomitus.
Lōge post prin
cipium.
comment. 1. 1
com. 5

Clysteres.

Lib. 11. c. 5

Loco citato.

Lib. 11. c. 5.
Venæ sectio.
comment. 1. 1
tex. 5
Diuersa senten
tiæ de venæ se
ctione.
Loco citato.
Conciliantur.

Propria opin.

Purgans medi-
camentum.

Loco citato.

Loco citato.

A purgatione,
quæ medicamē-
ta adhibenda
sint.

canda sit etiam ea, quæ in cubito existit. Propterea cum eodem Galen. lib. de curand. rat. per venæ sectionem, sic de ea sentirem, ac iam dictos auctores conciliarem ait nanque ambiguum esse num renes partibus superioribus, an inferioribus abscribi debeant, & propterea eis affectis neque perpetuo in cubito secta vena, neque etiam in poplite, aut malleolis iuuantur, sed ubi recens fuerit phlegmone, copiaque sanguinis affuerit, vena cubiti secanda est. quibus vero affectio inest, quam proprie nephritim nominant, Eam quæ in poplite est, secare expedit, aut certe quæ in malleolis sunt. Reuulsionis itaque gratia, ubi copia sanguinis affuerit, & timor ne ex ingenti dolore phlegmone excitetur, Aetius venam cubiti propinque manus secari iussit, ut ex eius verbis patere poterit. Hippocrat. vero euacuationis gratia cum reuulsione, seu deriuatione, ubi sanguis multus, aut crassus in venis abundet, cum eundem sursum reuellere pomptum non sit, sed magis expeditum per inferiores partes euacuare, seu per conuentiorem regionem, qua maxime natura vergit (ut sui moris est) poplitis venam secare præcepit, e directo videlicet affecti renis, cum rectitudinem perpetuo seruandam esse iusserit. Verum quæcunque vena incidatur, multo minus euacuandum est, quam ipsa repletionis copia expostulat: neque enim (ut inquit Aetius) futurum speramus ut omnino cito e renibus excidat lapis, præsertim si magnus existat. Quare seruare oportet sanguinem in eam, quæ cum tempore futura est in corpore expensam. A venæ sectione, ubi etiam vitioso humore ægri abundabunt, purgans medicamentum, quod abundanti humori conueniens sit, præbendum est. neque omitendum hoc est, nisi aliud quidpiam id fieri prohibeat: notissimum nanque est, (ut inquit Galen. eodem sexto de morb. vulg.) quod si utroque auxilio homo indigeat, a venæ sectione incipiendum est, quoniam si per sanguinis missionem corpus prius vacuatum fuerit, purgans medicamentum exhibitum venas, & arterias, & inanes corporis regiones inuenit non oppletas, quo fit ut absque vlllo impedimento in totum corpus permeet ad attrahendum succos, facillimeque fiat eorum euacuatio per vasorum spatia & fusionem, tenuitatemque succorum: Nam si vasa sanguine repleta sint, & purgans medicamentum dederis, non poterit propter plenitudinem in corpus differri, unde fit, ut subsistet, & nihil efficiat, aut si quicquam facit, malefaciat, ut liquet libr. de renum affectionum dignotione, ac curatione. Pariter ubi sanguinem multitudo non affuerit, sed vitiosi duntaxat humores redundarint, eisdem purgatio apta est, citra venæ sectionem pro ratione redundantis succi. In quem usum bile redundante, mel roridum, seu casia fistula præbeatur; Aliis vero crassioribus redundantibus succis, utpote bile atra vel pituita, prædicta diacatholicon, aut confectionem de dactylis, & puluerem hieræ simplicis adlicere poteris hunc in modum, Pulpæ casiæ recipe vnc. i. s. vel vnc. ii. diacatholicon drac. vii. vel confectionis de dactylis drac. iiii. pulueris hieræ simplicis, & pulueris radices glycyrrhizæ ana drac. i. fiat bolus: vel parato decocto ex eadem radice glycyrrhizæ, floribus cordialibus, vua passa, & sebesten, in eo vnc. ii. vel vnc. ii. s. roridi mellis, & drac. vi. diacatholicon, vel drac. iii. confectionis de dactylis dissoluas, Toto autem corpore expurgato quæ laxare meatus, ac renum corpora mollire valent, medicamenta adhibenda sunt, fomentis vtense decocto foliorum maluarum, foliorum, ac radicum altheæ, florum chamæmeli, fœnugræci, seminis lini, & radices graminis in hydræleo, & cum spongiis sæpius supra affectum renem adhibeas. Ex eisdem quoque infusiones parari poterunt: At omnium (ut inquit Alexand.) optimum est balneum, ut quod non solum mitiget, sed etiam curare possit: id vero ex dulci aqua fiat, aut ex hydræleo: dolore adhuc uehementius infestante, & renum regio, ac lumborum inungantur inscripto unguento, quod recipit olei chamæmelini, uel anethi-

ni, & amygdalarum dulcium ana vnc. i. s. adipis anseris, vel gallinacei, & butyri recentis ana drac. iiii. ceræ quod satis sit, fiat vnguentum, interim adiciens oleum, quod ex scorpionibus, paratur, aut ex eodem cum recenti butyro, & oleo amygdalarum dulcium, ac cera, vnguentum fiat: Post fomenta uero infusiones, ac balnea; adhuc cataplasmata conueniunt. Inter quæ hoc primo vtare farinæ tritici, recipe, seminis lini, & fenugreci, cuiuslibet manip. i. olei anethini, vel chamæmelini, & amygdalarum dulcium ana vnc. i. s. mellis vnc. ii. resinæ terebinthinæ vnc. i. radice althææ contusæ drac. iiii. misceantur arte, & fiat cataplasma, prius prædictis farinis in modo dicta decoctione decoctis. optimum quoque cataplasma fiet ex lupinorum farina, hordeacea, ac seminis lini in aqua, & oleo decoctis: In decoctione autem althææ, ac peucedani radix, ac chamæmelum admisceatur: bonum est etiam (vt inquit Aetius) panem passum decoctum circa lumbos, & uentrem imponere, neque tamen erit absurdum pestini, ac uesicæ eadem vnguenta, ac cataplasmata adhibere, & nequam primum frigescent, calefactorio extra ea contegere oportet, id quod commode fieri potest per sacculos ex milio, fursure, ac floribus chamæmeli paratos, ac in latere paucio uino insperso calfactos: Conducunt etiam non parum cucurbitule absque incisione adhibite: quæ sæpe lapidem celeriter adeo transferunt, ut subitam eius mali leuationem comparare possint, lapide nimirum in locum ampliorem translato supra à renibus initium facientes ad inguina per obliquam earundem partium (quas ilia appellant) positionem procedentes: quo loco frequenter dolores incedunt propter situm meatuum, qui vteretres appellantur: quemadmodum lib. de renum affectionum dignotione, ac curat. & ab Aetio scriptum est: quanquam ea, quæ uias dilatant, ac renes laxant, non immodice adhibere conueniet. Nanque emollitio, & laxatio uirium robur exoluit, sed tantisper eis utendum est, quantisper eis lapis in rene hæret. Cucurbitulas item iam dictas, ubi dolores uehementius infestant, adhibere non conuenit, sed ipsis aliquantulum lenitis, & inflammatione non impediante, ex eiusdem Aetii sententia. quo etiam tempore ea quæ urinam cient, ac lapidem frangunt, exhibere tempestiuum est. Etenim transitorio lapide, & ex sede agitato dolores quiescunt, vt ipsemet testatur Aetius: Quæ uero calculosis auxiliantur, vnica facultate indigent quæ secare & abstergere cum manifesta caliditate potest, Galen. teste decimo de compositione medicamentorum secundum locos. Talia autem sunt omnia fere amara, ut ipse inquit. A ualde tamen calidis, ac diureticis omnino abstinendum est, præsertim à longo eorum usu. Nam effectricem calculorum causam adaugent dum renes intemperatos, igneosque per caliditatem reddunt, ut prompte alios affare calculos possint, licet factos comminuant. Alexand. teste: Admodum itaque calida, ac acria, medicamenta studiose vitari debent. Vnde calculosis quæ ualde calfaciant dari nullo modo conuenit vt liquet sexto de sananda. Quod si necessitas te cogat eisdem uti, semel, aut bis eis vtare, & demum desistere ab eis debes ex eiusdem Alexand. testimonio: Quæ de re extenuantibus, ac incidentibus citra magnum calorem vtendum est, sed quæ tepidam (vt ita dixerim) facultatem habeant. Hæc etenim paulatim citra noxam lapidem comminuunt, nec cum duriores reddunt. Sed hæsi- taret forte aliquis si curatio quælibet per suum contrarium efficitur, quomodo lapidem possint comminuere quæ tepidam facultatem habent, cum à calore fuerit genitus? Cui respondebimus nos, quod cum calculus ab intemperie, & valido calore sit factus ob id merito exhibemus quæ tepidam facultatem obtinent, vt quæ contraria his sint, a quibus lapis est effectus, si quidem tepida ceu minus calida sunt ualde calidis contraria, vt liquet eodem lib. de renum affect. dignatque curat. Hæc itaque medicamenta, quæ minimum ca-

Lib. ii. c. 5

Locis citatis.

Quo tempore
urinam cientia
ac ea quæ lapa-
dem cōm inuē-
exhibenda sunt

Cap. i. in prin.

6. de san. tuend
c. 11. circa fin

Dubium.

Solutio.

In med. 9.

Cap. 12 loris possident, callosas seu tophaceas consistentias incidere sunt idonea Galen. auctore quinto de simplicium medicament. facultatib. veluti sunt radices regionum asparagorum, & rubi, & betonica, polium ac acetum scillinum, & vitrum combustum & quæ eius generis sunt, eodem teste. Præter hæc autem a Paulo graminis radix, adianthum, althææ semen, spongiarum calculi, cicer nigrum, seu eius ius, phu, meon, asaron, carpesion, & saxifragia commendantur. Sion vero, & scolini radix, atque erisymon esu, & potu profunt, ut idem Paulus testatur Alexand. vero cardui decoctum cum apio, seu etiam decoctum radices quinque folii cum oxymelite tanquam valde efficax commendat in vicem autem quinque folij eryngii decoctum, aut erysimi præbet. Similiter & radices graminis, & plantaginis radix, & folia, atque semen, ius cicerum, viticis semen, & anygdala ab eodem commendantur: Præter hæc etiam peucedani radix, atque ipsa radícula, paliuri semen, & tribuli decoctum radix Ciperi, althææ semen, & radix, rumicis domestici radix, & vermes terreni cocti approbantur. quorum singula partim decocta, partim tenuissime trita præbeto bibenda, ut ipse refert. Vbi vero hæc non suffecerint, ad valentiora medicamenta transire oportet, quæ (ut Aetius fatetur) communia etiam sunt & calculose vesicæ remedia. inter quæ sunt præcipua lapis iudaicus, cicadæ siccæ sine pennis, ac pedibus contusæ, ac hircinus sanguis inarefactus, qui præexistentes lapides soluit, atque ita per lotium excerni eos facit: ut etiam alii amplius non gignantur. præterea dolorem sedat, Aetio auctore: Quomodo autem is parari debeat, ab eodem auctore cap. duodecimo, libr. 11. scriptum est: Accedunt ad hæc alia, quæ a tota substantia magnopere conducere videntur. inter quæ passerulus quidam inter sepes, & murum victum quæritans troglodites appellatus ab Aetio: & Paulo conscribitur, Cuius descriptio ab eodem Paulo cap. 45. libr. tertio, & Aetio cap. 11. libr. 11. scripta est. Hic sale conditus. & in cibo crudus acceptus, morbum perfecte sanat, in posterumque generari prohibet. Conditur autem, ac diuersis modis præparatur, quemadmodum ab eisdem auctoribus in præcitatis locis scriptum est. Aetius item hoc etiam medicamentum, tanquam efficacissimum scriptum reliquit, Leporis pellem in ollulam conice, & in furnum demitte. atque vbi vsta fuerit ut probe conteri possit, acceptam tere & ex ipsa cochlearium vnum cum vino ieiunis in soli aquæ calidæ insensu præbe: asplenii quoque decoctum (quod vulgus ceterach nominat) cum oxymelite non parum confert, Nam & ipsum lapides frangit, Galen. teste sexto de simplicium medicamentorum facultatibus. Vltimo loco nostrum quo vtimur, puluerem conscribere libuit, quo perpetuo vsus sum, & præter id quod nullam noxam affer, mirifice lapidem comminuit; recipit autem seminis althææ, & violarum albarum, singulorum grana quinque, lithospermatis, & radices glycyrrhizæ ana scrup. s. lapidis iudaici, & spongiæ, cuiuslibet grana tria, pulueris ossium dactylorum, ceraforum, & mespillorum ana scrup. i. seminum melonum drac. iiii. fiat puluis, cuius drac. i. pro qualibet vice cum vnc. ii. vini albi aquosi, aut oxymelitis, aut vnc. iiii. decocti asplenii in aqua parati, ac exiguo aceto addito tribuatur. Interim vero corporibus, præsertim natura frigidioribus, seminis apii, asparagorum, cinnamomi, ac saxifragiæ, cuiuslibet grana septem adicere poteris: Vbi vero doloris vehementia, ac vigiliæ infestauerint, & magnum vitæ immineat periculum, viribus præsertim consentientibus cum his, quæ torporem inducunt, succurrendum erit, ex Pauli, & Aetii sententia, præbeaturque Philonis medicamenti, aut theriacæ nouelle drac. i. cum vnc. ii. vini albi aquosi; Ut vero post exactum lapidem, alii non renascantur, si obesa fuerint corpora, audacter exquisitè extenuans victus præcipiendus erit. Vbi autem calidiora fuerint corpora, atque gracilia, neque extenuantem victum, nec medicamenta quæ extenuare possunt, requirunt, cum ea gracili

Loco citato

Ca. de aspleno:

Præseruatio ne
alii renascantur
calculi.

cili corpori sint inimicissima, sed mediam esse conuenit inter extenuantem, impinguantemque victus eorum rationem, Gal. auctore sexto de sanit. tuend. & Aetio cap. decimo quinto, libr. I. Scopus nanque est, ne crassior, aut frigidior materia, quæ ad calculorum generationem idonea est, congregetur, sed contra studendum est, ut bonam temperiem conciliemus, & extenuantibus citra magnum calore utamur, ut inquit Alexand. Qua de re in temperatis locis degant, in quibus anni tempora, & horæ nimio feruore non infestent: frigora tamen magis, quam æstus cauenda assumantur etiam ociosæ de ambulationes, & exercitia moderata: Etenim segnities, & ocium eis nocent. Cæterum ventrem semper probe laxum habere oportet: somno utantur moderato, neq; culcitris indormiant ex anserum plumbis confectis: hæc siquidem renes valde calefaciunt, eodem Alex. auctore: Caueant cibos substantiæ duræ, & qui ægre manducatione atteruntur, item eos, qui multam substantiam habent, plurimumque nutriunt, & qui acruatim digerunt, antequam perfecte coquantur, & qui grauis sunt qualitatibus, seu difficulter committantur, ac supernatant, & egre per aluum subleunt, & inflant, ite eos, qui meatus obstruunt, aut alias diutius in corporibus insident, ex Aetii sententia; Sic etiam cibis boni succi, & moderatus (ut inquit Paulus) rarusque leguminum omnis generis, frumentaceorumque usus. A caseo. & lacte & quæ ex ipsis preparantur caueant: Nam omne lac, præter asininum, eis in commodum existit: propterea quod ceteris omnibus ex tenuius. Asininum ideo confert, ex eiusdem Gale. & Aetii sententia: præ omnibus vero facietatem virare oportet: Vino utantur tenui urinam ciente, non valde veteri: Nam dulcia vina calculosis sunt nociua, similiter, & nigra, & summatim omnia, quæ crassi sunt succi, ac nimis calida, seu acria nocent. Omnibus vero confert calculosis, ut à cœna sæpe uomant: Similiter ante omnem cibum bibere aquam tepidam. Nihil etenim renes adeo recrementis vacuos, temperatosque reddit, ut non amplius calculos procreare possint, nam temporis spatio igneus, ipsorum calor à tēpore aquæ extinguatur: quare probe faciunt quid bibunt etiam in medio cibi aquam, aut uinum refrigeratum, aut rosaceum, aut violatum, ut idem Alexand. inquit. Paulus vero à balneo ieiuno ante vinum, aquam temperatam potandam exhibet, tanquam omnium præsentissimum remedium ad calculos arcendos. Similiter etiam ubi inter prandendum frigidam superbiberit, approbat: oxymel quoque cum quodam simpliciore urinam ciente, veluti adianto, apio, graminisque decocto commendat. Alexan. vero palaustris asparagi decoctum eryngii, & quinque folii hærbæ approbat, pariter (ut diximus) & plantaginis, tum radicem, tum uero eolia, & semen, ac cicerum ius. Vbi autem sanguis abundare videatur, curiose inspicienda est temporis opportunitas, ut venam secemus, ex Aetii, & Pauli testimonio: fiat autem ea è cubiti vena interna, nec multa sanguinis copia vice vna educatur, sed potius ubi oportet, eandem iterare expedit. Quod si vitiosorum humorum copiam perlentiscant, purgationibus conuenientibus uti oportet, ex sententia eorundem auctorum, pro ratione redundantis succi, quemadmodum supra meminimus. Per interualla quoque ea bibant, quæ urinam dicere possunt, tam simplicia, quam composita: quorum etiam supra mentionem fecimus, inter, quæ est acori graminis, nardi calami aromatici, fari, dauci, oreoselyni, hyperici, & rorismarini decoctum: ex his singula, eisque similia, tum per se, tum inuicem permixta præbeto: Nam urinam manifeste mouent, ut inquit Aetius. Et pro cibis utantur pastinaca valde cocta, fœniculo, syo, carduo, pulegio, atque calamintha. Ab eodem quoque naturalium aquarum usus (verum non sæpe) tanquam conuenientissimus commendatur. Similiter si per plures dies radicis eryngii decoctum, aut triflaginis, dictamui, seu radicis tribuli bibant. Semel item ebdomada mirifice con-

6. de sanit. tuend.
cap. 11.

fert, aut bis in mense præbere. 3. i. prædictę pellis leporis, ut supra præparate cum asplenii decocto, seu cicerum, iure, uel pauco uino albo, & tenui, aut tandem nuper scripti nostri pulueris similiter præbeto.

περί φλεγμονῆς τῶν νεφρῶν.

id est de inflammatione renum.

Cap. 95.

Signa renum affectorum.

Lib. 3. c. 45
Inflammationis
renum signa.

2. de loc. af.
c. 8

Cap. 3

HA V D secus quam ceteras corporis partes ex copia influentis sanguinis & renes ipsos inflammatione tentari contingit, præsertim ubi in carnosam eorum partem confluat. Dignosces autem quod renes afficiuntur, ex dolore cum positu, qui circa primam dorfi vertebram paululum supra spurias constat (præsertim si dexter rem fuerit affectus) aderit, distenditur que dolor sursum usque ad hepar, & deorsum usque ad vesicam, & pudendum, lumbosque, & coxendices, pectinem, ac femora: Consequitur & stupor propinqui cruris, dextri inquam, Aetio auctore cap. decimo sexto, lib. 11. At si sinister ren fuerit affectus, circa easdem regiones dolor aderit, parte sinistra, sinistrique cruris consequentur stupor. Quod si ambo afficiantur, circa ambas partes percipietur, dolor, amborumque crurum stupor consequetur. Ex nonnullis etiam aliis inditiis idem inuestigare posset, nisi esset, quod eadem qualitate quoque affectus indicant, inflammationem inquam. Et propterea pro eius notitia eadem dinumerabimus. Quis vero affectus præter naturam sit inflammatio, non semel duntaxat in præcedentibus dictum est. Indicant vero eam, ex Pauli testimonio, ardor, ac dolor cum grauitate, febricula, mentis alienatio, uomitio bilis syncera, & urinæ reddendæ difficultas: addit Aetius quod neque recta erigi possunt egrotantes, neque pedibus ingredi, & siue sternutatio, siue aliqua alia concussio irruat, : uehementi dolore lancinantur, frigent eorum extrema, & magis suræ, ac pedes. adest vrinæ emittendæ difficultas, minguntque assidue, ac laboriosè: in principio quidem tenuia, & aquosa: in quibus nihil subsidet: Inflammatione uero in peius proficiente, rubicundiora, deinde etiam crassa, & mucosa: ad suntque febres uehementres. Quod si adhuc amplius inflammatio augetur, hæc omnia fiunt uehementiora: acceditque his nausea morsus stomachi, uomitus bilis, & quidam usque ad animi deliquium auguntur, & exudant. Sistitur ipsis venter, adeo ut inflentur, & assidue ructus emittant. Sequitur fastidium uehemens, & quibusdam continuæ sunt exacerbationes: quibusdam vero per interualla. In vniuersam autem (ut idem Aetio visum est) ventris egestio, & urinæ multa excretio dolores ipsos præcedunt, testaturque accedere ægris dolorem pulsatilem retro, iuxta primam dorfi vertebram. Id quod pugnare videtur Paulo, qui dixit dolorem cum grauitate adesse, pariter & Galeno secundo de loc. affect. ubi asseruit grauamen dolorem, ne dum proprium hepatis esse, sed spleni, quoque, ac renibus inflammatis communem: Atqui dicere possumus Galen. ac Paulum de inflammatione quatenus inflammatio est, orta que in carnosa renum parte verba fecisse. Aetiū vero de magna inflammatione, magisque in ceteris renum partibus urgente: quod etiam confirmauit Gal. com. aph. 5. 6. lib. cum dixit, Quod si renum pars carnosa patiatur inflammationem, dolor est grauis, aliis vero partibus, quę sunt, in rene, patientibus, velut est tunica, quę renes obtegit, venter eorum interior, arteriæ, venæ, quę ad hunc terminantur, ac etiam productiones vasorum vrinariarum dolor sentitur autus, & eodem etiam secundo de loc. affect. cum dixit, Pulsus cum dolore factus sequi inflammatio affectus notatu dignus: cum maiores fuerint, idque semper in ipsis arteriis, atque in contmentibus

mentibus ipsas partibus, quas & ob angustiam premunt; & cum attolluntur veluti percutiunt, modo pars affecta sentire nata sit: inferuntur itaque ad renes arteriæ, eademque magnæ, ut ex anatome liquet, neque rane sensus expertes sunt, propter neruum ad eos distributum, præsertim ad eorum membranam, ac externam superficiem: Qua de re fit, ut cum ingens fuerit in eisdem partibus orta inflammatio, affectis, aut pressis iam dictis arteriis, & veluti inflammatos renes percutientibus, pulsatis, quoque dolor sentiat, qua etiam ratione Aetius febres vehementes in eiusmodi inflammationibus adesse testatur notatu dignis, ac in peius proficiscentibus iam dictis inflammationibus.

Paulus vero febriculam, cum exigua, & circa initia fuerit inflammatio. Si autem ad suppurationem renum inflammationes vertatur, cuncta predicta symptomata, ac accessiones exrendentur, & febres cum horrore irruent, atque id maxime circa vesperam: eruntque inordinatæ, & dolores cum horrore interpellato, ac vario infestare videntur, ut liquet ex Galen. sexto de loc. affect. Nam dum pus gignitur, dolores, ac febres magis eueniunt, ut inquit Hippocra aphorif. 47. secundi libr. Tumor item circa ilia quodammodo apparebit & vehementis caloris sensus ægros circa renes affligit, minguntque ruffa, & pura, (ut cap. 18. eiusdem libr. inquit Aetius.) Quod si in sanam partem inclinat æger, ex affecta grauitatem magnam magis se sentire dicit, quam antea quam inflammatio in abscessum perueniet, Alexan. teste cap. quinto libr. 9. Nam circa renem dolentem veluti suspensi cuiusdam ponderis sensum percipiet, ut ait Galen sexto de loc. affect. perfecta autem suppuratione, & febrium, & dolorum accessiones minores contingunt, & grauitatis sensus magis circa affectum renem infestabit, ac tempore rupturæ magis exacerbantur: ad quam etiam cum ipsis vrinis puris excretio consequitur, & nonnulla alia, de quibus sequenti cap. verba faciemus. Ceterum ob plurimas causas renes inflammari contingit, ut liquet ex eodem Aetio, nam plage, & attritiones, pharmacorum potiones, & humores corrupti inflammationem generant, & præsertim equitationes continuæ, & vehementes ut ipse inquit: quorum notitia facile haberi poterit. Verum in eisdem inflammationibus si vrinæ prodeant multæ, & crassæ, in quibus bonum est, quod subsidet, quoniam ipsæ maxime indicant, ac secernunt morbum, propterea quod inflammationis concoctionem indicant, bonum portendunt; quemadmodum, si vrinæ aquosæ, puræ, ac perlucetæ prodeant ægre morbum secerni indicabunt, eodem Aetio teste. Conferunt etiam renum passionibus hæmorrhoides superuenientes, utpote quæ velut faciem sanguinis vacuare sunt natæ, ex Hip. & Gal. sententia apho. 11. 6. libr. Victus ratio pro inflammationis renum curatione similis instituenda erit fere ei, quæ in inflammatione iocinoris præcepimus, nisi quod (ut inquit Aetius) licet à primo die a cibo abstinere debeant, non tamen in multos dies in ediam extēdere oportet: Etenim vrinæ puriores, & aciores per in ediam redditæ (ut ipse inquit) vehementissimos morsus infligunt. Qua propter in principio sorbitio nibus tenuibus morsus lenientibus ægros nutrire oportet, veluti est prisanæ succus, & aquæ calidæ potus, In cuius vicem aqua hordei, seu ea, in qua coriandrorum præparatorum semina fuerint decocta, uti poterunt. Vicent autem quam mulsam. in principio, prius quam concoctæ fuerint inflammationes, ac vsum eorum, quæ vrinam ciunt: oblādunt enim mordaces humores inflammationis partibus inducendo, eodem Aetio auctore. Nam ubi in vesica, vel renibus phlegmone est cœpta, medicamenta, quæ vrinas prouocant, bibenda haud quaquam danda sunt, Sed ad partes, quæ maxime longinquæ sunt, semper reuulsio facienda erit, ex Galen. decreto decimo tertio method. medend. extimata tamen tum phlegmones magnitudine, tum corporis totius statu: Qua propter sanguis detrahendus statim est, præsertim ubi maiori acumine renes

Si ad suppurationem uergat inflammatio, signa.
S. de loc. affect. cap. 3.
in prin.

Loco citato.

Prognostica.

Victus ratio,

Cap. ii.
Venæ sectio,

11. meth. loco ci-
tato,

Cap. 19.

Clysteres.

Purgans.

affligantur, & vehementior exurgat dolor, ex Pauli, & Aetii sententia, Vel omnibus succis ex æquo redundantibus, seu ipso sanguine exuperante, ut inquit Alexand. At quæ vena secanda sit non admodum liquet, Nam Aetius uenam cubiti secare iussit, Galen. vero decimo tertio method. medend. renibus, vesica, pudendo, & vtero phlegmone laborantibus, eas, quæ in cruribus sunt sitæ, venas esse secandas præcepit, potissimum quæ circa poplitem sunt: si minus, eas quæ iuxta malleolum; perpetuo autem, quæ è directo sunt positæ quamuis in eodem libr. paulo ante dictam sententiam, ad partes maxime longinquas reuulsionem fieri in iam dictis inflammationibus iusserit: ambæ tamen sententia veræ sunt, Nam ubi reuellere duntaxat opus sit, in contrarium, ac maxime longinquas partes perficienda erit. Et propterea venam cubiti, eamque internam secare conuenit. Si vero vacuare simul cum deriuatione intendat medicus, crurum vena quæ è directo sunt sitæ affecto reni, secandæ sunt. Nam (ut ipse inquit) statim prima vacuationis diuersitas pro particularum diuersitate variatur; & propterea vnde, aut quomodo vacuatio sit facienda eger ipse docet locus. Hinc cum eodem Galen. concludamus quod ubi recens fuerit phlegmone copiaque, sanguinis affuerit, reuulsionis potissimum gratia ex cubito vena secanda est. At si nec recens fuerit, nec sanguinis multitudo adsit, euacuandi præsertim causa, eam secare expedit, quæ in poplite est, aut quæ in malleolis, quemadmodum idem Galen. libr. de cur. rat. per venæ sectionem scriptum reliquit. Vel si maus primo eam, quæ in cubito est pro reuulsionem secabis: deinceps (si opus fuerit) eam, quæ in malleolis pro euacuatione rectitudine seruata, Nam & Aetius quoque repetitam sanguinis detractionem commendauit. Verum priusquam ad venæ sectionem deuenias, clysteres adhibendi sunt, ex malue decocto, aut semine lini, & fenugreci cum oleo, & melle, aut ex prifane succo cum oleo, & melle, ex eiusdem Aetii sententia. Ceterum copia non multa infundenda est, ut repleta intestina comprimant renes: & ubi stercora prodierint, oleum anethinum cum butyro quiquidam adipibus in his eliquatis anserino videlicet, aut gallinaceo, iniiciantur, ut ipse inquit: Aut ex maluarum, betæ, ac violarum folliis & hordeo decoctum patetur, cuius recipe libr. i. aut libr. i. s. & adde olei violacei vnc. iiii. aut chamemelini, vel anethini vnc. iiii. mellis rosacei vnc. ii. salis communis parum, casia tractæ, aut pulpæ casia fistulæ vnc. i. butyri recentis, & adipis anseris, seu gallinacei, cuiuslibet drac. iiii. vel vnc. s. misceantur, & fiat clyster, Interim (si videbitur) addere poteris vnc. s. vel drac. iiii. diacath. Cæterum si vitiosus quispiam humor, præsertim acris, & biliosus cum sanguine redundarit, à venæ sectione purgationem adhibere conuenit, quæ humorem præpollentem educere possit. Verum exhibenda nequaquam erit priusquam humorem contemperaueris, ac solutu facilem paraueris, aut si crassus fuerit ipsum extenuaueris, ex Alexand. testimonio, potissimum ubi virtus vitiosum humore euincere, ac superare nequeat. Et propterea inter initia humoribus existentibus crudis, & inflammatione ipsa feruescente, nequaquam purgans medicamentum exhibendum est, ut liquet ex eodem Alexand. id quod etiam annuere videtur Aetius cum dixit, neque etiam purgatiuum pharmacum exhibendum veluti quidam consueuerunt: quanquam & idem Aetius vehementiora medicamenta purgantia vitauerit. Nos vero nec eadem humore etiam contemperato, concocto ac præparato etiam post initia probamus, sed ea duntaxat, quæ vim habent redundantem humorem leniendo expurgare, veluti tamarindi, casia fistula, mel acreum, saccharum violaceum syrup. ex pluribus infusionibus rosarum, aut violarum, & interim diacatholicon. Hisce itaque uti poteris medicamentis purgantibus separatim, aut quibusdam eorum simul permixtis, ubi vitiosi in corpore redundarint succi, eis prius concoctis, ac præparatis, ut dictum est. Nam conque-

conquiescere oportet in renum morbis, cubare mollior, soluere aluum, si aliter non respondet, etiam ducere, ut inquit Celsus cap. decimo, libr. quarto. Quod si post dicta auxilia adhuc inflammatio inualuerit, extrinsecus etiam inter initia feruente adhuc inflammatione refrigerantia ad mouere conuenit, potissimum ubi biliosus fuerit sanguis, qui inflammatione excitatur, renesque ardorem igneum sentiant, ueluti est oleum rosaceum, & ipsum omphacinum, seu mellinum pauco aceto addito, & succo polygoni, aut portulacæ: Aut ex oleo rosaceo, uel melino luteis ouorum, polygoni succo, aceto pauco & cero ceratum fiat, & supra renes accommodetur, ex Pauli sententia. Alexand. uero ex rosaceo, pauco aceto, succo polygoni, aut portulacæ, & cera ceratum fieri iussit, quo nullum reperitur efficacius, ut ipse inquit. In incremento autem ipsius inflammationis aliquod prædictis medicamentis admiscendum est, quod digerendi, ac discutiendi uim habeat, ueluti est chamæmelum, & eius oleum, fœnugræcum, semen lini, & fertula campana, & althæa ac nonnulli etiam recentes adipēs, ut gallinaceus & anserinus: declinatione autem facta, ea, quæ plus discutiunt miscenda sunt, ueluti est chamæpitys, polium, abrotanum, triffago, asarum, flos iunci odorati, & reliqua huiusmodi, & ad cataplasmata procedendum, quæ ex farina fœnugræci, & seminis lini fiant, ordeacea, ac fabace, radicibus, ac foliis althææ in iure chamæmeli decoctis, additoque oleo chamæmelino, seu anethino, & chamæpitys, seu triffaginis, uel alterius ex prædictis pharmacis parum, cum aqua malsa, seu cum sapa, potissimum ubi etiam crassior uidebitur esse, quæ derelicta est, materia. Hoc etiam tempore confert fortibus per spongas uti ex decocto chamæmeli, seminis lini, anethi, ac althææ foliis, & radicibus, pauculo calamo aromatico, ac flore iunci odorati addito, ac pauco etiam aceto. Nec minus & calefacientibus balneis tuto utare, eisdem quoque in incremento inflammationis, ac summo uigore tuto uti poteris, ubi quæ inflammationem parit materia, crassior fuerit quanquam ne id prætereundum est, ex Alexand. & Pauli auctoritate, quod admodum calida uitanda sunt, ne materia, quæ in parte inflammata continetur, in pus conuertatur. Item quæ impendio refrigerant non minus vitare oportet, ex eorundem sententiam, ne quam primum renes inflammati indurêtur, potissimum cum ipsi suapte, natura facile scyrrhis deprehendantur, tum propter eorundem substantiæ qualitatem, tum etiam propter excrementorum naturam, quæ per ipsos dilabuntur, ut liquet decimo tertio method. meden. At ubi perfecte concoctæ fuerint inflammationes, & quieuerint dolores, tunc etiam per urinam ciencia purgandum. Quapropter tribuenda sunt, acorum, phu, petroselinum, gramen casia, chamæpitys, & polium, ex Aetii decreto. Horum unumquodque (ut ipse inquit) ex aqua coquendum est, & cum uino & melle bibendum, in cibisque tribuenda sunt fœniculum, apium, daucus, pastinacæ probe percoctæ, erithma, scandix, & gingidium. Verum si inflammatio ad duris permutatione uertatur quam celerrime adiuuare oportet tum suppurationem, tum puris eruptionem ex eiusdem Aetii doctrina. In quem usum conferunt spongiæ flos gratia ad motæ assidue imbutæ aqua & oleo, aut eadem decocto inbuatur foliorum, & radicum althææ, chamæmeli, fœnugræci, & seminis lini, & sæpius (ut supra) alidæ admoueantur. Eundem usum præbebit cataplasma ex farina hordeacea cum ficum & althææ ex aqua malsa decocto. Bonum quoque est ipsas ficus admiscere tritas, & absynthii comam contusam, uel ex eadem farina hordeacea, & erui oleo, & resina terebenthina cum melle, & ficibus pinguibus cataplasma fiat. Interim addere poteris cardamomi, uel columbæ stercoris parum, ut Paulo uisum est. Et ubi maligna fuerit inflammatio ex putrescentibus humoribus orta, quos ex febrium acrimonia cognoscas etiam rosæ in cataplasmata commiscendæ, myrthique baccae, & erui, ac lentis,

Topica.

Cap. 16

Vrinam ciencia
quo tēpore ex-
hibenda sint.

Puris generatio
ni quando opi-
tulandum sit, &
eum quibus,

Quæ tribuenda
sint pro absces-
sus ruptura.

tis farinæ, hæc etenim humorum putrefactioni resistunt. vt eidem Aetio placuit, genito vero pure, ipsius eruptio procuranda erit, In quem vsus ea, quæ urinam ducunt in potu exhibeantur, veluti cucumeris semen decorticatum ex aqua mulsa, palmulis in ipsa incoctis: danda etiam iris est cū melle despumato delingenda: eodem Aetio teste: aut fæniculum, glycyrrhizæ, iridisque radicem in aqua mulsa decoquito, ac exhibitō. vel etiam chamæpityos, fæniculi, pulegii, vel origani, & aliorum similium decoctum in potu præbeto. Remorātem quoque rupturam iuuant cuminum cum passo, & ruta cū vino mulso (vt idem fatetur Aetius.) At quæ præbenda sint post abscessus rupturam pro puris repurgatione, ac quomodo id dignoscendum sit, sequenti cap. docebimus.

περί ἰλαρώσεως τῶν νεφρῶν.

id est de exulceratione renum. Cap. 96.

4. metho. c. 1.
6. meth. c. 1.
Quid intelligen-
dum sit per re-
num exulcera-
tionem.
Signa renum af-
fectorum.

Viceris renum
signa.
Pau. li. 3. c. 45.
6. de loc. affect.
Cap. 2.

6. de loc. affect. c. 3.
Causæ internæ.

QUONIAM non solum post abscessus rupturam contingit renes ipsos exulcerari, sed ab aliis quibusdam causis, vt dicemus, propterea de hac exulceratione verba facere intendimus. Appellant autem græci affectū hunc quādoque ἰλαρός, interim ἰλαρόν, latine vero vlcus, & exulceratio dicitur. Nihil autem aliud est, quàm continui solutio in carnosā substantia contingens, Nam si in aliis partibus eueniat, cum in omnibus incidere possit, diuersa quoque nomina sortitur, vt liquet quarto & sexto metho. medend. Qua de re renum exulcerationē appellabimus eorundem solutam continuitatem. Ex dolore vero cum grauitate circa lumbos, si ambo affecti fuerint, coniicies eos affectos esse; & alter, si dexter, in dextra parte, si sinister, in sinistra dolor sentietur. sunt vero nonnulla alia signa, ex quibus renes exulcerari dignoscuntur, quæ cum simul, & affectum, & sedem affectam indicent, propterea nos in eiusdē affectus dignotione cuncta dinumerabimus. Est porro affectus hic sub eo morbo, qui communis a Galen. appellatur, contentus, solutio continui dictus, & propriæ in carnosā parte, hoc est renum parenchymate eueniens: quo fit, vt præter lumborum dolorem cum grauitate sine impedimento urinam reddant, cui pus mixtum reperitur carnosīs particulis inquantibus (Paulo auctore.) Gale. autem sexto de loc. affect. scriptum reliquit perseverantis vlceris notas (ex abscessu potissimū orti) ex vrina haud obscure deprehendi: adde quod laborans creberrime in affecto rene dolorem sentit, atque interdum cum vrina exiguum pus, veluti ab vlcere excernitur: similiter ramentum nonnunquam cum vrina expelli videtur per partes quasdam ipsius vrinæ inæqualiter dispersum, mediam conditionem seruans in eius cōmixtione pus ipsa, ac interim sanguis quoque cum vrina excernitur, qui erosus iam vlceris inditium est. Nam si sanguinem, aut pus mingat pluribus videlicet diebus, ac mensibus, aut renum, aut vesicæ exulcerationem significat, Hippocr. & Galen. auctoribus aphorif. 75. quarti libr. In qua vero earum partium euenerit, dolor distinguit, qui in differentibus accidit locis, & ea, quæ cum urinis excernuntur, adeo vt si velut carunculæ paruæ cū vrina crassā vna exeāt, proprie renum exulcerationem significabunt, vt 76. aphor. quarti libr. ab Hippocr. & Gale. decretum est. Etenim vocatum quidem ramentum vlceris essentia vero proprietas affectæ partis proprium inditium est, eodem Gale. auctore 6. de loc. affect. Ceterum si disrupto abscessui exulceratio succedat, carunculæ paruæ oblongæ cum vrina excernuntur, & si maligna fuerint vlcera, humores foetidi, liuidi, & mucosi. Si vero benigna fuerint, etiam pus ipsum albū, & æquale, & leue absque odore graui, & paucum reperietur, vt inquit Aetius, præcesseruntque alia præcedentis abscessus inditia, veluti præcedenti cap. ad-

notaui-

notauimus; quemadmodum si disrupto, uel exeso aliquo. renum exulceratio consequatur, eiusdem ruptionis, seu exesionis signa præcedant, quæ cap. de profluuiio sanguinis renum fufius demonstrauimus. Nec minus & lapidis signa præcedent, si ex eo peroredente exulceratio contingat. At si propterea quod acres, & mordentes succi urinae permixti per renes pertranscunt, iidem exulcerentur, eorundem acrium, ac mordacium succorum inditia redundantium aderunt, quæ nedum ex urinis percipi pocerunt, sed ex temperamento, ætate, habitu, anni tempore, præcedentique uictus ratione, ac reliquis. Nullumque aderit inditium rupti, seu erosi uasis: nec ruptionis abscessus, aut lapidis: Ex his etenim quatuor causis internis renum exulceratio oritur; ut liquet ex Pauli testimonio. Potest insuper quandoque ex externarum causarum aliqua excitari, ut ex assumptione alicuius medicamenti vim habentis renes erodendi, ac exulcerandi, aut ex illato vulnere. Id quod ex infirmi, seu astantium loquela prompte coniciet. Exacto autem studio laborandum est, ut renum vlcus cicatrice inducatur, quod nisi illico contingerit, difficiliorem redderet curationem, Gal. auctoritate sexto de loc. affect. quamuis minoris malitiæ sint renum, quam uesicæ vlcera: quoniam carnosæ partes, quam neruosa faciliores sunt curationis. Tamen nosse oportet omnem exulcerationem, & uesicæ, & renum egre curabilem esse, præsertim quæ ex erosione sit oborta: adeo quod paucos nominus, qui ab ea perfecte sint liberati, ut liquet ex Aetio. licet recentia ulcera non adeo ægre ut diutina curari possint, siue in renibus, siue in uesica fuerint orta. Renum quoque, & uesicæ vitia in senioribus difficulter sanantur, ut inquit Hippocrat. aphorif. sexto, sexti libr. quoniam & earum partium opus indefinens est (quiete autem opus est, siquid sanari debeat) & quia excrementum acre exacerbare natum est: Multo autem difficilior sanantur in senibus renum & uesicæ passiones, quoniam & omnes alij morbi præcipue longi ut testis est Galen. commen. eiusdem aphorif. Quinimo iidem diuturnis morbis correpti fecere commoriuntur, ut eidem Hippocr. visum est aphorif. 39. secundi libr. Pro cuius exulcerationis curatione aer eligi debet ad siccum inclinans: in actiuis temperatus, aut paulo ad calidum vergens: frigidus autem vitari debeo. Nam ipsum vlceribus mordax est, ut liquet aphorif. 20. quinti lib. somnus moderatus, aut consueto longior præcipiatur, cum immodicæ uigiliæ obsint, quies iniungenda est, vitentque ægri omnem delassationem, ac effertuentem gestationem, maxime quæ sit in equo, & omnem uehementem concitationem, & è conuerso perpetuum ocium, ex Aetii. decreto cap. trigesimo, libr. II. In uicem autem exercitii ægrum decumbentem molliter fricare singulis diebus mane conuenit: Repletiones omnes vitari debent, quinimo mollienda alius erit mollibus, ac lenientibus clysteribus, ubi natura fæces quotidie non excernantur. Animi affectus immodici omnino inhiuantur. Similiter & coitus, Nam omnibus renum, & uesicæ affectionibus insensissimus est, & maxime senibus, ac natura imbecillioribus, ut inquit Aetius: Cruditates autem cauendæ sunt, & ne quid crudum in cibo accipiant, neque quod ægre concoquitur, aut facile corrumpitur, aut inflammationem parit, sumant. Maxime tamē vitare debent quæ facile acescunt, & quæ crassi humoris sunt, quæ ægre, scernuntur, quæ urinam cient, & quæ amplius ventrem perturbant: item omnia acria effertuentia, & quæ accepta amplius astringunt, & magis rehicant & non nutriunt, & quæ stomacho inimica sunt, & quæcunque bilem, aut pituitam præcipue gignere possunt. Idoneus autem cibus erit ptisanæ cremor aut eadem met ptisana, aut amyllum, aut simlago lora cum lacte coacta: dan- dum & lac ouis permixtum & iusculum gallinæ pingne, ex Aetii decretis Item oua gallinarum tepida, & mollissima, si edantur, ualde proficiunt. Ego sane noui quedam ut inquit Alexand. qui oua, quam primum essent posita sorbebat

Externæ causæ

Prognostica.
6. de loc. af. c. 3

Curatio

Victus ratio.

forbebat circa coctionem, dicebatque se plurimum adiuuari, & rofiones, ac dolores, qui circa vesicam oriebantur, mitiores fieri, vt ferre posset, affirmabat. Ex oleribus conueniunt, malua, feris, rumex, portulaca, asparagus palustris, cucumis, & lactuca, omnia tamen coacta, nanque hec morsus obtundunt: nec quicquam crudum vorent, Cruda etenim olera tam renum, quam vesicæ ulceribus inimica sunt, ex sententia eiusdem Aetij. Cæterum pane vtantur recenti decenter, apparato, Carnibus gallinarum, pullorum, phasianorum, starnarum, & reliquarum volucrum montanarum teneram carnem habentium, & non antiquarum. Ex destribus autem conuenientiores sunt hædorum extremitates. Ex piscibus conueniunt aselli parui, & qui gobij appellantur, gam mari, locustæ, & fluuiales cancri, qui velut remedium præbeantur, vt ait Aetius. Erinaceus quoque recens familiariter permittatur. Ex bellariis vna passa non incommoda est. Similiter conueniunt nuces pineæ recentes duabus aquis macerare, pistachia, & amygdale virides, naturæ tamen. & probe mundate. siccæ vero non uetustæ, sed præmaceratæ, & decorticatæ. Voluptatis quoque gratia acetum modicum, concedendum. Eduliorum, autem varietates & superflua condimenta, omniaque nidorosa, graueolentia, & putrida inhibenda sunt. Sint item omnia, quæ in cibo sumuntur, mediocris multitudinis, etiam si vtilia esse ferantur. Multus etiam potus, & mercator, ac ieiunis potus omnes incommodi existunt. A frigida quoque potu in totum abstinendum, cum frigidum vlcerebus (ut diximus ex Hippocr. auctoritate) fuerit inimicum. Aqua tamen pluuia non corrupta omnino aliis melior existit, (ut inquit Aetius) quæ tamen actu non sit nimis frigida. Vtantur autem pro potu turius vino albo astringenti diluto, aut aqua, in qua hordeum torrefactum & radix glycyrrhizæ fuerint decocta. Confert item pro potu vti aqua mulsa, vbi ulcus non fuerit ex uiciosis succis, & mordacibus ortum. Quod si ex iam dictis acribus, & mordacibus humoribus renum ulcus contingat: ab eorundem humorum purgatione curatio auspicanda erit, ipsis tamen prius concoctis, ac præparatis. Sit autem medicamentum purgans, quod leniendo soluat. Veluti est mel aereum, saccharum uiolaceum, casia fistula, & syrup. ex pluribus infusionibus rosarum. Interim modicum diacath. adicere poteris, & ut eorum morsus obtundatur, syrupis uti licebit ex malua, cychorio, seu hortulana endiuia (quæ scariolam uocant) confectis: item eis, qui ex portulaca, uiolis, nimphæa, rosis seu papauere conficiuntur. Quanquam vomitu etiam eos, & forte tutius euacuare licebit, vbi ad eum fuerint potissimum parati. Nam non solum ad repletiones vomitus laudatur, verum si quis omni mense audacter vomas, forsitan & renum vlcus, & quicquid inde mali accedere posset dissoluet, ætuo teste. Post quæ ad ea, quæ vlcera repurgant, præbenda te conuertas: quanquam ea (ex quacunque alia causa fuerint iam dicta vlcera exorta) confestim præbenda sunt. Inter quæ magnopere conducit lac, præsertim cum melle, asininum potissimum, aut equinum: Sit autem recens mulctum, ac calidum animali in domum, vbi æger decumbit, deducto, Nanque & aliorum etiam internorum vlcerebus optimum est pharmacum, & graui puri maxime amicum, & corpus probe, nutrit, ut inquit Aetius. Confert etiam aquæ mulsæ aquosæ portio, nec non & cremor ptisanæ cum modico melle (ut inquit Alexand.) aut fœnugræci decoctum cum melle, seu cucumeris semen cum passo (ut uoluit Paulus,) Vel maluarum, seu cucumeris, aut melonum semine cum eadem aqua mulsa, aut adianti, equiseti, seu graminis decocto præbeas. Insuper & decoctum parabis ex ordeo cum corticibus torrefacto, adianto, ac glycyrrhizæ radice, cuius unt. iiii. uel. unc. iiii. cum unc. i. s. feminis melonum, ac cucumeris exhibeas: Pastillos quoque ex melonum, seu cucumeris semine, ac maluarum, & halicabi cum abrafa radice glycyrrhizæ, ac tragacantho ac uua passa, & saccharo

Medicamentorum ratio,

Purgans medicamentum,

Quæ vlcera repurgant,

saccharo conficias: quorum vnum, vel duos vice qualibet cum prædicto decocto, seu aquosa aqua mulsa dabis: Ex his vero, quæ urinam ducunt, simpliciora superius iam dicta ad repurganda etiam renum vlcerata bibantur. Etenim a situ & figura partium indicatione sumpta in renum, & vesicæ vitiis, nedum mel ipsum, sed etiam eorum, quæ urinas mouent quidpiam vlcerum medicamentis misceri oportebit, ex Gale. auctoritate 4. metho. med. Paulus eis, qui per urinam pus reddunt, bolum armeniam præbet, aut ferularum combustarum cinerem quantum tribus digitis comprehendi potest ex passo. Exhiberi autem poterit cuiuslibet eorum 3. i. cum aqua mulsa. aut lacte, potissimum ubi munda fuerint vlcerata: quod inde tibi palam fiet, si neque testorium etiam vlceri obductum cum urinis excretum appareat neque etiam pus excretum sit fœculentum sed subalbum, leue, & æquale, & paucum, ex Aetii auctoritate. Hoc etenim tempore pro his, quæ urinam ciunt, quæ exiccant, astringunt, ac cogunt, tum alimenta, tum medicamenta, simul atque ea, quæ conglutinant adhiberi debent. In quem usum hoc nostro medicamento vtare, exiccat etenim, cōglutinat, atque astringit cum hoc, quod dolorem sedat. Excipit vero vix passæ, phisticorum, pinei fructus, & amygdalarum dulcium torrefactarum, cuiuslibet 3. s. seminis althææ, & halicacabian. scrup. i. seminis lactucæ, & hyoscyami scrup. s. amidi, tragacanthian. scrup. i. s. radice dulcis scrup. ii. s. seminum melonum, & cucumeris ana. drac. iii. boli armenie, seu cineris ferularum combustarum scrup. ii. sacchari dissoluti in aqua rosarum, & capillorum veneris quantum satis sit, fiant in morsulis: Ad inueterata autem renum vlcerata, ea pharmaca assumentur, quæ ad exulceratam vesicam describentur. Extrinsecus quoque quæ renes exicare, ac roborare possunt admoueantur, vnguenta, cerata, cataplasmata, seu emplastra, quæ ex oleo myrtino, cytoriorum, rosaceo, ac mastichino, polygoni, seu plantaginis succo, mastiche, thuris cortice, bolo armenie, sandalis, hordeacea, seu fabacea farina, ouorum albugine, cera, & aceto, ac similibus cōficiantur. Hæc studiosi fusius conscripta cap. de vesicæ vlcere raperet.

4. meth. c. 7

Quæ exiccant,
ac conglutinant
quādo cōpetant

περὶ τῆς οὐρῆς.

id est de stillicidio urine.

Cap. 97.

NON satis erat (vt diximus) pro eo excremento, quod græci ὀύρον, latini urinam, seu lotium appellant, excernendo, naturam renes fabricasse, Nam cum eos iuxta iecur, quo promptius tale excrementum a sanguine fecerneretur collocasset, nec eodem loco commode excernere potuisset, Iure quibusdam prælongis meatibus, ac fortibus, a græcis vriteris dictis, indiguerunt: quibus mediis vi renum eadem urina secreta proprium receptaculum deuenisset: li etenim sunt, qui renes vesicæ committunt, qua ratione in infernis partibus, vt commode tale excrementum excerneretur, Vesicam tanquam cystemam quandam, ac proprium eius receptaculum construxit, vt proinde ipsa quoque vesica inter alimenti instrumenta secundam rationem a natura fabricata merito connumerari mereatur, ea potissimum, quæ excrementa excipiunt, Eius itaque munus est, vt susceptum lotium statuto tempore, cum scilicet ratio iuberit, foras propellat, Gal. auctore 5. de usu part. Propria namque eius actio est (et idem Gal. testatur. de loc. affect.) urinae excretio. Num vero tale excrementum vesica attrahat, an a renibus duntaxat ad ipsam excernatur, Galenum reperio diuersis in locis aliter sentire, Nam 6. de locis aff. Vesicam non trahere a renibus, quemadmodum neque intestina a ventericulo, sed renes per vriteras excernendo in venterem mittere, Ventericulum autem in ieiunum per eam partem (quam Herophilus dodecadaetylon vocat)

scriptum

Vesicæ munus
5. de usu par. c. 5
in prin.
6. de loc. affect.
cap. 3
Num vesica urinam attrahat a renibus,
Cap. 2.
Cap. 7

Dilucidatio ver-
borum Gale. di-
uersis in locis,

Cap. 10

6. de loc. affect. 3
& 4.
3. de caus. symp.
cap. 2
Quid per urinę
stillicidium in-
telligendū sit.
Quod vesica in
eo afficiatur,
Cap. 3.

Quis affectus
præter naturā
sit urinę stillici-
dium,
Lib. de diff. sym-
pto.
Cap. 5
3. de caus. symp.
Cap. 2
Causæ.
Loca citato.

Cap. 2

scriptum reliquit. At 5. de usu part. oppositum sentire videtur, cum dixit, Porro vesica, non ea solum quę bilem, sed & quę urinam recipit, purum utraq; atque ab aliis secretum cum attrahant excrementum proprium, inter optimo vasa alia alimentum sibi ipsis suppeditatura flagitarunt. Atqui nos vbique locorum Galen. veritatem fateri asserimus, Nam non à renibus, priusquam ab eis ad vteras excreta fuerit, urinam vesica attrahit, sed ab vteris ipsis postquā ad eas vi renum fuerit expulsa, aliās non minus vesicę, quam renum vitio passio *διὰ τῶν* appellata ortum deducere posset. Attrahit itaque lotium vesica ab vteris suis vtēs fibris rectis, quas nō alia ratione à natura obtinuit, quā, ut tale excrementum attraheret, & non a renibus (vt dictum est.) Quod si quis inficias ibit, qui fieri possit ut alienum, atque excrementosum ab eadem vesica, aut qua uis alie parte trahatur, cum facultas hæc partibus insita sit omnibus vt familiaria, & non aliena, ac excrementosa attrahant? Cum eodem Galen. respondebimus nos, Vesicam non pro sui nutrimento lotium attrahere, sed ut instrumentum a natura fabricatum ipsum recipiat, ac statuto tempore (ut diximus) excernat, & quanquam superfluum quoddam sit urina, ac excrementosum, adhuc ipsa vt natura instrumentum affinitatem quandam, cognitionem, ac familiaritatem (vt ita dixerim) cum eo habet, seu saltem qualitatis communitatem quandam, lotio potissimum, ac eadem vesica secundum naturam se habentibus, alias neque trahere huiusmodi excrementum potuisset, neque innoxie, ac citra dolorem notabili quodam tempore retinere, ut ex nota Galen. liquet præcitato libr. quinto de usu part. Quicquid tandem sit sæpenu-mero contingit, ut eiusdem vesicę functio multifariā oblædatur, ipsa aut propriis, aut communibus effectibus præter naturam offensa. De quibus iam tempestiuum est verba facere, ab eis exordietes, qui ipsi soli proprii sunt, quorum unus, atque præcipuus is est, quem Græci *σπασμὸς* appellant, eodem Galen. auctore. 6. de loc. affect. & 3. de caus. sympto. Latini vero urinę stillicidium nuncupant. Quod vero urinę stillicidium significet urinę stillatim excretionem, nomen ipsum ostendit, vt inquit Galen. commen. aphor. 48. 7. libr. Nam quando aliquis parum, & frequenter, mingit, passio urinę stillicidium nominatur, eodem Galen. auctore com. aphor. 58. 5. lib. Eadem sententiam confirmauit Aetius cap. 19. libr. 11. cum dicit, Stranguria autem appellatur cum paulatim, & guttatim urinę destillant, & assiduam ad mingendum irrationem faciunt. At quod solius vesicę propriū symptoma sit urinę stillicidium præter id quod Galen. scriptum reliquerit 6. de loc. affect. ipsius propriæ actionis læsio ostendit quę est urinę excretio. Immoderatus etenim excretrix facultas in hac affectione mouetur: Quanquam eadem vesica non perpetuo, proprio ac primario affectu laboret, sed interim ex accidenti ac per consensum pro diuersitate causarum, ex quibus tale vitium excitatur, vt dicemus. Porro quod affectio hæc sympto. sit in genere excretorum immodice, deprauatum motum excreticis vesicę facultatis insequens, ex eodem Galen. liquet libr. de differ. & tertio de caus. sympt. Excitatur autem excretoria uis ad immodicum motum quotiens retentiuā facultas, vel ex multitudine excrementorum, acrimonia ve, uel ex propria imbecillitate laborat, vt eodem tertio de caus. sympt. scriptū est, Quapropter non ab re duas esse in vniversum causas stillicidii urinę cum Galen. fateamur commen. aphor. 16. 3. libr. 58. 5. & 48. 7. Quarum una eiusdem urinę acritudo existit, Reliqua vero potenti æretentiuā, quę est in vesica imbecillitas: assiduę etenim excretiones fiunt, vel propter imbecillitatem, vel demorsum, eodem auctore tertio de caus. sympto. Quamuis vbi acrimonia in causa sit nedum ex humoribus acribus, qui in venis existunt, & per renes, & vesicam expurgantur, fieri possit urinę stillicidium, sed interim ob renum vitium, præsertim ipsis purulentis existentibus oriri poterit. Hippocr. auctore præcitato

præcitato aphorif. 58. quinti libr. Aliquando etiam ob alias partes, quæ cum vrinis humorum suorum vitia, aut pus, vbi abscessus aliquis infestauerit, trāsmittere possunt. Id vero interstinguere valebis, Nam si ex humoribus intra vasa redundantibus acrioribus proritetur affectus hic, vrinæ ipsæ ostendent, & totus habitus ad acriorem, biliosioremq̃ erit conuersus, Alexand. teste cap. sexto, libr 9 Si vero ob purulentos renes, aut aliud eorum vitiorum acriores fient vrinæ, ex his, quæ in præcedentibus conscripsimus pro renū affectorum dignotione perdisces, Nec minus, si ex alia quapiam parte mordaces succi, aut pus cum vrina excernantur, & propterea vrina acrior fiat, prompte cognoscere valebis ex propriis indiciis talium, affectum, ac partium affectarum. Ex quibus omnibus causis vesica ipsa non per proprium affectum laborabit, sed vrinæ vitio morsum sentiens, ad excretionem excitatur, Et propterea vrinæ stillicidium non eiusdē proprius dicetur affectus, sed symptoma (vr Galen. inquit eodem sexto de loc. affect.) Possunt insuper & vrinam acritudines fieri a quibusdam intemperaturis, & præcipue ab ea, quæ est secundum caliditatem, tum ab ea, quæ est secundum caliditatem & humiditatem, & tertia ab ea, quæ est secundum caliditatem & siccitatem, auctoritate Galen. comm. præcitato aphorif. 16. 3. libr. Quo loco animaduertant studiosi codicem, tum græcum, tum latinum esse deprauatē, cum dicat, tertio ab ea, quæ est secundum humiditatem: quod cum aperte falsum sit, castigandus locus erit, qui dicat, tertio ab ea, quæ est secundum caliditatem & siccitatem, vel ab ea, quæ est secundum siccitatem, a qua immodica tamen existente eodem commento dixerat fieri posse vrinæ stillicidium. Id enim Galen. phrasis, ac ratio ostendit. Verum vbi neque vna iam dictarum causarum affuerit, vesicam ipsam proprie, ac primario affectam esse propter eius imbecillitatem coniiciendum erit. Imbecillitas autem, aut propter eiusdem intemperaturā aliquam, seu tumorem præter naturam, aut vlcus contingit, vt in præcitatis aphorif. a Galen. decretum est, & sexto de loc. affect. Omnis autem immodica intemperatura imbecillam reddere vesicam potest, præsertim autem frigida, eodem Galen. teste præcitato comen. aphorif. 48. 7. lib. & 6. de loc. affect. Tunc etenim plane grauari videtur, vel paucō admodum contento in ipsa humore, vt idē Galen. inquit. Cæterum cum ab intemperie vesica imbecillior redditur eius essentia oblata, læditur ppria ipsius actio, quæ (vt diximus) est vrinæ excretio. Ob frigidam autem intemperiem, si vesica fuerit reddita imbecillior, & vrina magis alba apparebit, & ea, quæ præcesserunt frigidiora fuere, tum victus, tum balnea, similiter temperamentum, & ætas, ac reliqua, id prompte indicabunt, Nec admodum difficile erit percipere, si ex quapiam alia immoderata intemperie (licet raro id eueniat) eadem vesica imbecillior facta fuerit. Similiter, si ob instrumentales affectus eiusdem vesicæ talis fuerit orta imbecillitas, cum & ipsi imbecillitatem interdum inducere possint, ex sententia eiusdem Gale. eodem sexto de loc. affect. haud egre perdiscere valebis, tum ex te ipso, tum ex his, quæ infra dicemus, veluti inflammatio, erysipelas, aut abscessus, aliquidve tale in ea fuerint orta, aut etiā vlcus aliquod. Nec te præteribit quod interim per compatiendi rationem vesica patiente, vero videlicet, aut recto intestino inflammatis, possit & vrinæ stillicidium excitari, Nam vicinitatis ratione pati vesicam est necessarium, vt quæ intemperaturam participes, & inflammationem, & præterea prematur, atque angustetur a tumoribus præter naturam, qui in illis existunt, Hippoc. & Gale. testibus iam citato aphorif. 58. 5. libr. Idque ex propriis indiciis dictarum partium inflammatione laborantium percipies. Cæterum si ob vrinæ acrimoniā vrinæ stillicidium exordium sumat, eger assidue ad mictionem cogendus est, & plurima aqua calida dulcis exhibenda in potu. Nam si acre recrementum diutius in vesica

more-

Cap. 4.

6. de loc. af. e.
citato.
6. de loc. affect.
Loco citato.

Cap. 4

Prognostica,

Curatio stillicidii
urinae, si ex
acrimonia eius-
dem urinae pro-
ueniat.
Vicius ratio.

Medicamento-
rum ratio.

Purgatio.

Alterantia, &
contemperantia.

Clystere.

Balnea.
Fotus.

moretur, partes ipsas corrodit, & exulcerat, Actio teste. Quod si senioribus talis affectio eueniat, difficulter sanabitur, veluti & quodlibet aliud renum, & vesicae vitium, vt Hippocr. visum est aphorif. 6. sexti lib. Idque potissimum fieri, vbi ex frigida intemperie cum frigidorum humorum redundantia ortum habebit, Timor etenim erit ne ad mortem vsque eos comiteretur, quemadmodum & alii frigidi, ac diuturni morbi, vt liquet commen. aphorif. quadrigesimi 2. lib. Porro si ab acribus succis intra vasa redundantibus, biliosis, quam vrinè stillicidiū contrahatur, eis in vniuersum vtendum erit, quæ alterant, humectant, ac contemperant, Paulo, & Alexand. testibus. Quapropter aer eligendus est in passiuis ad humidum inclinans: In actiuis reperatur: somnus moderatus, aut consueto parū longior: Vigiliæ immodice vitentur: quiescant agrotantes, & exercitum vitent: Alius seruetur lenis, si non natura, saltem arte lenibus clysteribus. Animi accidentia vitanda sunt, præsertim ira: A cibis calidis, acribus, aut falsis omnino abstinendum, & a tarda comestione, vt inquit Paulus. Quapropter his utilis est ptisana, eiusque cremor per se, interdum etiā cum lacte, vbi magnā pars acrimoniae finierit, quoniam lac (vt inquit Alexand.) corrumpitur, si qualitate sicca, & acri præpollente multum exhibeatur. Poterit insuper eadem ptisana cum pullorum, aut gallinarum iure parari, seu etiam cum amygdalarum dulcium cremore. Inter pisces quoque saxatiles eligi possunt, Et inter olera lactuca, buglossum, malua, ac portulaca. Pro potu vinum præberi non debet, nisi id dulce sit, optimeque dilutum, Et eis exhibeatur, qui alio potu vti non valent, propter eiusdem vini consuetudinem, aut corporis imbecillitatem. Reliquis vero pro potu aqua præbenda est dulcis, calida: quemadmodum Aetius, & Alexand. iubent. In vicem cuius aqua etiam hordei, aut decocta aqua dulcis cum paucis saccharo rosaceo permixta, seu radice glycyrrhizæ decoctum præberi poterit. Optimum quoque est & lac ipsum calidum potatum, vt inquit Aetius, & amyllum cum lacte decoctum, itemque cum palmorum decocto absorbendum præbere. Quod si neque his contemperetur redundans succus, ac eius acrimonia obtundatur: tunc exuperantem vitiosum humorem quam celerrime purgare oportet, aliisque medicamentis contemperantibus, ac morsum obtundentibus utendum. In quæ usum conferunt mel acreum, casia fistula, saccharum violaceum, ac syru. ex pluribus infusionibus violarum, aut etiam rosarum, poteruntque vnc. iij. mellis aerei, aut sacchari violacei, seu vnc. ii. casia fistulæ cum myxarum, vnc. passæ, radice glycyrrhizæ, ac hordei decocto, seu aqua lactis exhiberi. A dicta purgatione, ante eam syrup. etiam violaceus, ex infusione rosarum, ex nymphæa, papauere, aut buglossi succo paratus contemperandi gratia commodè exhibeatur. In hunc etiam usum exhibita purgatione cremos seminis citruli, cucumeris, vel melonis competit cum aqua hordei, aut palmularum, seu radice glycyrrhizæ decocto, vel pastilli hunc modum parari præbeantur. Recipe seminis melonis, citruli, & cucumeris ana drac. ii. vnc. passæ, & succi radice glycyrrhizæ ana drac. i. seminis lactucæ, portulacæ singulorum scrup. s. amyli scrup. i. s. sacchari in aqua rosacea dissoluti, quantum satis sit, misceantur, & fiant pastilli. Clysteres quoque interim adhibeantur parato decocto, ex hordeo, foliis maluarum, althææ, betæ, ac violarum, exiguoque sale, cui adicito olei violacei vnc. iiii. mellis violacei vnc. ii. casia fistulæ vnc. i. misceantur, & fiat clyster. His quoque apta sunt continua aque dulcis balnea, vt Alexand. Paulo visum est. Insuper & continuis fomentis (ut inquit Aetius) uti oportet circa pubem adhibitis ex decocto foliorum maluarum, violarum, & althææ, rosarum, florum chamæmeli, ac fœnugræci paratis, In ungendaque partes circa vesicam ex oleo violaceo, de nymphæa, seu papauere amygdalarum dulcium, ac rosaceo. Quod si acrimonia adhuc augeatur, etiam

etiam per colem lac ipsum cum amylo in vesicam iniiciatur, ut inquit Aetius. Confert item in hunc usum lac ipsum per se caprillum potissimum, Item cremor seminis papaveris, melonis, seu cucumeris, ac etiam maluarum, & alchæ. cum aqua hordei, in qua etiam radix glycyrrhizæ fuerit decocta, si iniiciatur. At si urinae stillicidium ob frigidam vesicæ intemperiem fieri contingat, his, quæ calfacere possunt, & in victus, & medicamentis uti necesse est, Tralliano auctore Cibis itaq; & potibus validioribus utantur. Inter olera apio, ac daucos, fœniculo, seu oreosolino. Pro potu vinum calidius his est idoneum. Similiter & aromatum decoctiones in potu exhibere conuenit, ut inquit Aetius, aut artemisiæ, seu scordii decoctum, ex Alex. auctoritate. Item conuenit theriacam præbere in potu cum passio, & uino mulso, ut eidem Aetio uisum est. Nec minus confert oleo rutaceo calido pectinem fouere, ac egrum in samptuchi, aut rutæ decoctum desiderare, imumque ventræ contingere, ac calfacere. Aliquando & per sedem oleum rutaceum infundere, ex sententia eiusdem Aeti. Conueniunt item quæ urinam ciunt, tum cibi, tum medicamenta, ex eiusdem Aetii, & Pauli auctoritate, & insuper confert aquis naturalibus pro balneis uti, & reliquis calidis unguentis, Alex. teste. quorum speciatim sylvam sequenti cap. studiosi inuenient. At si ex aliqua quapiam intemperie urinae stillicidium excitari contingat (quamuis raro id eueniat) perpetuo suo curabitur contrario, quemadmodum si aliud membrum primo sit affectum, & id ipsum per uesicam expurgetur, aut uicinitatis ratione per cōsensum offendat, manifestum est illud primo curari debere, ita tamen, ut neque uesicam negligamus, ut inquit Aetius.

Si ob frigidam
vesicæ intempe-
riem oriatur cu-
ratio.

περί Δυσγρίας.

id est de difficultate urine.

Cap. 98.

Nec minus, & inter eos præternaturam affectus, qui soli uesicæ proprii sunt, connumerandus est is, qui a græcis *δυσγρία*, a latinis uero urinae difficultas dicitur, Cum uidelicet meiere æger cupit, & cum ui urinae excernuntur, ut inquit Aetius cap. 19. lib. 11. Quanquam a Gale. com. apho. 48. 7. libr. bifariam mingendi difficultas interpretetur: Vno modo quando cum dolore sit mictio: alio quando cum difficultate aliqua, adeo quod uix uesica operetur. Hinc Trallianus cap. 6. lib. 9. dicebat, Urinae difficultas partim cum dolore, partim sine dolore oritur. Id autem (ut dicemus) euenit ob causatum, ex quibus oritur uarietatem. Siue itaque cum dolore, siue citra dolorem, sed cum difficultate aliqua, adeo ut uix uesica operetur, fiat hæc affectio: perpetuo urinae difficultatem eam nominabimus, ex Galen. decreto præcitato loco. Quod uero, nedum uesica, sed ipsa sola in hac affectione semper laboret, ex eius functione oblæsa patere poterit, quæ urinae excretio est, ut præcedenti cap. notauimus. Hæc etenim ita oblæsa est, ut imbecilla, & ueluti torpens reddita sit. Similiter ex dolore cum posito, si cum dolore mictio fiat. At quod symptoma sit in genere retentorum, uel excretorum immodice, lib. de differentia, & 3. de caus. sympt. scriptum est. Ex eius quoque excretionis modo liquere id poterit, Nanque cum dolore, aut saltem cum difficultate sit mictio. Vbi autem cum dolore fuerit ex inflammatione, aut abscessu, ulceratione, inæquali intemperatura, aut spiritu flatuoso ortum habebit. Si uero motus duntaxat difficilis fuerit, aut propter potentie imbecillitatem, uel tumorem contra naturam (indolorosum inquam) excitabitur ex eiusdem Gal. sententia præcitato aph. 48. 7. lib. Verum si dolor cum grauitatis sensu fuerit, quod inflammatione, aut abscessu uesica infestetur, suspicandum est. Distingues autem inflammationem ab abscessu ex alijs proprijs eorundem morborum inditiis. At si cum dolore pus quoque cum uri-

Quid per urine
difficultatem in-
telligendum sit.

Pars affecta.

Quis affectus
præter naturam
sit.

De differ. sym.
cap. 5.

3. de cau. symp.
cap. 1.

Causæ.

Causarū signa.

na excernatur citra grauitatem, sed cum vehementi rosione, vlcerationem in causa esse iudicabis. Sed si absque grauitate, verum cum distensione sola dolor in vesica percipiatur, spiritum copiosum, ac flatuosum difficultatis vrinae causam esse suspicabimur, Alex. teste. Vbi autem nullum tale affuerit inditium & cum dolore mictio fiat difficilis, ex inaequali eiusdem vesicae intemperatura eandem vrinae difficultatem oriri censeo. Verum quanquam ea & calida, & frigida, & etiam sicca quandoque esse possit: saepenumero ex frigida contingit: etenim vesica exanguis, & frigida est, & propterea a causis frigidis plusquam aliae partes, promptius afficitur, quemadmodum euenit in aquilonis flatu. Tunc nanque vrinae difficultates oriri consueuerunt, Hip. & Gal. testibus aph. 5.3. lib. Id autem percipere poteris, nedum ex aquilonis flatu, sed ex reliquis quoque causis infrigidantibus, quae praecesserunt atque etiam ex etate, temperatura, vrinaeque tenuitate, & albore, ex Pauli auctoritate. At si ex reliquis inaequalibus temperaturis excitari contingat cum dolore vrinae difficultas (quanquam non saepius id contingat) ex propriis earundem inditiis, haud aegre percipi poterit, quemadmodum interim contingit in ardentissimis, ac siccissimis febribus, vt Aetio, & Paulo visum est. ex eisdem quoque intemperaturis, licet non inaequalibus dolorem inferentibus, redditur potenti & imbecillitas: ex qua citra dolorem cum difficultate mictio fit, licet praecipue ex frigida: quae haud aliter dignoscuntur, quam praedictae quanquam vbi cum frigiditate simul pituitosus humor redundet, praeter alboborem vrina crassa apparebit, Paulo teste nec non & alia adderunt inditia redundantis pituitae: potissimum si in toto redundarit, & demum ad vesicam demittatur eiusdem vesicae ceruicem obstruens: ex tumore item quopiam praeternaturam (eodem Galen. auctore) difficilis quandoque fit motus in vrinae excretionem, De eo tamen intelligendum est, qui dolorem non parit. Nam de his iam meminerat inter eas causas, quae cum dolore faciebant vrinae difficultatem. Sunt vero hi scirrhi, & oedematosi tumores: qui quonam modo dignoscendi sunt prompte cuiuslibet patere poterit, ex propriis eorundem tumorum inditiis. Quare non est cur hiea particulatim conscribam; Porro si vrinae difficultas in ardentissimis, ac malignis febribus fiat, mala est. Nam nedum vesicam affligi significat, sed inditium est, quod omnes neruosa partes sint affectae, ex Aetii testimonio. Verum ex aliis causis vbi oriatur, tanto salubrior erit, quanto dolore vacabit. Ex frigida tamen intemperie si exci-
 retur senibus periculosior est, veluti & ceteri morbi frigidi. Verum vbi ex ea reddita fuerit imbecilla vesica, adeo vt eius actio laedatur, & mingendi difficultas iam originem traxerit, Pro eius curatione aer eligatur ad calidum vergens, Somnus moderatus, ac moderatum exercitium, Cibi in quantitate modici, & boni succi, In qualitate vero ad calidum vergentes: qui & vrinae quoque ciendae facultatem habeant. Propterea cum eis vtendum est oreoseliuo, apio, foeniculo, asparago, dauco, & reliquis similibus: qui item cum aromatibus, praeparentur, cinnamomo videlicet, gariophyllis, macere, galanga, zingibere, nec non & aniso. Vino quoque vtantur calidiori, immo etiam eo, quod cum aromatibus quibusdam est, compositum, quemadmodum id est, quod vulgus Neapoli hypocrassum appellat. Competit quoque & aqua mulsa cum aromatibus quibusdam parata. Pro medicamentis, eis vtantur, quae calfaciendi, ac vrinam ciendi vim habent, vt diximus, quemadmodum est scor-
 dii, & arthemisiae decoctum, hyssopi, pulegii, foeniculi, origani, vel thymi cum aqua mulsa: nec minus interdum theriaca, aut mithridatum, diagalanga, aut diacinnamomum, aut diacalamentum, aut dianisum praebere poterit: praedictorum scilicet 5. j. assumens cum vini albi vnc. iiii. aut tantundem praedictae aquae mulsae. Extrinsecus quoque fouendae sunt partes circa vesicam

Lib. 3. cap. 45.

2. aph. com. 43.

Prognostica.

Lib. 11. cap. 20.

Curatio. si ex frigida intemperie oratur mingendi difficultas.

Victus ratio.

Medicamentorum ratio.

ex decocto pulegii, sampſuchi, origani, & foliorum rutæ calaminthæ, florum chamæmeli, & fœnugræci: Fiat autem quandoque decoctum, nedum in aqua ſed etiam in vino albo, aut in duabus partibus aquæ, & vna vini, prout magis expedire videbitur. Ex quibus quoque inſeſſus parari poterunt. Item eadem partes illinendæ oleo anetino, chamæmelino, rutaceo, irino, nardino, de caſtoreo, & reliquis ſimilibus. Clyſteres quoque inniciantur ex florum chamæmeli, pulegii, furfuris, ac carycarum decocto, pauco ſale communi addito ac vnc. iiii. olei rutacei, anethini, vel irini, & vnc. ii. mellis roſacei, aut mellis communis deſpumati adiectis. Vbi vero cum frigida intemperie ſimul pituitoſi ſucci redundarint, nedum in veſica, ſed in toto corpore, priuſquam ad iam dicta medicamenta deuenias, iidem concoquendi, præparandi, ac purgandi ſunt. Præparentur autem melle roſaceo, oxymelite ſimplici, aut ſcillino cum ſyrup. è ſucco borraginis vel è corticibus citri, & aquis fœniculi, lupulorum, meliſſæ, ſeu betonicæ Purgentur vero agarico, pulueribus hieræ ſimplicis, caſia fiſtula, diacath. ſeu confectione de daſtylis: vel ſi mauis catapotiis vtare fœtidis, ſeu de ſagapeno cum agarico permixtis. At ſi in veſica duntaxat prædicti ſucci redundant: benefacit etiam compositum oxymel, & muſſa, decoctum radicis rhamni. ac origani, quod mirifice iuuat; vt inquit Alexan. Item, vtendum eſt hyſſopi, pulegii, origani, vel thymi decoctis cum aqua muſſa, ex Pauli auctoritate, Interimque vtendum prædictis medicamentis extrinſecus adhibitis; Quod ſi ex flatuoſo ſpitu dyſuria gignatur, quæ flatum diſcutiant, medicamentis intus, & extra exhibitis vtendum erit: quorum copiam requirant ſtudioſi cap. de coli dolore. Ex cæteris item veſicæ intemperantiis, ſi exciterur, perpetuo eorum contraria medentur. Quapropter ſi in ardentibus, ac malignis febribus fiat vrinæ difficultas, ſouendæ partes ſunt imi ventris, pectinis, inguinum, & coxendicum oleis, ſuperfuſionibus, fortibus, ac cataplaſmatis, quæ laxandi, ac humectandi vim habeant cum exiguo aut nullo calore. In quem uſum conuenit oleum chamæmelinum, anethinum oleum commune dulce, ſotus, ac ſuperfuſiones: ex maluarum, althææ, ac fœnugræci decocto: Similiter & inſeſſiones: quæ etiam ſalubriter in hydrelæo ſient, ex Pauli teſtimonio. Et ſi alius quoque aſtricta fuerit prædictorum decoctum oleo communi, anethino chamæmelino, aut amygdalarum dulcium addito inniciatur. Si vero difficultatis vrinæ cauſa fuerit inflammatio, abſceſſus, vlceratio, vel quiuis alius tumor præter naturam, Ex eorundem vitiorum curatione, quorum in ſequentibus mentionem faciemus, curabitur.

Si cum frigida intemperie frigidi quoque ſucci redundant, curatio.

πρὶ τῆς ἰσχυρίας.

id eſt de ſupreſſione vrinæ.

Cap. 99.

V Eſicæ inſuper velut vrinæ receptaculo. ac meiendi inſtrumento id ſymptoma ſuperuenire ſolet quod à græcis ἰσχυρία, latinis ſuppreſſio vrinæ dicitur. quinimo ipſi ſoli propriū eſt, Gal. teſte 6. de loc. affe. Quod vero iſchuria vrinæ ſuppreſſæ affectionem ſignificet, ipſum nomen declarat. Aegrius enim in totum in hac affectione vrina ſupprimitur, ac cohibetur, vt liquet ex Aetio cap. 21. lib. 11. Quanquam nos ex Galen. ſententia, non quamlibet vrinæ ſuppreſſionem, ſeu cohibitionem ἰσχυρίαν appellamus, cum dixerimus eam ſolius veſicæ proprium eſſe ſymptoma, ſed illam duntaxat, in qua in veſica vrina omnino ſupprimitur. Supprimi nanque poteſt vrina ipſa veſica haudquaquam affecta, ſed renibus, vel vreteris, (eodem Gal. teſte primo de loc. affect.) Verum hanc vrinæ detentionem, ſeu cohibitionem (licet vulgus. medicorum nō ſecus ἰσχυρίαν vocet) ἰσχυρία tamen

Cap. 4.

Quide per ἰσχυρίαν intelligēdu ſit.

Cap. 1.

H h 2 non

Cap. 2.

Duplex for

De qua tractetur

Quæ pars in ea afficiatur.

1. de loc. affect. cap. 1.

De differ. sym. cap. ultimo.

Quis affectus præter naturam sit.

3. de. cau. sym. cap. 2.

6. de loc. affect. cap. 4.

Causæ.

Vesica bifariam in hac affectio imbecilla reddi potest.

Cap. 4.

Lib. 11. cap. 21.

Ex quibus, & quod causis vesicæ, os occludatur.

non est, cum uidelicet urina in vesicam omnino non uenit (ut liquet ex Gal. 3. de caus. sympt.) Permittendi tamen sunt (ut ipse inquit) ita nominare, cum propriam eius affectionis appellationem non habeant. Non tamen latere debet amborum affectum differentia: siquidem alter eorum est, cum uesica quidem est plena, sed nihil excernitur, de quo modo tractare intendimus. Alter cum uacua est nihil omnino in se continens. Ea de re diximus ueram ischuriam esse omnimodam urinæ cohibitionem in uesica, quæ sola, & necessario in hac affectione laborat, quoniam propria eius actio, quæ est urinæ excretio, oblata est: adeo ut ab ea nihil excernatur, tumorque aliquis apparebit in pube satis euidenter in circumscriptione uesicam impletam esse ostendens, ut liquet ex Gal. eodem primo de loc. affect. Quod uero symptoma sit in genere retentorum immodice, testis est idem Galen. lib. de differ. & 3. de caus. symp. In totum etenim urina detinetur, atque supprimitur; Id uero bifariam fieri potest, decreto eiusdem Gal. eodem 3. de caus. sympt. & primo ac 6. de loc. affect: quoniam uel occlusum est eius os. Vel si hoc se pro lege naturæ habet, ipsa ad sese astringendam, ac lotium foras extrudendum est imbecilla. Qua de re hic affectus cum plena uesica urinæ est, eademque supprimitur interim noxam propriæ functionis eius consequitur, quoniam præter eius imbecilitatem non ualet seipsam contrahere, ac urinam foras propellere. Interim si uero eadem illata existente, occluso tamen eius ore efficitur. Redditur autem in lotio excernendo uesica ipsa imbecilla in hac affectione dupliciter: Vel propter quampiam eius intemperiem, præsertim frigidam, Vel obtuso eius sensu. ita ut laborans uesicam impletam urina non sentiat ob affectos eiusdem uesicæ neruos, citra tamen expultricis eius facultatis læsionem, cum uidelicet proprii uesicæ nerui afficiuntur: Tunc etenim immodice extenta ipsa uesica propter urinæ multitudinem, quam in se continere non sentit (inter dormiendum potissimum) se ipsam contrahere non ualet nihilque excernitur, contractrice eius facultate læsa propter immoderatam tensionem: Id quod etiam interdum euenire solet aliis quibusdam sanis cum urgentibus negociis uel in concionibus, uel tenatu, uel foro, uel conuiuio, uel propter aliquam similem causam longo tempore urinam retineant; fuit etenim & uesica ipsa uelut quodlibet aliud naturale instrumentum neruorum particeps, ut quæ molestiam sibi exhiberent sensu quoque, uelut reliqua dignosceret; quibus adeo affectis, ut torpeat uesicæ sensus quod immodice repleatur, ac immoderate extendatur uesica accidit: quapropter & contractrix eius facultas læditur, quoniam in seipsam contrahi mediis transversalibus fibris, quibus in tali actione utitur, huiusmodi potest. Quo fit urina supprimatur, nec excerni quicquam eius possit, citra tamen expultricis facultatis læsionem: nanque ipsa expeleret utique, si contractrix facultas, quæ excretionem præcedit, suum munus perficeret: quippe uesicæ officium (ut patet eodem 6. de loc. affect.) unicum est, contractio inquam: imbecilla itaque redditur uesica in hac affectione aut ad sese constringendam aut ad lotium foras excernendum, eius corpore adeo affecto, ut quod in ea continetur, exprimere non possit. Verum primi causa est immoderata extensio propter immodicam repletionem, quinimo quantum amplitudo ipsius uesicæ expleta circumtenditur, tanto angustior seipso fit meatus, ut inquit Aetius. Reliqui uero intemperatura aliqua, sepiissime autem frigida. At si ex occulto eius ore, seu meatu, quem urinæ fistulam uocant, urinæ suppressio fiat, In uniuersum tribus modis fieri potest: aut enim corpus ipsius in tantum tumerem præternaturam atollitur, ut meatus inde occupetur: quemadmodum si inflammatione, scirrhus, uel abscessu, uel alio quouis tumore fuerit affectum, Interim & clauditur propter meatus conuenientiam

tiam ex nimia siccitate, aut aliquid ei præternaturam innascitur, velut caruncula, vel callus, Aut a re quapiam obstruitur meatus, veluti a lapide, pure, grumo, vel crasso, lentoque humore. Qua de re hæc omnia distinguere oportet, non solum ex præsentibus symptomatibus, sed etiam iis, quæ præterunt: Præsentia ex te ipso inspicias oportet; Præterita vero non solum a laborantibus, sed etiam ab ipsius familiaribus interrogando perdiscere, ex Gale. auctoritate primo de loc. affect. Vbi autem ex vesicæ imbecillitate orta fuerit urinæ suppressio sic percipies, Nam si hominē ita figuraueris, ut decliuus sit ceruicis vesicæ positus, ac manibus tumorem præternaturam compresseris, utique expelletur urina: quemadmodum si ita nihil profeceris urine fistulam constipatam esse cognosces; Verum nunquid expultrix duntaxat facultas ipsius fuerit oblata, vel torpidus fuerit ipsius vesicæ sensus propter proprios eius nervos affectos, adhuc non liquet, sed illud hoc pacto distingues. Nam si propter excretoris facultatis læsionem originem sumperit, cum fieri non possit, nisi propter aliquam intemperaturam, præsertim frigidam ipsius vesicæ: ex propriis intemperaturæ indiciis, quæ præcedenti cap. notauimus, haud egere dignoscere valebis. Quod si nullum tale affuerit indicium, præcesseritque læsio aliqua spinalis medullæ: Ut uerbi gratia, si fuerint ipsius ad externas partes uertebrae luxatæ eo loco, quo ad uescam proprii nerui distribuuntur: similiter si quomodolibet prædicti nerui fuerint affecti, ita ut animalis facultas ad uescam non pertingat, ex obtuso, seu resolutio eius uescæ sensu causari urinæ suppressionem censeto propriis uescæ neruis affectis, atque ipsa propter immodicam repletionem immoderate extensa. Verum si sanis quibusdam corporibus urinæ suppressio accidat, propterea quod longo tempore propter aliquam urgentiam ipsam detinuerint, ex eorundem loquela: & quod nullus alius præcesserit præternaturæ affectus, qui ipsam cohibere potuerit, facile percipies. At ubi urinæ cohibitio non ex corpore eiusdem affecto, seu imbecillitate proueniet, sed occluso eius ore, (ut diximus) figurato etiam ægro a deo ut decliuus sit ceruicis uescæ positus, ac manibus tumore præternaturam compresso minime expelletur urina. Occluditur autem uel ab inflammatione, (ut dictum est) uel scirrhus, uel abscessu, uel alio quouis tumore præternaturam, sed inflammatio ex propriis eiusdem signis, tumore uidelicet, dolore, ac febre, & reliquis dicendis, cap. proprio dignoscetur. Similiter scirrhus, uel abscessus, aut alius quouis tumor præternaturam: Si autem ob carunculam aliquam ab ulcere innatam uescæ ceruix obstruatur, ex præcedentibus ulceris notis, & ex eo, quod demissa ænea fistula, urina uacuatur, intelligere possumus. Interim cum urinæ excretionem sequuntur & cruor, & carnis fragmenta, Galen. teste primo de loc. affect. Verum si fuerit tophus, seu callus in ceruice uescæ innatus, præter id, quod longo temporis spatio ex crasso, lentoque humore paulatim nasci potest, Neque forte ulceris signa præcedent, neque ortæ carunculae signa aderunt. Quod si a lapide meatus obstruatur, ante urinæ cohibitionem lapidis inditia apparuerunt, urina uidelicet aquæ similis, in qua subsident sabulosa quædam, Insuper quod pudendum assidue scalpant taliter affecti, postea uero urina de repente supprimitur, aliasque signa præcesserunt generati lapidis, aut in renibus, quæ eodem ca. conscripsimus, aut in uescica: quæ proprio cap. conscribemus. At nulla lapidis nota retentam urinam præcedente, si sanguinis effluxerit, par est, ut grumus urinæ fistulam obturet: quo circa demissa per colem fistula, paulum urinæ reddunt; qua deinde extracta, in ipsius ore grumi inditium apparet; quanquam fieri possit, ubi ulcerata fuerit uescica, ut paulatim in ipsa grumus concreascit, uel non præcedente sanguinis fluore, ex eiusdem Galen. sententia primo, & 6. de loc. affect.

Cap. 5.

Si ex vesicæ imbecillitate oritur suppressio urinæ, signa.

Si ex obtuso uescæ sensu oritur, signa.

Si ex externa causa aliqua.

Signa, si ex occlusio ore uescæ urina supprimitur.

loco citato.

locis citatis.

Cap. 3. & 4.

Cap. 3.

Prognostica,

Loco citato,

Curatio.

Cap. 4.

Lib. 11. c. 24.

ad quos grumos, qui in uesica continentur, veluti etiam ad alios, qui in intestinis, ventriculo, atque, thorace, animi defectio, & calor pallidus sequi solet, pulsus vero parvus, obscurus, frequensque apparet, & laborans ipse cum anxietate resoluitur, adeo ut mirari aliquis possit, quæ nam sit huius euentus causa, ut eodem 6. de loc. affect. scriptum est, quam nos breuitati indulgentes omittimus, potissimum cum studiosi apud eundem Gal. præcitato loco, lib. de cibis boni, & mali succi, ac aliis plerisque perlegere eam possint.

Probabiliter quoque coniciamus cum pus eundem meatum obstruxerit, si renes, aut vesica, aut alia quæpiam pars, quæ per uesicam expurgari potest, ante affectu aliquo laborauerint, per quem talem, tantumque pus colligi poterit, tenuisque pus prius cum urina profluere uisum est, quemadmodum ubi ob crassum, lentumque humorem obstruatur, eiusdem humoris redundantis inditia aderunt, quæ nos cap. de difficultate urinæ adnotauimus, similiter ex præcedentium noticia in huiusmodi coniecturam inducimur, ex præcedenti uidelicet uictus ratione, Nam cibis crassis, lentisque, ac multis, & in ocio educatus est æger. Neque negligenda erit uniuersi corporis dispositio. Conniente autem iam dicto meatu ex immodica siccitate, Exiccantes quoque causæ præcesserunt, ueluti contingit in ardentissimis, ac siccissimis febribus, in quibus laborantem sæpenumero nec loqui posse uidemus, nisi os madefecerit. Porro urinæ suppressionem, quæ ob lauciatam spinam, aut casum, aut uerrebreg luxationem, aut ob lætales accessionum concursus suborta est, impossibile est curare; Quare caute remedia adhibere oportet, ut inquit Aetius cap. 24. lib. 11. Idem quoque auctor citato loco dicebat, quod cum ex his, qui paralyti exolutam uesicam habent, alii præter uoluntatem urinam emittunt, alii autem lotium non excernunt, Minus periculo sunt obnoxii, qui præter uoluntatem eam emittunt, ac magis hi, quibus detinetur, Nam lotio suppresso uesica & lumbi eis distenduntur, similiterque pecten, femora autem tumefacta habent, & cum non eiiciant lotium, subiecta membra mortificantur: neque ita longe post moriuntur, ut ipse inquit. Quod uero perniciofa etiam sit urinæ suppressio ex concreto sanguine, seu grumo, de cretum reliquit Galen. 6 de loc. affect. Nam & putredo partium, & marcor ipsum sequi solet, ut ipse inquit: & licet nonnullis medicamenta exhibuisset pro eius curatione, nihilominus omnes perierunt, uno quodam seruato solutis grumis, quos paulo post cum urina excreuit. Curandi uero ratio non una duntaxat erit, cum plures sint eiusdem causæ, sed pro causarum diuersitate uariatur: Qua de re si propter uesicæ imbecillitatem generetur, citra tamen casum, relicta uictus ratione, quam cap. de stillicidio urinæ reperies, primo figurandus erit æger modo, quo iuxta Galen. sententiam diximus, ac manibus tumor præternaturam comprimi, ita ut urina expellatur, musculi quoque abdominis, maxime medii ægrotantis manibus, seu alterius comprimantur, iuxta Gale. præcepta 6. de loc. affect. Deinceps assidui infessus, seu focus in foenugræci, seminis lini, altheæ, rutæ, samplici, ac artemisii decoctum cum oleo eis apparentur, & loci ex oleo rutaceo calido sæpe per diem, & noctem, & maxime post infessus irrigentur, & perfundantur, Cucurbitæ etiam locis affigantur, & cataplasmata imponenda ex cruda hordeacea farina, ex uino dulci, & mulso, ut testatur Aetius, præsertim si obtusus fuerit uesicæ sensus. Insuper confert, si unguento hoc irrigentur loci, Recipe olei nardini, costini, & rutacei ana unc. i. olei de scorpionibus, & irini, singul. vnc. s. mastiches, florum stœchadis ana 3. ii. castorei 3. i. sagapeni, & bdelli ana 3. s. dissoluantur gummi in uino albo, & addita cera fiat unguentum. In hunc etiam usum confert unguentum, dialthæa dictum, & reliqua medicamenta conscripta cap. de difficultate urinæ tam intus, quam extra adhibita:

& ubi propter ægrum vesicæ sensum contigerit, præter inessus, ac irrigationes iam dictas, excitare eius actionem oportet, nitro, aut nitri spuma ad meatum admotis, aut cimicibus contritis. Quod si ita non procedat, ad catheterum usum confugiendum, & per hoc ipsum instrumentum immissum urinæ prolectandæ, Aetio teste. Vrinam ducentia nequaquam bibant, ne multitudi-
 ne eius vesica distendatur: quibus etiam confert castoreum, itemque theria-
 cam in potu propinare, & post uacuationes, sinapismi tum pectini, tum lum-
 bis optimi sunt, ut eidem Aetio visum est: a quibus cerata, quæ partes mi-
 tigant, & malagmata odora imponantur, ut ipse inquit. Viscera quoque erina-
 cei terrestres exiccata, ac suffita, ægro vnde quaque contacto, urinam sup-
 pressam sanant. Oportet autem ipsa sale condire, ac exiccare, quin & in po-
 tu accepta sicca, trita quantum tribus digitis apprehendi potest, ex vino iu-
 uant. Carnis item erinacei in sole exiccata 3. lib. in vino data confert. Vermes
 quoque terrenos tres, aut quinque tritos ex vino mulso, aut aqua mulsa præ-
 beto, eiusdem Aetii præcitato: Item forinsecus arthemisiæ folia cum myr-
 rha trita, pectini, & immo ventri illinantur, seu perdicium herbam tertio, &
 affuso oleo teruefacito, atque vesicæ imposito: sed & sedes quoque his illi-
 nenda est, quibus obtusus est vesicæ sensus, ex decocto origani, thymi, ane-
 thini, ac centaurei cum oleo rutaceo, pauco admixto castoreo. Infundimus
 etiã per colæ oleum rutaceum, de scorpionibus, aut nardinum, seu irinum, etiã
 pauco castoreo addito, ut vesicæ actio reuocetur: Si vero crassi humores in
 causa sint, forientis, inessationibus, ac cataplasmatibus iam dictis, cura con-
 credenda est, ac reliquis utendum, quæ capit. de difficultate urinæ conscri-
 psimus. Ab his autem, quæ urinam ciunt, in totum abstinendum: In sa-
 nis autem, si accidat (ut dictum est) ob negotiorum importunitatem, aut ali-
 quod tale simile, ut lotium diutius retentum vesicam debilem reddat, auxilia-
 ri oportet ipsis ambabus manibus supra imum ventrem admotis, ac vrina len-
 te expressa: In ardentissimis, ac acutissimis febribus si hoc symptoma accidat,
 in fine præcedentis cap. curationem reperies. Si vero propter inflammatio-
 nem, aut alium quempiam præter naturam tumorem vrina supprimatur, ex
 propriis eorundem cap. curatio petenda erit, quemadmodum si ob caruncu-
 lam, aut callum retenta fuerit, per emollientia, ac relaxantia remedia, ac
 urinæ fistulam dilatantia curanda erit, & ubi ea non suffecerint, nea fistula,
 seu argentea demittenda erit, vulgus syringam vocat. Vbi vero multitudo, ac
 crassities puris vesicæ cervicem obstruxerit, per eadem medicamenta mol-
 lientia, ac relaxantia, nec non, & incidentia cura tentanda erit, intus, & extra
 huiusmodi medicamentis adhibitis. Quod si nec his finem assequaris, modo
 dicta nexa, seu argentea fistula immitenda erit. At si ex lapide vesicæ cervix
 fuerit obstructa, ex proprio cap. curandi ratio peratur. Verum ut lapis ex me-
 tu recedat, supino figurato ægro, ut crura reliquo corpore sint sublimiora,
 multifariam ipsum concuties, quibus peractis iube ut æger urinam reddere
 tentet, Quod si nihilominus vrina adhuc supprimatur, rursus concute, sed
 vehementius, atque si sic quoque permanferit, demissa ænea fistula, simul &
 lapidem a ceruice repelles, & urinam reuocabis, Galen. teste primo, & 6. de
 loc. affect. Vbi vero grumus vesicæ fistulam obturet, medicamentum, quod
 lapidem terere possit, ex oxymelle, atque ipsum quoque oxymel per se in
 potu dandum erit, præcitato eiusdem Galen. præcitato lib. 6. de loc. affect. Ar-
 themisia quoque in potu præbenda est, rubi, aut betæ succus, leporis coagulū
 aut hēdi, vnumquodque cum aceto mulso, ex Aetii auctoritate cap. 27. li. 1.
 Quod si hoc modo nihil proficias, necessitatem inducet catheteris adhibendi
 per quem ubi urinas eduxerimus, rursus prædicta in potu exhibeantur. Si ue-
 ro neque sic grumi dissoluantur, intercapedinem inter anum & pudendum

Lib. 11. c. 21

Lib. 11. c. 14.

Lib. 11. c. 13.

1. de loc. affect.
cap. 16. de loc. af. c. 4.
cap. 4

Loco citato,

(*περιεον* græcis dictam) inferne dissecare oportet ut eidem Aetio visum est.*περι ἐνσπιντων. id est de his qui in seipsis mingunt, vel de his, qui urinam continere non possunt.*

Cap. 100.

Cap. 14.

Masculi vesicæ
cervicem ambi-
entis usus non
unus est.
Cap. 16.Quod urinæ
redditio non sit
opus naturale,
nec animale dū
taxat, sed mixtū
ex utrisque.
cap. 4Pan. lib. 3. c. 45.
Gal 6. de loc. af-
f. 3. & 4
Quid per urinæ
incontinentiam
intelligendū sit,
Pars affecta,

Licet musculi, tanquam motus voluntarij instrumenta à natura fuerint fabricati, nihilominus & quidam eorum quodammodo inter alimentij instrumenta, quæ tertia ratione superfluum inquam gratia fuerint constructa, numerari possunt, quoniam excernendis excrementis fuerunt destinati, Gal. teste 5. de usu. part. qui adhuc genere duplices sunt: quoniam alii tempestivum effluuium incitant, alii vero intempestivum ipsorum cohibent. Excitant autem in tempore musculi omnes epigastrij, intempestivè quidem effluere non sinunt, & musculus, qui transversus rectum intestinum foriter & claudit, & is, qui vesicæ collum similiter circumambit obliquus admodum existens, quamvis ille claudendi duntaxat meatus gratia extiterit, hic autem priori quidem ratione ut contractus vndique depellat quicquid in ipso meatu continetur constructus est: posteriore autem ut ipsum claudat, eodem Gal. auctore præcitato lib. 5. de usu part. quo loco concludit triplicem prædicti musculi usum, quorum primus est ut nihil in meatu urinario relinquatur: Secundus ut ori vesicæ clauendo opituletur: & tertius, ut excernendorum celeritatem acceleret. Quapropter mirari non oportet quomodo per bonam valetudinem, volentibus nobis, urina excernatur, Cum videlicet musculus iam dictus cervicem vesicæ circundans voluntatis nostræ imperio ob temperans ab actione quiescit, fungente autem tum vesica suo munere, in excernendo naturaliter agens: & proinde Gal. 6. de loc. affect. tum eos condemnat, qui urinarum, ac cibi excrementorum deiectionem totam ab electione procedere existimarunt, cum eos, qui his è diverso totum hoc opus naturale putarunt tanquam à veritate deviantes, Nam alui deiectio, & urinæ redditio utroque instrumento propriis suis facultatibus agente perficiuntur, Rectum intestinum, atque vesica naturali quidem utuntur facultate: musculi vero ea, quæ & animalis, & voluntaria nominatur, Tunc vero quiescunt ab opere musculi hi, qui fluores cohibere solent, cum abdominis musculi munere suo funguntur, maxime vero medii: opus autem horum est, ut adeo exacte extremam recti intestini partem, atque vesicæ cervicem strigant ipsas partes ambientes, ut nihil humoris ex vesica in meatum ingredi possit; neque per aluum sterces excerni licet hic secundus sic musculi cervicem vesicæ ambientis usus, ut dictum est. Quiescimus itaque voluntarie ab horum actione cum urinam, vel sterces excernere propositum est. At si præter voluntatem excernatur urina: nam de hoc affectu tractare intendimus, vesica ipsam retinere nequeunte, symptoma oritur, quo affectus *ἐνσπιντας*, Paulus appellat, à Gal. vero 6. de loc. affect. *ἀνοχστος ἐκκρίσις τῶν οὐρῶν* nuncupatur affectus hic, Sed à latinis urinæ incontinentia, seu præter voluntatem excretio: In quo affectu vesica urinam retinere non potest, sed præter voluntatem paucis omnino intervallis excernitur, ut liquet ex eodem Gal. ibidem. Quod vero in prædictu affectu vesica ipsa afficiatur non secundum propriam eius essentiam, seu corpus, sed secundum iam dictum musculum eius cervicem stringentem, citato loco ab eodem Galen. scriptum est, cum dixit, Quod si nervi musculi cervicem vesicæ ambientis resoluantur, proprium inditium, quod musculus hic resolutus sit, est urinæ præter voluntatem excretio. Verum cum hæc actio voluntaria musculi læditur, non perpetuo ipso per essentiam affecto, læsio

excita

excitatur, sed quandoque per consensum, nervis scilicet, per quos animalis facultas ad ipsum fertur, oblectis Nam cum vnica duntaxat perit actio voluntaria, solum musculus, qui ipsam efficere solet, aut nervum ipsius affectum esse putandum est, eodem Gal. auctore 4. de loc. affect. Verum nunquid musculos, aut nervus, qui ad ipsum peruenit, vel ambo simul affecti sint, haud facile percipi poterit, Nisi quispiam copulata symptomata. attente deprehendat, & ea quæ præcesserunt, optime inuestiget. Nanque musculo affecto circa cervicem vesicæ, eius affectionis signa aderunt. Et si intemperie duntaxat laboret, frigida videlicet, ex aliqua tali procacharctica causa, quæ forte præcessit, ac reliquis signis percipi poterit, Veluti & Gal. percepit in piscatorem quodam, cum in fluuio pisces venaretur: adeo enim hic circa sedem, & vesicam in frigidatus erat, ut ipso inuito effluerint & alui excrementa, & vrina: hunc curauit per calida remedia affectis musculis adhibita, & celeriter sanus euasit ut ipse inquit eodem 4. de loc. affect. Quod si nequaquam symptoma aliquod apparuerit eo loco, quo prædictus musculus positus est, neque talis aliqua externa causa in frigidans præcesserit, proprios nervos eiusdem musculi affectos esse à quapiam interna causa coniiciendum erit circa os sacrum ortos, quem etiam affectum multo tempore per multa præsidia uix idem Gal. sanauit, quanquam ipsis etiam nervis primario affectis, adeo ut facultas animalis per eos ad musculum peruenire non ualeat. Musculum quoque per consensum affici dicimus, cum priuatur eo, quo præsentem suum munus perficiebat. Id uero est animalis facultas: propterea hunc musculum perpetuo in urinæ inuoluntaria excretionem per essentiam, aut per consensum affici dicimus, idque proprium esse signum quod ipse læsus sit; Sed mox obiicit quispiam asserens falsum esse quod perpetuo resoluat uesica inuitis nobis urina excernatur Nam ea resoluta (ut inquit Paulus) cap. 18. 3. lib. & Aetius cap. 34. lib. 6. Interim inuoluntarie urina excernitur, quandoque uero omnino detinetur. Nisi esset quod secus hi quam Gal. de uesicæ resolutione uerba faciunt, Nam ipsi commune caput scripserunt de uesicæ resolutione, tam si fiat eius essentia, seu corpore aut propriis nervis ad eam distributis oblatis, quam si musculus eius cervicem ambiens, aut nerui ad ipsum deuenientes resoluti fuerint. Gal. uero particulatim utramque pertractat, cum una improprie (ut ita dixerim) resolutio dici possit, quando uidelicet uesicæ substantia, aut eius proprii nerui affecti fuerint, quoniam tunc non motus, sed sensus duntaxat ipsius aufertur, Quapropter rectius obtusus, seu ablatus eius sensus diceretur, quam resolutio, Quo casu ischuria generatur, ut præcedenti cap. ostendimus. At si nerui, qui ad musculum distribuuntur, aut ipsemet musculus, adeo afficiantur, ut eius actio omnino auferatur, tunc proprie resolutio dicitur, & proprium inditium (ut ipse inquit) quod musculus hic resolutus sit, est urinæ præter uoluntatem excretio. Et propterea affectio hæc cum symptoma sit in genere excretorum immodice, perpetuo noxam functionis consequitur, non liquidè naturalis facultatis ipsius uesicæ, sed animalis prædicti musculi, quæ neque male sit diminuta, aut deprauate oblata, sed nullo modo sit, & ablata est: nihil etenim in retinendo uesicæ opitulatur animali facultate motrice uoluntaria omnino priuatus, ac destitutus. Inditium autem eius est, quod uesica haudquaquam urinam retinere potest, sed inuitus, & præter uoluntatem paucis omnino interuallis ipsa excernitur. Huius affectionis causæ plures esse possunt, cunctæ uidelicet, quæ prohibere possunt animalis facultatis transitum ad prædictum musculum, quas omnes cap. de resolutione conscripsimus, & propterea non est, cur hic iterum eas repetamus, cum exinde studiosi petere possint. Quod uero pueris maxima ex parte soleat affectio hæc accidere 45. cap. 3. lib. Paulus scriptum reliquit, At quod si ex aliqua externa causa gene-

Cap. 4. i

Cap. 4. circa
finem,

Dubium,

Solutio,

Quis affectus
præternaturam
sit urinæ incon-
tinentia,

Causæ,

prognostica,
retur

Cap. 4.

Cn ratio,

Vitus ratio,

Lib. 3. c. 13

Lib. 11. cap. 24.
Medicamentorum ratio,

Lib. 1. cap. 15.

Ad eos qui se i
somno perminu
gunt.Lib. 11. c. 95
Cap. 9. in fine.

retur iam dictus affectus musculo in frigidato celerius curetur, quam si citra manifestam causam proueniat, lesis eiusdem musculi propriis nervis circa os acrum, 4. de loc. affect. à Gal. scriptum est. Eos. item, qui vrinam sine voluntate emittunt ob ceruicis vesicę vulnus, aut casum, aut vertebrę luxationem superuenientibus, quę mortem fatentur notis, nulla medicina periculo subtrahit, vt idem Paulus testatur cap. 18. lib. 3. Ceterum quoniam sapius ex frigida prædicti musculi, aut nervorum ad ipsum deuenientiam intemperie affectio hæc originem ducit, interim per se quandoque vero cum frigidorum succorum redundantia, propterea curandi rationem eius cum ex hac causas excitetur, conscribere instituiamus. Qua de re aer ad calidum vergens eligatur somnusque modicus, Nam similiter moderatę vigilię conferunt: Ocium, ac desidiosa vita vitentur: moderatum exercitium confert; alui delectio singulis diebus procuranda erit, si non natura, saltem arte clysteribus, seu glandibus. Cuncti animi affectus vitandi præter iram, quę interim confert. Cibi facilis coctionis, ac boni nutrimenti eligantur, ad calidum etiam vergentes: Propterea pullorum, galinarum, perdicum, phasianorum, ac aliarum paruorum auium carnales eligendę sunt, quę perpetuo cum aromatibus condiendę erunt, similiter in earum iure hyssopi parum sampsuchi, saluię, satireię, seu serpylli, foeniculi, seu oreoselini incoquatur. Interiem eisdem carnibus assatis vtantur, Nam succi cibi eisdem competunt, vt inquit Paulus. Pro potu aqua mulsa exhibeatur vel vinum subrubeum, astringens potissimum eis, qui ab eo se abstinere non possunt, & (vt summatim dicam) vniuersa vitus ratio calidior & siccior sit, vt inquit Aetius, nisi acriores, & mordaciores appareant vrinę. Quod vero ad medicamentorum rationem, attinet, quoniam communia habet auxilia hoc vitium cum ischuria orta ex torpido vesicę sensu, seu eius resolutione, eodem Aetio teste cap. 34. lib. 6. Idcirco eisdem commode vtare & si resolutionis causa frigidi, & crassi succi redundantes fuerint, eis quoque vtendum erit medicamentis, cum alterantibus, tum purgantibus, quę cap. de resolutione probauimus. Vitanda itaque sunt medicamenta, quę refrigerant, potissimum, ea in quibus valida est hæc vis: Et calidis fouendi sunt ægri, ac roborantibus potissimum (Paulo auctore) Exempli gratia ænelæo calido, & similibus; naturaliter autem huic vitio opitulatur (eodem auctore) gallinę guttur combustum, si ieiunio bibendum in aqua tepida præbeatur. Similiter leuchantemi flores, vel leporis testiculus totus, ex vino odorato: potio item calaminthę, & myrrhę ante cęnam salutaris est, vt idem inquit Paulus, præsertim si cum vino odorato præbeatur, Aetio auctore, Ceterum ex Aetii sententias eos, qui præter voluntatem vrinam emittunt, per mordacia cataplasmata, & malagmata, & per rubefacientia ex sinapi a pparata curare conuenit, similiter ex arenę in iectione à sole feruefactę, aquisque naturalibus, & maxime sulphurentis, & bituminosis, primum quidem calidis, postea etiam frigidis curandi sunt. Nec non partes exercendę, ac perfricandę: Vrinam autem ducentia nequaquam exhibeantur, eodem auctore. Ad eos vero, qui se in somno permingunt, conuenit ex sententia eiusdem Aetii pulmo hædi moderate assatus, & citra panem large ad triduum in cibo a ceptus; Similiter leporis crebellum siccum potatum ex vino, aut testiculum leporis siccum in vinum inditio, & bibendum dato, vt ipse refert. Vesica quoque porcina per se vsta, & in potu exhibita iuuat: Simili modo & ouil a vesica facit, Cinerem itaque eius ex posca præbeto, Item confert si castorei 3. i. in vino odorato in potu exhibebis, eandem vesicam ouillam seu caprillam vstam ex posca Gal. 9. de compositione medicamentorum secundum loca præbet bibendam, Nec non & leporis testiculum in vino odorato feruefactum, obtinereque iubet pudendum cimolia terra cum perdicii succo.

Cum

Cum vero diuturnum, & inueteratum fiat hoc malum, velut eos qui præter voluntatem ob resolutionem vesicæ vrinam emittunt, hos curato: Differunt etenim ii ab illis, in eo quod iis per somnum saltem hæc accessio contingit. Illis vero, quibus ob musculi colli vesicæ resolutionem hoc accidit, etiam dum vigilant eodem modo afficiuntur, ex sententia eiusdem Aetii ca. 25. l. 11.

περὶ λιθίας τῆς κύστεως.

id est de lapide vesicæ seu calculo. Cap. 101.

Quemadmodum in renibus, ita quoque in vesica, affectus quidam, qui à græcis λιθίας, à latinis lapidatio, seu calculosus affectus appellatur, gigni solet velut à Gal. scriptum est primo de loc. affect. & ab Alexan. lib. 9. cap. 7. Quod vero vesica hoc morbo laboret, hisce notis deprehenditur, Nam vrinæ crudæ, & colore subalbidæ conspiciuntur, sedimentum est arenosum, & scabiei simile prætereā egri pudendum scalpere, aut id violenter, & sæpe distendere solent, atque tunc magis cum ad vrinarum excretionem vrgentur, vt inquit Alex. Continue quoque in vrinam propelluntur, ac stillicidio vexantur, Paulo recte cap. 45. lib. 3. Interim quoque vrina de repente eis supprimitur, præsertim vbi lapis in vesicæ ceruicem incidit, vt liquet ex Gal. eodem primo de loc. affect. Quamuis Hipp. apho. 79. lib. 4. vno duntaxat signo hunc affectum dignosci scriptum reliquit, cum dixit, In quorum vrinis, velut arenulæ subsistunt, his vesica laborat calculo, Verum cum hoc inditium commune sit, tam vesicæ, quam renibus calculo laborantibus, vt liquet ex Gale. eodem loco, propterea addendam esse alteram aph. partem præcepit, pro aph. veritate. Prædictis itaque notis tum partem affectam, quæ vesica est, cum etiam & qualitatem affectus, qui calculus, seu lapis dicitur, dignoscere poterimus. Quod vero morbus sit in numero, ac in excessu, cap. de renum calculo dictum est, toto etiam genere præter naturam, vt liquet 14. met. med. Cæterum quod prima potissimaq; causa sit vrinarum crassitudo 6. de morb. vulg. à Gal. scriptum est, huiusmodi namque crassitudo multa in vesica collecta, & in vnum coiens, cum semel aliquando non apto tempore excreta intus diutius remanserit, concrescendi, coaugmentandique initium capit eo vero principio facto, facile (quod iam superest) quicquid iterum crassi in vesicam delabatur, priori adglutinatur, maiorque inde tophus calculus redditur, quemadmodum extra, & in calidis aquis sponte nascentibus, & in natis, vbi calefit aqua, quotidie lapis coalescere cernitur: Opitulatur autem non parum in hoc vesica ipsa, vt quæ rigida sit, nervosa, ac pauci sanguinis, nec non amplissima, interius conuivitate inanis. Vbi etenim in ipsam fuerit crassitudo transmissa, ibi cogitur, & conspissatur, initium huius conspissationis (vt diximus) accipiens, quando in eadem vesica diutius commoratur. Præcipua itaque, ac potissima causa generationis calculorum in vesica est ipsa qualitas materiæ crassitudo in quâ vrinarum, ex Gal. testimonio, Id quod confirmavit Alex. citato loco, cum dixit, Veruntamen vesicæ calculi pueris magis, quam viris generantur, neque à tanta caliditate, sed materia potius crassiore, & ad generandos calculos, prompteque ab insita caliditate concrescendos idonea. Atqui caliditas ad coaugmentandum lapidem etiam non parum operatur, licet non ipsa præcipue, sed materiæ qualitas ipsius compactionis causa existat, vt diximus, ex Gal. sententia citato lib. 6. de morb. vulg. Et propterea quivis calor etiam mediocris, vt in pueris reperitur, ad huiusmodi materiam spissandam satis est ne dum ascititius, at igneus, namque opus est vt & ipse aliquid faciat ad coaugmentandum

Cap. 1

Vesicæ calculi laborantis signa,

1. de loc. aff. ca. 11.

Quis affectus præter naturam sit 14. met. c. 13. in prin. 6. de morb. vulg. cōmentario 3. commento 15. Materialis causa generationis lapidis in vesica.

Efficiens causa,

Cōmentario 3. commento 15.

Cur senibus cal-
culi non generen-
tur.

Cur in pueris
magis quam in
adultis in vesica
lapis generetur.

commentario 3.
commento 15
Lib. II, cap. 9.

cap. 12

6. de mor. vulg.
Loco citato.
lib. II, c. 9

Loco citato.
Dubium de calo-

mentandum lapidem, etenim senes humorum crudum non parum aceruant, quanquam non propter edacitatem, ut pueri sed propter potentię concoquentis imbecillitatem: quia tamen calorem adeo fortem non habent, ut ex materia crassam vaporem resoluens, lapidem generet propterea in eis calculi non generantur, eodem Galen. auctore com. aph. 26. 3. lib. Requiritur ergo & caliditas etiam pro calculis in vesica generandis, etiam si mediocris fuerit, uelut in pueris, quinimo in eis, magis quam in adultis, omnium medicorum consensu pro confesso habetur, lapides in vesica generari, propterea quod crassissimę vrinę a pueris redduntur, tum propter ipsorum edacitatē, tum quod a cibo ludentes, profilientesque mouentur, lactentibus vero & materia ipsa occasionem præbet lac enim natura crassum est, & ad calculos creādos aptissimum, ut liquet ex eodem Gal. lib. citato 6. de morbis vulg. etiam, cibis utcumque oblatis, & nocius utuntur, ut (inquit Aetius.) & neque horam cibum capiendi seruant ordinatam; quinetiam priusquam prior sumptus cibis concoquatur, alium ingerunt, & cum uehementius a cibo moueantur, crudus, & incoctus in venas distribuitur: Cuius etiam euentus causa a Galeno primo de cris. talis assignatur, Nam cum una ventriculi operatio non possit duobus similiter sufficere, augendo scilicet, & alendo, propterea antequam in ipso sufficienter alimentum sit coctum, ipsum ad se corpus trahit, atque hinc fit, ut plurimum crudi humoris coaceruet, Neque hoc satis esset pro calculorum in vesica generatione pueris ipsis, nisi omnes naturales actiones in eis ualidę essent, ita ut humorum crassitudo funderetur, atque dissolueretur: Contrario modo indeclinantis ætatis hominibus, in quibus cogitur atque inspissatur. Qua de re cum multus insitus calor sit in pueris, & actiones firmę, materię crassitudo attenuata in renes feretur atque ideo facile in vesicam percolatur haud parum (ut inquit Gal.) & actionum vi ad egressus celeritatem conducente: ac eorum corporum mollitię, ut testatur Aetius, exemplo sunt & exteriora quęcunque natura crassa per aliqua angustia transfundere voluimus, Nam quasdam eorum partes calore eliquatas facile peruadere conspiciamus, quasdam non fusas, neque eliquatas transire non posse cernimus, veluti pix, resina seuum, cera, & mel: adde quod eadem materia crassa cum ab initio calido in pueris magis elaborat, sit rationi cōsentaneum est, ut tenacior euadat, Nam quęcunque a calore in concoquendo mutantur, temporis processu lentorem quedam acquirunt, & si ab initio nullum habuerint, quo circa plane magis in unum coeunt, densantur, atque coagmentantur, Nam inter æque crassa quod tenacius est, ad vnionem spissitatem, & concretionem aptius habetur. Hinc non ab re cuilibet facile patere poterit quam ob causam, & si quibusdam adultis corporibus magna coaceruetur copia crassorum humorum, adsitque ascititius calor eorundem ualidus, in eisdem, minus ac per rarissime calculi in vesica generentur, sed in renibus potius, cum eadem materia non admodum elaborata, dissoluta, ac fusa ad renes proueniet: & propterea non facile in vesicam percoletur, quinimò in eisdem magis cogitur, atque inspissatur, ea etiam non ita celeriter distributa. Similiter cur pueris in vesica post mictum, adultis vero in renibus ante mictum calculi generentur, Ex his quoque patet eorum error, qui propterea in pueris calculos gigni in vesica asserebant, quod, itinera ob vasculorum exiguitatem angusta sunt, Nam si ita esset, oportet in renibus potius, quam in vesica calculos pueris creari. angusti enim per illos transitus sunt, Vesicę autem ceruix lata adeo in pueris, est, ut cuiusque materię crassitudo per eam facile transmitti possit. Præterea neque in illis forte, qui iam progressa ætate sunt (ut inquit Gal.) meatum per renes angustia gignentis lapillis in causa est, sed & actionum infirmitas, & crassorum succorum crudi-

cruditas, vt ipse refert. At si obiiciet quispiam afferens Hippo. aliud sentire de calculi in vesica pueri generatione 2. de nat. hum. cum art. Nascuntur etiā pueris calculi ob loci huius calorem, ac totius corporis, Viris calculi ob corporis algorem non innascuntur. Dicimus nos Hipp. nos secus sentire, ac Gal. Nam quod efficiens causa generationis calculi in vesica sit puerorum calor, ambo confitentur, nec idem Gal. abnegat etiam in ipsa vesica pro calculi generatione calorem esse necessarium, quinimo illud scriptum reliquit precipitato com. apho. 26. 3. lib. licet 6. de morb. vulg. dixerit opitulari in calculi generatione vesicam, vtpote: quæ frigida, nervosa, & pauci sanguinis sit & amplissima interius concavitate inanis: Nam relatione facta ad alias corporis partes, per quas humorum crassitudo peruat, in pueris ipsa vesica frigidior existit, licet etiam suapte natura talis sit: cum hoc tamen nihil obstat, quod in ea pueris tantus consistat calor, quantus satis sit ex materia crassa vaporem resolvere, ac lapidem generare, quamuis minor sit, quam is, qui in iocinore aut renibus consistit. In viris autem, ac declinantis ætatis hominibus, quam optime Hippocr. ob corporis algorem in vesica calculos haud quaquam oriri fatebatur. Nam quis veretur eos puerorum relatione nativo calore frigidiores? licet ascititio calidiores: frigidiora nanque hoc modo redduntur corpora cum primum eis incrementum consistit, nihilque corpus augetur: non ingentis autem calor, qui in eis copiosior reperitur, causa est, vt materiæ crassitudo cogatur, atque inspissetur, & ita ad renes feratur, & propterea non facile in vesicam percoletur. Iure itaque propter ingenti caloris paucitatem virorum corpora relatione ad ea, quæ puerorum frigida, appellari poterunt, Quæ iterum causa est, vt in eorundem vesicis calculi non, generentur, vt dictum est. In vesica igitur pueris, magis quam in ætate pro vectis calculus condescere solet, ex communi sententia græcorum fere omnium auctorum, quinimo hunc proprium esse puerorum morborum Hippo. simul cum Gale. apho. 25. 3. lib. & 2. de nat. hum. testati sunt. Si autem accidat quod genitus calculus in vesica per chirurgiam curari debeat, pueri vsque ad decimum quartum annum propter corporum mollitudinem facile curationem recipiunt: Senes quod corpus ipsorum contumax sit, vix consanescunt: Mediæ vero horum ætates etiam in hoc medio quodammodo habent, Paulo auctore cap. 60. lib. 6. & rursus (vt ipse inquit) faciliè sanantur qui maiores calculos habent, propterea quod inflammationibus assuerunt: qui minores difficulter sanantur contrarias ob causas. Quoniam vero communem habet hæc affectio curandi rationem cum calculo renum, Propterea eadem victus ratione vtendum erit, quam ibi instituimus; potissimum autem cauendum est a lacte ex Gal. decreto 6. de morb. vulg. nec non ab aquis impuris & multo limo refertis, ac vehementer frigidis, vt inquit Aetius. Similiter & eisdem auxiliis vti conuenit, nisi quod validioribus ibi conscriptis vti oportet, indicatione sumpta a parte affecta, & præsertim ab eius positu. Nanque crassitici que potissima causa generationis calculi in vesica existit, per extenuantia occurrendum est, ne multa materia crassa congregetur. Qua propter validis, atque efficacioribus medicamentis, præcitato cap. conscriptis vtare: priuatim autem vbi ea non suffecerint, ex Aetii auctoritate, tanquam lapides vesicæ atterentia, & vrinam ducentia pharmaca hæc competunt, fœniculi siluestris radix, graminis radix, arthemisia, chamæmelum, amaracus, altheæ radix, & semen syon, quod circa aquas nascitur, adiantum, smyrnii, semen, rumicis radix, lapis, spongiæ, lapis iudaicus recolithon dictum, asplenon herba, litholpermon, lapis, qui ab ægris per lotium eiectus. est tritus, ac potatus, vermes terreni recentes cocti, triti cum vino, vitis lachryma. Horum vnum quodque (vt ipse inquit) cum vino albo datur decoctum, aut siccum in super-

culi generatio-
ne in vesica in
pueris.
Tex. 112.

Resolutio.

6. de mor. vulg.
loco citato.

2. de nat. hum.
tex. 111.
Prognostica.

Curatio.

Victus ratio.
Locis citatis.

Medicamentorum
ratio.
Lib. 11. cap. 10.

sum

Lib. 9. cap. 7.

sum aut cum melle, seu cum quopiam ex vino, & melle potum. Danda etiam in potu ea, quæ urinam cient, velut cumetis semen, apii, petroselinii ac violæ albæ semen, & corporibus, quæ frigidiorē habent temperiem, meon, phu, acorum, ac reliqua calidiora præbeto. Poterunt quoque ex eisdem varia medicamenta componi, ac prout vsus exiget exhiberi cum vino albo, aut aqua mulsa, seu decocto asplenii, & radicis graminis, aut etiam oxymelite. Ab extra Alex. tanquam efficax auxilium longo tempore, & experientia prius inuentum, & comprobatum caprillum, seu hircinum sanguinem calidum extrinsecus illinitum commendauit, super vesicam impositum. Verum longe optimum esse fatetur, si in calido balnei aere ipsum illinas, atque ita deliges, id vero non modo semel, sed sæpe, & per interualla: quod si neque per hæc adhibita pharmaca lapis in vesica atteri possit, ubi meatum obturans urinae suppressionem inducat: eo modo curari debet, quem præcipimus ex Gal. auctoritate capit. de ischuria orta ex calculo: & ubi ex multifaria concussione curari non valeat, catheterem immittere oportet: Sed si neque hæc fußerint, ad sectionem transeundum erit modo, quo a Paulo præcipitur præcitato capit. 6. lib. 6. Exacto autem lapide, & cicatrice vlceri obducta, eā victus ratio constituenda erit, ne eos renasci contingat, quam Aetius instituit cap. 15. eiusdem lib. 11.

περὶ φλεγμονῆς τῆς κύστεως.

id est de inflammatione vesicæ.

Cap. 102.

Vesicæ inflammationis signa.

Lib. 2. capi 45.

Lib. 11. cap. 16. prognostica. Loco citato.

V. eius ratio.

Vesicæ quoque interim vitia quædam superueniunt quæ cæteris corporis partibus communia sunt, veluti id est, quod græci φλεγμονή latini inflammationem nuncupant: Verum quid sit, in quo morborum genere reponatur, & a qua causa generetur, ac quis sit eius generationis modus, in præcedentibus locupletissime dictum est: neque enim quantum ad hæc spectat a cæteris inflammationibus vesicæ inflammatio differt. Reliquum est igitur ut ad eius inditia deueniamus insimul conscribentes quæ affectum ipsum ac partem affectam indicant: testantur itaque eam communia inflammationis signa, & quædam propria. Nam ardor, dolorque cum grauitate circa pubem, ac inguina sentiunt, febris aderit, mentis alienatio, vomito bilis syncera, & urinae reddendæ impotentia, ut inquit Paulus, Vigillant quoque & delirantes aliena loquuntur, ac durus fit eius pectus, & pubes una cum vehementi dolore, & egerendi appetentiæ, velut in tinesmo fieri solent: quod vero egeritur tenue est, & subsidentiā non habet: aliquando & inflationes sequuntur, & aluius astricta est, intestino recto ob inflammationes vesicæ compresso (Aetio teste.) Inter omnes autem morbos, qui circa vesicam oboriuntur grauissimus, & maxime moriferus inflammatio existit (eodem Aetio auctore.) Hinc sequitur, quod) ut quibusdam visum est. inter omnes inflammationes in vesica ortas, ea lætalis sit, in qua vehementior excitatur dolor, febris acuta magis, ac cum urinae, tum alui deiectionis omnimoda suppressio: & e contra minus lætalis erit ea, in qua prædictorum, signorum contraria apparebunt. etenim febris ex inflammatione vesicæ non absque ratione fit: & quanto illa maior est, & grauior, tantum augeri febrem contingit ex Gale. auctoritate com. aphor. 44. 6. lib. Quantum vero ad eius curationem spectat paucis cibo, ac potu asseruandi sunt ægri. Potus autem sit aqua hordei, vel aqua, in qua cinnamomi parum fuerit decoctum. Reliqua victus ratio e capit. de inflammatione renum petenda est. Cæterum quantum ad medicamentorum rationem attinet, primum omnium aluius leni infuso clystere subluatur, & post stercoreum educationem oleum chamemelinum, anethinum, aut in quo semen

semen lini, vel althæa, fuerint incocta in intestinum solatii, & leniendi dolores gratia, iniiciatur. Et si nihil aliud prohibeat confestim in morbi principio sanguis detrahendus est, ex Aetii, Pauli decreto. Verum quæ vena secari debeat, ambo subticuerunt: Circa quod id exequendum esse censerem, quod ubi multa sanguinis copia redundarit, & vires copiosam venæ sectionem haudquaquā ferre possent, potissimum in morbi principio, internam cubiti uenam secare tutius erit reuulsionis duntaxat gratia, post quam eodem die, aut saltem sequenti poplitis, aut tali uenam, perpetuo restitutionem seruando tutius secari poterit euacuationis gratia cum deriuatione, Nec obstat Galen. documentum lib. de cur. ratione per uenæ sectionem, & 13. meth. vbi inflammata vesica, poplitis, aut tali uenam iniicere dam esse præcepit, nanque ubique locorū supposuit vires adeo esse robustas, ut per unicam uenæ sectionē ferre ualeāt tum auersionem, tum euacuationem, vel (vt rectius dicam) euacuationē cum auersione simul, quo casu neque nos aliter exequendum esse fatemur: sed ubi vires (ut diximus) ferre tanquam non ualeant sanguinis euacuationem, tunc tutius esse audacter asserimus prius cubiti uenam è directo sitam internam secare, & demum eam, quæ poplitis, aut tali. Auenæ sectione in decoctum seminis lini, fœnugræci, in hydrelæo pauco addito aniso, aut dauci semine insidere egrū facito, admoveaturque, eger quo in dicto decocto desidens mingat: Et si imbecilla fuerit uesica ad expellendam urinam, ægrum ipsum, aut aliquem ex astantibus scite, ac placidè pectorem premere oportet, neq; id ultra modum ne dolor inde intendatur, ut inquit Aetius. Deinceps vesicæ locos irrigato ex oleo chamæmelino, anethino, seminis lini, aut eo, in quo altæa fuerit incocta; item fomenta adhibeantur per aquam, & oleum in vesicis semiplenis admota, aut spongiis: & ubi hæc non suffecerint, cucurbitam circa pectorem, aut pubem una cum scarificatione affigemus. Quod si neque sic medicamentis malum cedat, præstabit papaueris calicem simul, cum oleo incoquere, & adipem anserinum, & gallinaceum in ipso oleo eliquatum simul infundere ut eidem Actio uisum est, qui etiam Rufi auctoritate, vehementioribus existentibus doloribus, opiatum medicamentum utitur ex opio, modica myrrha, & croco composito medicamento, lanæq; illito, ac in podicem indito, similiter cataplasmatibus utendum esse censer, ex cruda hordeacea farina, capitibus papaueris, hyoscyami foliis, ac modico maudragoræ succo adiectis. Si vero urinx suppressæ periculum urgeat, necessario ad catheteris usum confugimus, non quod affectionis molestiam tollat, sed vt urgentem urinx suppressionem corrigat, & à præcipiti periculo liberet, vt liquet ex eodem Actio: quanquam periculo non careat catheteris immissio in uiris: dolorem siquidem exacuit, & inflammationem auget: Mulieribus uero ipsum adhibere nihil absurdum. Breuis enim in ipsis urinx meatus existit, & recta situs, ut citra dolorem hoc molimen admittant, ad post urinx proleptationem, rursus ad eadē mitigatiua auxilia accedendum, vsq; quo inflammatio soluatur, aut suppuretur, ut eidem Actio uisum est. Verum ubi ad suppurationem vergat, eadem iuuanda erit cum his, quæ in aliarum partium inflammationibus ad suppurationem vergentibus conscripsimus. Et post maturationem, si nō disrumpatur abcessus, eidem quoq; naturæ opitulandum erit pro eius disruptione, quo disrupō, quam præcipiēmus in sequenti ca. ulceris curationem conuenientem esse in confesso est.

Curatio.
Locis citatis,
Venæ sectio.

Lib. de cur. rar.
per uenæ sect.
Cap. 18.
13. me. cap. 11.

Topica

Loco citato

Citato loco.

Ibidem

περὶ ἐλκώσεως τῆς κύστεως.

id est de exulceratione vesicæ.

Cap. 103.

Signa vesicæ
exulceratæ.

Cap. 1.

Cap. 4.

Cap. 3.

Cap. 5.

Cap. 8.

6. de loc. affect.
Cap. 5. & 4.

Cap. 25. lib. 11.

NON raro etiam contingit vesicam ipsam exulcerari, quod quidem significari poterit ex his, quæ Hip. conscripsit apho. 81. lib. 4. cum dixit, Si sanguinem, aut pus minxerit, ac squamulas, & grauis odor adsit, vesicæ exulcerationem significat, Verum Paulus ex dolore vehementi in pube, & imo uentre, vrineq; difficultate, & ex pure, quod ubi redditum est, subfidet, squamulisque fædi odoris vel laminis similibus, vesicam exulceratam indicari scriptum reliquit, eodem cap. 45. lib. 3. & si eadem scabie laborat, furfuracea subsidentia significabit, quemadmodum idem Hipp. aphor. 77. 4. libr. decretum reliquit, cum dixit, Quibus cum urina crassa fursurea quædam simul exeunt, his vesica scabie laborat, quo loco Gal. animaduvertebat verbum illud, crassa, nanque cum vrina tenui fursurea quædam ferri possent ex venis ipsis earum tunica affecta, uel sanguine, qui in ipsis continetur à febre ardentis perusto: Dignoscitur itaque vesica exulcerata ex ea excrementorum qualitate, quæ partibus adhærentia essentia proprietatem obtinent. cuius generis est id, quod græce ἐφελκίς, latine crustula, seu ramentum dicitur, lamarum speciem referens, Galen. auctore primo de loc. affect. Similiter à dolore cum posito, Nam vehemens tormentum in pube, imoque uentre sentiunt egrotantes, ac etiam ex actione læsa, quoniam vrgebit urinæ difficultas, Ex Pauli testimonio. Sed quoniam non satis est ad affectæ sedis inuentionem ea duntaxat symptomata, quæ in præsentia infestant, intueri, ut idem Gale. fateatur. 6. de loc. affect. sed ex his, quæ præcesserunt, subinde de finimus, Ea de re id quoque inuestigari debet, ut certior dignotio fiat, num uidelicet æger circa vesicæ positum simul cum horrore, ac febre dolores prælenserit interrogando. Cum quibus etiam inditiis non nihil confert, si id quod excernitur sit cum ipsis urinis confusum, an contra, Nam id aliquando quidem exacte commixtum videtur aliquando mediocriter, interdum vel nullam habet mixtionem, vel quodammodo superfertur, vel solum excernitur. Quapropter Gale. non ab re eodem 6. de loc. affect. de uesicæ affectibus verba faciens, dicebat quod, vesica suppurata solum pus sine vrina excernitur licet citato lib. cum de colicis affectibus loquitur, deprehendi manifeste, atque secerni ulcus penis ab eo, quod in vesica ortum est præceperit, quoniam in primo protinus exitu signum vlcis apparebit, vrinam præueniens, si in pene sit ortum: quod vero à vesica egreditur, urinæ admixtum videbitur: Nono etiam de comp. medic. secundum locos discerni dicebat corpuscula, quæ excernuntur ex exulcerato pudendo, ab eis quæ ex uesica feruntur: quoniam illa statim circa primum exitum apparent. Verum quæ ex vesica delata ipsis vrinis admixta sunt: quantum, si interea ramentum, seu pus urinæ admixtum excernatur in vesicæ vlcibus, confestim tamen, ut inquit Paulus, ubi redditum est subfidet, licet interim eueniat ut solum pus sine vrina etiam excernatur, vel nullam habens commixtionem cum ea, quemadmodum sæpenumero accidit in penis vlcibus: & propterea idem Gal. addidit, ut facius unum ab altero discernatur: quinetiam assidue inter meiendum mordicus dolent pudendorum vlcera præcipue cum vel crustula, vel sordibus solutis pura fuerint: id quod in vesicæ vlcibus haudquaquam fit nisi iuxta collum eiusdem vlcera consistant, ut inquit Aetius. Tunc etenim mictione tempore duntaxat, & maxime ubi min gree. coeperint, aut cessauerint, dolor, sentitur, atque id amplius contingit, si urinæ sint acriores ut ipse inquit cap. 29. lib. 11. Quare licet in vlcibus, quæ in pene sunt, etiam sine vrinis, & pus, & sanguis exeat, ut plurimum (eodem Gal.

Gal. teste. com. aph. 75. 4. lib.) nihilominus & simul cum eisde m vrinis statim circa primum exitum, quandoque pus emittitur, & si cum eis nullam habeat mixtionem, quemadmodum de vesicæ vlceribus diximus, Sic etiam in vesicæ vlceribus euenit, interdum quod vrine admixtum videatur id excrementum, quod vlcera comitari solet, confestim tamen subsideat, ut inquit Paulus, idque sæpius accidit, interdum etiam, vel nullam habet mixtionem, vel quodammodo superfertur, vel solum sine vrina excernitur, ut idē inquit Gale. Attamen vtra potius istarum partium fuerit exulcerata, dolor, qui in differentibus accidit locis, & proprietates eorum, quæ cum vrinis excernuntur indicabunt, quemadmodum idem Gale. scriptum reliquit com. præcitati aph. 75. 4. lib. Pro discernenda exulceratione renum, aut vesicæ: quod quidem indiscriminatim Hipp. in eodem aph. conscripserat sic dicens, si sanguinem, aut pus mingat, aut renum, aut vesicæ exulcerationem significat: aut saltem ex dolore cum posito, illud discerni poterit. Vel dicas aliud esse, si pus ex vesica excernatur eadem suppurata, & aliud si ramentum ex ipsius vlcere. Nā primum relatione ad alias, superiores partes suppuratus, quæ per vrinam expurgari possunt, solum sine vrina excernitur, ut inquit Gale. licet non semper, quod in aliis superioribus partibus haudquaquam euenit. At ramentum, si ex eiusdem vesicæ exulceratione secernatur, collatione facta ad penis ulcera, vrinæ admixtum uidebitur: prouenire autem consuevit urinam in penis vlceribus, ac protinus in primo exitu apparere, quamuis etiam idem ramentum in vesicæ vlceribus, relatione ad alias exulceratas partes se ipsa superiores, interdum uel nullam habeat cum vrinis mixtionem, uel quodammodo superfertur, vel solum excernitur (eodem Gale. teste) Itaque relatione ad penis ulcera, ut plurimum vrinæ admixtum uidebitur ramentū ex vesicæ vlceribus decidens, quia non protinus in primo exitu apparebit, aut vrinam præueniet, ut in penis vlceribus contingit, Verum collatione, ad alias superiores partes facta, vel nullam habebit mixtionem, vel quodammodo superfertur, vel solum excernitur, ut diximus, quia neque exacte, neque mediocriter cum vrina permixtum videbitur, sed vel nullam, vel exiguam cum vrina mixtionem habebit. Cæterum cum vesicæ vlcus morbus sit in soluta continuitate, tum ex iam dictis, & etiam ex his, quæ dicemus, dignosci poterit, Propterea omni tempore dolor acutus comitatur ægros, maxime vero mictionis tempore, & excretionis puris: assidue etiam decumbunt, & neque erecti stare possunt. neque reclinati quiescunt ægri, siquidem dolores acuti sunt, & vlcera iniucunda, partim quod vrina assidue ea contingat, partim quod ea natura acris existat, neque quamuis plurima excernatur vniuersa vesica vacuari potest, sed semper ex vrina quidpiam in ipsa relinquitur, quod continue vlcera contingit ut Aetius, & siquidem sordida fuerint vlcera fœculenta, ut idem fatetur, simul excernuntur, & mucosa, & quæ crassam subsidentiam ad modum farinæ habent aliquando autem & pelliculæ tenues admodum forum, & lamarum cum vrina excernuntur. Si vero serpendo depascant vlcera, subcruenta excernuntur, & saniosa, & tœtentia: ad hæc accedunt vrinæ emittendæ difficultas & pudendi arrectio, & petulantia, & dolor non solum cum vrinæ meatu fuerit affectus, sed etiam cum tale quidpiam in profundo existeret: Atqui cognosces num in profundo, siue iuxta vrinæ meatum sit affectus, ex eo, quod si in amplitudine sua vesica sit affecta, dolor circa pubem consequitur: Si vero iuxta collum vesicæ vlcera constant, tempore mictionis tantum, & maxime ubi mingere cœperint, ac cessauerint, dolor sentitur, atque id amplius contingit, si vrinæ sint acriores, ut superius dictum est, ex eiusdem Aetii testimonio. Contingit autem ipsam exulcerari, aut propter præcedentem abscessum, aut ob tuberculum, quod præcessit,

6. de loc. affect.
cap. 3. & 4.
Quibus inditiis
distingendum
sit ulcus vesicæ
& penis ulcere.

Vlceris vesicæ
alia signa.

loco citato.

Si in eius canis-
tare, seu cerui-
ce fuerit exul-
ceratio, signa.

Causæ.

Ii aut

prognostica.

Curatio.

Lactis potus.

Reliquorum
medicamento-
rum ratio.

aut ex ruptura, seu ob fluxionis rofionem: aut alia simili quapiam causa, ex eodem auctore. Quomodo autem diuerſe iam dictę cauſę diſcernantur, ex propriis earundem indiſiis prompte percipies. Omnes autem fere qui veſica cę vlcere laborant ab in deſinente dolore, febribus, vigilijs, & colliquatio- ne perimuntur, alii quidem citius, alii tardius: & propter hoc ipſum, & quoniam neruoſa eſt veſica ipſa, inſanabilia vt plurimum eius vlcera exiſtūt: periculoſiora, autem ſunt, quę ex eroſione ſunt orta, & modica ſpes eſt ea reſtaurandi, vt eidem Aetio viſum eſt, Verum vlceribus exiſtentibus in eius ceruice, quoniam non neruoſa eatenus, & exanguis eſt, veluti eius cauitas, ſed carnoſa, haut ita periculoſiora ſunt, neque ad curationem difficillima, quemadmodum de eius diſciſſione com. aph. 18.6. lib. Cal. ſentiebat Qua de re tum propter hæc vlcera, tum etiam quoniam ſep æ præter expectationem quædam eueniant, cura eggreſſienda erit, per quam ſi nihil aliud certe acceſ- ſorii dolores minuentur, vt etiam apud Aetium legitur: Primum igitur æger, vt decumbat perſuadendus eſt, & in lecto quietem toleret, idque maxime, ſi febres ſimul ad ſint: deinde remedia intermittentibus febribus adhibenda ſunt: maximum vero id fuerit lactis potus: neque ſcio, an poſt vllum aliud reme- dium ſecundo loco id ſit habendum, Nam & aſperitates lenit, & exulcera- tiones eluit, aliasque affectiones extergit vt ex eodem Aetio liquet, Eliga- tur autem lac aſininum præſertim, aut caprillum pauco adiecto melle roſa- ceo. Reliquę viſtus ratio ſeruanda erit, prout cap. de vlcere renum inſtitui- mus, adeo vt ex ea vrina acris non fiat, & propterea mordeat, ac irritet vlce- ra. Quo ad medicamentorum aliorum rationem attinet, illud primo ani- maduertendum erit, quod ubi ob humorum acrium fluxionem exulceratio fiat, Idem primo præparandi, ac purgandi ſunt, deinde ad vlceris curatio- nem deuenire. Similiter ſi cum inflammatione, aut vehementi dolore vl- cus complicitur, primo nanque eiſdem affectibus obuian- dum erit deinceps vlceris curationem aggredi. In quem vſum in veſicam muſſa dilutiſſima in- fundenda eſt, vel lac cum pauculo mellis, aut cum cucumeris ſemine ſeu can- dido oui liquore, cum pompholyge, vel ſimillum medicaminum aliquo, ex Pauli ſententia. Sit autem lac aſininum præcipue, aut caprillum, cum quo mellis roſacei paucillum adiacere poteris, vel decoctum paretur ex hordeo non decorticato, plantaginis folijs, ac radice glycyrrhiæ, cui paululum mellis, aut mellis roſacei admisceto: & ſi acrimonia conſequatur, optimum amyllum addendum erit, aut ſeminis althæę, & maluarum, cucumeris, vel fœ- nugręci cremor interim etiam, & ſeminis papaueris. Et vbi eadem vlcera ſordida fuerint, magis quę repurgandi vim habent pharmaca infundenda ſunt, augendaque mellis, aut mellis roſacei quantitas, mordacitatis etiam tē- pore inſtaate. In inteſtinum quoque per ſedem priſanę ſuccus infundendus eſt, & ſeminis lini ſuccus, & cucumeris ſemen decortica- tum tritum cum la- tte, roſaceo oleo ad ſingula inſtillato. At ſi exulceratio paſcendo ſerpat, ſubſtringentibus medicamentis ab extra adhibitis utendum eſt, atque his quidem calidis actu, vt ob calorem quidem parte circum dol- tiantes lenien- do iuuent: ob poteſtatem autem ipſorum uicinos locos exulcerationem de- paſcere prohibeant: ſunt autem hæc uua paſſa, palmę, gallę, malicorium, alu- men, acacia, hypocitiſtis, & ſimilia. Singula autem ex his aut palmis excipian- tur, aut tataplaſmatis ex loliacea farina; decoctio autem fiat in poſca, vt præ- cipit idem Aetius. Similiter etiam in veſicam infundatur lac recens muſtum, per ſe, aut cum amylo, aut roſaceum optimum recens tepefa- ctum. Cum ue- ro repurgata fuerint ulcera, adiuuare oportet, quo ad cicatricem perducan- tur, atque id per inſeſſus aſtringentes, & eiſdem facultatis epithemata: in quem vſum emplaſtrum ex ouis, hordeo viſto, & cadamia, tripla eorum par- te

re cum cerato myrteo, aut rosaceo temperata commode superponitur. Nec minus confert si medicamentum ex amylo, sarcocolla, & cerusa, pauxillo oleo rosaceo, & cera additis, & cum lacte dissolutum iniiciatur in uesticam, generosiusque euadet, si vstum plumbum, ac thuris corticem adicias. Cæterum si ad multum tempus exulceratio perseveret, quemadmodum in plerisque fieri consuevit, tunc lane exacerbationes, & interualla, siue remissione ægros apprehendunt. quare in exacerbationibus quidem cataplasmata, & fomenta & irrigamenta leniendi vim habentia adhibeantur. Remissionis vero tempore, ductu ad destruendum malum apto utendum erit, quemadmodum ab eodē Aetio decretum est; neque alia ratione uesticæ scabies curabitur, quam simili victus ratione, ac medicamentis detergentibus, atque exiccantibus citra morsum,

περὶ γογγόλης

id est de seminis profluvio.

Cap. 104.

Quemadmodum omnia corporis nostri excrementa duobus modis vacuantur, interdum enim a continentibus ipsa corporibus excernuntur, interdum sponte profluunt, eo quod ob imbecillitatem ab ipsis corporibus contineri non possunt, ita quoque de semine dicendum, Gal. auctore 6. de loc. affect. quanquam semē ipsum a reliquis differat excrementis ut quæ inutilia sint: ipsum vero vtile, ex omnium philosophorum, ac medicorum consensu, In omnibus igitur excrementis ut excernere tempestiue, ita continere cum oportet naturæ officium est: fit autem secretio aperto fluxionis meatu, ac reliquo conceptaculi spatio, & contracto & ad apertum iam meatum quicquid in continente spatio continetur, impellente. Retentio vero fit cum clausus permanet meatus, & contentum a continente haudquam impellitur, sed contra comprehenditur, atque retinetur: hoc modo in his, qui integra valetudine degunt, contenti humores in cauis instrumentis naturaliter, & excernuntur, & retinentur. At in illis qui præter naturam se habent, retentio ob excreticis facultatis imbecillitatem, Excretio vero ob retentricis infirmitatem euenit, aut ob aliquam dispositionem, quæ haud secus quam naturalis ipsa excretoria vis partes mouere possit. Hoc itaque vitium circa, seminis excretionem sæpenumero contingit, quod a græcis γογγόλη, a latinis seminis profluvium appellatur, nomen siquidem compositum ex γόν quod semen genitale, & ἄν quod fluere significat, quasi genitalis seminis profluvium dixeris: semen autem modo γόν, modo γόνος a græcis nominari solet, ut liquet ex Galen. citato lib. 6. de loc. affect. Est autem (ut ipse inquit) affectus hic seminis excretio inuita, quam etiam inuoluntariam nominare licet, sed manifestius dixeris seminis esse assiduam excretionem, cole haudquaquam extento, quam descriptionem confirmavit Aetius cap. 33. lib. 1. cum dixit, profluvium seminis excretio est eius præter voluntatem citra pudendi tensionem: & Paulus cap. 55. lib. 3. asserens, quod seminis profluvium est inuita, ac præter voluntatem excretio, quæ continue naturalibus non intentis ex retentricis naturæ facultatis imbecillitate provenit: quod sine venere, sine nocturnis imaginibus sic fertur, ut interposito spatio tabe hominem consumat, Celso auctore capit. 21. lib. 4. Cum autem in spermaticis vasis succus hic spermaticus cogatur, & propterea flexus multos instar capreolorum quorundam varie implexorum retinuerunt, ut diutissime, qui ad testes feruntur sanguis, & spiritus detineantur, ac concoquantur, idque clare cernas eum inspiciens, qui in primis flexibus habetur humorem adhuc sanguinem esse insequentibus deinceps magis, magisque albescere

Cap. 6. in princ.

Quomodo ex-
pulsio, & reten-
tio naturaliter
sint eorum,
quæ in cauis in-
strumentis con-
tinentur.

Quomodo in
his, qui præter
naturam se ha-
bent.

Cap. ultimo.

Seminis pro-
fluvium quid
sit.

14. de uſa par.
cap. 10.

Quæ pars affi-
ciatur in ſemi-
nis profluuiio.

6. de loc. affect.
cap. 6.

Lib. 11. c. 33.

Quis affectus
preter naturam
ſit. c. 4. in ſine.
Loco citato.

Cauſe.

Aet. li. 11. c. 33.

Gal. 6. de loc. af-
fect. c. 6.

Lib. 9.

Lib. 9. c. 9

Alia differentia
ſeminis proflu-
uii.

Cauſe.

2. de cau. ſymp.
cap. 2.

3. de cau. ſym.
cap. 4.

cap. ultimo.

Signa.

quoad in omnium poſtremis totus albus omnino fuerit redditus, qui flexus poſtremi in teſtes terminantur, quique iterum cum laxi ſint, & cauernofi, humorem qui in vaſis ceptuſerat concoqui, excipientes & ipſi rurfus perconcoquant, ut liquet ex Gale. 14. de uſu par. Propterea non ab re in hac affectione ſola vaſa ſpermatice affici manifeſtum eſt, ut citato loco legitur, & 6. etiam de loc. affect. Cum dixit igitur gonorrhœa inſtrumentorum ſeminis affectio eſt, non pudendorum, quæ ſeminis genitalis via ſunt, qua excernatur: Id etiam confirmauit Aetius paulo antecitato loco: In ipſis nanque & generetur, & continetur naturaliter genitale ſemen. Quod uero ſymptoma ſit in genere exeretorum immodice, 3. de cauſ. ſympt. a Gale. ſcriptum eſt. Atqui dignoſcitur ex eo, quod ſemen profluens aquoſum, ac tenue exiſtit: excernitur etiam citra appetentiam coeundi, & ut plurimum citra ſenſum, quandoque uero cum uoluptate quadam promant, corrumpitur etiam ſenſim vniuerſum corpus, ac gracileſcit, præſertim circa lumbos, Aetio teſte. Os quoque uentris quibuſdam reſoluitur, & toto corpore non ſolum relaxantur, imbecilli; ſunt ſed etiam ſicci, graciles, pallidi, cauiſque oculiſcernuntur ut colligitur ex Galen. 6. de ſanit. tuen. Conſequitur autem ſeminis profluuium ad retentricis in vaſis ſeminariis facultatis imbecillitatem, ut inquit Aetius, ſeu potius reſolutionem eiufdem facultatis, ex Gale. teſtimonio, quam facultatem imbecillam reddere poſſunt excedentes omnes intemperaturæ, præſertim humida, aut calida, ſeu quæ ex his conflatur. Id uero ex propriis earundem intemperierum ſignis diſtinguere poteris, ſimul cum totus corporis natus, ac præcedente victuſratione; Interiem autem contingit quod a copia ipſius ſeminis eandem retentricem facultatem vaſorum ſeminariorum grauante, ut ſemen ipſum retineri haud quaquam poſſit, & ſic inuoluntarie excernatur. Coacervatur autem talis ſeminis copia eis, qui ventrem exercere conſueuerunt, & crebriore uti concubitu: demum uero continentius, & purius, innocentiusque degant, ut refert Alex. cap. 9. lib. 6. Interdum autem ex ſeminis acrimonia, ac tenuitate, adeo ut eam continere non poſſit eadem contentrix facultas, etiam excitatur ſeminis profluuium: Id quod ſeminis colore, ac ſubſtantia, quoniam bilioſius, atque tenuius apparebit, iudicabis. Ad hæc prægreſſæ cauſæ tum victus, tum ſuperior uita illud manifeſtabunt, nec non mordax, atque præcalidum inter emittendum ſemen ſentiunt, Verum magna ex parte ob retentricis facultatis imbecillitatem eorundem vaſorum ſeminariorum propter aliquam intemperiem gonorrhœa excitatur, eodem Alex. auctore. At quoniam eueniat interdum quo initis quoque ſemen excernatur non ob retentricis facultatis infirmitatem, ſed ob aliquam diſpoſitionem, ut diximus, quæ haud ſecus quam naturalis ipſa excretoria uis partes mouere poteſt: Propterea id quoque dignoſcendum erit: quanquam alia quædam differentia gonorrhœæ exiſtat hæc, & contrario modo eueniens, quam ante dicta. Nam illa cole haudquaquam extento (ut diximus prouenit, quando uidelicet ad retentricis facultatis imbecillitatem refert: hæc uero frigido, ſeu tento quodammodo pudendo ſit, & uelut conuulſio quædam eſt, Gal. teſte 2. de cauſ. ſympt. Excitatur uero cum quaſi conuulſioni quid ſimile inſtrumenta patiuntur, ut ipſemet teſtatur 3. de cauſ. ſympt. Euenit autem ubi aliquis uel comitiali morbo, uel conuulſione uiolenter irruente fuerit correptus: quamuis haudquaquam abſurdum fuerit in ſeminariis vaſis, & quidem ſolis aliquando eiufmodi diſpoſitionem excitari, quando uidelicet conuulſioni aliquid ſimile patiantur, quod idem Galen. confeſſus eſt præcitato lib. 6. de loc. affect. quemadmodum alias quoque partes aliquando uidemur ut manus aut pedes, aut digitos conuelli, modo ſimul cum vniuerſi corporis conuulſione modo ipſis ſolis affectis Percipies autem hanc differentiam gonorrhœæ, licet ferre improprie gonorrhœa

thœa dicatur, (ea proprie, & vere existente, in qua cole haudquaquam exren-
to semen præter voluntatem emittitur, vt diximus,) quoniam rigido, seu
extento pene, licet in voluntarie semen emittitur, & vbi citra morbum comi-
talem, aut aliam vniuersalem conuulsionem id fiat, nullum dictarum aderit
affectionum indicium, sed ipsa vasa seminis duntaxat conuulsioni similem
dispositionem patiuntur: quæ dispositio non alio modo generari poterit
quàm conuulsio quæuis alia particularis, potissimum autem à flatuoso spiri-
tu ortum habet. Cæterum seminis profluuium licet in omnibus ætatibus
oriri possit, maxime tamen contingit pubertatem transgressis citra decimum
quartum annum, vt inquit Aetius: quod item non solum viris, sed & mulier-
culis accidit, licet in fœnis ægre tollatur affectio, vt ipse refert. At quod
mulieribus tale vitium exciteretur, lib. 2. de semine testatur Gale. exemplo mu-
lieris, quæ vteralibus morbis vexabatur, cui in nullam prius, deinde ex ea
foras, & copiosissimum, & crassissimum semen effluere visum est, tale autem
collectum erat, propterea quia diu vidua permanerat, tempore autem, quo
ipsum emittebat lumborum, manuum, & pedum distentiones quædam ean-
dem inuaseraut, adeo ut conuulsa esse videretur, vt ipse inquit. In vniuersum
autem pro seminis profluuii curatione refrigerantibus atque exiccantibus
cum cibis, tum medicamentis vtendum est, & potissimum in quibus & semi-
nis copia, & facultas reretentrix infirma est vt testatur Alexa. quoniam cura
huius affectionis communis est cum ea, quæ in omni fluxione adhibetur, Ae-
tio Auctore & propterea (vt ipse inquit) vniuersam victus rationem resic-
catoriam, & astringentem constituere oportet, & similibus quoque medica-
mentis vti Aer itaque eligatur ad siccum, atque ad frigidum vergens, somnus
ut moderatus in cubile frigidus, non valde molli: decubitus vt plurimum
in latus dextrum, vel sinistrum, vitata forma supina, ne lumborum arteriæ
inde supercalhant, quibusdam etiam herbis arefactis subtratis, quales sunt
portulaca, nymphæa, solanum, umbilicus veneris, lactucæ, rosæ, ac viticis folia
& reliqua huiusmodi: In quiete quoque circa initia taliter affectos asserua-
re oportet, Nam post prima morbi tempora exercitiis ægros committere
conuenit: quibus totum corpus, partesque affectæ confirmantur, vt Paulus te-
statur. Alui excrementa quotidie excernantur natura, vel arte lenibus vide-
licet clysteribus. Abstineant quoque à spectaculis, & lectionibus, quæ vene-
reæ rei vsum in memoriam reuocare possunt, quinimo omnem de rebus ve-
nereis cogitationem excludere oportet, Aetio teste. Quo ad cibos attinet,
paucis vtendum est, atque eis, qui ægre corrumpuntur, & difficulter permu-
tantur, ac resiccandi vim habeant, vt idem Aetius testatur. Vitandi autem
sunt flatuosi, ac etiam valde calidi. nam velut semen generant cibi, qui bene
nutiunt, & flatuosi sunt, ac totis substantiis familiares, & medicamenta
flatuosa, & calida, Ita extinguunt ipsum desiccantia, & refrigerantia omnia.
quæue totis substantiis sunt contraria: etenim quæ refrigerare sunt nata,
tum edulia, tum medicamenta semen cogentia, incrassantia, & stabile red-
duntia, vim habent ipsum supprimentem, non autem corrumpentem, velut
est lactuca, blitum, a triplex, cucurbita, mora, cucumeres: quæ vero resiccant,
prorsum ne esse quidem semen permittunt, vt nymphæa: & etiam si calida
sunt natura, velut ruta, quemadmodum Gal. libr. 5. de simpli. medica. facult.
scriptum reliquit. Qua de re vbi tenue, acre, ac biliosum semen, quod emitti-
tur, fuerit, in frigidatibus, magis quàm resiccantibus tum cibis, tum medica-
mentis vtendum erit: Nam hi contemperantia, refrigerantiaue exigunt, vt
genitura sensim crassior, & temperatura reddita non amplius effluat, cum præ-
dictis autem cibis viticis, ac canapis semen præsertim tostum rutæ item se-
men, ac folia lactucæ semen, & cauliculi, nymphææque radix, ac semine præben-

Prognostica

lib. 11. cap. 32

cap. 1. & 2

curandi metho-
dus.

lib. 9. cap. 9

loco citato

Victus ratio

lib. 3. cap. 55

citato loco

cap. 23

Loco citato.
Medicamento
rum ratio.

Locis citatis.

Citato loco.

Aet lib. II. c. 34

cap. 14

da sunt. Potus sit aqua frigida, præsertim pluuiialis, vel pro communi aqua ea, in qua ferrum sæpe extinctum fuerit, præbeatur, auctore Aetio. A vini potu, potissimum multo, ac acrium rerum usu abstinendum est: Mox quoque quo ad medicamentorum rationem attinet circa lumbos, & pubem medicamentum ex rosaceo, maxime ex omphacino apparato, ac paucio uino cum linteis lineis sæpius applicari debet: Similiter si in melino, aut ænanthino oleo, paucio uino addito madefiant: neque ineptæ erunt, si spongiæ posca imbutæ adhibeantur, dein cataplasmate uti ex palmulis, malis, acacia, hypocistide, ænanthe, rhoe, & similibus: nec non infessibus utendum erit ex lentisci, rubi, myrti, & id genus aliorum in uino austero, siue diluto, aut etiam ipsa aqua decoctis ex communi consensu Pauli, & Aetii, Quamquam ubi ob feminis tenuitatem, atque acrimoniam fiat tale profluuium, etiam temperatis balneis uti conuenit, ut Alexan. visum est: quinimo ad frigida lauacionem confugere non inconuenit, maxime si medicamentaria qualitate aqua prædita sit, velut sunt in albulis aquæ sapore subsalfo, & tactu lactei teporis, ex Aetii testimonio: in quem usum magnopere commendando naturale balneum puteolorum, quod vulgus Balneolum appellat, modo eius actualis caliditas fuerit repida, aut infrigidetur. Per interualla etiam vnguenta adhibenda sunt, eaque componenda ex cera, & rosaceo, succo aliquo astringente, aut refrigerante adiecto. Succi vero apti sunt succus semperui, folani, umbilici veneris, sanguinariæ, nymphæ, portulacæ, lactucæ, & alii huiusmodi: Verum ab assiduo eorum, quæ vehementer refrigerant usu, tum in his, quæ forinsecus apponuntur, tum etiam in his, quæ per hos exhibentur, cauere oportet. Intus quoque sumenda sunt quæ semen exigunt, veluti viticis semen torridum, aut folia, seu flores; similiter canapis quoque semen, aut lactucæ, seu nymphæ semen, & radix quæ cum uino nigro austero in potu exhiberi debent, ex Tralliani sententia, Vel ex aqua bibenda præbeantur, præsertim, in qua ferrum sæpe fuerit extinctum, aut in qua fuerint decocta portulacæ, seu sanguinariæ folia, iis potissimum, in quibus semine biliosum, ac acre reperitur: quibus etiam confert corticem radicis halicacabi cum eadem aqua bibendum exhibere; Valet quoque peculiariter ad hoc non solum temperamento, sed tota ipsius substantia, licet calida sit, Ruta, (ut idem Alex. inquit,) namque ea comesta semen coagulat, & corrumpit, ut refert Aetius. Optimum quoque censetur (ut liquet ex eodem auctore) laminam plumbi lumbis supponere, tum eorum, qui in somno, tum qui alias semen profundum, multum enim refrigerare consuevit. In his uero, qui plumbi durtiem ferre non possunt, ex prædictis herbis refrigerantibus quædam arefacta substernantur: quibus etiam viticis folia, rutæ, ac calaminthæ commisceantur, maxime uero & rosæ, profunt enim hæc citra renum læsionem, Nam uehementes refrigerationes eorum, quæ lumbis subduntur, renes iniuria afficiunt, ut ipse inquit: quanquam ante eum Galen. non modo hæc, sed nonnulla alia, quæ conscripsimus medicamenta 6. de sanit. tuenda, scripta reliquerit: quo loco etiam assiduum usum feminis viticis, ac etiam rutæ pro cibo commendauit, idque magnopere conferre cuiusdam experientia, comprobauit. Nos uero tanquam experientia comprobata, quibus uti consueuimus, medicamenta quædam conscribemus, inter quæ syr. est qui recipit sanguinariæ, acetosellæ, plantaginis, cuiuslibet P. j. portulacæ, capreolorum uitis, umbilici ueneris, & rubi ana manip. i. s. myrcillorum, seminum coriandrorum præparatorum, ac seminum papaueris albi, singul. unc. s. foliorum lactucæ, florum nenupharis, borraginis, & violarum ana manip. s. foliorum rutæ, viticis, menthæ, ac calaminthæ siccorum ana 3. iiii. bulliant secundum artem in aqua pluuiali quantum satis sit, de qua recipe lib. iiii. dein. succi rosarum

farum rubearum, granatorum, & pomorum accidorum ana lib. s. a diicito, & cum saccharo, exiguoque aceto fiat syr. quo vtatur æger sæpius singulis diebus vnc. ii. vel iii. absorbens. Item pastilli hoc modo confici poterunt, Recipe semini rutæ, agni casti, & vrticæ ana scrup. s. seminis lactucæ, portulacæ, plantaginis, & papaueris albi, singul. scrup. i. seminum coriandrorum præparatorum & canapis torrefactorum ana gra. iiii. diacalaminthæ. 3. ii. cornu cerui vlti, seminis rosarum, sandalorum, & corallorum rubeorum ana grana vii. seminum melonum 3. iiii. sacchari dissoluti in aqua rosarum, quantum satis sit, formentur pastilli, quorum vnum cum pauco vino rubeo astringenti, aut pauca aqua, in qua sæpius ferrum fuerit extinctum, aut etiam eisdem simul permixtis, assumant pro qualibet vice: Vnguentum etiam, quo vt consueui, tale est: Recipe olei rosacei, omphacini, cytoniorum, de nenuphare, & myrtini ana vnc. i. cremoris seminis lini, & seminum cytoniorum extracti cum aqua rosacea ana vnc. s. foliorum rutæ, agni casti, & menthæ siccorum ana .3. s. succi polygoni, portulacæ, & semperuiui ana vnc. i. s. pulueris corallorum, & sandalorum rubeorum, sanguinis, draconis, & boli armeniacæ ana .3. i. ceræ quantum satis sit, & aceti parum, misceantur, & fiat vnguentum verum vbi rigido, seu intento pene seminis profluuium fiat, si propterea quod morbo comitiali, aut alia vehementi conuulsione æger laboret, eueniat, his opitulandum est cum his medicamentis, quæ prædictas affectiones curare valent, quorum copiam propriis capitibus studiosi reperient. Neque tamen prætereundum circa lumbos & pubem prædicta medicamenta adhibere: At si particularem quampiam dispositionem conuulsioni similem seminaria vasa patiantur, & propterea seminis profluuium accidat, iis, quæ sequenti cap. de priapismo dicemus vtendum, erit, potissimum si ex flatuoso spiritu eadē in eis excitetur affectio: quanquam lentium decoctum in potu sumptum, præter id, quod semen extinguat, membri etiam turgiginem remittere, ac sedare valuat, vt quidam aiunt ex Aetii testimonio.

Li. 11, c. 34

περί πριαπισμῶν, καὶ σατυρίας.

id est de priapismo, & satyriasi. Cap. 105.

INter multa, adeo atque admiranda instrumenta, quæ ad generis propagationem à natura comparata, nihil minus admirabilem constructionē inspicias ipsius pudendi, seu colis corpus siquidem neruosum, cauum seu cauernosum & durum, ex osse quidem emergens, non aliter quam reliqua alia ligamenta, eo duntaxat ab eis discrepant, quod cauum, atque cauernosum sit, & propterea quod eius utilitas ita flagitabat, vt 15. de vsu parti. à Gal. scriptum est: cum nanque libidinis impetu quispiam stimulatur volentibus nobis pudendum ipsum intendi debebat exacte nedum coitus causa, sed vt semen quam longissime ab eodem iaculetur, propterea eius essentia talis est, qualis in nulla alia nostri corporis parte est videre: neruosum siquidem corpus existens (vt diximus) ac omniquaque fistulosum, & durum, excepta ea parte, quam glandem vocant. distenditur autem protinus vbi ad coitum animal insurgit à naturali facultate, quæ illum attollere potest, Nam eas actiones, quarum gratia à natura partes institutæ sunt, protinus ab initio citra doctrinam aggrediuntur, cum vsus requirit (eodem Galen. auctore) 6. Cap. 6 de loc. affect. Verum cum sic extensus fuerit à vaporoso spiritu ab arteriis influente, in tumore attollitur, atqui à spiritu in tumorem ipsum attolli manifeste patet, iis, qui celeritatem eius, & cum intumescit, & cum iterum residet, perpendunt, spiritu eodem modo eius extensionem sequente, quemadmodum pulmo thoracem, ob eam, quam habet ad motum ipsius.

cap. 1. 2. & 3.

Cap. 6

li 4 sequelam,

Cap. ultimo,

Capite citato
Priapismus,
quid sit,

Cap. 9.

6. de sanit. tuen
da cap. 5.

Satyriasis quid
sit.

Cap. ultimo.
Quæ pars in ei
afficiatur.

Quis affectus
præter naturam
sit priapismus.

Cap. 7.

sequelam, Et ob hanc rem replentis fistulosum neruum spiritus vim cum ac
coitum irrumpit anima, non arterias proprie referre debemus, sed ad eius-
dem nerui propriam actionem, quæ ex propria eiusdem partis essentia profi-
ciscitur, ut liquet eodem 6. de loc. affect. etenim probabile est vniuersi cor-
poris arterias eadem habere actionem, quippe cum eodem tempore totius
animalis omnes inter sese similiter producantur. Itaque haudquaquam par
esse videtur ut arteriæ pudendis insertæ, aliam quampiam habeant facultatem
præter eam, quam antea in toto corpore habebant, nisi quod ampliora sint
ipsis quam cæteris arteriis ora, & quidem iure optimo ad celeritatem seque-
læ, ad id quod euacuatur, sic præparata, semper enim natura quod vnicuique
actioni utile est, undiquaque explere videtur. At quoniam quandoque eue-
nit ut nullo præcedente ad libidinem stimulo, atque desiderio, talis fiat pu-
dendi, seu colis extensio in longitudinem, atque circulo quoque totus augea-
tur, propterea affectus quidam excitatur, qui a græcis *πριαπισμός*, latine
quoque priapismus dicitur deducta denominatione a priapo, quem ita fini-
xerunt, atque pictura descripserunt homines, quasi ei suapte natura huius-
modi coles esset, eodem Gal. auctore citato lib. 6. de loc. affectio. quem secta-
tus est Aetius cap. 32. lib. 1. Est autem affectus hic (ut eidem Aetio visum
est) tentigo pudendi, atque auctio in longum, & spissum, citra rei ueneriæ
appetentiam, ex caliditate quadam acquisititia cum inflammatione quadam
& dolore locorum consistens: Paulus quoque cap. 57. lib. 3. Priapismum
esse firmum genitalis incrementum, quod in longum, latumque intumescit
citra ueneris appetentiam, fatetur: Gal. autem citato loco priapismum esse
dixit, cum coles & in longitudine, & circulo totus augetur nullo stimulan-
te ad libidinem aut desiderio, aut aquisitio calore, ut quibusdam accidere
consuevit, qui supini decumbunt. Verum breuiori compendio (ut ipse in-
quit) dicere poteris. Priapismum esse permanentem colis, aut auctioem,
aut tumorem: & 6. de comp. medic. secundum locos ait, Priapismus est au-
ctio pudendi stabilis in longitudinem, ac orbem tumefacti citra rei Veneriæ
appetentiam: consulto autem ab eo addita sunt verba illa, aut aquisitio
calore, nam ubi ob supinum decubitum calfacti sunt lumbi adeo, ut coles
extendantur, etiam nullo stimulante ad libidinem desiderio, haudquaquam
priapismus dicitur, sed par est (ut idem Galen. inquit) ut calfactis lumbis, &
arteriæ etiam calidiores reddantur, & propterea magis pateant earum ora,
Quamobrem non exiguam tunc spiritus essentiam in fistulosum neruum ef-
fundant, qui paulatim impletus colem extendit stimulante ad libidinem ip-
so calore ob supinum decubitum acquisito: Attamen neque firmum, neque
stabile tale incrementum erit. Quod si cum eodem colis tumore seu augmen-
to eiusdem colis palpitatio contingat affectum non amplius priapismum, sed
satyriasm appellare consueuerunt, ut liquet ex Paulo cap. 56. lib. 3. Quod ve-
ro priapismus colis, seu pudendi affectus sit, ex Gal. patet. 6. de loc. affect. Ipse
nanque siue præcipuo, & proprio affectu, siue secundo, & per consensum af-
ficiatur, prout diuersimode affectio hæc generationem habet, ut dicemus: il-
ludque confirmari poterit eiusdem functione læsa: erat autem eius functio,
ut protinus stimulo ad libidinem animali distenderetur naturaliter ab eius
naturali facultate, cum vero nullo præcedente desiderio aut libidinis impe-
tu, neque supino decubitu ipse inuitus distenditur eius distentio præter na-
turam existit. At ipse affectus morbus est in magnitudine, seu quâtitate. Nam
ex inflationum genere existit, ut liquet ex eodem Galen. 14. meth. med. Præ-
ter autem inuitam erectionem ipsius pudendi priapismo laborantibus dolo-
res contingunt, quales tetanici habent, & ii, qui reliquis membris distendun-
tur, etenim inflatum, & distentum pudendum ipsum conuulsionis modo affi-
citur,

citur, vt testatur Aetius. At qui velut principes causas auctoris eius, aut creationis naturalis plenitudo existit, vel nerui ipsius fistulosi, vel arteriarum, aut etiam vtriusque cum ex priore conditione mutantur (vt eodem 6. de loc. affe. scriptum est) ita quoque vel ob arteriam orta immodice patentia vel vapore sum spiritum fistuloso neruo ortum, hic affectus excitatur, Vtrum autem potius pro causa sit habendum inquirere oportet praesertim ex iis, quae praecesserunt, & ex modo curationis inquit Gal. & quanquam ab vtrisque ipsum fieri posse existimauit, crebrius tamen ob arteriarum ora patentia sequi dixit: quippe cum facilius sit et distendi, quam flatuosum spiritum in neruo generari, experientia item, nedum ratione illud comprobauit, Cum saepenumero fateretur se uidisse hunc affectum excitatum ob arteriarum iam dictam dispositionem, semel autem ob ipsius nerui praecipuum, ac proprium affectum; perpetuo tamen halituosi spiritus impletio affectum hunc excitat, vt 14. meth. med. 3. de caus. sympt. & 9. de comp. medic. secundum locos scriptum est: ex humoribus viscosis, ac crassis per moderatam caliditatem. Interim genito eodem aliuoso spiritu: Verum vbi in eodem fistuloso neruo flatuosus spiritus fuerit genitus, ex continua eiusdem, quae praecessit palpitatione dignoscitur, quemadmodum e diuerso vbi supra modum arteriarum ora, quae ad pudendum deueniunt, fuerint patefacta, atque propterea assatim spiritus multitudo ad ipsum colem affluat, nullum tale symptoma praecedere solet: Incidunt autem quidam in talem affectionem cum longo tempore praeter consuetudinem a concubitu abstinerunt, si multo semine abundant, praesertim cum non student, vt multa exercitatione sanguinis abundantia dissipetur: alij enim, qui mali succi alimentis, ac acribus vsi sunt atque etiam quidam ubi ante nequaquam cingi consueuisset, in hanc affectionem incidit, cum duobus mensibus praecinctus peregre proficisceretur, ex Gal. testimonio Coniiciendum itaque est iam dictis arteriarum ora nimis patefacta fuisse: Aliis ob humorum copiam seu vitium, & acrimoniam, aliis vero ob flatuosum spiritum; & sine ordine, & violenter vacuatum. Caeterum ex quacunque causa arteriarum ora patefiant, adeo vt affectus hic generetur, colem secundario, & per consensum, non autem proprio, ac praecipuo affectu laborare consonum est: quemadmodum si spiritus flatuosus in eo fuerit genitus, ipsum proprie, ac praecipue affectus infestat: Incidit autem hoc vitium non sane multis, sed inuenibus magis, quam aliis aetatibus, vt inquit Gal. 14. meth. med. Neque ipsum despiciendum erit, Nam ex praecipiti perire solent nisi confestim eis auxilium feratur, Aetio teste, Cum uero moriantur, ventre inflantur, & frigidum exudant: id quod & eis euenit, qui aliis conuulsionis modis perimunt. Qua de re pro eius curatione, & victus, & pharmaca exhibeantur attenuatorie facultatis citra manifestam calfactionem, vt testatur Gal. 9. de comp. med. secundum locos. Exhibendus itaque est victus, qui & flatui aduersetur, & siccet, ex auctoritate eiusdem 14. meth. med. abstinendum qua a cibis calidioribus, qui materiam in spiritum resoluunt, aperiuntque artérias tendentes in pudendum: nec duntaxat ab eis abstinendum: verum etiam ab his qui viscosum humorem pariunt, aut multum semen efficiunt, vt Alex. visum est: quinimo in primis morbi diebus usque ad dies tres in inedia eos afferuare oportet, dein cibum paucum generis frumentacei, qui leniter attenuare ualeat, citra manifestam calfactionem, atque omnino nihil inflantem exhibere conuenit, vt liquet ex Aetio, eosque in aquae potu continere, seu ea, in qua coriandri semina preparata fuerint incocta. Motu quoque, & exercitio, aegri utantur, potissimum paruae pilae, ac frictione partium superiorum: In latus ite decubant, substernendaque in strato sunt ea, quae ad seminis profluuium dicta sunt. Similiter a spectaculis, narrationibus, turpi consuetudine,

Causae.
Lib. 11. cap. 32.
Capite citato,

Immediata pri
apismi causa.
14. meth. cap. 7.
3. de caus. sym.
cap. 4.
9. de comp. med.
sec. loc. cap. 9.

6. de loc. affect.
in fine,

Prognostica,
Cap. 7.

Loco citato
Cutandi metho
dus.
cap. 9.
Ratio uictus,
cap. 7.

Lib. 9. cap. 11.

citato loco,

Eodem lib. 9.
cap. 10.

Pau. lib. 3. c. 57.

In fine.
Medicamento-
rum ratio.

Venæ sectio.
Cap. 7

Comment. 24.

Purgatio.
14. meth. c. 8.
9. de comp. me.
sec. loc. c. 9

Clysteres.

Topica.

14. meth. c. 7
9. de comp. me.
sec. loc. c. 9

imaginatione, ac commemoratione eorum, quæ ad uenerem excitare queunt penitus sunt arcendi: nam qui præter uictum calidum, ac humidum, quo semen rursus gignebatur, etiam a turpibus desideriis non cessarunt, hi quoque post mortem rectum, intentumque habere pudendum deprehensi sunt, ut idem Alex. refert: Nullis etiam Venus prodest, nisi quibus ex huius abstinence semen abundare coniciamus, ut inquit Paulus, quemadmodum cuidam amico Gal. consuluit, modo post seminis excretionem, postea a narrationibus, spectaculis, ac meditationibus libidinem suscitare potentibus summo opere caueret, ut ab eodem 6. de loc. affect. scriptum est: Quo vero ad medicamentorum rationem attinet, priusquam ad iam dicta medicamenta deuenias, totum corpus vacuare oportet, modo id capax uacuationis sit, ea tamen utens uacuatione, quam cubans aptissime sustinere possit: & quoniam inuenibus magis quam aliis ætatibus hoc excitatur uitium, ut diximus ex Galen. auctoritate: Ea propter his sanguinis missio præcipue est salutis, Ceu nec ætate eorum eam recusante, ut idem Gal. fatetur citato lib. 14. meth. med. A principio itaque statim propter dolores, & inflammationes, ab hac affectione prehenso venam secare conuenit, potissimum si multo semine abundant, ac præter consuetudinem a uentre se abstinerint: secus autem interna dextri cubiti uena, utpote quæ celerrime, & plurimum ex iis, quæ principes sunt, partibus uena hæc corpus vacuat, ut 4. de rat. vic. in morbis acutis à Gal. decretum est: nec non & ab inferioribus eadem promptissime reuellit: Verum ubi vitiosi magis succi in toto corpore redundarint, purgatione utendum erit, quamuis in priapismo vomitoriis medicamentis potius, quam subducentibus aluum sit utendum, ex eiusdem Gal. sententia præcitato lib. 14. meth. med. & 9. de comp. med. secundum locos. Eandem quoque sententiam sectati sunt Paulus, & Aetius. Atqui licet ab efficacioribus purgantibus pharmacis in totum abstinendum sit, ut eidem Aetio visum est, & potius uomitoriis medicamentis utendum, auersionis in contrarium gratia, attamen ubi insuetus ad uomitionem fuerit æger, aut medicamentis vomitoriis uti recusarit, leuioribus quibusdam medicamentis aluum subducentibus, quæ vicinas partes fluxione haudquaquam infestent, uti poteris, Cum neque id etiam Gal. negauit: ea sunt nostro æuo, quæ leniendo purgant, veluti melaereum, saccharum violaceum, syr. ex pluribus infusionibus rosarum, vel uiolearum, & reliqua huiusmodi, Vel lenibus clysteribus aluum submolles per betæ, & malug decoctum, pauco mercurialis succo admixto, ut refert Aetius: Animum autem acerbis, atque efficacioribus, ne inflammationes exacerbentur, cauere oportet, tam clysteribus, quam purgantibus medicamentis: Nec minus cauenda sunt, quæ urinae ciendæ facultatem habent, ex auctoritate eiusdem Aetii. A sanguinis missione, seu purgatione ceratum ex simplici rosaceo factum, ac cum aqua frigida subactum pudendo, & lumbis imponatur: Sic nanque quendam Gal. percurauit a uenæ sectione prædictis partibus ipsum imponens: quemadmodum & alium, qui post missum sanguinem humido medicamento, quod ex chamæmelo conficitur, fuit usus, ut liquet eodem 14. meth. med. Hæc eadem medicamenta super easdem partes imposita 9. de compositione medicamentorum secundum locos comprobauit: Alexander vero idem ceratum rosaceum cum aqua frigida, & pauco aceto subactum commendauit: Lumbis autem, quæ euidenter refrigerat, imponenda, veluti est solanum, portulaca, hyoscyamus, & semperniuum, & necessario etiam coles, & intercapedo inter anum, & pudendum ex aliquo leniter refrigerante illinitur, uelut est argenti spuma, cimolia, & cerusa, si aceto, aut posca, vel aqua sint diluta, ex Pauli, & Aetii sententia. Verum ipsi laboranti particulæ medicamentum, si ea calidior sit affecta, quo ad portionem caloris abundantis refrigeret, imponendum: sin aliter inter initia quidem

dem omnino, quod modice refrigeret, postea vero id necessum non est: Pari modo & quæ circa lumbos sunt particulae omnes eiusdem facultatis medicamento sunt comprehendendæ, ex eiusdem Gal. sententia eodem 14. method. cap. 9
 med. Valde nanque frigida, præsertim quæ astringunt, & torporē inducunt, cauere oportet, ne affectus difficilis ad discutiendum reddatur, vt idem inquit Alexand. præsertim vbi hoc vitium ex flatuoso spiritu in cauernoso neruo orto fuerit excitatum, nam quæ siccant, ac flatum discutiunt absque valido calore hoc modo affectis adhibenda sunt: Optimum quoque erit tum colitum lumbis & inter capedini inter anum, & pudendum huiusmodi medicamentum reliquis imponere, quod recipit olei rosacei unc. i. s. chamæmelini unc. i. succi solani, aut semperuiui, seu portulacæ, unc. s. argenti spumæ, & cerusæ ana 3. ii. ceræ, & aceti parum, fiat vnguentum: & rursus ea præbenda sunt, quæ naturali efficaciam prædita per experientiam sunt inuenta, veluti est nymphae semen, ac radix, vicisq; semen, ac etiam rutæ; ea nanq; potui exhibenda sunt: & ruta etiam viridis absontiis admisceatur, ac ipsum rutæ semen copiosè comedatur; non tamen à principio hoc fiat nanq; multum calfacit, sed posterius post aliorum extenuantium vsum: nymphae autem semen ac radix à principio præberi poterit, ex sententia eiusdem Gal. præcitatis locis: est nanque illud commune preceptum omnium ferme, quos vitiosus succus creat, morborum, quod in fine calfacientibus, & siccantibus sit vtendum: quippe hæc quod reliquum humoris est, prorsus absumunt, vt ipse inquit. Amplius ea in potu exhibenda sunt, vbi hæc non suffecerint, quæ præcedenti cap. de seminis profluvio descripsimus, potissimum quæ genituram infirmare possunt, ac extinguere. At si prorogatur vitium, cucurbitulae cute ferro incisa defigenda sunt, præsertim si sanguinis multitudo adesse adhuc videatur: Et hirudines adhibenda etiam eo casu, vt eisdem Paulo, & Aetio visum est. Mulieribus quoque hæc affectio satyriasis, & tentygo dicta accidit, ad quam consequitur ingens pudendorum pruritus cum dolore, ita ut mulier locis assidue manus admoueat, atq; ideo intolerabili veneris desiderio contabescat, & falsi humoris affluentis acrimoniam ac mordacitatem percipiat vel liquet ex Aetio ca. 82. lib. 16 quanquam eis raro hoc malum accidat, vt inquit Paulus cap. 56. li. 3. Qua de re ipsis etiam à principio vena secunda est, alimentum contrahendum, & pubi, ac lumbis illinenda quæ leniter refrigerant, ac contrahunt, vt eidem auctori visum est: reliqua vero ab eodem præcitato loco petenda sunt.

Quæ a tota substantia conferunt.

14. met. c. 7. & 9. de com. med. sec. loc. c. 7

Satyriasis etiam mulieribus accidit.

περί ἀπραξίας πορίων.

id est de ignavis partibus genitalibus.

Cap. 106.

NON minus sæui, quam impii diceremur si pauperculis, qui nuper uxorem duxerunt eisque potissimum, quibus magistratus, aut regni amissio immitet nec non & mœstis male nuptis eorum vxoribus auxilia non præberemus, cum inefficaces ipsi in veneris congressibusprehenduntur contrario vitio laborantes, quam ii, qui præcedenti affectu cōfliccati sunt. Qua propter pauca etiam de hoc vitio verba faciemus: Estque affectus hic impotentia quædam ad rem veneream exercendam, quamuis ea uti cupiant, vt ex Aetio colligitur 35. libr. 11. propterea quod ignaua, & impotentia genitalia membra habent: Afficiatur autem in hoc vitio pudendum, cuius proprium munus est, vbi ad coitum insurgit animal, media eius naturali facultate, quæ ipsum attollere potest, vt protinus distendatur, velut præcedenti cap. iuxta Galen. sententiam annotauimus. Affectio autem symptoma est in genere noxe functionum naturalium, ac eiusdem pudendi propriæ

Quid sit affectus hic. Quæ pars in eo afficiatur.

Quis affectus

præternaturam
fit
causæ.

curandi metho-
dus

Victus ratio
cap. 23

Medicamento-
rum ratio,
cap. 23

propriæ, ablatae nam neque hi in venerem ruunt, & propterea ignavi sunt, ut inquit Paulus cap. 58. lib. 3. Excitatur autem ut plurimum, Vel ex pudendorum resolutione, quæ ob frigidam aliquam intemperiem in eis exortam, efficitur; Vel ob seminis inopiam. Quanquam etiam ob reliquas causas quandoque excitari contingat, renum præsertim occasione, aut reliquarum partium principum. Atqui nos relictis huiuscemodi causis, quibus oportet conuenientem quoque curationem accommodare cum affuerit, si affectus hic ob particularum resolutionem, vel seminis inopiam duntaxat fuerit ortus, remedia conscribemus. Ceterum facile quispiam percipiat, nunquid ex seminis inopia fuerit genita affectio, an propter colis resolutionem, cum ex præsentibus, tum etiam ex his, quæ præcesserunt, inditiis, corporis naturam, temperamentum, ætatem, ac præcedentem victus rationem rimatus. Nec minus quoque & curandi rationem inueniet, Nanque tam alimenta quam medicamenta, quæ ipsis conueniunt, calefacientia, & instantia necnon & seminis gignendi potentia prædita esse debent, ex Aetii testimonio, Etenim semen generant. Cibi quidem, qui bene nutriunt, & flatuosi sunt, totisque substantiis familiares, medicamenta vero calida, & flatuosa. Ipsum etiam prouocant, quæcunque calida sunt, & flatuosa absque desiccatione, quoniam cum seminis substantia ex bona superfluitate generationem fortitur, sitque etiam flatuosa, bene nutriant, & flatuosa sunt. necesse est, quæcunque semen, aut procreare, aut prouocare possunt, ex Gale. sententia 5. de simplicium medicamentorum facultatibus. Carnes itaque pro cibo eligantur gallinarum, caponum, perdicum, phasianorum, starnarum, iuuenum columbarum, turdorum, meralum, necnon reliquarum paruorum auium montanarum; magnopere autem perdicis, oua, ac gallorum testiculi ad coitum excitant, ut inquit Aetius. & quoniam non solum quod bene nutriant cibi necesse est, sed etiam flatuosi sint oportet, propterea cum eisdem aut per se soli bulbi conueniunt, cicer, fabæ, nux pinea, ut ex Gale. liquet citato loco. Similiter competit pastinacæ radix, ac etiam rapare, & porri, erucæ tum folia, tum semen maxime agrestis, orminum, anisum, fœniculum, amygdalæ dulces, polypodes, & concharum genera, ex Aetii testimonio: vna quoque dulcis, ac recens, & erucæ semen tritum cum vitello oui in puluerem redactum, ac assumptum commendantur, Vinum bibant odoratum, rubeum aut subrubeum, vitentque omnino aquæ potum: infernas autem corporis partes eos exercere conuenit: in mollibus lectis dormiant, ac legant, quæ ad coitum cohortantur. Lectionibus item, ac spectaculis huiusmodi assideant, ex eiusdem Aetii sententia. Quo vero ad medicamentorum rationem attinet multi seminis esse, dicuntur, scincus, & satyrion, quemadmodum simul cibi, & medicamenta sunt lini semen, & eruca, ut eodem 5. de simplicium medicam. facultatibus liquet testes vulpis sicci, triti cochlearii mensura potati membri tentiginem faciunt: partes etiam renes scinci amplectentes ad tentiginem pudendorum excitandam bibantur. Similiter & maior bulbus orchis herbæ, quæ etiam testiculi appellationem habet, cum lacte potatus tentiginem ciēt, pudendum item cerui aridum vnius drachmæ pondere cum vino meraciore præbeto, ut inquit Aetius. Compositis item medicamentis in hunc usum uti poteris, ut mithridato, diamoscho dulci, diambra, ac diasatyrion, cuiuslibet 3. i. cum paucio vino odorato præbens. Vel in hunc modum medicamentum conficito, Recipe seminis erucæ, vrticæ, anisi, ac fœniculi, & pastinacæ, singula 3. s. nucis pineæ, amygdalarum dulcium ana 3. ii. piperis, cinnamomi, cuiuslibet vnc. s. ramenti genitalis ceruini, ac satyrii ana vnc. i. diambra, seu diamusci, vel diasatyrii 3. i. s. sacchari dissoluti in aqua mellisophylli, & rosarum quantum satis, sit fiant in morsulis ponderis vnc. i. &

cum

cum odorato vino fuluo seu subrubeo præbeatur ante cenam, vel etiam mane ante prandium. Naturalia quoque continus oleo, vngantur, cui adiectum sit radicis narcissi momentum, cocci gnidii, feminis vrticæ, pyrethri, aut viticis, vt liquet ex Paulo cap. 36. lib. primi: Priuatim autem stellio concretus, in pollinemque redactus magno dextri, pedis digito oleo adiecto illinitur, & venus exercetur: Vbi cessare voles, digitus abluitur, vt liquet ex eodem auctore cap. 58. lib. 3. Leporis quoque coagulum, aut leonis adipem pudendo illinitio deinde tria piperis gen era cum tragacanthi succo testiculis, in tercapedini inter anum, & pudendum, ac lumbis illinito, ex Oribasio. Vel olei liliacei recipe, mastichini, & de castoreo ana vnc. j. adipis leonis vnc. s. piperis piperis, cyperi, myrrhæ, ac sulphuris viui ana 3. i. moschi grana iiii. misceantur & cum cera quantum satis sit, fiat vnguentum, quo pudendum, testes, locus inter anum, & pudendum, ac lumbi illinantur.

περί τῶν τῆς μήτρας παθῶν, καὶ πρώτον περὶ ἐποχῆς ἐκμύων
id est de vteri affectibus, & primo de mensium
suppressione. Cap. 107.

IN construendis animalis partibus, eis inquam, quæ ad generis instaurationem fuerunt fabricatæ, natura non colem duntaxat, & testes, verum etiã tanquam maxime necessarium vterum machinara est, quem græci modo μήτραν eo quod ex ipsa omnia animantia, velut à matre oriantur, quandoque ὕστεραν quod posterior situ sit omnibus visceribus appellarunt, Aetio teste cap. primo lib. 16. Cum itaque vterus tanquam concipiendi instrumentum à natura esset productus, non ab re ventri ipsum subiecit, qui locus est (tum ad vsum venereorum, tum ad semen recipiendum, & præterea ad foetus incrementum, atque perfecti enixum) opportunissimus, Nam ad coitum locum nullum accommodatiorem in toto animalis corpore inuenias, quoniam longe ab instrumentis, quæ faciei insunt, sit diffitus ad foetus etiam augmentum opportunissimus. quod eo loco possit sine dolore distendi plurimum: ad partum vtilissimus, quod ad inferiora, & ad crura exitus fetui sit futurus facilius, Galeno auctore 14. de vfu part. nec mirum si omnes partes, quæ sunt in viris, in mulieribus etiam reperias, tamen eo duntaxat discrepent, quod in mulieribus hæ partes, quæ ad generis instaurationem sunt fabricatæ, intus sunt conditæ, In viris autem sunt extra, Nam quamuis homo animal sit omniũ perfectissimũ, nihilominus eo ipso rursus vir muliere est perfectior cuius perfectionis causa caloris exuperantia existit: hic enim primum est naturæ instrumentum: Quapropter in quibus parciore inuenitur, in his opificium sit imperfectius est necesse. quo fit ut admirari non liceat si foemina matre tanto est imperfectior, quanto frigidior, vt eodem 14 de vfu part. a. Galen. scriptum est, qua etiam ratione mulier partibus genitalibus, velut & reliquis viro est imperfectior: & propterea parte eadem, quæ intus formatæ fuerunt, dum ipso vero adhuc gestaretur, cum extare, & foras emicare præ caloris imbecillitate non potuissent, animal, quod conformabatur imperfectius eo quod vndique est absolutum reddiderunt: Nam quemadmodum talpæ oculi exprimi intus incepti foras à natura propelli non potuerunt, ita membra genitalia foeminis intus formata in exteriorem partem nequiverunt emergere ob imbecilliorẽ videlicet, ac imperfectiorem foemine naturam, in eo tamen talpis perfectior foeminea natura euasit, quod talpæ nullam ex cæcitate utilitatem consequuntur: foemina vero non parum hac membrorum suorum imperfecta fabrica ad generis successionem conferunt, vt ex eodem Galen. liquet libr. secund. de semine: Neque credendum est opificem partem totius generis

cap. 8. in prin.

cap. 6. in prin.

Cap. 5. antea

generis nostri dimidiam sua sponte imperfectam, ac velut mancā fuisse facturum, nisi imperfectionem hanc magna quādam utilitas fuisset sequutura: etenim propterea quod intus sunt conditæ partes hæ, vterus ad semen recipiendum, fætusq; generationem ad retentionem hac ratione fuit appositus: fætus item non modo ad primam sui constitutionem, sed ad omne etiam deinceps incrementum materiam postulabat copiosam, & proinde duorum alterum ipsi accidisse opus fuisset, aut vt ipsius vtero gerentis alimentum raperet, aut vt superfluum acciperet, verum rapere non erat melius superfluum vero assumere non poterat, si fœmina fuisset calidissima, discuteret enim ipsum sic, & facile exiccaret: frigidiorē igitur eam eo vsque fieri satius fuit, quo ad alimentum; quod confecisset, totum discutere non posset: quod enim est frigidus ne concoquere quidem potest, quod vero calidius vt concoquere, ita discutere valide potest. Quod vero non ita multum a calidissimo relinquitur, & coquere satis, vi quod non amplius est frigidum, & relinquere aliquid superfluum, ceu quod non vehementer adeo sit calidum potest. Hęc denique est frigiditatis fœminæ utilitas quam mox sequutura erat partium imperfectio, (vt diximus) cum ipsæ præ caloris imbecillitate foras prorumpere non possent, quod quidem commodum maximum, ac secundum est ad generis instaurationem: Hinc fit vt vterus instrumentum semini recipiendo ac retinendo, fœtui præterea alendo, ac perficiendo sit aptum, quanquam non in omni ætate: quoniam neque in imperfectis, neque in eis, quæ consueuerunt tantum habet magnitudinem, quod ad concipiendum sit aptus, sed in solis ætate florentibus proportionata talis magnitudo reperitur quemadmodum etiam & ipsum excrementum, seu fætus alimentum in solis florentibus animalibus abundare potest, Nam in declinantibus, cum vires sint imbecillæ alimentum non rite concoquitur, quo fit, vt cum illis bene agatur, si ad suum proprium vsum alimentum, quod satis sit, possint comparare: In eis autem, quæ augentur, licet valentes sint vires, & ob eam causam alimentum benignum concoquant plurimum, tamen cum duabus actionibus nutritioni scilicet, & auctiori sufficere oporteat, superfluum nihil relinquitur. In solis igitur ætate florentibus, seu augeri iam desinentibus, & viribus adhuc valentibus, magna huius benigni alimenti est affluentia: & quoniam quicquid ex alimento, siue bono siue malo superuacaneum est, id a validioribus membris ad infirmiora depelli solet; propterea effectum est, vt cum in ipsis (vt pote extremis in formatione) partibus natura defecerit, atque infirmissima omnium euaserint, ea excrementa, quæ in ipsis mulieribus redundant seu redundans sanguis ad omnium infirmissima partes (quæ genitales sunt) feratur: Mittuntur namque in venas, quæ vero committuntur, menses, & non attrahuntur: nimirum cum vterus ad delationem eorum nihil conferat vt 5. de simplic. medicamentorum facultatibus testatur Gal. qui quidem sanguis menstruus fœminis ipsis antequam concipiant singulis mensibus fit purgatio salubris: Vbi vero concepere, alimentum fœtibus accommodatum euadit. Fluere autem incipiunt mulierum plurimis menses circa decimum quartum annum, iuxta Aetii, & Pauli sententiam: paucis vero ante decimum tertium, aut duodecimum; plerisque autem post decimum quartum erumpunt, ex eiusdem Pauli testimonio: quo etiam tempore & pubescunt mulieres, & mammae ipsis & intubescunt: Non tamen cuncti eodem tempore, eademq; mensura, & per totidem dies prodeunt. Nam multis ad duos, tresve dies, non paucis vsque ad quintum profluunt: aliis etiam vsque ad septimum rarè vero ad duodecimum purgatæ sunt. plerisque etiam minus duarum heminarum mensuram quatuor dierum spatio, interpositis viginti duobus diebus, aut summum trīginta, singulis mensibus deferunt: Porro dehinc etiam

Cap. 22. post
prin.

Aet lib. 16. c. 4
Pau lib. 3. c. 60

etiam menses aliis anno quinq uagesimo: paucis vero vsque ad sexagesimum edurant; nonnullis, præsertim obes, a trigesimo quinto anno menses cessare incipiunt, vt eisdem auctoribus visum est. Cæterum sanguinis, qui profluit copia paulatim usque ad ætatis vigorem augetur: deinde aliquandiu æqualitatem seruans, paululum penitus crescit, aut minuitur: At vbi ad finem tendit paulatim rursus minuitur, donec in totum desinat, eodem Aetio teste. Cum itaque mulieres menstrua purgatione omnino carent: vel naturale est, vel præter naturam: Naturale siquidem, quantum ad ætatem attinet (vt diximus) vel infra decimum quartum, vel ultra quinquagesimum annum. Prægnantibus quoque secundum naturam menses supprimuntur: Similiter & cantrices, & saltatrices, quoniam quicquid in eis superfluum est, nimia exercitii uehementia consumit, non purgantur: & in summa (vt inquit Aetius) mulieres calidioris temperaturæ, & fortibus exercitiis vtentes, & agrestes parum purgantur: Dignoscas autem si secundum naturam menses supprimantur, quoniam mulier nulla inde molestia, vel totius corporis, vel vteri afficitur, vt inquit Aetius. Atqui non de hac, sed de ea mensium suppressione nos proprie loqui intendimus, quæ præter naturam, existit ex quâpiam præternaturali causa orta, vel totius corporis vitio, vel vteri, & partiû eius proprio, vt dicemus: quanquam semper ipsi vtero tribuenda affectio sit, eo vel primarie, vel secundarie, & per consensum affecto: nanque à toto corpore (vt diximus) tanquam superfluum (uelut infirmissimam partem) ad vterum cum valet mulier, eodem nihil ad eorum translationem conferente, transmittitur: vt exinde ab eo naturaliter modo, & tempore, quo diximus expurgetur, vbi concipiendi, tempus non adierit: Nam conceptionis tempore ipsæ purgationes tanquam necessariæ in eo detinentur: & propterea non concipiunt quæ non purgantur: Recte itaque dicimus etiam vterum ipsum affici, cum non perueniant ad eum ea, quæ antea, cum secundum naturam se haberet, uenire solebant: Quod uero hoc vitium symptoma sit in genere reentorum immodice, liquet apud Galen. lib. de differ. & 3. de caus. sympr. Sed quod præter naturam menses detenti sint, ex pluribus inditiis dignoscere valebis: quorum primum, ac maximum est Hip. 39 apho 5. lib. cum dixit, Si mulier quæ neque grauida est, neque peperit, lac habet, huic menstrua defecerunt: At nullo apparente in mammis lacte, vt refert Gal. 6. de loc. affect. hæc inditia adierunt, grauitas totum corpus molestat: fastidia cibi incidunt: horror inæqualis cum febre quandoque: & si vteri os claudatur cum quadam adierit duritie, propter quod differunt ab his, quæ conceperunt: quibusdam dolor cum grauitate in vteri regione accidit, modo in una, quandoque in altera parte: quinetiam in coxam dolor transit, ac crus ipsum, quod è regione est, per incessum claudicat: præterea lumborum, colli, & syncipitis dolor, qui etiam oculorum fundamenta infestat, sequi solet: item febres ardentes, & vrine nigricantes cum rubra quadam sanie, perinde ac si aquæ, ex qua nuper maceratæ carnes ablutæ fuerunt, fuliginem quis miscuisset: quemadmodum in Illustrissima Donna Maria Sansuerina Comitissa Nolæ sæpius talem vrinam inspexi: quibusdam etiam urina, aut difficulter redditur, aut omnino supprimitur. Quod si longiori tempore menses supprimantur, nullamque medicus mulieri vocationem promoueat, tumor aliquis præter naturam in ilibus interdum exoritur, ostendens nimirum ex internis partibus quampiam esse inflammatam, nonnullis etiam in extrema ilium parte panus excitatur, vt liquet ex eodem Gal. præcitato li. 7. de loc. affect. Quoniam uero mensium suppressio nonnullos consequitur præter naturam affectus, tum ipsius vteri proprios in quacunque eius parte ortos, siue circa eius cornua, siue ceruicem, siue totam eius cauitatem, cum etiam totius corporis communes, vt ex Gale.

Loco citato,

Lib. 16. c. 51.

Lib. 16. c. 51.
Quæ pars afficitur in mensium suppressione.

Quis affectus præter naturam sit mensium suppressio.
Lib. de diff. sym. cap. ultimo.
3. de cau. sym. Cap. 4
Cap. 5

Cap. 5
Suppressionis mensium causæ cap. 4.

liquet

Causæ ex parte
uteri,

Ex vitio sangui-
nis,

3. de cau. symp.
Cap 4.

Ex parte totius
corporis causæ,

Capite citato,

Externæ causæ
Lib. 16. c. 54.

Internæ.

Loco citato,

Cap. 18.

liquet 3. de cau. symp. Propterea eos narrabimus, primo affectus præter naturam, qui ad uterum pertinent, & deinceps eos, qui toti corpori communes sunt. Vnus autem & præcipuus uteri affectus retentionis mensium causa eius densitas, atque duritia existit, siue a natura corpus eius tale conditum fuerit, siue certo tempore uterum occupauerit, angustia item venarum vestri statim à principio congenita, vbi scilicet hac parte foemina male est formata, aut eorundem vasorum compressio, quæ ex his, quæ circumiacent fit, cum videlicet corpus immodice pinguescit: nec non, & eiusdem uteri intemperies quædam tum natura, tum sub quibusdam affectibus orta, suppressionis mensium causa existunt: Interim quoque menses retinentur ipsius sanguinis occasione quotiens quod uacuatur vel crassum est, vel glutinosum: quinetiam si ipse sanguis menstruus sine vitio sit, cæterum in uasis, quæ ad uterum pertinent, obstructio quædam vel obseratio prius facte, sic quoque menstruum retinebitur, ut idem Gal. testatur citato loco 3. de cau. symp. & com. apho. 28, 5. lib. 3. de cau. symp. Vitio itaque uel propriæ substantiæ ipsius uteri, vel vasorum, quæ ad ipsum pertingunt, aut eiusdemmet sanguinis qui ad ipsum deuenit, contingit sæpe numero menses supprimi: Nos autem cunctas has causas uteri vitio prouenire fatemur; quemadmodum etiam si ob robur vasorum eiusdem ventri sanguine ipso ad alias particulas delato, contingat menstruum detineri, eidem utero vitium tribuimus: Sic si ob inflammationes, seu eius cervicis distorsiones, aut peruerfiones, seu callos, aut carnis excrescentias istic exortas, aut pinguedines copiam mensium purgatio prohibeatur, ad uteri vitium referendū erit: nec minus si aut pellicula circa collum, aut osculum uteri fuerit adnata quemadmodum his accidit, quæ imperforatæ appellantur: Siue etiam vlcerū cicatrices, quæ vasorum oscula in utero excæcarunt: aut cicatrix obducta post abortum, ob quem uteri os fuerit exulceratum menses detinebunt etiam uteri occasione id fiet: Totius etiam corporis culpa aliquando prorsus non purgabitur foemina, tum propter plura exercitia, tum propter tenuem victus rationem tum propter succorum ad alias particulas inclinationem: & cum hæc ipsa mediocria sunt, minus quam pro naturæ debito purgabitur, ut eodē 3. de cau. symp. à Gal. scriptum est. Nos vero cunctas tum externas, tum internas suppressionis mensium causas totius corporis culpa dinumerabimus, ab externis exordientes. Nam assiduæ curæ, immodicus timor, ac mœror ingens, menses supprimunt (Aetio teste) item alimenta, vel infra, vel supramodum ingesta: nam modicum alimentum statim transpirat, multum vero meatus obturat, & excretionem intercepit: nimia quoque exercitij vehementia (quoniam quicquid superfluum est consumit) menses suppressere valet: Internæ vero causæ sunt calidiores, aut frigidiores totius corporis temperaturæ, calidiores siquidem hoc excrementum discutiunt, ac consumunt: frigidiores vero quoniam crassiorem, ac tenaciorem sanguinem gignunt, vasa uteri obstruentem: habitus quoque graciles, aut obesi nimium: graciles inquam, quoniam nihil penitus superflui sanguinis habent: obesi vero seu pingues, propterea quod reliquis magis exangues sunt, minimasque venulas habent, Nam sanguis, qui in ipsis est paucissimus, ferre in pinguedinem transit, & propterea teles minime omnium concipiunt, ut inquit Aetius. Ob diuturnū etiam aliquem morbum foeminæ extenuatæ non purgantur, vel propter præcedentem per nares, aut sedem, aut quampiam aliam partem sanguinis euacuationem, etiam per venæ sectionem immodice factam, potissimum ex cubiti venis, Nam hæc sanguinem ad superiores corporis partes retrahens, menstruas purgationes comprimit (Gal. auctore lib. de cur. rat. per venæ sectionem:) nec minus & reliqua excretionum genera, velut est multus sudor, assiduus vomitus, alui profluvia, & pustularum omnes genus per entem erumpens

pens, morbi que, acuti, & magni menses suppressere possunt, ut liquet ex eodem Aetio. Quædam etiam (ut ipse inquit) ob plenitudinem non purgantur. Has omnes suppressionis mensium causas tum totius corporis communes, tum ipsius uteri proprias, & propriis earundem inditiis, ægrotantium sermonibus, corporum habitibus, ac ex præcedenti victus ratione, haud ægræ discernere queas. Et si accidat quod non omnino menses fuerint detenti, eorum quoque substantia, ac color considerandi sunt. Quod vero mulieribus, quæ non purgantur consueti more, sanguinis, reiectionis, ac syderationis periculum imminet, testatur Aetius cap. qui nquagesimo secundo, libr. decimo sexto. Et quædam in melancholicum atræ bilis morbum, aut insaniam delabuntur. Quapropter proroganda euacuatio eis non est, quippe cum menstruum suppressio offendat, maxime si à partu supprimantur, nam non abundantiam modo, sed insignem etiam humorum pariunt prauitatem, ut 3. de morb. vulg. testatur Galen. Quibus autem ulcerum cicatrices oscula vasorum in utero excæcarunt, & propterea menses fuerint detenti, penitus incurabiles sunt, quem admodum curari quoque non possunt, ubi pellicula quædam circa collum statim à principio, aut osculum uteri fuerit adnata, nisi illa perforetur, aut reseretur, ut liquet ex eodem Aetio cap. 51. Caterum cum suppressorum mensium causæ tot sint, pro earum diuersitate, curationem quoque variari contingit: & cum plures earum facile curari possint, ut si ex externis causis menses detineantur, nonnullæ etiam ac uterum pertineant, cum aliquo proprio affectu laborat, quarum curationem infra docebimus. Propterea si ex plenitudine, seu propter frigidorum humorum redundantiam, vel calidorum, aut nimiam caliditatem, seu frigidam corporis intemperiem suppressi fuerint menses, Curationem duntaxat instituemus, insimul quæ menses prouocare possunt medicamenta conscribentes. Si itaque ob plenitudinem mulieres non purgantur, aliis consentientibus, venâ secare conuenit. Nam copiosa sanguinis missione sanantur propterea (ut inquit Aetius) tum cubiri, tum tali venam secare oportet, neque eisdem proroganda euacuatio est, ut Galen. inquit libr. de curat. rat. per venæ sectionem, Verum nequaquam in cubito venas secandas esse admittit, namque sectæ in cubito venæ reuellere purgationem assolent, sed in malleolis, aut poplitibus secari venam iussit, etenim ex cruribus euacuationes tantum abest ut attrahant, ut etiam menses promoueant, ut ipse inquit: Conciliari autem possunt, Nam Aetius magnam supposuit plenitudinem, quæ cum copiosa euacuatione indigeret, vires, aut reliqua haudquaquam permetterent, quapropter capiti venas primo, deinceps eas, quæ in talo secari iussit, ut ex utrisque simul tanta possit sanguinis copia euacuari, quantam vnica sectione plenitudo requirebat: Galen. vero non adeo magnam plenitudinem inspiciens, & ex aduerso vires robustas in mulieribus plenitudine laborantibus supponens, eandem in poplitibus, seu tali venis venæ sectionem fieri decretum reliquit, Et eum dixit quod sectæ in cubito venæ mulierum reuellere purgationem assolent, ac purgationes menstruas comprimunt ad superiores corporis partes sanguinem retrahentes tanquam verum admittendum, ubi post eas poplitis, seu tali venæ non incidantur, Neque perpetuo cunctis mulieribus venam scindere necesse est, sed quibusdam malleolorum scarificationes satis esse queunt euacuandæ superfluitati, ut mulieribus albidioribus, ac carnosius, quibus paruæ sunt venæ, & quæ sanguinem quoque tenuem aceruare solent, ut dicemus Tempus autem secandi venam non erit multo ante statum mensium tempus, sed ubi iam accesserit, tribus, quatuorve dicans consueti mulieri circuitus auertens, ut idem inquit Gale. Quantitatem autem, nedum plenitudinis quantitas, sed virium robur metietur: & ubi quidpiam non urgeat eandem sectionem venæ iteraret ut ius erit, quam semel uniuersim uacuare, aut in eodem

Loco citato.

Prognostica.

Cōmentario ;
commento ; 7

Lib. 16

Si ob plenitudinem menses suppressantur, curatione.

Lib. 16. cap. 57
Venæ sectio,
Cap. 15,Conciliatur Aetius cum Gal. de venæ sectione.
Lib. citato cap. 18Tempus venæ sectionis.
Lib. de cur. rat. per venæ sect. c. 18.

Loco citato,

Cap. 19

Si ob nimiam
caliditatem mē-
ses supprimatur
curatio,

Ratio uitius,

Lib. 16, cap. 53

Loco citato,

Si biliosus red-
ditur succus, cu-
ratio,

Topica,

Per os sumenda
medicamenta
quæ.Si ob frigidam
corporis autem

crure, vel in altero, vt videbitur. Conducit etiam nedum istis diebus, in quibus sanguinem vacuas, uerum & ante eos quatuor, aut quinque vt extenuantem uictum procures (eodem Galen. teste) & tenuis uictus eisdem exhibetur, ueluti est ptisanæ succus cum aceto præparatus, & olera ad hunc etiam vsû idonea: Sanguine uero vacuato, medicamenta, quæ menses prouocare possunt, adhiberi debent, quorum infra mentio fiet. & cucurbitæ pubi, & inguinibus affigendæ sunt, siquidem menses euocant, vt liquet decimo tertio metho. medend. Si uero ob nimiam caliditatem citra calidorum humorum redundantiam mulieres non purgantur, licet uictus rationem adeo instituere ualeamus, vt menstrua purgatione non haberent opus, tamen quia conceptioni penitus aduersaretur, propterea conceptus gratia purgationes sunt necessariæ. Ea propter eas quam maxime humectare oportet quacunque ratione calidiores fuerint, siue ex naturali temperamento, siue ob exercitiorum excessum. Aer itaque eligendus est ad humidum, ac paulo ad frigidum uirgens, somno longiori utantur, quies eligatur: exercitium autem vitetur, ac caueant immodicos animi affectus, iram, mæstiriam, timorem. Vberiore, humidiorque cibis, ac potu utantur, vt ptisana, ac eius cremore, & amylo ex lacte parato. Ex oleribus, lactuca, cucurbita; E carnibus, caro gallinarum, caponum, & pullo- rum, & aliarum auium, quæ teneriores sunt: Similiter agni, hædi, ac recentis porcelli competit. Ptisana quoque in prædictorum carniuum iure parari poterit, interim autem ex lacte, Pisces item, qui teneras carnes habent, gustari poterunt: Et ex fructibus, ficus recentes, uux maturæ, pepones, ac cucumeres, vt inquit Aetius: Nec erit absolum quandoque recentibus ouis gallinarum forbilibus, aut etiam tremulis uti. Potus autem sit uinum tenue, album, dilutum non uetus, vt idem Aetius testatur, Ac balneis aquarum dulcium utantur, & (vt summatim dicam) tenutritoria uictus ratione, Nam ex multo calore huiusmodi corpora sicca euadunt. At si simul cum corporis calida intemperie biliosus redundarit humor, congruis medicamentis ipsum purgare conuenit, melle aereo uidelicet, casia fistula, rhabarbaro, syrup. ex pluribus infusionibus rosarum, vel violarum, & reliquis huiusmodi, idque præstantius fiet si prius syrup. violaceus, aut rosaceus, ex succo cichorii, vel borraginis, aut aliquis talis similis pluries fuerit exhibitus; quo expurgato, pubi, & inguinibus cucurbitulæ affigantur; nec non frictiones, & uincula infernis partibus, cruribus inquam, ac tibiis fieri præcipias, & reliqua, quæ sanguinem, ac uterum alterare possunt, medicamenta tum intus suscepta, tum foris imposita adhibentur, præsertim aquæ dulcis balneum, in seffus ex maluarum, ac altheæ folis, & violarum, hordeo, & chamæmeli floribus decocto parentur. Item circa pubem, & inguina tale unguentum imponatur. Recipe olei amygdalarum dulcium, & amararum, & olei de cucurbita ana vnc. i. adipis anseris, & butyri recentis ana drac. iiii. ladani drac. ii. fiat unguentum. Insuper pessi fiant ex contusis maluarum, & altheæ radicibus hordeo decocto, saccharo rubeo, adipe anseris, vel gallinæ omnibus contusis, ac simul permixtis, & iericon linteo ueteri inuoltatis, prius tamen quàm immitantur, in oleo amygdalarum dulcium, vel de cucurbita intingantur. Hoc item tempore cremor seminum melonum, vel cucumeris cum aqua hordei cum corticibus paretur, aut aqua capillorum ueneris, vel in qua radix glycyrrhizæ fuerit decocta, & exhibetur. Insup pastilli parentur ex prædictis, ac reliquis seminibus communibus: qui a balneo seu in seffus cum prædicta aqua hordei, vel capillorum ueneris præbeantur, & ubi hæc non suffecerint, ad ea, quæ menses prouocant, medicamenta in fine huius capitis conscripta confugas, ea tamen eligendo, quæ minus calida sunt, & cum prædictorum aliquo permisceas, ac utare. At ubi frigida corporis intemperies menses profluere impediat, oppositam curationem esse oportet, quam

ad

ad calidiores temperaturas retulimus, Nam calidioribus tum cibis, tum medicamentis vtendum est, fortioraque exercitia, ac plurimos labores imperabimus. Vinum item fuluum, odoratum, vetus, ac minime dulce exhibeatur. Inter medicamenta vero ea eligenda sunt, vt inquit Aetius, quæ calore suo sanguinem dissoluunt, veluti est thymum, pulegium, calamintha, dictamnium, abrotanum, & alia huiusmodi, quorum in fine mentio fiet. At si cum frigida corporis intemperie crassorum, ac frigidorum adsit redundantia succorum, qui sanguini admixti mensium purgationem impendant, ipsos prius decenti medicamento purgare conuenit, vbi concocti, ac præparati fuerint, & deinde quæ menses prouocare possunt, adhibenda sunt. Parentur autem tum extenuanti victus ratione, cibisque semper, ac potibus aliquid odoratum admiscens, cum etiam extenuantibus, ac incidentibus medicamentis, vt rosaceo melle, interim etiam & oxymelite, modo vterus affectus non sit, aut quæpiam alia nervosa pars. In quem etiam vsum syr. de tribus radicibus Gentilis, de duabus radicibus Mesues, aut de hyssopo, vel eiusdem hyssopi pulegii, calaminthæ, origani seu abrotani decoctum ex aqua mulsæ præbeto; Concoctis autem, ac præparatis iam dictis frigidis, ac crassis succis, medicamentum purgans exhibeto ex Gal. hiera, & agarico compositum, vt Recipe agarici trochiscati scr. iiii. pulueris hieræ 3. i. formentur catapotia cum melle rosaceo, aut oxymelite, vel ex casia fistula, agarico, & hiera bolum conficias, adiectis interim serup. ii. uel iii. diaphiniconis. Et vbi validioribus indigeas, pillulis fœtidis, de sagapeno, aggregariis, ac de agarico, & reliquis huiusmodi vtare. A purgatione autem sanguinem ex malleolis mittere conuenit, non tamē in multa copia uena incisa, vel adhibitis malleolorum scarificationibus, potissimum si mulieres albidiores, ac carnosiores fuerint, quæ quidem paruas in cruribus venas habent, & sanguinem aceruare tenuem solent, iuxta Gale. decreta lib. de cur. rat. per venæ sectionem. Tempus autem mittendi sanguinem sit (vt superius demonstrauimus.) Verum si redundans humor atrabilis fuerit, syr. de pomis, de succo borraginis, aut fumariæ, aut etiam de epithimo pluries exhibeatur, & demum epithimi, ac senæ decocto, in quo vnc. i. casia fistulæ fuerit dissoluta, & 3. vii. diacath. aut 3. iiii. confectionis hammech. purgetur; Nec etiam inconuenit 3. i. agarici in prædicto decocto adicere, quo expugato, in malleolis vena incidatur congruo tempore, vt docuimus, potissimum vbi graciliores, ac nigriores fuerint mulieres, ac magis si magnas habere venas apparent, Hæ etenim crassiores sanguinem, ac magis melancholicum colligunt, vt liquet eodem lib. de cur. rat. per venæ sectionem. Post hæc medicamenta, quæ decentos menses euocant, conscribenda sunt, quibus prædictæ omnes a purgatione vti debent. Huiusmodi autem sunt quæ exaltant, non tamen valenter desiccant, vt testatur Gale. 5. de simplicium medicamentorum facultatibus. Cuius farinae sunt (vt ipse inquit) pulegium, calamintha, sauina, meium, dictamnium, asarum, costus, casia, cinnamomum, amomum, aristolochia, iris, bunium, & eius generis reliqua. Hæc enim (vt refert) absolutas uteri purgationum retentiones sanant. At eodem lib. de cur. rat. per venæ sectionem, menses abunde prouocare asserit, nepitam, & pulegium, si in melicrato coctæ exhibeantur, vt contusa, arida, cribroque subtili discretæ, ac rursus trita vsque dum polleinem tenuitate referant, & inde in melicrato inspersa: Conuenientissimum autem tempus sumendi est à balneo inuolutis adhuc linteo, Verum hæc medicamenta, eiusdem auctoritate, mitia sunt. His autem valentiora existunt, sauina, & dictamnium, quorum vsus sit antedictis similis: quo etiam tempore medicamentum datur, quod proprie amarum appellatur, Cōfert namque mulieribus, quæ non probe purgantur si 3. j. exhibeatur cum aquæ cali-

periem menses
supprimantur,
curatio.

Lib. 15. c. 54

Vbi frigidi re-
dundant succi.

Præparatio.

Purgatio.

Venæ sectio.

cap. 11.

Si atra bilis re-
dundat, cura-
tio.

Cap. 11

Medicamenta
quæ menses euo-
cant.

Cap. 12.

Cap. 13

2. de com. med.
sec. loc. c. 1
Lib. de cur. rat.
per uenæ sect.
c. 18.
Aet. li. 16, c. 54.

Gal. lib. de cur.
rat. per uenæ se-
ctio, c. 18.

Topica medica
menta.

de cyathis tribus, ut eidem Galen. visum est secundo de compositione medicamentorum secundum locos, & citato libro de curandi ratione per uenæ sectionem. Duo autem tempora commoda sunt ad talia medicamenta accipienda (ut refert Aetius) Alterum appropinquante iam purgationis tempore, Alterum ut post vñctionem fomentaque, ac balneum statim bibant, comedant que cuncta supra a nobis commemorata. Ac insuper thymi, radicum asphodeli, corticum radices mori, mercurialis, carpesiæ, floris iunci odorati, spice nardi, ac celticæ; similiter acori decoctum in uino albo veteri, quod excollatum calidum exhibeatur, ut supra, his præsertim, quæ frigidam temperaturam habent: Probe item facit opopanacis, sagapeni, myrrhæ, aut castorei drac. i. si exhibeatur. Idem quoque possunt cumini, fœniculi, oreoselini, dauci, ammi, & cicerum decocta, ut idem auctor refert, Paulus præter hæc helenii radices decoctum, arthemisiæ, saluig, absynthii, seminis apii, ac seseli approbat, quæ omnia nedum vino (ut inquit Aetius) aut aqua mulsa, ex Galen. auctoritate, verum etiam in qua decoqui possunt, prout magis, vel minus mulieres fuerint natura frigidiores: qua etiam ratione habita magis uel minus calfacientia medicamenta eligi possunt, nedum eorum, quæ hic conscripsimus, sed aliorum, quæ ab aliis commemorantur, quorum copia magna est, adeo ut si quis omnia auxilia in hunc usum commoda recensere uelit, ei multo ocio opus fuerit, ut Aetius inquit. Pastillos tamen, quibus in hunc usum uci consueui, hic conscribam, potissimum cum semper ingentem ex eis utilitatem perspexerim, recipiunt aut seminis fœniculi, dauci, & seseli, singulorum scrup. i. cinnamomi, casia, cuiuslibet scrup. s. seminum melonũ, aut cucumeris vnc. s. sacchari dissoluti in aqua melyssophylli, aut capillorum veneris quantum satis sit, formentur pastilli, quibus temporibus ante dictis vtantur cum aqua mulsa, aut aqua capillorum veneris. Consueui interim semen apii, ammi, oreoselini, interim quoque maiorem vel cinnamomi, & casia, vel seminum communium frigidorum quantitatem adicere, habita ratione diuersi habitus tēperaturæ, ac ætatis ipsarum mulierum similiter & temporis anni ac reliquorum. Mirifice quoque conducunt pastilli e myrrha, si 3. i. exhibeatur cum aqua mulsa, aut aqua capillorum veneris, Item infusus, fomentationes, & balnea adhibeantur, Balnea quidē mineralia si haberi poterunt, Inter quæ sūmopere præstat id quod Puteolis reperitur, Syluiang balneum appellatum: At si naturale balneum haberi nequit, Infusus fiant in aqua, in qua arthemisia, chamæmelum, pulegiũ, calamintha, sauina, maiorana, ac ruta fuerit decocta, aut quædam alia ex his, quæ supra meminimus. Ex quibus quoq; saccelli parari poterunt, qui calfacti in latere irrorato ex paucio uino albo applicentur: & pius iterentur, ac foueantur partes circa uterum: Insuper suffitus ex aromatibus muliebria ducit, Hippoc. auctore aphor. 28. 5. lib. quoniam uasorum ora obserata aperit, extenuat humorum crassitudinem & obstructions incidendo liberat, ut in cōmuni inquit Galenus. Fiat quoq; inunctio in imo uentre, pube, & inguinibus ex hoc vnguento, quod recipit olei liliacei, & irini ana vnc. i. olei amygdalarum amararum, & de capparibus, cuiuslibet vnc. s. succi rutæ, aut sauinæ, & arthemisiæ, vtriusque 3. iiii. ladani 3. vii. cum cera quod satis sit fiat vnguentum: Pessis etiā ubi opus fuerit, vtendum, primo mitioribus. deinde etiā validioribus. Atqui mitiores pessis sunt ex anserino, seu gallinaceo adipe, saccharo rubeo & paucio croco, quibus interim mercurialis herbæ contuse parum adicere poterit, aut tātundem arthemisiæ, vel maioranæ, seu rutæ, aut sauianæ, & pulegi quando que. At si validioribus opus erit, myrrham, bdellium, galbanum, ityracem, aristolochiam, rubiā tinctorum, abrotanum, calamintham, resinam terebenthinam, ac reliqua huiusmodi adicenda sunt, eisdem prius contusis, ac linteo serico, aut lineo tenui ad formam digiti humani inuolutis, oleoque irino, aut liliaceo

liaceo prius infusis, mulieris pudendo immittantur, adeo ut os uteri attingant, ligentur tamen cruribus, ut promptius ubi opus fuerit, auferri valeant.

περὶ ὑπερκαθάρσεως, καὶ ἀμωγῆς αἵματος ὅτι παρ.

id est de immodica purgatione uteri, & sanguinis profusio. Cap. 18.

MODERATI sunt menses prodeuntes in omni muliere si sana sit, ut duarum heminarum atticarum mensura secedant, aut paulo plures, vel pauciores, atque hoc ad duos, aut tres dies, Hippocraus Li. 1. circa prin. re libr. de morb. mulieribus: longius autem tempus, vel brevius morbosum & sterile est. Etenim si pauciores, aut plures dies quam solet, prodeant, aut ipsi etiam pauciores, aut plures fuerint, morbofi sunt, ut ipse inquit, si quidem menses iuxta sanitatem corporis, & uterorum exitum inveniunt, itemque iuxta naturalem, ac iustum modum, & a calore, & humiditate mensium, & stomacho scilicet uteri non ualde laeso, ut idem Hippocr. testatur lib. de sterilibus. Solet autem menstrua purgatio quibusdam mulieribus cum alba, & molles fuerint, propterea quod multus tenuisque sanguis in eis colligatur, diutius permanere, tum de ipsarum etate intelligendo, tum etiam de diebus, quibus huiusmodi mulieres purgantur, quemadmodum contrario modo affectis, nigris inquam duria, ac gracilibus contrarium euenit, ex Galen. sententia sexto de morb. vul. Cum itaque menses plures, ac copiosiores fuerint, quam solent, nimiam eorum purgationem appellamus, graecis *ὑπερκαθάρσις καὶ ἀμωγὴ* dicunt. Idque trifariam fieri contingit, Vel collatione habita ad priores circuitus, ita ut sanguis copiosior quam consueuerit, & per plures dies prodeat, vel à partu, vel etiam ab abortu, ad quos plurimus sanguis insequatur: quanquam in hoc veluti & in reliquis naturalibus excretionibus, non quantitas duntaxat pro scopo proponenda est vel qualitas, aut genus substantiae, ut libr. de differen. sympto. scriptum est, sed si tempestiue, vel intempestiue fiant, ad animalis commodum, vel incommodum. Quapropter tum nimiam vel immodicam dicemus proprie mensium purgationem, Cum ea amplius non tempestiue, neque ad animalis commodum fiat, sed potius intempestiue, & noxa, ac nocumentum ex ea mulieribus consequatur: Nam quandoque plus iusto purgabuntur absque earum lesione propter longam desidiā, & victum liberaliorem. Quod vero in hac affectione uterus oblaesus sit, nemini in dubium venit. Nam mittuntur in venas, quae utero committuntur menses, ut praecedenti cap. dictum est, tanquam ad omnium infirmissimas partes, qui eisdem mulieribus valentibus existentibus antequam concipiant, salubres sunt purgationes. Qua de re si immodice profluant, ipsum uterum affectum esse indicabunt, aut per se solum, vel simul cum toto corpore, aliquibus partibus eius. Affectus vero symptoma est in genere excretorum immodice, non tamen toto genere praeter naturam, veluti & reliqua sanguinis profluvia. Nam praeter eam, quae mulieribus, per uterum erumpit, ceterae sanguinis plusculae vacuationes toto genere praeter naturam sunt. Illae uero sola multitudine, seu quantitate, ut liquet ex Galen. tertio de caus. sympto. Cum autem immodice menses vacuantur, sequitur color fœdus, pedes molli tumore attolluntur, corporis robur prostermitur, vitiatur ciborum tum concoctio, tum cupiditas, atque in totum omnia, quotquot immoderatam sanguinis uacuationem, siue ex hemorrhoidē, siue alio quopiam sanguinis fluore euenientem sequi consueverit accidentia, huiusmodi foeminas infestant, ex eiusdem Galen. testimonio libr. sexto de loc. affect. Ut autem rite diuersae causae huius immodice excretionis

In principio.

Commentar. 1. & commento 6

cap. ultimo:
Quid per immodicam mensium purgationem intelligendum sit.

Parsque afficitur.

Quis praeter naturam affectus sit mensium profusum.

Cap. 4.
Signa.

cap. 5. in fine,
Quae animad

uertēda sint pro
causarum cogni
tione,

Lib. 16. cap. 64
Causæ diuersæ.

loco citato
Prognostica

Cap. 8.

Ca. 14. in prin.

Curatio.

Vitus ratio.

Loco citato.

Medicamento
rum ratio.

Vene sectio.

inuestigentur, primum consideranda est erumpentis sanguinis multitudo, & delationis modus: Ex his nanque perdisces, num ex vasorum rupta, reseratione aut erosione fiat, Nam amplioribus vasis ruptis, aut apertis, magna sanguinis copia cōfertim profluit. A minoribus uero vice versa (vt inquit Aeti.) At si ea, quæ præcesserunt, cōsideres nūquid ex ruptura, vel apertione vasorū sanguis profluat, prompte perdisces. Nam eis disruptis, aut vehemens frigus, aut vehemens motus, vel sanguinis abundantia præcessit, aderitque interim aliquis dolor. Apertionem autem eorum non frigida, sed e contrario calida dispositione præcedunt, veluti si multis, eisdemque calidis balneis mulier usa fuerit, atque terram inhabitet calidam, fueritque antecedens tempus eiusmodi, similiter quoque alimenta, & potiones, nullusque dolor aderit. Ab erosione vero, si sanguinis profluuium prodeat, dignosces, quoniā non cōfertim, sed modicus, ac paulatim, & cū maximo dolore defertur, eodem Aetio teste cap. 64. libr. 16. Quod si erosionis causa redundantes in toto corpore vitiosi succi fuerint, bilioli inquam, aut pituitosi falsi, tum ex reliquis eorundem humorum propriis inditiis, tum etiam ex calore eiusdem, qui profluit, sanguinis menstrui, percipies, iuxta Hippocrat. sententiam libr. de morbis mulieribus Eiusdem autem mēstruæ purgationis immodica vacuatio haudquaquā spernenda est, Nā nonnullæ, cum vteri nimio sanguinis profluuii laborarunt, hydropem accersuerunt, Gal. auctore 2. de natur. facult. Id quod etiam timendum est in omnimoda mēstruæ purgationis cessatione, vt ipse inquit, cum utrumque ad extremā frigiditatem mulierem ducat: Quæ vero mēstrum profluua grandiores partus consequuntur, haud ita periculum minantur, quini mo etiam plerunque sua sponte cessant, vt inquit Paulus cap. 62. lib. 3 Quem admodum si abortiui fœtus causa fiant, repentinum quādoque periculum inducunt, vt liquet ex eiusdem Aetio, & Paulo. Verum ex quocunque tandem causa fit mēstrum profluuium, vbi fuerit immodicum, animi deliquium minatur, & syncopem, vt patet primo de arte curat. ad Glauc. Interim etiā & mortem, quamuis naturalem partum cōsequatur, velut in reliquis accidit immoderatis sanguinis profusionibus. Pro curatione itaque profluuii mēstrum, aer eligatur temperatus, aut parum ad siccum, frigidumq; vergens, somno etiam temperato vtantur, Caueant a motu, atque exercitio, sed quies iniungatur: animi affectus immodicos vitent, præsertim iram. Cibus eligatur quantitate moderatus, qualitate astringens, bonique succi, similique potus. Quapropter circa initia micas panis e posca exhibebis, vbi præsertim ieiunium tolerare nequeant, ut oryzam ex posca, aut ouum sorbile, molle, frigidum, (vt inquit Aetius.) in quem vsum etiam similagine, amylo cum posca vti poteris. Carnibus vbi opus fuerit, vtantur, syluestribus potius, quā domesticis, ac eisdem assis, magis quā melix, vt phasionorum, starnarum, perdicum, merularum, turdorum, aliarumque paruarum auium montanarum, & inter quadrupedes leporum, cuniculorum, seu capreolorum carnes eligatur. Quod si eiusdem etiam elixis vti velint, in earum iure polygoni, plantaginis, aut oxalidis folia decoquantur, aut etiam fructus astringētes, vt cytonia struthia, seu pyra. Vinum omnino pro potu vitandum, ex Pauli testimonio, sed aqua pluuiali vtendum, in qua etiam ignitum ferrum fuerit extinctum, aut aqua, in qua oxalidis, polygon, seu plantaginis folia fuerint decocta, aut myrti fructus, seu cydonia, atque ipsa, item posca pro potu vti conuenit, non siquidem frigida, sed tepida, vt Aetio visum est, Confestim quoque artus, & extremas partes, præsertim superiores, constringere oportet, quanquam & inguina vinculis excipi possent, Paulo, & Aetio testibus, & iuxta Hippocr. sententiam cucurbitulæ magnæ sub mammis apponendæ vt aphor. quinquagesimo, 5. li. scriptum reliquit. in quem etiā vsum, potissimum ubi sanguinis fuerit

fuerit redundantia, ac reliqua non prohibuerint, venæ sectio reuulsionis gratia in cubito facta confert, præsertim internæ venæ, exiguaque sanguinis quantitas auferatur, & si opus fuerit, iteretur. deinceps verò si ob vasorum apertionem sanguis profluat, per ea, quæ obturant, curare oportet, quemadmodum si ex eorundem vasorum ruptura cōtingat, quæ conglutinant adhibenda sunt. Atqui obturatur osculum dilatatum per astringentia, conglutinatur autem ruptum per eadem, & quæcunque ipsis in compositionem miscentur citra mordacitatem resiccantia, & glutinosum quoddam habentia, veluti est terra lemnia sphragis appellata, & samius aster, (Galen. auctore septimo de compositione medicamentorum secundum locos) quæ veluti ad sanguinis spuitiones vnde decunque natas conferant, eademque vi sanguinis ex vtero profluvia, & vocatum fluxum muliebrem iuuat, ut liquet ex eodem auctore 9. de simplicium medicamentorum facul. Dabimus item in potu balauftium ex posca, aut hypocistidis, vel acaciæ succum, siue lycium, vel etiam vix acerbæ succum siccum, ex sententia eiusdem Pauli, & Aetii. Prodest etiam sesamum posca macerare, atque ita molle factum edendum præbere, aut loti ramenta, & eorundem decoctum. similiter & corallorum 3. ii. exhibere (vt idem refert Aetius.) In quem etiam vsum succus polygoni, aut plantaginis ex posca potus non parum confert, vel drac. i. cornu cerui vsti, & tantundem corallorum rubeorum, lapidisque hæmatite scrup. i. cum posca exhibeantur. Nec minus conducit, si 3. i. vel drac. ii. radice symphyti cum eadem posca, quæ semper tepida sit, exhibeatur. & vbi hæc non suffecerint, drac. i. pastillorum è spodio, è succino, vel è terra lemnia cum eadem posca præbeas. Extrinsecus autem vteri loca perfundantur, seu foueantur ex eadem tepida posca, aut oleo rosaceo, melino, seu myrteo paucio vino admixto. Item cataplasmata ex hordei, fabarumque farina, symphyti radice, polygoni, ac plantaginis foliis, acacia, alumine, & hypocistide ex posca composita adhiberi poterunt, aut ex palmulis, malis cydonii, malicorio, balauftiis, alumine, gallis, acacia, & hypocistide, teneris rubi, seu lentisci virgulis cum eadem posca cataplasma fiat: Vel vnguentum quod vulgus medicorum Comitissæ appellat, paucio aceto addito adhibeatur. Efficaciter quoque prodest taurocolla aceto macerata, donec dissoluatur, deinde valido linteo inducta, lumbis agglutinetur, decreto eiusdem Pauli, & Aetii. Insuper inessus fiant ex foliorum myrti, rosarum, plantaginis, polygoni, symphyti, virgultorum rubi, ac lentisci decocto. pessulorum quoque vsum haudquaquam contemnendus erit, qui ex foliis plantaginis, polygoni, aut myrtillorum, symphyti que radice contusis, pauca addita manna thuris, hypocistide, ac balauftio cum eiusdem plantaginis, seu polygoni succo conficiantur. Interim gallarum puluis, ac aluminis scissi, necnon acaciæ succus cum ouorum rostorum luteis adiaci poterunt, & quandoque cupressi folia, aut rubi, pariterque & cytini. Cum vero vsum exigit, linteo serico, aut lineo tenui excipiantur. & ad formam humani digiti redacti in rosaceum intignantur, ac subdantur. Suntque pessuli penitus vsque ad os vteri immittendi. Infunduntur quoque per instrumenta ad hunc vsum parata in vterum, quæ *μυρρενχύται* græci vocant, plantaginis, polygoni, seu solani succus. Similiter acaciæ, vel hypocistidis, Vel decoctum in aqua pluuiali, malicorii, gallarum, balauftiorum, hypocistidis. Vel decoctum in aqua pluuiali, malicorii, gallarum, balauco, aut etiam acacia. Galen. vero ex vtero sanguinis profluum quaternis iam diebus profluens, cum nullo alio potuisset haberi remedio, plantaginis succo vtens, prorsus sanauit: Quanquam id medicamen & ad ea, quæ ex erosione excitantur sanguinis profluvia, sit vtilissimum, vt patet quinto method. meden. Erosio vero magna ex parte in ceruice potius vteri, quam aliàs contingere solet, discerniturque per excretam saniam si fuerit profunda. Si vero circa os

Cap. 4. in prin.

Quæ in potu præbenda sūt, cap. de terra samia in prin.

topica.

Si ex erosione proueniat mensum profluum curatio.

Cap 5

Ca. 4. 5. in fine.
Cap. 5. in fine.
Curandi metho-
das.
Cap. 4

3. metho. c. 3
2. de comp. the.
per gen. cap. 1
Quibus purgati
competat.

cervicis constiterit, solum non per hanc, sed per tactum quoque cognosci po-
test (eodem Gal. teste 6 de loc. affe.) At quod ea per renutritionem erosorum
quæ fit per cibos boni succi, & medicamenta sarcotica dicta, hoc est carnem
gignentia curetur. patet eodẽ 7. de compositione medicamentorum secun-
dum loc. Quapropter nedum iniectus plantaginis succus (vt diximus) huiusce
modi profluvium suppressere valet, si cyathi mensura inciat, vt inquit
Aetius, uerum etiam aliquando fortius, aliquod admiscendum erit, aliàs aliud
pro affectiõis respectu. Nam si vas, vnde profluit sanguis magnum, & amplũ
fuerit, austeris medicamentis opus erit, balauftio inquam, acacia, hypocistide,
gallis, malicorio, & similibus. Si vero paruum, conferent aloe, manna, thuris,
cortex, pinus, terra lemnia, lapis hæmatites & reliqua huiusmodi, quæ nedum
cum succo plantaginis, verum etiam vino austero nigro, aut senecionis succo
subdita, & iniecta conferunt, ex sententia eiusdem Aetii. Et (vt summatim di-
cam) quæ mediocriter, & sine morfu detergũt, atque exiccant, commoda sunt
vt quæ carnem generent, vt liquet tum 3. metho. med. tum 2. de compositio-
ne medicamento. per genera. Vbi uero exulceratio, seu erosio adhuc fiat, uel
augeatur propter redundantes (ut diximus) in toto corpore uitiosos succos,
nulli in dubium uenit eos prius purgandos esse, & deinceps modo dicta medi-
camenta adhibere. Qua de re si biliosi fuerint, adhibitis prius (si derur occa-
sio) syrup. quibusdam, vt ex infusione rosarum uel succo myrtino, uel è succo
oxalidis, seu acetoso simplici, vel oxy saccharo cum aquis plantaginis, polygo-
ni, uel oxalidis, hoc purgans medicamentum exhibeatur, quod recipit, tama-
rindorum vnc. s. corticum myrobalanorum citrinarum drac. iiii. in aqua oxali-
dis, & plantaginis fiat decoctum in quo dissolue syrup. de nouem infusionibus
rosarum rubearum unc. iiii. rhabarb. sine spica 3. i. uel scrup. iiii. misceantur, &
fiat apotio. At si falsa pituita erosionis causa fuerit, syrup. è corticibus citri, vel
mel rosaceum cum syrup. myrtino, vel ex absynthio aliquibus vicibus præbe-
to, deinceps uero medicamentum purgans tale exhibebis. Recipe corticum
myrobalanorũ chebularum 3. iiii. agarici trochiscati 3. i. uel scrup. iiii. fiat de-
coctum in aqua plantaginis, in quo vnc. iiii. syrup. ex tribus infusionibus rosa-
rum persicarum, vel vnc. iiii. syru. ex pluribus infusionibus rosarum rubearum
dissoluas, & potui exhibeatur.

πρὸς πυρρὰς ῥέξ.

id est de muliebri profluvio. Cap. 109.

3. de caus. sym.
cap. 4
1. de dif. sym.
cap. vii.
6. de loc. aff. c. 5
in fine.
Muliebri pro-
fluvium quid sit.
3. de caus. sym.
cap. 4
6. de loc. affect.
Cap. 5
Quæ pars affi-
ciatur.
Locus citato.
Quis affectus
præter naturã
sit.

QUE M A D M O D V M totius corporis culpa aliquãdo profus nõ pur-
gabitur foemina, aliquando parcius, aut liberalius, ita quoque inter-
dum malum quidpiam per vterum vacuabit, vt liquet ex Gale. 3. de
caus. sympto. Vocatur autem hæc affectio à græcis ῥέξις πυρρὰς vt patet ex
Gal. citato loco, & libr. de differ. sympto. ca. 6. de loc. affect. quem sectati sunt
Paulus cap. 63. lib. 3. & Aetius cap. 65. lib. 16. A latinis uero muliebris fluxio,
seu profluvium muliebri appellatur. Est uero totius corporis recrementi de-
stillatio, vt inquit Paulus, Vel vteri destillatio diuturna, vt Aetio visum est,
Vel vniuersi corporis per vterum expurgatio, ipso haudquaquam affecto, vt
ex Gal. colligitur citatis lib. 3. de sympto. caus. & 6. de loc. affect. In hac autem
affectiõne (licet eius multiplex habeatur ortus, vt paulo post dicemus) vterus
ipse haudquaquam affectus est, licet per ipsum vniuersum corpus expurgetur
quemadmodum interdum per renes quoque euacuatur, ex eiusdem Gale. au-
thoritate præcitato lib. 6. de loc. affect. nec alicuius determinatæ corporis par-
tis affectio hæc dici poterit, quanquam & ipsa symptoma sit in genere excre-
torum

eorum immodice, præsertim in qualitate, Nam vitiosum est, quod expurgatur, ut eodem lib. de diff. & 3. de caus. symp. scriptum est. Deprehenditur verò muliebris fluor hisce notis, a menstrui sanguinis eruptione differēs, eo quod in illa syncerus sanguis prodit, hic uero fluxus corruptus apparet, diuersorū tamen colorum, pro diuersitate redundantis succi, ut dicemus, qui etiā citra dolorem prodit. Quapropter loci (ut inquit Paulus) continue madent humoribus colore variantibus, laborans decolor est, cibum non sentit, eumque fastidit, in ambulatione difficulter spirat, oculos habet prætumidos, nunc cum dolore, nūc citra illum, aut cum exulceratione, aut sine illa, aut inflammata, aut sordida, aut pura, Inferre quoque solet hic fluor inenarrabilem tristitiam, & pedum tumorē, & in aliquibus perpetua destillatio perseverat; In aliquibus vero per intervalla quædā redit, ex Aetii testimonio. Atqui si purus sanguis qualis ex disiecta vena profluit, & cum dolore promanabit, uteri erosionem indicabit, de qua præcedenti cap. sermonem fecimus, Nec tale profluvium muliebri appellari debet, Nam in eo uterus haudquaquam affectus est, In hoc proprio morbo laborat, qui erosio, seu exulceratio existit, Hic vero corruptus fluxus, qui in muliebri profluvio fit, aliquādo ruber est, veluti tenuis sanguinis sanies, aliquādo albus, velut pituitosus succus, a pituitoso videlicet sanguine ortum habens: interdum pallidus, ubi bilis amara redundat: interdū aquosus a seroso humorum superfluitate, Nam perpetuo id, quod euacuatur, tale specie est, quale est quod in animali redundat, ut liquet eodem 3. de caus. symp. potissimum autē id fit, si mulier laxa sit carnibus, & pituitosa, ex eiusdē Gal. sententia citato lib. 6. de loc. affect. Qui itaque exquisite colorem præfert aliquem, is redundantem humorem facile indicat, Si vero obscurum colorem habeat, causam eius ita perscrutabimur, linteum eo inquinatum arefactū simplici aqua eluemus. & inde a maculæ colore redundantis humoris notionē capiemus, ut inquit Acrius. Generatur autem talis fluxus muliebris, vel ex completēdi functione imbecilla, vel expultrice immodice concitata, vel ambabus simul læsis, aut quod totus sanguis tenuis, serosusque est redditus, ut lib. de diff. sympto. a Gal. scriptum est. At qui sanguis talis fieri potest, vel ex sanguificæ facultatis operis frustratione, vel eius, quæ tenue, & serosum separat, seu idem excerni. Incidere etiam aliquando potest ex retentrice ipsa immodice opus suū urgente, & cute inspissata, & renibus occlusis, ex eiusdem Gale. auctoritate citato lib. de differ. sympt. Præter has itaque causas vniuersus sanguis tenuis, serosusque reddi potest, ac per uteri vasa expurgari, retentrice eorundem vasorum facultate interim imbecilla, interdum vero expultrice (ut diximus) immodice concitata, aut etiam ambabus simul læsis ob copiam, & sanguinis qualitatem: si autem nū sanguificæ virtutis vitio, vel eius, quæ tenue, serosum separat, seu excernit, symptoma hoc fiat, discernere velis, ea consulas, quæ capite de hepatica affectione, aut de renum affectibus conscripsimus, inspissatā autem cutem probe ex te ipso percipies, neque magno labore retentricis, aut expultricis facultatis læsionem, seu utrarumque reperies. Cæterum ætate vigentes mulieres rubra tere fluxio infestat: declinante vero ætate, alba: & utraque fluxio, si suæ ætati acciderit, facile curatur, si alienæ, difficulter ex Aetii testimonio. In omni vero muliebri defluxu uteri os aperitur, & velut relaxatur, quibusdam etiam uterus ipse procedit, ut usque ad muliebri pendendum progrediatur. Qua de re magna cum diligentia curanda est affectio hæc, neque localibus auxiliis fluxus confestim reprimendus erit, Nam aliquæ in hydropem, aliquæ in nervorum affectiones, aut oris ventris, aut capitis vexatione collapsæ sunt, ut liquet ex eodem Aetio. Vniuerso itaq; corpori pro eius curatione, quæ citra immodicum calorem exiccant, auxiliantur, cum affectus sit humidus, atque aquosus, (Gal. auctore lib. de præfagatione ad Posthumum

Lib. de differē
sym. c. ult.
Signa profluvii
muliebris.
3. de caus. sym.
cap. 4.

Citato loco.
Loco citato.

Causæ.
capite ultimo.

Loco citato.

Prognostica.

Lib. 16. cap. 66.
Methodus cu
randi.
cap. 9.

Vitus ratio

Medicamentorum ratio.

Aet. lib. 16. c. 66
Vene sectio.
Topica medicamenta.

Lib. 19. ca. 66

Potiones.
Loco citato.cap. 8
Quibus medicamentis fuerit usus Gale.

Purgatio, ubi serofus redundat succus.

Si pituita redundet, purgatio.

Bile redundante.

cap. 13

humum) quem etiam sectatus est Paulus præcitato loco. Et propterea vniuersa victus ratio ad duo inclinare debet, vt idem Galen. asserit, potius videlicet paucitatem, & totius corporis frictionem ex melle solo multum cocto, (tantum tamen refrigerato, vt hac in re fontanæ aquæ similis æstiuo tempore sit) post frictionem corpore peruncto: simili itaque victus ratione astrictoria, ac ad siccum vergente aliquatenus crassèfaciente quandoque, quam præcedenti cap. etiam instituiamus, vt edum est, (vt summam dicam) si quod interim magis, aut minus exiccantibus, ac astringentibus cibis vbi oportet pro diuerso humore redudante, quemadmodum etiam & eadem victus ratio ad frigidum, vel calidum magis, vel minus vergere debet. Quo vero ad medicamentorum rationem attinet, similis quoque ratio habenda erit, Verum si mulier rubro fluore muliebri vexabitur, primum ei sanguinem per venæ sectionem vacuabimus, vbi nihil obstiterit, Partitur autem sanguinis detractio, veluti in his, qui sanguinem reiciunt, quo paulatim reuulsio fiat, vt inquit Aetius: Secunda autem est cubiti vena, Nam hæc non solum materiam ad vterum confluentem diuertit, sed muliebris fluoris detentionem, ac constrictionem tutam efficit, A venæ sectione lumbis, ac inguinibus detracta, & mollia lintea imponenda sunt, frigidis succis imbuta, quorum præcedenti cap. meminimus. Locetur autem mulier coxis accliuibus, cruraque extendat, ac inter se complicit ad vteri partes contrahendas, At si copiosè sanguis feratur coxæ, pectus, & lumbo spongiis posca madefactis integantur. Si vero modice destiller, lana succida vino, & rosaceo imbuta adhibeatur, & extremæ partes deligentur. atque hæc non solum in principio fiant, sed etiam post circuitus, ante exacerbationem, & in ipsa exacerbatione, ex eiusdè Aetii decreto, & reliquis etiam vtatur medicamentis extra adhibitis, quæ præcedenti cap. adnotauimus. Commodè quoque sunt quæcunque potiones sanguinem reiectantibus competunt, ex eiusdem Aetii sententia. Cæterum vbi vitiosi redundarint succi, biliosi inquam, pituitosi, aut serosi, quam primum quoque iidem expurgandi, ac ab vtero deriuandi, & diuertendi sunt & propterea Gal. eodem lib. de præcognitione ad Posthumum in Boethi vxore, quæ hac affectione laborabat, primum medicamento per aluum educente usus est. secundo eis, quæ per vrinam ipsum educere valent. & tertio his, quæ per cutem euocare possunt: quibus remediis quindecim diebus cum fuisset usus, prorsus prædictam mulierem à morbo vindicauit, & proinde Boethus quadringentos aureos ad eum misit: Seroso itaque humore existente, qui redundat, ex hiera, & agarico formatis catapotis, & potione ex decocto myrobalanorum chebularum cum syrup. ex pluribus infusionibus rosarum rubearum, vel persicarum ægram purgabis. Quod si neque vna purgatio satis sit, iteranda quoque eadem erit, in minori tamen quantitate, quemadmodum & Gal. in modo dicta ægra rursus medicamentum purgans exhibuit, At si pituitosus fuerit sanguinis, nedum hiera, agarico, & myrobalanis purgare conuenit, verum etiam & reliquis insignioribus medicamentis pituitam per aluum ducentibus, vt catapotis fatidis, ex sagapeno, aut agarico compositis, item & nostris, quæ ca. de aqua intercutem conscripsimus, prius tamè ea exhibeantur medicamenta, quæ iam dictam pituitam concoquere, ac præparare valeant. Bile autem flaua redundante, eadem hiera, cum rhabarbaro myrobalanorum citrinarum decocto, ac syr. ex pluribus infusionibus rosarum purgabis. A purgatione vero ea medicamenta exhibeantur, proprie *σπυγμικά* id est vrinam cientia dicuntur, quorum sylua à Gale. scripta est libr. 5. de simpl. medic. facult. calida inquam, ac sicca exilentia, A quibus sanguis non extenuatur duntaxat, sed & funditur, ac secernitur, non secus atque lac, quod coagulatur, seroso videlicet, & tenui seorsum segregato, crasso vero in se se coeunte, siquidem quod facillime ad se attrahât renes quod in sanguine aqueum, tenueque

tenueque, ac serosum est, Vtraque hæc conferunt, nempe totius sanguinis primum fusio, deinde segregatio, quorum neutrum absque valido calore peragi queat. Hæc itaque peculiariter ab eodem Galeno ibidem vretica, siue vrinam mouentia appellantur, non quia solum moueant urinas, sed quia solas absque vt etiam menses, aut lac: inter quæ apium, atque asarum eligens, prædicte mulieri eorundem decoctum in aqua exhibuit: hæc nanque per vrinam humorē, qui per vterum expurgabatur deriuando etiam euacuant, vt ipse testatur cum hoc quod neque menses ciunt vt quibusdam arabicis falso visum est, & renes occlusos liberant, si id quoque talis muliebris profluvii causa fuerit; nec minus & per totius corporis frictiones humor quoque euocandus est: & si ex cute spissata adhuc talis affectio fuerit orta, iisdē frictionibus rarefiet, quæ primo molibus linteis, & demum asperis faciendæ sunt, iuxta eiusdem Gale. doctrinam præcitato lib. de præcognitione ad Posthumum; his quippe medicamentis uniuerso corpori adhibitis, intracto quidē vtero huiusmodi muliebres fluores Gal. sanauit, vt eodem 6. de loc. affect. scriptum est. Subsequebatur autem totius corporis fricationem iunctio ex melle solum, multum quidem cocto, vt diximus. Verum vbi hæc non suffecerint, perseueraueritque muliebre profluvium, ea exhibenda sunt, quæ præcedenti cap. de mēsiū profluvio dicta sunt. potissimum autem ea eligantur, quæ non admodum efficacia existunt, itē portulaca commanducata, succusque ipsius potus præsidio est, balaustium, rubi fructus, & flos, vt inquit Paulus: nec minus & equisetum sistit rubrum fluorē potum ex aqua, aut vino: vel hypocistidis, aut lentisci fructus torrefactus cum vino sumptus, vt idem Paulus refert. Similiter famius aster, terra lēnia sphragis appellata, item coagulum leporis, aut hædi, aut ouis, aut vituli, aut cerui confert; vna etiam immatura sicca picæ cortex, & myrti (vt liquet ex eodē.) faciunt quoque, & prœniæ grana pallida quindecim assidue pota, aut corallo- rum 3. i. è vino nigro aut vinacia trita cum vino, aut corticis loti arboris decoctum, vt inquit Aetius, præsertim vbi fluor albus, aut serosus fuerit. proditum quoque est, vt inquit Gal. 10. de simpl. medic. facul. leporis coagulum si cū aceto ebibatur, sanare profluvium muliebre. Quod si cum dolore fluxus deferatur, asininum lac, præsertim asinæ per pascua pratorum nutritæ quiuis fuerit succus præstat. Confert etiam & stercoris eiusdem asinæ succus, similiter & alicæ, aut ptisanæ succus, & rosaceum quoque, vel per se, vel cum lacte infusum. Ne vero ab humore transeunte vlcus excitetur, sanies profluens assidue calida aqua eluatur, & ipsis locis moderate astringentia adhibeantur, quæ simul abstergendi vires habeant, deinceps rosaceum, aut myrteum, aut melinum oleum illinatur, & aqua etiam pura nihil astringens habēs admixtum in principio præsertim adhibeatur ob influentis humoris acrimoniam, nec nō & ob eadem causam & alicæ, & orizæ succus infundantur, ex eiusdem Aetii decreto. Ceterum vbi fluxus cessauerit, à veloci ambulatione, à multis pectinis, ac lumborum frictionibus, ab acrimonia esu, à calfacientibus, à flatuosis, & ab his, quæ vrinam prolestant, diu abstinendum est, & balneis ratio vtendum, neque venter mouendus est, neque spiritus retinendus, Hæc enim omnia malum reuocant, vt idem inquit Aetius. quæ forte præcepta Boethi uxori Gal. instituit, postquam ab eodē affectu ipsam uindicauit, ne in posterum amplius eo morbo ægrotaret, ab eodem Boetho rogatus, prohibens ne illi simile quod vacua uerat, in futurum aliud gigneretur.

Cap. 3.

Cap. 5. circa me-
dium.Quæ medicamē-
ta a purgatione
competunt.Aet. li. 16. c. 67
Gal. 10. de sim-
plic. c. de coagu-
lo.

Lib. 16. c. 67

Loco citato

περὶ ὕστερινῆς πνιγῆς.

id est de uteri strangulatione, seu suffocatione. Cap. IIO.

QUANTUM ea pars, quæ mulieribus ad pariendū a natura data est, a græcis *μήτρα*, seu ὕστερος, a latinis matrix, seu uterus appellata (ut superius annotauimus) in internis corporis partibus posita sit (quoniam supernis, eisq; principibus cōmunicat, cordi siquidē per arterias, cerebro per spinę membranas, ac nervos, & iocinori per venas,) propterea non mirum, si interim in eo affectus quidam oritur, cui omnes, vel quædam prædictarum partium consentiunt, qui affectus a græcis interim ὕστερος καὶ ὕστερινή πνιγῆς, a quibusdam ἀπὸ τῆς ὕστερινῆς dicitur, latini autem uteri strangulatum, seu vterinā suffocationem, vel spirationis ob vterum priuationem vocant, volentibus tamen ipsis vtraque appellatione vnum quendam affectū explicare, nomen assumens tum a parte ipsa affecta, tū a superueniente symptomate. Est autem affectus hic (Paulo auctore cap. 71. libr. tertii.) vteri recursus ad superiora: in hac affectione modo sursum, modo in latus vterus retrahi uidetur, Galen. teste sexto de loc. affect. quamuis Aer. quoque fatetur, qđ in hac affectione uterus uelut ad supernas partes ascendisse uidetur, Semper etenim, siue sursum retractus fuerit totus uterus æqualiter, siue ad latus inæqualiter trahatur, velut supernas partes ascendisse uidetur, cum eiusdem suffocatio oritur: quo motu non creandæ prolis gratia mouetur, si priuatur his, quæ concupiscit veluti animal, ut quibusdam uisum est, & propterea vniuerso corpori nocere fatendum est: nec ob id quod posteaquā ita per corpus vterus errauerit ad septum transversum perueniens respirationem impedit, veluti quidam prædictæ opinioni addiderunt, idcirco strangulatio fit; sicut etiam falsa quoque eorum opinio est, qui afferunt vterum exiccare ubi suppressi sint menses, deinde humectari cupientem, ad viscera vsque ascendere. Cum vero ascendendo nonnunquam septem transversum cōtingat, idcirco animal spiratione priuari, etenim tāquam erroneæ prædictæ opiniones à Galen. eodem sexto de loc. affect. impugnantur, & refelluntur, alia propterea causa huius retractionis, seu recursus inuestiganda erit, si prius partem ipsam affectam, ac affectum ipsum demonstrabimus. Quod uero uterus primo, ac præcipue in hoc vitio afficiatur, omnim medicorum consensu liquet, & Galen. citato loco per hæc uerba confirmauit, cum dixit, quod autem a priscis iam inde sæculis optimo iure creditum fuerit hysterica dicta symptomata ad vterum tanquā ad radicem pertinere, vel maximo argumento esse potest, quod & solis viduis, & ijs, quibus menses supprimuntur, huiusmodi affectus euenire consueuerunt, quanquam si quispiam dixerit quod ubi in hac affectione uterus retrahitur, vteri corpus nō est affectum, sed peruersione laborat, cum alias aliorum trahatur, hic haud absurda dicere videbitur, ut idem Galenus inquit: At quisnam affectus sit vteri suffocatio seu strangulatio, non admodum liquet, Nam interim cum eius retractione, seu peruersione fit, interim autem citra peruersionem, sed quando cum vteri peruersione affectio iam dicta generatur, nulli in dubiū venit morbum esse in situ, seu figura ipsius vteri, prout ab Hippo. & Galen. 3. de artic. scriptum est, quanquam non propterea qđ peruersus, seu retractus est uterus, symptomata, quæ in animalis corpore apparent, oriantur, sed propter aliam causam (ut dicemus.) In hac etiā vteri strangulatione, quæ cum eius peruersione fit, idem uterus intemperie, eademque frigida immodice laborat, qua duntaxat eum laborare asserimus eum citra eiusdem peruersionem affectus hic excitatur, licet oriri haud quāquā possit quomodolibet generationem habeat, nisi intemperies hæc principibus

Quid sit strangulatio uteri, & de loc. affect. cap. 5. post med. Act. li. 16, c. 68.

Cap. 5.

Quæ pars afficitur in uteri strangulatione.

Quis affectus præter naturam sit.

Tex. & comm. 100.

bus partibus imperiatur, cordi inquam, aut cerebro, seu vtriusque primum & deinceps ab eis vniuerso corpori præsertim in prima, ac præcipua eius specie, seu differentia. Perpetuo itaque intemperie, eaque nimium frigida in hac affectione vterus laborauit, Qua de re morbum hunc non inflammationem, sed flatuosam perfrigerationem esse Soranus dicebat interim autem simul cum ea male situatus seu figuratus erit pro diuersitate, seu magnitudine causarum, ex quibus originem duxerit, vt dicemus. Comitatur autem taliter affectos cum accessio propinqua est, torpor mentis, pigritia, crurum imbecillitas, pallida facies, ac tristis quidam aspectu: instante vero strangulatione, sopor grauis, ac profundus, mentis ac sensum apprehensio cum vocis interceptione, pulsus autem parui, ac debiles fiunt, & aliquando penitus intercipiuntur, quibusdam autem neque respiratio sensibilis permanet, aliquam vero, aliàs actionibus integris manentibus, magnam respirationem ex hac affectione habent, stomachi etiam dolore vexantur, & saliuam vomunt, si in stomacho, aut capite humiditas fixa est, Interdum etiam sic examinatur, vt tanquam comitiali morbo prosternatur: distat tamen hic casus, eo quod neque oculi vertuntur, nec spumæ profluunt, nec nervi distenduntur, sopor tantum est idque quibusdam feminis cerebro reuertens, perpetuum est (Celsus auctore cap. 20. libr. quarto) Inclinate vero accessione, corpus firmari incipit, & malæ rubescunt, ac oculi post multam grauitatem attolluntur, & vbi iam malum ægram relicturum est, humiditas quædam ex locis mulieribus excurrens tactu percipitur, & intestina murmurant, ac ipse vterus paulatim laxatur, atque sic exurgens egra intellectum & sensum recipit, vt liquet ex Aetio, & Paulo Obstretices quoque seu medicæ, quæ ipsas exquisitè tetigerunt, fatentur circa vterum notas quasdam apparere, Nam ceruix eius inclinata videtur, interdum quidem veluti sursum retractus sit totus vterus interdum vero veluti ad latus trahatur, Nam simul cum vtero, ceruicem quoque ipsius retrahi necesse est (Gal. auctore eodem sexto de locis affect.) Cæterum cum vteri strangulationis differentiarum plures esse possunt, pro efficientis causæ magnitudine, vel pro specierum quarundam varietate inter se differentes quia in earum aliqua omnino spiratio perditur, non ab re quæret quispiam quomodo viuere tales possent, quæ nihil omnino spirant? Cum in confesso sit spirationem à vita, & vitam à spiratione separari non posse, adeo vt viuentem non spirare, & spirantem non viuere sit impossibile, quinimo vbi cor respiratione priuetur, illico hominem perire necesse est, vt liquet quinto, & sexto de loc. affect. & libr. de vtilitate respirationis qua de re quidam Heraclide posteriores credentes seruari aliquid spirationis, quamuis ipsa non appareat, carptæ lanæ floculos coram naribus suspendi iubent, vt exacte deprehendatur num spiritus aliquis inter spirandum tum intro tum foras rursus deferatur: aliqui poculum aqua plenum ori ventriculi imponere præcipiunt, & considerant an aliquo motu aqua agitetur, quippe immotum omnino seruari humorem aiunt, si tota perierit spiratio; & profecto vtrique ignorant aliquando sublata penitus oris, ac narium respiratione animal viuere posse, modo ea supersit, quæ in toto corpore ab arteriis, & corde perficitur: id quod in latentibus animalibus manifestè apparet, nulla apparente in ipsis spirationis nota: hæc etenim per totam hyemem mortuis simillima in cauernis latitant per arterias tantum totius corporis transpirantia: pari item ratione in vteri strangulatione fieri potest, vt toto corpore frigefacto (vt diximus) id enim manifestè videtur, nulla prorsus prodeat ob ore spiratio, supersit autem ea, quæ à corde, & arteriis fit, ex etenim maximus, & præcipuus respirationis usus (vt sexcentis in locis à Galen. decretum est) vt intimus calor & refrigeratione, & ventilatione seruetur. Qua de re exiguus ille calor in hysteriis mulieribus derelictis arteriarum, cordisque officio conseruari poterit quæ

Vide Aet. loco citato.

Signa suffocationis uteri,

Cap. 5
Quomodo uiuere possint, quæ uteri suffocatione laborant, et si nihil omnino spirent.
5. de loc. affect. Cap. 1.
6. de loc. af. c. 5
Lib. de vtilitate respir. c. 2

**Cur hysterica-
rum corpus re-
frigeretur.**

Loco citato.

Causæ.

quæ actio, à quibusdam medicis transpiratio dicitur, quamuis, (vt diximus) quæ sit ab ore, & naribus respiratio omnino fuerit abolita, licet etiam adeo parua esse possit, vt sensum lateat nedum respiratio, sed etiam transpiratio ipsa: illudque clare constat non solum in Galen. sed etiam Aristotel. doctrina. qui libro primo de natura animalium cap. vndecimo, talia protulit verba, Sed datur viuendi facultas etiam si desit spiratio, quanquam itaque perfecta animalia, quæ temperate calida sunt, præsertim dum sanitate fruuntur, citra spirationē haudquaquam viuere possint, vt liquet ex modo citatis Galeni locis, attamen quæ frigida suapte natura sunt, vt latentia, aut ex accidenti vniuersum eorum corpus tale redditum est, vt in hysterics conspicimus citra respirationem non inconuenit vt in vita seruentur; modo arteriarum, cordis que officium eis conseruetur; nec propterea his, quæ cap. de apoplexia scripta sunt, contradicimus. Adhuc vt nihil ad affectum hunc pertinens maneat indiscussum, iterum queret quispiam quam ob causam corpus hysteriarum mulierum refrigeretur? Ea vero haud difficulter dissolui potest, si causas, quæ præcesserunt, diligenter intueamur, Nam conuenit inter omnes medicos, vt idem Galen. asserit citato lib. sexto de loc. affect. hunc affectum magna ex parte viduis euenire, hisque maxime, quæ cum antea probe purgarentur, ac parerent, neque virorum concubitu gauderent, iis omnibus priuantur, ex quibus conicere possumus quod ob retenta menstrua, vel ob semen cohibitum mulieres vteri suffocatione, seu strangulatione cruciantur. idque fortasse magis (vt idem Galen. inquit) a semine retento contingere potest, vtpote magnum vim obtinente: vt est enim in mulieribus humidius, ita etiam & frigidius. Semen etenim in vtero paulatim coaceruatum, aut etiam sanguis menstruus, vitiosi redduntur, ac perfrigerantur, quibus perfrigeratis vterus quoque taliter afficitur, a quo demum ad cerebrum, ac cor frigiditas transmittitur paulatim tractu temporis. à quibus deinceps vniuersum corpus celeriter alteratur, ac refrigeratur, & relata inferunt symptomata, vel tenui quadam substantia, veluti aura ab eisdem excrementis ad iam dictas partes principes ascendente, vel continuitate partium traducta alteratione per quandam veluti qualitatē diffusionem mediis corporibus, cum quibus vterus ipse prædictis principibus partibus communicat: neque mirum videri debet, si uel ex minima humorum mole tanta consequantur symptomata, etenim à phalangi quoque ictu totum corpus affici videtur exiguo veneno per minimum foramen iniecto, & longe maiori admiratione est scorpionis ictus, quod breui admodum tempore grauissima inferit symptomata, quanquam exiguum sit id, quod iniicitur, aut nihil omnia o, nullo apparente foramine in ipsius aculeo: nec non quod canis rabie capti, solum sputum si humanum corpus tetigerit rabiem excitare possit, ex eiusdem sputi qualitate aucta quadam corporis dispositione, ita vt post sex menses quando ad magnitudinem notatu dignam peruenit, discerni possit: item similibus quoque affectibus infestare possumus iis, qui pernicioso epoto veneno eueniunt corruptis in nobis ipsis adeo humoribus, vt veneni tum qualitates, tum vires æquent: Vitiatum itaque semen, aut menstruum cum retinetur, corporibus potissimum vt afficiantur idoneis, paulatim tractu temporis principalium partium aliqua consentiente, à qua deinceps vniuersum corpus celeriter alteratur, cum totum corpus refrigerare valeant, prædicta grauia symptomata inferre possunt, & aliàs aliæ quoque accidentium species oriri solent pro multitudinis, qualitatē ratione tum menstruorum, tum seminis. Nā ubi crassa, vel acris fuerit eorū natura, conuulsiones: Si vero atræ bilis naturam habuerint, nescitiam inducere possunt, quemadmodum animi quoque defectiones, & ad fertes extēsiones, & refrigerationes, & stomachi actum sequi consueverunt. Et propterea contingit etiam quibus-

quibusdam sensus, ac motus priuatio & pulsus obscurus, ac paruus, & penitus interceptus. In aliquibus vero tum sensus, tum motus adest, itemque ratio, verum vix respirant: aliquibus etiam vox intercipitur: aliis contrahuntur artus, ut liquet non de compositione medicamentorum secundum locos. At si ex mensum suppressione vteri strangulatio excitetur perueniente quidem ad vterum ipso sanguine menstruo, sed ad interna ipsius ingredi non potente, aut quia crassior est quam ut per ora vasorum possit penetrare, aut quia clausa sunt ora, propter quod multiplicatus in venis eas extendit, atque vicina ipsis vincula ma-
defacit, citra eius peruersionem non erit, quoniam plenitudo repletorum corpora, & in latum, & in profundum extendit, sed longitudinem abbreviat, continuo propterea vterum retrahi necesse est: ob quam causam vel sursum, vel ad latus retrahatur oportet: Quod fit ut si æqualiter vndique trahatur, recta erit, & sine inclinatione ipsius transmutatio. si vero in æqualiter ad partem vehementius trahentem, Vasorum itaque ad ipsum vterum peruenientium & plenitudo, & suspensio causa est, ob quam vterus in eius strangulatione vel sursum, vel ad latus trahatur: id quod semper euenit quando eadem affectio ex menstruorum retentione originem habet, & præter id quod purgationes eisdem supprimuntur, spiratione tamen non priuantur, neque animi defectu, aut aliis modo dictis symptomatibus valde laborare videntur: Nam vitio semini maior quidem quam menstruis vis adest ad noxam vniuerso corpori inferendam ex eiusdem Galen. sententia, & proinde magis spirationis, ac pulsus abolitiones eo redundante apparebunt, conuulsiones, animi defectiones, ac alia paulo antedicta, symptomata, & sæpius viduis, atque aliis monialibus ex tali causa proueniet vteri strangulatio, etiam si optime purgentur præsertim si naturaliter multo semine abundauerint, aut affatim à concubitu, quo antea creberrime fuerant usæ, abstinerint: sæpenumero citra vteri peruulsionem tales sunt strangulationes, cum videlicet tenue, ac non multum fuerit semen retentum; quandoque etiam cum eiusdem peruersione seu retractione cum videlicet semen ipsum plurimum fuerit, ac crassum, eodem modo quo sanguis menstrualis tum vasa, tum vincula implens, extendens, ac madefaciens, quemadmodum accidit in muliere vidua longo iam tempore, quæ præter cætera mala, neruorum quoque distensione vexabatur, cui cum manibus tractarentur partes muliebres, adhibitisque calidis medicamentis abortu titillatione cum labore ac voluptate, veluti per coitum usu venire solet, crassum, plurimumque semen excreuit, atque ita molestia sua liberata est, ut idem Galen. testatur citato libr. sexto de loc. affect. Huic etenim vterus retractus erat sic obstetrice dicente: quandoque etiam (ut inquit Aetius) oritur affectio hæc vel vtero perfrigerato dum menses prodeunt, vel propter abortum, vel sanguinis eruptio-
ne ab vtero ob aliquo repente suppressa: id quod prompte et astantium loquela percipies: At quod mulieri, quæ vterinis molestat, aut difficulter parit superueniens sternutatio bonum sit liquet ab Hippocrat. aphorismo 35. 5. lib. quo loco per vterina, suffocationes vteri intellexit Galen. & bonum tum signum, tum causam esse sternutationem fatetur. Quod vero grauior, ac molestior sit vteri suffocatio ex detento semine orta, quam ex suppressis mensibus maiorem noxam, ac maiora symptomata inferentes, ex eodem Gal. liquet eodem sexto de loc. affect. Quemadmodum etiam quod satis periculosior sit ea, in qua tum spiratio, tum pulsus abolentur, (quam primam eius speciem, siue differentiam nominauimus) etenim nonnullæ ex talibus pereunt, licet quædam etiam seruata videntur. Accidit hæc affectio omni quidem tempore, sed hyeme præcipue, ac autumno, iunioribus præsertim salacibus, ac sterilibus, maxime si per medicamenta steriles fuerint. Cæterum affectus hic ubi inua-
dere

Si ex mensum
suppressione
at vteri suffoca-
tio, signa,
Cap. 10

Signa, si fiat ex
vitio semine,

6, de loc. af.
Loco citato,

Prognostica,

citato loco

Curatio acces-
sionis tempore,

Quæ naribus
admoûda sint.

Cap. 14

Lib. 16. c. 63

Cap. 10

Suffitus.

Vtero quæ im-
mittenda sint.

Loco citato,
Pess.

Quæ per sedem
inicienda sint.

dere afflueuerit, comitialis modo diuturnus, & per circuitum repentes effici-
tur, & tutus quidem apparet, singulis tamen accessionibus præceptis periculū
affert, vt non eadem solum die, sed intra paucas horas iuterimat, vt patet ex
Aetio, & Paulo: Quoniam vero hæc affectio duplicem curationis modum re-
quirit, vnum accessionis tempore reliquum vero eodem non urgente. pro-
pterea, quæ accessionis tempore, adhibenda sunt, primo conscribimus,
victus ratione derelicta, Nam accessionis tempore, ac etiam vbi eadem cona-
quieuerit, cibum nullum, aut paucum præbere oportet, vt liquet ex Paulo
Aegra itaque ceruice, & scapulis accliuibus collocetur: femoribus, ac ingui-
nibus decliuibus: extremæ partes deligentur, ac fricentur, crura præsertim,
& pedes, & quemadmodum in multo effluxu cucurbitas mamillis imponi-
mus, sic quibus sursum aut in lacus tractus est vterus, inguinibus, & coxis ad-
hibebimus: & naribus quidem ea, quæ fecidissimum odorem habent: vteris
autem odorata, & ea etiam, quæ laxare, ac calefacere possint, medicamenta
afferemus, Galeni decre. primo de arte cutat. ad Glaucō. Qua de re naribus
admoûere oportet castoreum, sagapenum, galbanum, singula ex aceto trita,
ac naribus illita, aut acetum acerrimum calfactum naribus adhibeatur, in
quo calamintha, thymus, & alia huiusmodi acria fuerint decocta: hæc ete-
nim crassos cerebri vapores incidere, ac attenuare possunt, ac simul frigidi-
tatem depellere, & inspirata thoracem, ac pulmonem expurgant, & stoma-
chum corroborant, vt inquit Aetius. Item nares suffiantur castoreo, galbano,
aut sulphure, aut funiculo lucernatio, recens extincto, aut pennis vstis; seu so-
leis antiquis, aut cæparum, aut alliorum corticibus, aut capillis ipsius pro-
priis exustis: quidam etiam maculam vrinarium inueteratam, & pannos sul-
phureos incensos naribus admoûent; sinapi item tritum cum aceto naribus
adhibeatur, aut rutam viridem manibus contritam suffito, aut eadem cum
melle: lana excepta in anum indatur, Ex Galen. auctorita. 9. de compositione
medicamentorum secundum locos, qui etiam excitare strangulatas asserit:
bitumen, castoreum, galbanum, picem liquidam, & cedriam, Pilos vstos, ru-
tam, allium, cæpam, & cornu cerui si odorentur: Steruationes etiam exci-
tentur castoreo, aut pipere naribus per specillum admoto. Os item egræ
aperiatur, ac medius digitus: ad uomitum proliciendum intromittatur, & su-
per hæc omnia mulier magis uociferationibus excitetur, aut vocetur: Vte-
rum vero inferne per pudendum odoratis suffias styrace, cinnamomo, casia
costo, amomo, ligno aloes ac similibus: illiniantur etiam intra pudendum ea,
quæ laxandi, calfaciendi, ac flatus dissoluendi vires habent, veluti est oleum,
irinum, nardinum, rutaceum, aut in quo cuminum, vel anisum fuerit decoctū,
& reliqua huiusmodi, quæ digitis excepta obstetrix usque ad ventri os immit-
tat, ac leniter, & diu confricet, vt hinc irritatus, crassus humor, qui in vtero
heret prouocetur, ac calfactus excernantur, vt idem Aetius inquit. Pessi item
parentur ex his, quæ eadem vim habent calfaciendi, laxandi, & flatus discu-
tiendi, quorum formulas cap. de mensium suppressione inuenies, nisi quod
odorata quædam iniicere poteris, lignum aloes videlicet, casiam, cinnamo-
mum, costum, moscum, & interim ea, quæ à vulgo ambracanis, & zibeti ap-
pellantur: testudinis item terrestis hepæ tritum in pello subdito 3. i. nanque
ad vteri strangulatus, ac dolores confert: hoc etiam tempore in sedem glau-
des indantur ex ruta, cumino agarico, sale gemma, hiera, ac melle præpara-
tæ: aut ex cumino, ruta, & caricis eadem parètur: Proderit quoque vbi hæc
non suffecerint clysteribus sterco subducere, vt inquit Paulus, quorum co-
piam cap. de coli dolore reperias: Præcordia item fasciis vinciantur, & disten-
tis manibus os vteri comprimatur; illinianturque imus venter, ac inguina & sac-
celli

celli in eisdem locis adhibeantur, prout eodem cap. de mensium suppressione docuimus: & ubi facultas detur, infusiones quoque parentur in decoctis baccarum, & foliorum lauri pulegii, calamynthæ, marrubi, arthemisæ, conizæ, sauinæ centaurii, dictami sampuci, fœnugræci, althææ, chamæmeli, aristolochiæ, iridis, & serpylli, ex eiusdem Aetii sententia, Verum infestationum tempore cerebri cura non relinquatur, sed rosaceo, & aceto caput irrigetur, & in aceto etiam prius spondilium serpyllum, ruta, & interdum castoreum decoquatur, ac naribus quoque prædicta odoramenta assidue adhibeantur, præsertim castoreum cum aceto, ut ipse inquit: Post hæc ad castorei potionem tranfibimus, quod assidue potum sæpe penitus ab hoc morbo liberat, dandumque est quotidie 3. i. pondere, aliquando cum aqua mulsa, aliquando cum arthemisæ decocto Aetio, & Paulo testibus. At ubi accessio conquieuerit, ac ab eadem præseruari velit ægra, aut diurnus factus, fuerit affectus plerumque à uenæ sectione initium facimus, præsertim si menstruæ purgationes fuerint detentæ, deinde ad alui euacuationem progrediemur: Secetur autem tali vena: Purgatio autem fiat ex hiera, ut prædictis auctoribus visum est. Verum si cum mensium suppressione crassi etiam, ac frigidi succi redundabunt, iidem prius concoqui, ac præparari debent, & deinde purgari ex eadem hiera cum agarico, seu pilulis foetidis, aut de sagapeno cum eadem hiera, & agarico, & (ut summum dicam) eisdem medicamentis utare, quæ cap. de mensibus suppressis conscripsimus, A quibus diaspolitico pharmaco assidue uti debent, & eo, quod ex tribus piperis generibus constat, ac etiam eo, quod ex calamintha appellatio nem habet, Verum singulis admiscenda sunt quæ semen minuunt, ac abolent, qualia sunt viticis, rutæ, cannabis semina, nymphææ radix, ac reliqua huiusmodi, quæ cap. de fluxu genituræ notauimus, præsertim si ex detento, semine uteri strangulatus fiat: castorei quoque 3. i. assidue potent modico aniso adiecto, ut Aetius asserit ex Philagrii auctoritate, Interim quoque diambra, diamoscho, ac antidoto mithridatica uti poteris. Celsus, castoreum, vel git, vel anethum, potui dandum esse præcipit: Adhibeantur quoque supra relatæ ut infestationes, ac pessæ: postremo vero ad naturalia balnea, eaque calida confugiendum, post quæ vnctiones, quoque approximetur pectini, inguinibus, ac lumbis ex oleo liliaceo, irrino, ac rutaceo, & nardino, viticis, ac rutæ semine, costeo, ac casia, exiguaque cera paratæ: interim quoque saluæ, aut calaminthæ contusæ, seu feminis cannabis quidpiam admisceto: multum etiam conferunt deambulationes matutinæ, gestationes, quæ in curru, vel naui, vel iumento: A motu vero gestationis prodest vociferatio, & lectico clara modulata, ac concinna: item vnctio, frictio, & exercitatio per congrua intervalla repetita, ut inquit Aetius. Et in vniuersum ubi ex redundante potissimum semine generatur hæc affectio, tum victus, tum medicamenta cōferunt, quæ resiccandi vim habeant, siue calida, siue frigida fuerint, similiter & his utendum, quæ totis substantiis semen extinguunt. At uteri strangulatus cōuenire inquit Gal. 6. de com. med. secundum locos agarici 3. i. in potu acceptam ex uiuo; item plantaginis semē, & succum cum vino, nec minus confert onyx ex conchylio potatus, & acetum scylliticum absorptum, ut ipse inquit.

Infestationes.

Vbi accessio
non urgeat, cura-
ratio.
Venæ sectio,

Purgatio.

A purgatione
que tribuenda
sint.

Lib. 16. cap. 68
Topica,

Lib. 15 cap. 63

Cap. 10.
De agarico no-
ta.

περὶ προπίπτουσιν ὁ ἴσχυρ.
cidentia.

id est de uteri prolapsu seu pro-
Cap. III.

Vteri prociden-
tia quid sit.
Aet. loco citato
Paul. li. 3. c. 711
Prolapsi uteri
signa.

Causæ.
Externæ.

Internæ.

Pronostica

Curandi via.

Contingit etiam, licet raro, ut quemadmodum sursum, aut ad latus
uterus peruertitur, ita quoque deorsum prolabatur: atqui ipsum pro-
labi dicimus cum ira deorsum euertitur, ut foras promineat, ex Ae-
tii auctoritate cap. 76. libr. 16. Non tamen velut quidam imperiti pu-
tant à suis appendicibus exolutus totus excidit, nam si ita procideret restitui
haud quaquam posset ex eiusdem Aetii, ac Pauli sententia. Quod vero uterus
hoc vitio laboret, morbo scilicet insitu, seu positione, hæc signa manifesta-
bunt; Nam id, quod procidit struthiocameli ouo simile est iuxta maioris, ac
minoris differentiam, prout violenta eversio contingit, & in principio plu-
rimus sanguis erumpit, deinde consequitur dolor præcordiorum, lumborum,
imi ventris, ac pudendorum, & periculum est ne perfrigeratis locis conuul-
sio inferatur, quamuis progressu temporis ubi affectio inualefcit, & loci cal-
losi facti sunt, neque conuulsionis periculum immitet, neque dolor infestat.
eodem Aetio teste: sunt autem eiusdem prolapsus causæ multæ, quarum quæ-
dam externæ sunt, & quædam internæ: externæ quidem, ut si ab alto delapsa
sit mulier, & in coxas delata disruptis pelliculis, ac ligamentis, quæ uterum cō-
tinent, ac vicinis partibus connectunt, ob violentam etiam secundæ extra-
ctionem, quod præcipuè in abortibus contingit, ac ob inartificiosam fœtus
extractionem, item nimia spiritus detentio, immensa oneris eleuatio, aut pla-
ga vteri prolapsum inducit: quin & ob vehementiores animi affectus; velut si
liberorum amissio, aut hostium incursus non cietur, aut ob periculosam nau-
igationem aut eiusmodi quandam causam mulieres toto corpore solui solent,
ita ut uterus simul prolabatur: Internæ autem causæ esse possunt humoris
plurimi, ac lenti defluxus, ac partuum frequentia, ob quæ appendices, ex qui-
bus uterus dependet, laxantur, ac soluuntur: aliquando etiam ob mēbranarū,
ac musculorum uterum subinentium reuulsionem hæc affectio contingit,
quod inclinata ætate maxime fieri solet, ut inquit Aetius, & Paulus. quarum
causarum dignotio haud ægrè haberi poterit partim ex te ipso, partim ex
græ, seu astantium sermone: Verum ex quacunq; causa fiat, cum adhuc recens
est affectio, conari oportet ut uterus ipse contrahatur; in principio enim facile
dirigitur, & recte locatus permanet, præcipue in vigoris ætate, Nam in etate
proiectioribus contrahitur quidem, sed ex leui occasione rursus prolabi-
tur, ex eiusdem Aetii testimonio. Cum vero in hac affectione uterus ex sua
sede diuaticatus sit, ut iterum reponatur in proprium locum oportet: Conue-
nit igitur (scilicet prius euacuatis, vrinaq; excreta, si in vesica lotium
collectum fuerit, quo uterus vndeque sit liber, nam inter vtrumque, rectū
inquam intestinum, ac vesicam situs est) laborantem figurare supinam coxis
altioribus, reflexis polpitibus, ac cruribus disparatis, deinde prolapsam vteri
partem oleo tepido, ac butyro, vel betæ, maluæ, althææ, fenugræci, feminis,
lini, aut similibus decocto fouere, post hæc lanam conuolutam figura, ac crassi-
tudine muliebri, pudendo correspondentem accipiemus, tenuiq; linteo cir-
cundabimus, ac inuoluemus, & acaciæ, aut hypocistidis succo vino diluto in-
tingemus, ac vtero apponemus; & citra violentiam totum, quod prolapsum
est, sursum reprimemus, quoad tota moles intra sinum recipiatur, & uterus in
proprium locum reponatur, deinceps alium lanæ hapsum vino astringente
imbutum superponemus, atque totum pectinem spongiis ex posca expressis
integemus, & mulierem declinabimus crura extensa, ac coaptata habentem,
ita ut alterum alteri incumbat, inde cucurbitulæ agglutinabuntur cum flam-

ma copiosiore vmbilico, & vtrisque inanibus partibus (quas illa nominant) naribus odorata admovebimus olfaciendæ: inferne autem quæ gravem odorem habent applicabimus quorum omnium præcedenti cap. copiam reperies. Tertia vero die lana adhuc intra pudendi sinum existente mulier in vino nigro austero aliquatenus tepesfacto, aut in myrti, lenticis, rubi, ac malicorii decocto infideat, & post infersionem rursus supina coxis altioribus locetur, & sublato ex pudendo priore lana, alia rursus eodem medicamento imbuta subdatur. Cataplasmata vero de foris imponantur ac imum ventrem ex palmulis polenta, lenticula, ac malicorio cum oxymelite, atque hæc tribus diebus interpositis rursus fient, quoad perfecte vitium discusseris: & ubi vteri crebro prolantur, posca abluantur, in eademq; mulier diutius infideat, & deinceps omnia relata fiant. Vbi vero prolapsus vterus temporis progressu intumuerit, plurimoq; humore refertus fuerit, ut præ tumore reduci non possit, betarum decocto ipsum rigamus, deinceps acetum affundimus, & salē tenuissimum inspergimus, & postea sedato tumore eodem decocto perfusum detrudimus, ut inquit Aetius, & deinceps cucurbitas, ut supra affigemus, & odorata assidue naribus admovebimus, egraq; vnde quaque circumtectis rebus fetidis suffiatur inferne. At si processu temporis id, quod prolapsum est cōputruerit, id ipsum auferetur nullius metu periculi, Etenim vniuerso vtero ablato ubi putrefactus fuisset, mulierem nihil omniū superuixisse, narrant Aetius, & Paulus quorundam auctoritate. Oportet autem ut à vociferationibus, sternutatione mouentibus, ac tussim aliisq; immodicis motibus abstineant, ita ut quiete, & tranquille viuant, vtanturq; cibis boni succi, & odorato vino, ac tenui.

μύλας . id est de mola. Cap. 112.

INter propria quoque vteri vitia connumeratur id, quod à græci *μύλα*, à latinis mola nuncupatur, nomen sumens à motus tum difficultate, tum grauitate, ut Aetius refert c. 80. libr. 16. Nam velut mola ipsa grauis est, ac difficulter mouetur, ita & affectus hic mola appellatus, ad eius similitudinem & grauat, & difficulter mouetur, licet non nisi per accidens, ut dicemus, quemadmodum & ipsa mola. Hanc molam induratum esse vteri tumorem, qui modo in vuluæ ostiolo, interim in tota ipsa prominet Aetius citato loco, & Paulus cap. 69. libr. 3. fatentur, etsi idem Paulus in fine citati capituli aliorum quorundam auctoritate asserat, molam carnem esse informem ipsius vuluæ tunicis adhærescentem, ac foetus modo in lucē edi, Verum quicquid præcitati auctores asserant, nos Galenum sectantes dicimus cum eo molam esse carnem informem, quæ in mulieribus vtero gestatur, ut 14. method. med. ad eo scriptum est, Vel molam esse carnem quandam inutilem, atque informem, ex eiusdem Gal. sententia 14. de usu part. Quapropter non omnē induratum vteri tumorem molam esse fatemur, ut Paulus, & Aetius sentire videntur, sed in vtilem illum conceptum carnosum, atque informem, qui etiā vtero gestatur. Inutilis nanque est cum sit à natura aliena caro illa, nec utilis mulieri, cum & ipsam grauet, ac laborem inferat, impediatq; mensum purgationes, ut dicemus. Nec etiam utilis pro generis propagatione, ueluti & naturalis conceptus est: item informis caro hæc cum artificiosa forma, & humana careat, licet quandam figuram contineat, quinimo diuersasfigurationes suscipit pro diuersitate materiæ, qua generatur, similiter & agentis à quo figurationem recipit. Quod vero sua conceptu mola contineatur, licet idem imperfectus, atque inconcoctus sit, confirmatur ab Arist. 4. de gener. animalium cap. 7. dum dixit, cum igitur ex humore concoctu difficili conce-

Quid sit Mola
ex Aetio & Paul.
10.

Mola quid sit,
ex Galeno.
14. meth. c. 13.
in prin.
14. de usu par.
Cap. 7. post
prin.

ptus constitit, tunc gignitur quod mola vocatur, efficitur enim conceptus eo modo quo ea, quæ inquinari dicimus cum elixantur, portatur etiam, seu gestatur vero conceptus hic, qui mola appellatur, & non est vteri tumor induratus in eius substantia ortus, quoniam interdum fætus modo in lucem editur. Pariunt enim quandoque mulieres carnem hanc, quam molam vocamus, ut testatur idem Arist. eodem loco, & Aetius illud quorundam auctori- tate confirmavit citato loco, cum dixit, quidam vero tradunt in quibusdam mulieribus carunculas ad iugulandis magnitudinem per pudendum excretas esse, aliquando singulis mensibus, aliquando bimestres, aut trimestres, Præ-

Cap. 7

Cap. de ovis,

Error quorun-
dam de Mola,

Quod uterus af-
ficiatur signa,

Cap. 13

Quis affectus
præter naturā
sit Mola,

Mole, signa,

Causa.

1. de morb. mu-
lieribus longe
post med.

terea Gal. eodem 14. de usu par. scriptum reliquit molæ conceptum ouo pro-
portione respondere, quamvis non perfectio, sed subuentaneo: at oua anima-
lium partes non sunt. nec eorundem tumores præter naturam, sed propor-
tione respondent, iis, quæ adnascuntur, ut liquet ex eodem Galen. 11. de
simplic. medicamen. facult. Quare & mola in numero eorum, quæ adna-
scuntur, existit, non tamen familiarium, & vtero gestatur, ac non ipsius indu-
ratus tumor est. Hinc quoque patet error eorum qui volunt molam esse in
multiplici differentia, nam præter hanc, quæ carnosam existit, quandam aliquo-
sam. & quampiam etiam flatuosam esse fatentur, quoniam nisi caro si inuti-
lis atque informis, quæ in mulieribus vtero gestatur, haudquaquam mola ap-
pellari debet, iuxta Arist. & Galen. sententiam. Quod vero vterus afficiatur
in hoc vitio ex mensium suppressione, præter naturam tumore, ac ipsius met-
xteri dolore percipitur. Affectus vero morbus est in compositione, specia-
tim in numero, ac inter eos, qui toto genere præter naturam existunt, veluti
est lapis in vesica, iuxta Gal. sententiam eodem 14. meth. med. Quanquam
Arist. velit quod nec perfectam, nec alienam omnino habeat naturam mola
ipsa: Atqui Gal. propterea toto genere præter naturam eam esse fatetur velu-
ti in vesica calculus, hypochyma, & myrmecia, quoniam omnia talia tãquam
molesta, & inutilia in totum submouere properamus, & non quod in eius
generatione, seu substantia nihil sit eorum, quæ secundum naturam sunt,
qua de re ab Arist. non discrepat. Dignoscitur autem affectus hic ex tumore
duro circa vteri partes, detractione, seu contractione partium superiacentiũ
ac gracilitate corporis, appetitus prostratione, & coloris vitio, mensesq; sup-
primuntur, & mammæ intumescunt, stomachus subuertitur, lubi grauian-
tur, neq; attollitur. adeo ut primum conceptus vteri suspicionem de se præ-
beat; uterum temporis progressu discernitur, Nam molam dolor punctio-
nis sensum inferas subsequitur, nec in ea motus ullus, velut in vteri conceptu
percipitur, nisi quod per compressionem dextra, & sinistra mouetur, cum ma-
nibus mola comprimitur, & ex accidenti quoque cum mulier de vno latere
in alterum vertitur. Cæterum postea toto corpore imminuto, ac ventre am-
pliato hydrodis imaginem præferebat. Discernitur tamen ab illo per tumo-
ris duritiem, & quod tumor hic ad digitorum compressionem, ac pulsationē
non cedit, neque tympani sonum veluti in hydrope ædit, & quod neq; ad ma-
nus contactum ulla fluctuatio percipitur, quanquam temporis progressu
quandoque hepate perfrigerato hydrodis ei superueniat, ut liquet ex eodem
Paulo, & Aetio. Cum itaque talem vteri molam esse fatemur, reliquum est
eius causas inuestigare, quoniam hæc non (ut Aetius asserit) aliquando præ-
gressa inflammatione succedit, aliquando post locale vlcus, cui caro super ex-
creuit, velut ea, quam ipsa tumorem vteri induratum appellat: nec ex semi-
nis muliebris, & plurimi sanguinis menstrui affluxu, ac in vtero retentione,
quem cogit calor immodicus, ac in carnis formam transmutat, generationem
suscipit, ut quibusdam falso visum est, sed aliam tum. materiale, tum effici-
entem quoque causam, habet, ut ex Hip. Arist. & Gal. auctoritatibus demon-
strabimus

strabimus, ait enim Hippo. lib. de morbis mulieribus, & lib. de sterilibus mola de sterilibus
 porro conceptus causa hæc est, cum multi menses modicum, & morbosum post medium.
 semen conceperint, neque conceptus rectus sit, & uenter plenus est, velut
 prægnantis: quibus verbis clare ostendit materialem causam ipsius molæ esse
 menses multos cum modico, & morbofo semine commixtos, semine inquam
 maris, & non fœminæ, Nam si de fœmineo semine intellexisset frustra mo-
 dicum, & morbosum adiecisset, cum quantulumcunque, & quaecunque tale
 esset semen frigidius, & humidius existens, atque imperfectius viri semine,
 molæ conceptus sequeretur. addidit etiam, neque fœtus rectus sit, quasi im-
 perfectus conceptus sit in mola ex paucitate, & uitio seminis ortus: nanque
 ex eius mediocri multitudine, ac salubritate fœtus rectus generatur si cum
 moderatis mensibus fuerit permixtum: quod vero idem sentiat Arist. præci-
 tato libr. 4. de gener. anim. clare patet, Nam querens cur cæteris animalibus
 mola non generetur, nisi quid admodum latea, sed mulieribus duntaxat,
 Respondet ea inter animalia affectionibus uteri obnoxiam esse, & men-
 struis abundare; quibus uerbis menstruum copiam necessariam esse pro
 molæ generatione fatetur Arist. quod vero necessarium quoque sit uiri se-
 men, eodem loco ostendit, cum dixit, iam accidit cuidam mulieri, ut cum
 concubuisset, & concepisse putasset, primum ventris moles ageretur, &
 reliqua ex ratione venirent, quæ demum difficultate intestinorum implicata,
 eoque modo periclitata peperit carnem, quam molam vocant: quod clarius
 quod semen viri simul cum sanguine menstruo concurrat in molæ genera-
 tione? Gal. autem lib. 14. de usu part. aduersus eos, qui volebant fœminæ se-
 men conferre ad fœtus generationem tanquam motus principium quoddam,
 hæc protulit verba, Si igitur eo usque volunt semen fœminæ progredi, pri-
 mum quidem quod parum artificiosam actionem ei tribuunt, quæ utique
 vel soli menstruo forte affuerit, nemo est, qui ignoret. Secundo autem quod
 mentiuntur etiam in his, quæ accidunt explorandis, non enim sicut gallinæ
 sine maribus, oua pariunt, ita mulierem aliquando viderunt sine viro, vel mo-
 lam, vel huiusmodi quippiam aliud concepisse. Cum igitur in fœmino se-
 mine nullum adsit motus principium neque perfectum, neque imperfectum,
 licet ad animalis generationem aliud conferat, aut saltem si illud habe-
 ret, non nisi cum maris semine habere putandum est, ut in eiusdem Gal. do-
 ctrina sæpius legitur: absque controuersia censendum erit neque perfectum
 fœtum, neque etiam molam (ut ex his, quæ diximus clare patet) citra viri
 semen posse generari, ut quidam ad pauca respicientes falso putarunt. Cæ-
 terum quod efficiens molæ causa non sit immodicus calor, sed potius eiusdē
 caloris imbecillitas, ab eodem Arist. citato loco scriptum est, loquens enim
 de molæ generatione sic ait, Afficitur enim conceptus eodem modo, quo ea,
 quæ inquinari dicimus cum elixantur, nec per calorem, ut quidam volunt,
 sed potius propter caloris debilitatem, Natura enim de uita certare vide-
 tur, nec posse perficere, finemq; apponere generationi, & demum subdit, Cau-
 sa nanque duritiæ cruditas est, quippe cum inquinatio quoque cruditas quæ-
 dam sit. Idem quoque sentire videatur Gal. citato lib. 14. de usu part. Nam lo-
 quens de ouis, quæ subuentaneæ nuncupantur, quibus proportionē mola
 respondent, asserit ea propterea esse imperfecta ex ipsis animal gigni non
 posse, veluti ex aliis ouis, quoniam ut perficiantur à musculo solam deside-
 rant caliditatem, Ergo veluti ex diminuto calore subuentaneæ fiunt oua, ita
 & mola, quæ eisdem proportionē respondet ex imbecillo, & non immodico
 calore ortum ducit. Erit autem eius generationis modus talis, quod cum in
 concubitu multa copia sanguinis menstrui uteri in cavitare contineatur,
 proiecto a mare modico, eoque morbofo semine, ac eidem sanguini menstruo

Materialis cau-
sa molæ.

Cap. 7.

Loco citato.

Efficiens molæ
causa.

Loco citato.

Concluditur mo-
dus generatio-
nis molæ.

Prognostica.

Libro primo,
Loco citato,
Curatio.

Vicus ratio.

Vene sectio.

Purgatio.

commixto ex imbecillitate caloris, præcipue ipsius feminis, & secundo forte ipsius sanguinis menstrui, utroque tamen in unum motum tanquam vno principio conspirante non potente eandem materiam perficere, ac concoquere, cum sit humor concoctu difficilis, ut inquit Arist. neque finem generationi apponere, carnem hanc inutilem, atque informem idem imbecillus calor (quam molam vocant) procreat, quæ interim per annos tres, aut quatuor perseverat: quandoque tota vita perducatur, adeo ut & consenescat, & commoriatur, ut inquit Arist. Cum autem intenditur hic affectus in aquam subtercutem degenerat, nonnunquam etiam insanabilis magna ex parte redditur, quibusdam & sanguis erumpit (Paulo auctore.) Hanc affectionem alii velut incurabilem penitus reliquerunt: alii incipientem tantum curari posse confidunt, negligenda tamen eius curatio non est, sed omnia, quæ convenire videbuntur, facienda, ut asserit Aetius. Quanquam Hip. lib. eodem de morbo. mulieribus sic de ea scripserit, Hanc igitur maxime quidem ne curato, aut certe cum prædictione, Quæ de re pro eius curatione ægra decumbat in domuncula angustiore, minus loci exposita modice perflata, cubili immobili, sed ita ut pedes habeat elatiores, quietosve, Nam motus quamlibet fluxionem concitat, ut testatur Paulus, Itaque aer temperatus in actius, aut modice ad calidum uergens, & siccum eligatur, somno moderato utantur, exercitium potissimum partium infernarum fugiant, quandoque vero moderata deambulatio confert: Sit alius lenis quotidie. Et immodici animi affectus omnino vitentur: cibi tribuantur quantitate moderati, ac boni succi. Sitque vini odorati optime diluti potus, cum quibus interim ea, quæ laxandi viribus prædita sunt, permisceas: & ea etiam quandoque quæ extenuandi vim habent. & ubi totum corpus plenum fuerit, si quod non prohibeat interna cubi uena secanda erit, haud tamen multa sanguinis copia extrahenda est, quin potius ubi opus fuerit eadem iteretur, interim quoque præsertim circa initia huius affectus malleolorum uenam secare convenit multo sanguine redundante post sectionem venæ cubiti, Nam si frigidorum, crassorumque humorum copia adsit, iidem potius præparandi ac purgandi sunt, quemadmodum ap. de suppressis mensibus docuimus: deinceps ad particularem molæ curationem deveniendum, eisque utendum est medicamentis siue intus, siue extra adhibeantur, quæ laxandi, ac molliendi, & mittigandi vim habeant, veluti infusus, & decocta maluarum, althææ, chamæmeli, seminum lini, fœnugræci, fertulæ campanæ, & anethi: fiat autem decoctum aut in aqua, aut in hydrelæo & processu temporis lauri folia, pulegium, thymum, hyssopum, salvia, arthemisia, polium, ac centaurium permisceri poterunt: Ex eorundem quoque decocto exiguo vino albo addito fœtus cum spongiis fiant: post quos imus ventris, pecten, & inguina infra scripto unguento perungantur, Recipe olei irini, liliorum alborum, anethini, & chamæmelini ana 3. i. butyri recentis, adipis anseris ana 3. iiii. ladini vnc. i. s. ceræ & vini odorati parum, fiat unguentum. Interim adiaci poterit cremor feminis lini, althææ, aut fœnugræci, ammoniacique, aut bdelli in vino dissoluti paxillum: Item cataplasmata hoc modo parentur, Recipe radicem, & foliorum althææ, & maluarum ana manipulum. i. farinæ fœnugræci, feminis lini, & hordæi ana mani. i. s. olei utriusque amygdalæ, & liliorum alborum, singulorum vnc. i. misceantur & cum aqua mulsa, & pauco uino odorato, fiant cataplasmata. Per si item subdantur ex ælipo, butyro, adipe anserino, medulla, aut cerebro cerui, melle, carycis pinguibus, & vis passis cum oleo irino, sampsucho, aut amaracino, ut inquit Aetius, aut ex adipe anseris, radice althææ, carycis pinguibus, butyro, ac saccharo idem figurentur: quibus interim rutæ, salviæ, arthemisiæ, aut maioranæ folia confusa miscebis: perseverante uero malo, acrium eduliorum usus assumatur,

&

& innatationes aquarum calidarum, & aque marinæ, vt refert Aetius: Rutam & anethum in vino veteri fuluo odorato decoque, & abiectis herbis, idem vinum calidum bibendum dato, & fermè aquæ loco exhibito. Nam hoc medicamento mulier quædam excreta sanguinis copia salutem adeptæ est, vt ipse refert Hip. vero citato libro de morbis muliebribus dictamnium creticum, aut castoreum in vino bibitum commendat. Tu uero eiusdem etiam medicamentis vti poteris, quæ cap. de mensium suppressione conscripsimus tã intus, quã extra adhibitis: similiter quoque & eis, quorum cap. de aqua intercutem meminimus, potissimum vbi affectus proteletur.

Lib. 1. loco citato.

περί τῶν μήκυσσιν ὀνέον.

sterilibus.

id est de non concipientibus siue de

Cap. 113.

Quod natura, si fieri potuisset, maxime optasset suum opificium esse immortale, nemini in dubium venit, verum cum per materiam non liceret, nam quod ex arteriis, venis, nervis, & ossibus, ac præter eam carne est compositum, incorruptibile id esse non potest, subsidium quod potuit ipsi ad immortalitatem est fabricata. Propterea mirabilem quandam rationem inuenit, quomodo in demortui animalis locum nouum aliud sufficiat, vt nullum animalis genus pereat, sed incolume semper sit, atque immortale. Quæ de re omnibus animalibus concipiendi instrumenta natura instituit, ad generit, inquam instaurationem, quæ cum communia sint cum viris, tum mulieribus, ea propter eisdem quandoque oblæsis contingit aut viri, aut mulieris, aut vtriusque ratione conceptionis impedimentum, quod quidem sterilitate appellatur. Nam nihil aliud est sterilitas, quàm priuatio conceptionis, tempore potissimum quo eadem perfici deberet. De hac itaque conceptionis priuatione, quæ ipsarum mulierum ratione provenit, & non quæ virorum, aut vtriusque verba faciemus, quanquam eadem ad viros transferri possit, In qua quod vterus afficiatur tanquam concipiendi instrumentum nemo vereri debet ex eiusdem vteri propriæ actionis, seu vsus læsione id dignoscens. Quod vero sterilitas symptoma sit in genere noxæ functionum ablatarum patet. Nam omnino abolita est propria ipsius vteri tanquam instrumenti actio concipiendi inquam, Atqui cum sterilis est non contigit tempore quo concipere deberet. Huius autem affectionis causæ plures esse possunt, vt inquit Arist. 2. de gener. anim. cap. 5. Nam & à primo ortu naturæ locis ad coitum commodis oblæsis steriles & mulieres, & viri redduntur, vt altere non pubescant alteri nō barbescant, aliis in processu ætatis idem accidit affectus, aut propter corporis nutritionem pleniorē, aut ex morbo, viris humidum, frigidumq; emittitur semen mulieribus purgationes vitiantur. experimento autem in aqua probatur fecunditas seminis num per summa innatet, aut descendat, suffitu vero mulierum probatio sit, per odores subeuntes vterum. multis etiam tum viris, tum mulieribus hoc idem accidit malum oblæsis partibus, & locis accommodatis ad venerem; quæ vitia (vt ipse refert) partim curabilia, partim incurabilia sunt, sed maxime steriles tunc perseverant cum primo naturæ ortu tales constiterint: Verum enimvero in ipsis mulieribus nonnullæ ipsius vteri præter naturam dispositiones possunt esse causæ, & præsertim eiusdem intemperaturæ, quemadmodum ab Hip. & Gal. apho. 62. 5. lib. scriptum est, Nanque bene temperati vteri ad conceptiones sunt idonei, male autem temperati si parum à bonitate recedunt, difficulter concipiunt, Si vero nimium, mulieres steriles fiunt, & proinde mulieres esse fecundas siue ambabus bonis temperaturis, est impossibile, vt inquit Galen. in commento: appello ambas bonas temperaturas mediocres, scilicet tum ex calidi,

Sterilitas quid sit.

Pars affecta.

Quis affectus præter naturam sit sterilitas.

Causæ secundū Aristotelem.

Ex Hip. & Gal. causa sterilitatis.

Frigidi uteri si-
gna.

Humidi uteri si-
gna.

Calidi uteri si-
gna.

Lib. 6. c. 28

Sicci uteri si-
gna.

& frigidi, tum etiam ex humidi, & sicci, commixtione, cum fieri possit, ut secundum unam oppositionem bene temperatus sit uterus, secundum alteram vero male; propterea Hipp. dicebat quaecunque vere ex utrisque mediocrem habent temperaturam, ex fecundæ sunt, Nam ne mulier concipiat, potest altera efficere intemperatura, ut inquit Gal. modo nimium à bonitate prece-
dat: hæc ubi frigida fuerit immodice, adeo quod ex ea uterus spissior efficiatur sterilitatem efficit: Nam angusta quidem erunt supra modum ora vaso-
rum, quæ ad ipsum pertingunt uterus, adeo ut neque secundæ possint adna-
sci ad iam dicta ora vasorum, neque si hoc fiat aliquando potest bene nutriri conceptus, cum vel nullo modo fiant hisce mulieribus purgationes vel omni-
no paucæ, & ea ipsæ vitiosæ. solo tenuiore, ac aquosiore sanguine perlaben-
te. hæc item eadem ora facile obstruuntur, & propter nativam angustiam, &
quoniam magna ex parte hæc mulieres humorem aggregant pituitosum: siqui-
dem corpus totum fere est utero simile. Adhæc in talibus uteris contingit
etiam maris semen refrigerari, nisi natura sit calidissimum: His itaq; de causis
uteri nimia frigiditatis conceptionem omnino impedit, ac mulieres steriles fa-
cit. Coniectamus autem uterorum frigiditatem ex suppressis mensibus: neque
enim præ nimia crassitudine commode feruntur, sed & stupidus sensus circa
pectinem, lumbos, ac crura percipitur: Aliquæ etiam crurum impotentes sunt
victus quoque præcessit frigidior ac crassi succi, At si prorsus perfrigeratæ fue-
rint, ne venerem quidem appetunt, & uteri osculum contractum habent, ut
ex Aetio cap. 27. lib. 26. & Paulo cap. 74. lib. 3. liquet: ob nimiam quoque uteri
humiditatem mulieres non concipiunt, extinguitur enim in talibus genitura, quæ
admodum in terra palustri cerealia semina, ex Gal. testimonio præcitato apho.
Hanc indicant in coitu humor distillans, tenuius, & copiosum menstruum, ut
inquit Paulus. In habentibus autem immodicam uteri caliditatem sterilitas
contingit modo quo ubi valde calidæ terræ semina committuntur, veluti in
æstibus sub cane (eodem Gal. auctore) Coniectatur autem uteri caliditas ex
reliqui corporis caliditate, & ex mensium paucitate cum dolore prodeuntium
ita ut pudenda mulieris exulcerent, sed & quæ prodeunt, nigriora sunt, & ob
nimiam puncturam nullum ordinem servant. Sequitur etiam ad huc tempe-
raturam insignis salacitas, & totius corporis siccitas, ut inquit Aetius. Propter
defectum quoque alimenti sicciores uteri non concipiunt, Nam in ipsis tale
quid accidit. quale ubi aut arenæ, aut argillosæ terræ, aut petrosæ mandantur
semina eodē Gal. teste. Humor vero in coitu ex eisdem haudquam distillat:
exiguum quoque ac crassum erit menstruum, aderitq; totius corporis exicca-
tio: Si quando vero prædictæ simplices intemperaturæ inuicem misceantur,
ex earundem inditiis manifesta erit earum commixtio: Atqui cognitionem
omnium immodicarum uteri intemperierum aph. 59. 5. lib. scripsit Hipp. cum
dixit, Si mulier non concipit, scire autem velis si conceptura sit, pannis cir-
cumtectam inferne suffies, & si odor videatur per corpus ire ad nares, & os,
scito quod ipsa non ex se ipsa sterilis est, frigiditas nanque spissitudinis ra-
tione non permittit usque ad os, & nares ferri aromatum exhalationem: eo-
dem modo & siccitas. Humiditas vero, sicuti ab ipso Hip. dicta est extingue-
re genituram sic, & aromatum qualitatem: At vehemens caliditas ea ratio-
ne, qua vincit aromatum facultatem, alterat, atque corrumpit, ac propte-
rea non permittit ipsa servantia suam naturam syncera ad os, & nares ferri
Quod si in hisce naturis ex suffitu aromatum cognitio sufficienter haberi non
possit, ex aliis inditiis nobis erit talis natura inuestiganda, hoc ipsum cogno-
scentibus quod rara admodum est huiusmodi calida temperatura in mu-
lieribus, siquidem foemina est mare frigidior: Vtilissima est itaque in sterili-
bus mulieribus ex aromatum suffitu dignotio, ut inquit Hipp. vel quia omnis
immo-

immodica intemperatura isti subiicitur, vel quia rarissime vnà ipsam subterfugit in mulieribus illis, quæ tenues apparent, & nigræ, & hirtæ, ita quod ex his signis percipitur earum immodica intemperatura sine suffitu aromatum, vt Galen. asserit citato com. aph. 62. 5. lib. Idcirco idem Hipp. aph. 44. eiusdem 5. libri dicebat, quæcunque præter naturam tenues existentes vtero gerunt abortiunt, priusquam crassescant, quapropter prius eas reficere, oportet: quem admodum etiam quæcunque præter naturam crassæ non concipiunt vtero, vt idem Hip. asserit aph. 46. eiusdem lib. iis omentum os vteri comprimit, & priusquam extenuentur, non concipiunt, Præterea eisdem menses pauci feruntur, cum maxima alimenti pars in pinguidinem transeat, vt Aetius refert. Cum vero hi duo habitus præter naturam sterilitatem efficiunt, ex te ipso eos dignoscere valebis, de quibus Paulus sic scriptum reliquit: neque enim pingues liberis procedandis sunt idonei, eo quod genitalibus mutuo se contingere commode haud possunt, tum quod momentum seminis emittant; neque etiam nimis extenuati liberis operam dare feliciter queunt: sermo autem Pauli communis est tum viris, tum mulieribus: Accidit quoque interim ex vitiosorum humorum redundantia quod mulier non concipiat: qualis autem vitiosus sit redundans humor, ex his quæ diximus cap. de mensem suppressione inuestigabis: Item ob cicatricem inductam si vasa fuerint excæcata, id quod dignosces ex præcedenti vlcere: & ab eodem etiam vlcere sterilitas interim fit, quod ex signis vlceris patebit, quemadmodum si ob membranam osculum vteri obturantem, aut ob nimiam eiusdem oculi angustiam, vel amplitudinem, siue quod ceruix vteri obliqua fuerit, consequatur sterilitas, ex obstetricum relatione percipies. Si etiam mulieri menses non omnino prodeant, aut pauciores quàm debeant, aut plures profluant quàm profluere deberent, adhuc non concipiunt, ex Hipp. auctoritate libr. de sterilibus. Flatus quoque in vtero existentes conceptionem impediunt, quos insequitur pectinis, & imi ventris tumor, extensio, & quandoque cum dolore pungituo sæpe ad alterum, sæpe vero ad vtrunque inguen se extendente quandoque etiam flatus per muliebrem pudendum erumpit, ita vt mulieres ipsum percipiant, interim quoque strepitum, ac sonitum circa vterum eodem sentiunt. At si per aliquod assumptum pharmachum mulier non concipiat, ex eiusdem mulieris loquela, aut astantium percipies, Sed inuiti quoque coitus inanes, ac steriles sunt, amor enim genituram conciliat, & propterea foeminae amantes crebro pariant, ætas etiam vel iunior, vel prouectior conceptionem impedit, & inepta mulieris forma sterilitatis occasio est, ne liquet ex Aet. si eodem cap. 36. lib. 16. Intempestius etiam congressus causa sterilitatis est, cum conceptionis tempus sit vel incipientibus, vel cessantibus menstruis. Reliquo autem alio toto expurgationis tempore licet aperta fuerint uteri uenarum ora, non tamen tunc concipere mulier ullo modo potest, cum semen nequeat in uulua remanere, sed ab influentis sanguinis copia eluatur, Cessantibus autem, vel incipientibus mensibus, & ora aperta sunt, & menstruum non multum, neque uniuersum, sed paucum, & paulatim effluit, unde efficitur ut ob asperitatem uulvæ semen adhæreat, satisque alimenti ex sanguinis confluentis paucitate habeat: ante etiam quam menses ueniant conceptus fieri propterea non ualet, quia & alimento caret semen, & adhærentiam nullam inuenit, cum eo tempore oclusis uasis leuis uulua relinquantur defluit itaq; semen neq; vniri cum tunica eius potest, siquidem aspera magis idonea sunt quàm leuia ad coalescendum, ex Gale. sententia libr. de dissectione uteri, Nam si leues fuerint uteri, mulier in uentre non concidit, quoniam licet genituram suscipiant, foras tamen emittunt, ut testatur Hipp. eodem libr. de sterilibus. Cæterum si medicamenta sterilitatem inducentia uasa uteri

Lib. 16. cap. 16

In principio,

Cap. 16.

In principio.
Prognostica.

ex

excæcent, incurabilem plerunque affectionem faciunt, licet quædam potiones cæcitatem curabilem indicant, cui si protinus subuenias mederi possis, ex Aetii testimonio: Quod vero quæcunque præter naturam crassæ sunt, priusquam extenuentur non concipiunt, superius dictum est, ex Hipp. auctoritate apho. 46. lib. 5. Similiter ex Gal. liquet, quod male temperati vteri si parum a bonitate recedunt, difficulter concipiunt, si vero nimium, mulieres steriles fiunt: si vlcera in vteris fuerint etiam oborta, & si menses sano modo prodeant, plerunque incurabilia sunt; & propterea in ventre tales non concipiunt quandiu vlcera habuerint, ex sententia eiusdem Hipp. citato libr. de sterilibus: Verum ubi ob frigiditatem mulier non concipit, uniuersa victus ratio eligatur ad calidum vergens: Cibi boni succi exhibeantur, attenuantesq; ac omnibus alimentis admisceantur quæ purgationes irritare possunt, veluti sunt olera odorata, & acria, scandix inquam, crythmon, fœniculum gingidium, apium, smyrnium, asparagus palustris. & similia: Speciatim autem accomodatum victum capitu. de mensium suppressione ex frigidis succis reperies. Conuenit nanque nedum victus ratione, sed aliis remediis omnibus eisdem calorem reuocare: At ubi frigidi etiam, & crassi succi cum frigida vteri intemperie redundarint, post eorum coctionem, ac præparationem purgante medicamento vacuandi sunt, quorum copiam, ac formulam citato cap. requiras. Quod si purgatio per inferna non suffecerit, vomitus quoque prouocetur origani, aut thymi decocto ante, & post cibum omni studio adhibito, vt pituita euacuatur, ex Aetii auctoritate. A purgatione autem, vel vomitu haudquaquam incommodum fuerit castoreum cominium, anisum, pulegium seu iuniperi fructum, & alia huiusmodi bibere, & singulis piper admiscere, ex eiusdem Aetii, ac Pauli sententia, quæ omnia absorberi poterunt vino albo odorato, aut aqua mulsæ: item confert mercurialis cum castoreo, aut absynthium tribus, aut quatuor diebus consueto mensium tempore, si in potu exhibeatur. Est etenim hæc potio ad conceptum efficax, vt idemmet Aetius inquit. In quem etiam vsum conferunt si 3. i. elegmaris diâbræ, aut diamoschu dulcis, seu de xyloaloe exhibeatur cum vino albo; aut aqua fluorum citrangelorum: nec minus & antidoti mithridati, aut theriacæ si tantundem exhibeas: Vteris vero fomenta fiant per suffitus, & vapores, arundine ollæ operculo perforato inserta, aut igni adeo adhibita, vt suffitus, aut vapor intra pudendum excipiat, sit etiam mulier pannis circumtectæ, suffitus inquam fiant ex calidis odoratis, vt casia, cinnamomo, costo, anomo, thure, myrrha, styrace, & aliis huiusmodi, quæ calidam habent temperaturâ, & odorata sunt valde: vapor autem fieri potest ex aqua calida, in aqua prius fuerint decocta arthemisia saluia, ruta, cuminum, pulegium, cyperus, acorô, iuncus odoratus, & reliqua semina odorifera, vt prædictis Paulo, & Aet. visum est: possunt quoq; & hæc singulatim cataplasmatibus modo positi imponi, & idem decoctum per pudendum vtero iniectum confert: item pubis, coxarumq; frictiones nihilominus conducunt: nec minus si oleo perfricetur irino, aut amaracino: Pessum quoque subdantur ex myrrha, ruta, galbano, & castoreo, chia mastiche, & cypero parati, & ne mordeant, at exulcerationem faciant, adipe anseris, aut gallinæ, & saccharo rubeo excipiantur, & serico linteo inuoluti, ac oleo irino, seu liliaceo intincti immittantur; sit autem eorum quantitas exigua, adipis autem, & sacchari maior. Nam neque difficile est eorum quantitatem artificiosa metiri coniectura pro affectionum magnitudine, aut diuturnitate, & reliquis. Sunt quoque & pessum alii ad conceptionem idonei, vt si coaguli leporis partes duas, aluminis scissi partem vnam melle excipias, ac pessum formato vtitor, vtero tamen prius per prædicta purgato. Item seminis satyrii, & mellis, singulorum sex unciam in pessum afformato, & vtere, ex Aetii auctoritate: nec minus

& reli

& reliquis medicamentis cap, de suppressis mensibus ob frigiditatem conscripsit poteris: Vbi vero calida fuerit vteri intemperies, victus ratio conuenit ad frigidum ac humidum vergens, Talis item eligatur aer, somno vtantur longiori, & quiete: ac infrigidantibus cibis, quales sunt ex oleribus lactuca, malua, blitum, accucumis, cucurbita, pepo, atriplex. & portulaca, alique cibi consimiles: Vinum eligatur tenue, album, & aquosum optime dilutum: Competunt item aquarum dulcium balnea: Ad lumbos vero, pubē, & imum ventrem infrigidantia quoque adhibenda sunt, velut est solani, aut vmbilici veneris succus, semperuiui, aut lactucæ rosaceo admixto: aut foliorum atriplicis, portulacæ, seu lactuce excipe pugillos duos, olei rosacei, violacei, & cytoniorum, singulorum unc. i. farinæ ordeï pugillum. i. cum succo solani, aut vmbilici veneris, & pauca aqua rosacea fiat cataplasma, & prædictis locis applicetur: item in pudendum commode subditur idem solani, aut vmbilici veneris succus rosaceo admixto, qui inuoluto linteo lineo, ad digiti formam excipiantur: mercurialis item lumbis, ac pectini imposita vtero calidiori prodest, vt inquit Aetius, & argenti spuma, ac cerusa cū aqua trita: recte autē metienda erit horum omnium quantitas, ita vt perpetuo caueas perfrigerationis excessum: Conferunt item nō minus si ea, quæ infrigidandi vim habēt, potui exhibeantur, siue syr. fuerint, siue decocta: quorū magna copia habetur, & propterea nos breuitati indulgentes prætermittimus, illud animaduertentes quod si cum calida vteri intemperie calidi, ac vitiosi redundarint succi, iidem etiam prius purgandi sunt, concoctis ipsis, ac preparatis, seu à natura euctis, & deinceps, quæ modo scripsimus medicamenta adhibere oportet, Nam quod menses morbofi fuerint, siue biliosi, siue pituitosi extiterint, mulier non concipit vt liquet ex Hip. eodem lib. de sterilibus. At mulieres, quæ ob vteri humiditatem non concipiunt, sicciore diætā vti conuenit, multumq; excerni ac fricari per superiores potissimum partes: cibis vitiantur siccis, & mediocribus, ita vt carnes affatas potius, & vigentium ærate animalium edant, & vinū potens meracum, sed partius bibant, vt Aetius fatetur. auersionis autem gratia aliquando post cibum, aliquando ieiunie vomant: sicca etiam fomenta crebro, balnea vero raro adhibenda sunt, & vbi totum corpus purgatum fuerit, resiccantia, ac astringentia medicamenta vtero adhibeantur, quæ si ante purgationem propinentur non parum lēdunt, cohibita etenim materia (vt inquit Aetius) ad principales partes decurrit: huiusmodi sunt lentisci decoctum, myrti, rosarum, & rubi tenerorum virgultorum, rhus coriarii, mali punici florum, & gallarum, & pilularum cupressi: ex quibus infusus, irrigationes, fofus, cataplasmata, infusiones, & pessi formari poterunt: hoc item epythemata vti poteris, ex eiusdem Aetii auctoritate, quod recipit psyllium tusum, & palmularum carnem cum aqua malsa, aut etiam mala cotonea similiter palmulis excepta adhibeto, vt ipsa inquit, Ad nimiam quoque vteri humiditatem huiusmodi potiones conueniunt, myrti baccas, aut malicorium punici dulcis cum uino terito, & exhibeto, aut auellans nuces vstas cum vino tritas propinato, ex eodem auctore: Mulieri vero, quæ ob vteri siccitatem non concipit, humidiora alimenta exhibenda sunt, & reliqua victus ratio humidior instituenda, mediocriterq; vino, & non nimis vteri vtatur, balneisq; inunctionibus cataplasmatibus, ac infusionibus humectandi vim habentibus vti conueniet; quanquam ubi totum corpus fuerit humectatum, vterus quoque eadem qualitate participabit. At si ex flatuoso spiritu in vtero existente conceptio inpediatur, primum quidem parcior cibus exhibendus est, mox danda quæ flatum expellunt, velut est ruta, cuminum, anethinum, apii semen, anisum, & pleraque alia familiaria semina, ac aromata, quæ partim potanda, partim applicanda sunt ipsi vtero, atque subdenda. Possunt & ex eisdem fomenta parari

Lib. 16. c. 31
Sterilitatis ex
caliditate ortæ.

Victus ratio.

Medicamentorum
ratio.

Lib. 16. cap. 28

Loco citato.
Si ob humiditatem
fiat sterilitas,
curatio.
Lib. 16 cap. 29

Loco citato.

Loco citato.

Si propter siccitatem
uteri non concipiant, curatio.

Si ex flatuoso spiritu
sterilitas fiat, curatio.
Aet. li. 16. c. 31

Ex angustia o-
ris uteri.
Paulo loco cita-
to.

Si os uteri ni-
mum hiat, cu-
ratio.
Paulo loco citato.
Aet. li. 16. c. 31
Si distortum, aut
peruersum fue-
rit idem uteri
os, curatio.
loco citato.
Ex deuorato
pharmaco,

Medicamenta
propria,

Lib. 61. cap. 26
Pauli. 3. c. 74
In fine.
Aet. lib. 16. ca.
12.

parari cataplasmata, ac cerata, & ad pubem imponi, vt liquet ex eiusdem Ae-
tio, & Paulo. Si vero ob oris vteri angustiam propterea quod ipsum conui-
uens, aut conclusum fuerit, sterilitas fiat, Inseccionibus, fomentis, ac perfusio-
nibus, & pessis odoratis, atque mollientibus aperiendum erit. A molliori-
bus tamen incipiendum, vt ex decocto maluarum, feminis lini, altheæ, fœ-
nugræci in oleo, aut hydrelæo, quod decocto nedum pro inseccionibus etiam
perfusionibus, seu iniectionibus vti conuenit: deinceps casiam, cyperum, aut
nardum adiacere poteris interim etiam ad validiora transeundum, qua de re
artemisiæ, chamæmelum, conizæ, calaminthæ, pulegium, & amaracum
apponere licebit, ex quibus quoque pessi hunc in modum parari poterunt
Recipe radicem, & foliorum maluarum, & altheæ contusarum ana 3. iiii. fa-
rinæ feminis lini, & fœnugræci ana. vñc. i. adipis anseris 3. iiii. croci parum
& mosci parum, misceantur, & in serico linteo inuoluta pessi fiant: qui in oleo
irino, aut liliaceo, aut nardino intincti subdantur: procedente vero tempore
caricæ, casia, resina terebenthina adiacere poterunt: interim quoque arthem-
isæ, amaracus, calamintha, pulegium, & mirrha: At si propterea quod vteri
os nimium hiat, non concipiant, victus fomenta, ac reliqua omnia medica-
menta sicciora, & abstringentia conueniunt, talia sunt gallarum decoctum,
cytini, lentiscus, rubi radix, myrtus & alia huiusmodi, quæ humidiori vtero
congrua sunt, ex eiusdem Pauli, & Aetii sententia: Vbi vero distortum fue-
rit, seu peruersum eiusdem vteri os, mollientibus quoque fomentis dirigere,
ac corrigere oportet, etenim fomenta ad hoc maxime faciunt, Conducit
quoque, & pessos mollitoris subdere, specillo quoque, & digito correctio fa-
cienda est eisdem mollitoriis medicamentis prius intinctis. Insuper maxi-
me conferunt pulegii, & arthemisæ decoctum, ac castoreum è posca potum,
vt refert Aetius: Si vero ex deuorato pharmaco quopiam sterilitas conse-
quuta fuerit, pharmaci viribus indagatis contraria medicamenta adhibere
conuenit: Reliquæ sterilitatis causæ, quæ etiam particulares requirunt cura-
tiones suis propriis capitibus petendæ, sunt, & nos breuiati indulgentes con-
sultò prætermisimus, veluti est habitus gracilis, vel obesus, vlcus cicatrix,
membrana os vteri obturans, mensium suppressio seu eorundem immodicus
fluor, & intempestiuus, seu inultus congressus, ac reliquæ huiusmodi. Reli-
quum est, vt ea conscribam medicamenta, quibus pro remouenda sterilitate
vti consueui, potissimum vbi ortas sterilitas non fuerit ex immodico vteri ca-
lore, id quod perrarissime accidit; quorum primum est, Recipe testiculi
apri syluestris exiccati in ombra, & scobis eboris, singulorum 3. i. testiculorum
vulpis 3. i. s. matricis, & coaguli leporis ana scrup. ii. seminum melonum 3. iiii.
cum saccharo, dissoluto in aqua rosacea, & mellisophylli fiant morsuli. Vel re-
cipe feminis seseleos, scobis eboris, & matricis leporis in vmbra exiccate
ana 3. i. diambæ, seu eclegmatis de xyloaloe 3. i. s. cum saccharo in aqua ro-
sacea dissoluto figurentur morsuli, quibus vtatur mulier cum paucis vino al-
bo, aut aqua mellisophylli, seu florum citrangolorum per plures dies ante vi-
ri congressum: quo etiam tempore pessi adhibeantur ex coagulo, matrice, &
stercore leporis, carycis pinguibus, adipe anseris, paucis croco ac moscho fi-
guratis, qui etiam in linteo serico inuoluti, & oleo irino, seu liliaceo intincti
subdantur, Interin vngula aromatica, spica, aut cyperus eisdem permisceri
poterit: a quibus desinentibus iam mensibus (quod tempus optimum est) me-
dio mutuo amore (nam amor genituram conciliat, vt inquit Aetius) venus
ineunda est, quæ etiam à tergo exercita ad concipiendum videtur conducere
vt inquit Paulus, sed & virum strenuam operam nauare oportet, interimque à
venere abstinuisse, & boni cibi succis nutritum esse, ex Aetii decreto. Si vero
velis cognoscere an mulier concipiet, vel non, butyrum, & lac mulieris ma-
sculum

sculum alentis bibendum dato, & si eructauerit, concipiet: sin minus, non vel caput alii integrum depurgatum, ac derasum ad vterum apponat, & postridie videat an per os oleat, & si oluerit concipiet, sin minus, non: item anisum in aqua tenuissime tritum bibat, ac dormiat, & si quidem pruritus ipsam circa umbilicum corripuerit, concipiet: sin minus, non, vt liquet ex Hip. in li. de sterilibus. At si uelis dignoscere num prægnans sit, mel, & anisum tenuissime terito, deinde in aqua diluto, ac exhibeto, & dormire finito, & si quidem tormen ipsi fiat circa umbilicum, prægnans est, sin minus, non est, vt liquet ex eodem citato loco: item cum dormitura est, aquam mulsam potadam, & si alui tormina patietur, concipit: sin minus, non concipit, vt liquet aphor. 415. lib.

Circæ principia.

περὶ Δυστοκίας.

id est de difficultate partus.

Cap. 114.

PARVM admodum ad generis propagationem machinata esset natura in fabricandis concipiendi instrumentis, potissimum mulieribus, nec notatu dignam opem medicus pro eodem scopo præstitisset in profligandis sterilitatis causis, nisi eadem natura, quæ in foetus generatione, ac conseruatione adeo fuit sollicita, in eius quoque ortu, ac editione in lucem miranda quædam cômèrata esset, & medicus ubi opus est, in hac affectione eidem naturæ ferret auxilium. propterea ab eadem natura factum est, cum mulieri partus appropinquat eo videlicet tempore, quo sufficiens foetui alimentum præstare non valet, vt inquit Hippocr. libr. de natura pueri: aut ubi per os nutriripotest, nam tunc proprie foetus perfectus est, & partus naturalis fit, Gal. teste. 15. de usu part. vt idem puer vberius præfens alimentum quærens, calcitrando membranas dirumpat mouens se manibus, ac pedibus: quo fit vt rumpatur membrana quædam interna, qua dirupat contingit etiam alias debilio rem vim habere: & rumpuntur etiam primum quidem illi contrigæ, & coherentes, postea extrema; quæ cum ruptæ fuerint, tunc foetus a vinculo exoluitur, & agitur foras procedit, neque amplius vteri ipsam continere possunt abruptis membranis, sed & ipsi quoque vteri in hoc præstant auxilium: haud enim sufficiens esset foetus ex seipso duntaxat perfectus in lucem edi (nisi quod vteri inhibentes, & cessare facientes ab opere retentricem eorum facultatem, quæ id quod vtero gestabitur vsque quo ad debitam perueniret magnitudinem retinuerat, ac amplexata, erat, altera, quæ hactenus quieuerat loco eius assumpta propultrice videlicet, ac eorum os, quod toto impregnationis tempore adeo conuiebat, vt ne specili quidem cuspidem amisisset, ex Herophili auctoritate, paulatim ad aperientes eo vsque vt possit foetui facilem præbere exitum ipsum propellentes) non parum pueri ortui auxiliantur. A seipsis quoque & ipsæ parturientes in hoc non exiguam opem præstent mediis abdominis musculis, vt 3. de natur. facult. scriptum est. Non ab re igitur com. apho. 55. lib. dicebat idem Galen quod ad bonum partum duorum corporum vigore est opus, & grauidæ mulieris, & infantis. Tot itaque, ac talia admiranda in animalis partu natura machinata est, prouidens vt foetus iam absolutus, ac consumatus tuto emittatur. Partus autem nominatur quando hoc ex naturæ commodo fit, quando vero non naturæ sponte, sed violenter incidit, abortus prouocatur, vt liquet eodem 3. de natur. facultatibus. Appello autem abortum imperfectam foetus emissionem vtcunque factam, cum Gal. 6. de morbis vulgaribus: e diuerso autem naturalem partum nuncupamus eorundem foetuum consumatorum, ac perfectorum naturalem emissionem: qui (vt inquit Hippocra. eodem libr. de natura pueri) hoc modo fit. Vbi enim adeo auctus infans est, vt alimentum, & augmentum, quod a ma-

Versus finem,
Cap. 7.

3. de nat. fac. c. 3

Inter naturali
partum, & abor
tum differentia.
3. de nat. fac. c.
12.
6. de mor. vulg.
cômentario 1.
commento 1.
Loco citato,
Quomodo fiat

tre

partus natura-
lis,

Cap. 12.

In fine:

Quo tempore
fiat.

Hippocrates,

Aristoteles,

In principio,

Galenus,

3. de nat. fac. c. 3

2. de cau. symp.
cap. 3.

Conciliatur hi-
tres Auctores,

Loco citato,

tre descendit, non amplius ei sufficiens sit, copiosius alimentum appetens calcitrat, & membranas disrumpens initium partus matri affert. Foetus itaque vehementissimis motibus succedunt partus, ex Hip. sententia: Hoc etiam tempore & vteri, qui amplius foetus grauitatem, ac eorum distensionem ferre nequeunt, Galen. teste eodem 3. de natura facult. Nec minus & sentientes interim se morderi a qualitate humoris in seipsos effusi, quod eos molestat facultate propultrice media abicere properant: nec non & a seipsis parientes in hoc praestant opus non mediis vteris, sed musculis (vt diximus) qui in abdomine existunt: qui ad deiectionem etiam, tum ad reddendam vri nam nobis sunt auxilio: Fit itaque partus hoc modo: Verum quo tempore fiat, non admodum liquet, Nam Hippocra. eodem libr. de natura pueri asserere videtur foetus perfectionem, ac naturalem partum decimo impregnationis mense fieri, ait enim, alimentum, & augmentum, quod a matre descendit, non amplius sufficiens est puero, vbi decem menses praeterierint, & factus auctus fuerit: & post pauca iterum ait, atque haec vt longissime in decem mensibus fiunt. Arist. vero quarto de generatione animalium capit. 4. & 7. de historia animalium cap. 4. sic de pariendi tempore scriptum reliquit, Sed cum cetera animalia omnia singulari, ac simplici modo partum suum perficiant, vnum enim pariendi tempus statutum omnibus est, homini uni multiplex datum est, Nam & septimo mense, & octauo, & nono parere potest, & quod plurimum decimo: nonnulla etiam vndecimum rangunt; Foetus vero, qui maturius quam septimo mense, prodeat, nullo pacto vitalis est, qui septimo vitalis quidem, hic primus exit, sed magna ex parte infirmior: idem conscripserat Hip. lib. de septimestri partu, dum dixit, sunt autem ex his septimestribus qui & superstites manent ex multis pauci. Gal. autem quod nouem mensibus perficiatur in vtero foetus 3. de natur. facult. his verbis demonstra- uit asserens, quippe nouem mensibus plerisque mulieribus perficitur in vtero foetus, & 2. de cau. symp. illud confirmauit, cum dixit, sane eadem virtus, quae sic de foetu est sollicita, vt nouem mensium spatio eius sublineat pondus, atque vt absolutus tuto emittatur, prouideat, & cetera: & paulo supra dicebat, quippe qui (de vteris loquens) tum foetus grauitatem, tum sui distensionem nouem mensibus protulerunt, iis absoluto in ipsis foetu ad eius expulsionem se comparant, sic itaque diuersimode sentire videntur de pariendi tempore praecitati magni uiri. Verum si quispiam eorum sententiam, & non verba percipere velit, absque nimio labore conciliari poterunt, ea primo sumpta hypotesi, quae ab eisdem tanquam manifesta admittitur, quod cum adeo perfectus, ac consumatus foetus existit, ut per os nutriri valeat, deficiatq; ei alimentum, ac augmentum, quod a matre suppeditatur, tunc partus naturalis fit, ac naturaliter in lucem editus foetus, huic aliam & secundam hypotesim addas, quod hoc alimentum diuersimode in diuersis vtero gerentibus se habet, si maiorem, vel minorem sufficientiam, aut paucitatem eius considerabis, prout sufficientes, vel paucos menses demittere consueuerunt. similiter & inter se non parum dissident foetus, qui maiores, vel minores cum existant, aut robustiores, vel imbecilliores plurimo, aut pauciori alimento indigeant etiam dum perfecti, ac consumati fuerint. Propterea Hippocrates horum haud ignarus eodem libr. de natura pueri, talia verba protulit, quin- etsi alimentum a matre prius puero defecerit, etiam sic partus matri prius aduenit, & ante decimum mensem puer prodit, & hoc perpetiuntur magis mulieres primiparae, deficit enim pueris alimentum ut ad decimum vsque mensem sufficere non possit, & demum: quae vero menses paucos demittunt, ea etiam pueris postremo tempore vbi iam maturi fuerint alimentum rarius exhibentes ipsos calcitrare faciunt, vt & ante decimum prodire festi-
nent

nent, modicus enim sanguis à iuenculis, ac nouellis matribus procedit. Longissimum itaque terminum naturalis partus conscripsit Hippocrates esse decimum mensem, per hæc verba, atque hæc ut longissime in decem mensibus fiunt, non negans illum posse citius contingere propter iam traditas causas, ut idemmet eodem lib. in citatis verbis scriptum reliquit nec Aristo. Hipp. sententiæ aduersatur: quinimo ipsam confirmauit, dum asseruit, & septimo, & octauo, & nono mense mulieres parere posse, & quod plurimum decimo, (ut ipse inquit) nonnullæ etiam vndecimum tangunt. Plurimum itaque naturalem partum decimo mense contingere fassus est Aristoteles. quemadmodum Hip. scriptum reliquit: non negauit autem, id quod nec Hippoc. negare videtur posse contingere, ac festinare ante decimum mensem, & quandoque vndecimum attingere, pro iam dicta tum foetus, tum alimenti diuersitate, postquam à septimo mense foetus vitalis est, antea vero nequaquam quamuis quædam, quæ longius, quam decem mensium tempus vterum gestare sibi visæ sunt, deceptæ fuerint, modo quo idem Hippocr. citato loco scriptum reliquit: de reliquis vero mensibus lib. de carnibus hunc in modum scripsit, Puer septimestri partu natus pro ratione natus est, & viuit: & demum octimestris autem natus nullus vnquam vixit, nouem vero mensium, & decem dierum partus fit, & viuit: In eadem quoque sententiam deuenit Galen. Nam licet nouem mensibus pariendi tempus præscripserit, illud plerisque mulieribus contingere asseruit, forte qui sic sæpenumero obseruauerit haudquaquam negans in decimo posse euenire, quinimo admittere illud videtur, ex eiusdem Hipp. auctoritate com. aph. 37. 5. libr. ac aliis quoque mensibus pro prædictorum varietate. Consummato itaque, ac perfecto foetu, deficienteq; eidem alimento, ac augmento partus naturalis fit siue nono, siue decimo mense id contingat, quod plurimum obseruatur, ut præcitatis auctoribus visum est, raro autem in aliis temporibus: Cæterum cum adeo miranda pro eius emissionem requirantur, euenit (idque non raro) ut difficulter edatur in lucem foetus, & sic difficilis fiat parientibus partus. Huic difficultati quomodo, & quibus opitulari valeamus conscribere intendimus, prius tamen eius causas indagatis: Est autem partus difficultas symptoma sub genere contentorum immodice contentum; sunt etenim foetus non vtero gerentium partes, sed proportionem respondent iis, quæ adnascuntur, familiarium inquam, quemadmodum, & oua, & fructus, nimirum ut diximus ad generis propagationem à natura creati, ex Galen. testimonio 11. de simpl. medic. facult. & propterea vbi detineantur tempore quo edi in lucem debent, præternaturam detinentur, Consequitur autem hæc eorum præternaturam detentio, aut ad noxam alicuius facultatis naturalis, retentricis inquam, ac expultricis siue ipsius pueri, siue pregnantis: interim vero citra noxam earundem facultatem ad alias consequitur causas, seu præternaturam dispositiones: Vniuersæ autem aut externæ sunt, aut internæ: externæ siquidem quæ partus difficultatem inferunt, sunt aut immodicum frigus, quod vterum densauerit, aut immodicus calor, qui vires dissoluerit, aut quoddam aliud fortuito eueniens, ut liquet ex Paulo, & Aetio. Internæ vero causæ aut vitio parientis, aut foetus, aut membranarum esse possunt, parientis siquidem, ut si crassa, oblesq; sit, vterus exiguus, dolorum imperitia, aut timidiuscula, aut natura imbecillis ut foetus nequeat propellere, aut etiam si ante tempus pariat, vel inflammationem in locis genitalibus, aliave particula fuerit experta, aut alio quodammodo laborans: obceruicis etiam vteri obliquitatem, & ob carnem eidem ceruici, vel osculo eius adnatam, abcessum, vel duritiem: potest & difficultas pariendi contingere: si etiam ossa pubis nimium conferta fuerint, quoniam in partu dilatari non possunt pariendi difficultatem faciunt: similiter si puerpera vesicæ calculo laboret,

Quis affectus sit
partus difficul-
tas,

Cap. de ouis,

Causæ.

Externæ:

Pau. lib. 2. cap.

76

Aet. lib. 16. c.

22

Internæ causæ.

trisariam.

Parientis vitio

causæ.

ret,

Ex parte fetus
causæ.

De Herophilo
uide Pau. li. 7
cap. 76
Gellius li. 10, ca
pi. 2
In fine,

Locis citatis.

Cap. 7.

Loco citato.
Causæ ex parte
membranarum.

cap. 5

Prognostica.

In fine.

Loco citato

Curatio.

ret, vel excrementorum copia in intestino recto, aut vesica fuerit detenta, siue prouecta ætatis fuerit, aut puella nondum virilis, nec vires vigoris adeptæ: nec minus ob nimiam lumborum cavitatem vterum comprimentem difficulter pariet: fœtus quoque vitio hoc idem quandoque contingit, ut si inusitata magnitudinis fuerit, vel exiguus, & modicæ grauitatis, seu magni capitis, vel monstruosus, vel mortuus, aut viuus quidem, sed adeo imbecillis ut foras non possit procedere: similiter si plures fœtus fuerint, Nam Herophilus quinque edidisse mulierem memoriæ predidis, Confirmavit idem Gellii auctoritas, qui diuo Augusto imperante ancillam in agro laurente quinq; pueros peperisse testatur: figura etiam ipsius fœtus naturæ contraria difficile efficit partum, ut si obliquus, aut in pedes procedat, ex Hipp. auctoritate eodem lib. de natura pueri: naturalis siquidem figura prodeuntis fœtus est ut recte in caput manibus ad vtrumque femur extentis prodeat: proxima huic ubi in pedes conuersus est præcipue si manibus super vtroque fœmore extentis prodeat: Reliquæ vero omnes præternaturam sunt, Aetio, & Paulo testibus, ut si caput in dextram, vel sinistra vteri partem declinet, aut altera, aut vtraque manus exeritur, & crura intus inter se diducuntur: aut etiam altero pede intus detento, altero prodeant, aut duplicati vteris innitantur, aut etiam obliqui prodeant, licet hi minus improbandi sint, ut liquet ex eodem Aetio: quapropter diligenter natura prouidit quo pacto fœtus qua conueniebat figura ad collum vteri proueniret: caput etenim eius primum collo matricis indidit, tum per id aliis ipsius partibus viam muniuit, ut liquet 15. de vsu part. procedit autem in caput si secundum naturam prodierit, ut inquit Hipp. quoniam grauissimæ sunt ipsi supernæ partes, si ex vmbilico perpendantur, Atqui si fœtus obliquus, aut transuersus paret egredi, aut si secundum longitudinem quidem, sed non ut nunc scilicet caput, non infereret, quod non nunquam etiam sed raro accidit, vel eius ante caput, vel manum exerens, difficilem aliis membris exitum efficeret, ut eodem 15. de vsu part. à Gal. scriptum est: Difficilis quoque fit partus si secunda, aut propter crassitudinem non obrumpatur, aut propter tenuitatem antequam oportet, diuellatur simul cum aliis membranis fœtum abientibus: siquidem humore euacuato, infans præficcitate egre mouetur, ac per os, & collum vteri difficulter elabitur: humor enim iste, qui in pueri membranis continetur ne dum eisdem lubricandis confert, sed vteri ceruicem id maximam dilatationem reddit facilem: à prædicto nanque humore collum humectatum mollius redditur, dilataturque facilius, eodem Gal. teste citato lib. 15. de vsu part. At licet tot sint pariendi difficultatis causæ haud tamen ægre à medico percipi poterunt: externæ siquidem ex astantium, seu puerperæ sermonibus: Internas vero tum ex se ipsis medici inuestigabunt, tum etiam ex earundem parientium, seu obstetricum loquela: Iure igitur particularem earundem causarum dignotionis modum omisimus: Caterum ex parientibus, ac puerperis maxime laborant primiparæ propter inexperience dorum: & dolent quidem totum corpus, maxime vero lumbos, ac coxendices nam coxendices ipsarum disparantur verum expertæ iam partus minus primiparis dolent, quæ vero multoties perpererunt multo minus dolent, ut inquit Hippoc. eodem lib. de natura pueri. & ubi obliquus, aut in pedes fœtus procedet, ne dum mulier difficulter pariet, sed multæ, vel ipsæ perierunt, vel puer, aut simul matres vna cum fœtibus, ut citato lib. scriptum est. Quod vero mulieri, quæ difficulter parit sternutatio superueniens bonum sit, decretum reliquit idem Hipp. aph. 35. 5. lib. quoniam vehementiori concussu, atque feruore partim quidem naturam excitat, partim vero excernit. quæ partibus corporis firmiter infixæ adherent, ut inquit Gal. in com. Quod autem ad curandi rationem pertinet, variatur quidem iuxta causarum diuersita-

diuersitatem; si speciatim eas curare velis, quanquam quædam sint animaduertenda tanquam omnibus causis communia, quæ primo conscribemus simul etiam & memoriam facientes quorundam medicamentorum, quæ indifferenter omnibus puerperis difficulter patientibus ex quauis causa adhiberi poterunt: primum animaduertendum est quod puerperæ eo tēpore, quo partus instat, non sunt multa alimentorum copia grauandæ, neque varia alimenta, & crebro exhibenda sunt, veluti Neapoli abuti consueuerunt, nedum mulieres, & vetulæ, verum etiam vulgares quidam medici, vt eisdem obsequantur, & quidam quoque non vulgares: distrahitur enim calor pro conficiendis multis, ac diuersis alimentis, & quo etiam tempore coctioni, ac retentioni alimentorum vacat, viriliter expellere nequit, qua facultate, ac functione valida eo tempore patientes indigent: pauca itaque, moderata alimentorum copia tribuatur, sintque concoctu faciles, bonique nutrimenti cibi, vt oua recentia, ac sorbilia, seu tremula, ius pullorum, gallinarum, phasianorum, aut starnarum, quod ex contusis carnibus fit, & vulgus consumatum appellat, vel et eorundem animalium contusa caro, quam idem vulgus tortilium nominat, aut buccellæ panis in vino græco, seu altero odorato vino maceratæ simul cum eodem vino tribuantur: ad hæc permittendum haudquaquam est vt obstetrices difficile parentium uterum diutius dilanient, sed leniter, & placide vteri partes contrectent, dulci interim oleo, aut alio quopiam eosdem locos perfundentes, item non illico parturientes in sella collocandæ sunt, sed obstetrices prius os vteri tangere debent, & cum non paulo apertum inueniunt, sed adeo dehiscens eius modum auctum, quod ad fœtus transitum satis pateat. tunc ut surgat mulier iubere debent, eandemque in subsellio collocare, adhortarique vt ad expellendum fœtum strenue se parent, quemadmodum 3. de natural. facult. a Galen. scriptum est: Spiritum quidem detinentes, verum non velut imperitæ faciunt ipsum in gutture congregare debent, sed ad inferiores partes propulsare, ex decreto Aetii cap. 14. lib. 16. quo tempore vbi partus difficilis sit, corallum, aut lapidem aquile, aut styracem, coriandrum viride, seu polygoni radicem in dextro crure allegare conuenit, Insuper & accipitris, seu falconis stercoreis 3. i. cum vino albo, aut aqua capillorum veneris præbe, vel tantundem cinnamomi, seu casia: Aut hunc in modum puluerem conficias, quo vti consueui, Recipe fimi accipitris 3. i. cinnamomi, casia ana grana vii. croci grana iii. misceantur, & cum paucis vino albo odorato, aqua capillorum ventris, aut florum citrangelorum exhibeatur; Interim quoque myrrhæ, aut castorei 3. s. aut scrup. ii. cum granis iiii. cinnamomi propinabis: Sunt qui trochiscorum e myrrha etiam 3. i. exhibent, insuper & phaseolorum, seu cicerum rubeorum, ac fœnugræci decoctum cum oleo amygdarum dulcium: quod si parum cinnamomi, croci, aut casia, seu alterius prædictorum permisceas, magis confert: Excitare quoque hoc tempore sternutamenta conducit, modo non admodum imbecilli capitis parturientes sint: Suffitus etiam resinæ, aut cumini, aut pinus corticis confert, Hip. auctore lib. de morbis muliebribus: Speciatim autem vbi ex immodico frigore vterum densante, ac coarctante fiat pariendi difficultas, in aere mediocriter calido locanda erit, & in eo gestatione eam mouere conuenit, modo febris, aut aliud quippiam non impederit: Nonnulli etiam conuassationes validas, sternutamantisque ciendis idonea adhibuerunt; Paulo, & Aetio testibus: quibus etiam opem ferre oportet laxationi per infusus calidos. & suffusiones, ac per infusiones oleorum tum actu, tum potentia calidorum: itemque per illinitiones, ac cataplasmata eiusdem generis: quadere infundere oportet largiter oleum dulce & calidum: item decoctum fœnugræci, aut maluarum, vel seminis lini, deinde & pubem etiam cum abdomine, & lumbis eiusdem medicamentis illinire, aut ali-

Primum documentum.

Secundum documentum.

Cap. 5

Lib. primo. circa medium.

Si ex immodico frigore fiat partus difficultas, curatio.

Si ex immodico calore fiat, curatio.

si ob alias causas ex parte parturientis fiat partus difficultas curatio.

si ex parte fœtus, fiat curatio,

Alio alio relaxante medicamento ut hydreleo & aliis huiusmodi: eadē quoque laxamenta adhibenda sunt à balneis si non febris, aut aliud quidpiam prohibuerit, ex eorundem auctorum testimonio: Si vero ob calorem immodicum veres exoluentem pariendi difficultas excitetur, condensantibus, ac maxime astringentibus, & firmitatem inducentibus eam roborare oportet: qualia sunt insersiones ac infersiones ex myrto, pampipinis vitis, malis punicis, aut rosis: nec minus odoramenta fiant ex aqua rosacea, myrtillorum, & nymphaeae cum aceto, addendo si lubet parum sandalorum, & corallorum rubeorum. Conuenit quoque unguentum ex vino, & oleo rosaceo frigidis, ut inquit Aetius: nec minus cibis, & potionibus refocillanda erit facilis coctionis, multi nutrimenti, ac modicæ quantitatis, permixtis semper quibusdam astringentibus, ut cidoniis, malis punicis, ac reliquis huiusmodi. Insuper buccellæ panis vino imbutæ ad arcendum animi deliquium eisdem offerantur, in aereque parum frigidiori degant: timidis autem, ac puellis mentis robur admoendum, quemadmodum eis, quæ inexpertes dolorum sunt ut validissime spiritum comprimare, & ad inguina depellant, admonendum est: At si imbecillæ sint mulieres parturientes ex morbo, temperamento, vel ætate prouectæ, eisdem cibis boni nutrimenti, ac potibus reficiendæ sunt: Quod si ob lumborum cauitatem, aut propter nimiam pinguedinem pariendi difficultas contigerit puerpera in sella prona flexis genibus collocetur, seu in lectulo ut vterus delabens ceruicē rectam extendat, atque idem è directo ostioli habeatur quod quidem ceratis oleis, ad pinguedinem delinire digito oportet, & sensim aperire: idem quoque vteri osculum, ubi clausum permanferit, pinguibus medicamentis emolliatur, ac relaxetur: Si vesicæ calculus affuerit, cum primo propellere oportet, & si eadem lotio plena fuerit, idem educendum: Similiter si intestinum rectum excrementis plenum fuerit, per clysterem mollem, & leniendi vim habentem eluamus: At si ob inflammationem, abscessum vlcus, tumorem laxum, aut durum, seu ob carnem collo vteri adnatam, aut aliquam aliam tunicam, vel ob quempiam alium morbum parturiendi difficultas eueniat, singulis pro affectionum ratione succurrendum est: & si eiusdem vteri paruitas in causa fuerit, loca pinguedine aliqua inungantur, ac foueantur, & os vteri digitis dilatetur: Quæ vero non vtero gerentis vitio, sed ipsius fœtus difficultatis pariendi causa sunt, hoc modo corrigendæ erunt, Nam si propter fœtus imbecillitatem, aut paruitatem id contingat, hortandæ sunt mulieres, ut strenue mediis abdominis musculis eundem fœtum contendunt expellere: At si propter ipsius fœtus figuram præter naturam, partus difficultas adfit, ad naturalem situm reducendus est, quantum eius fieri potest, partim pellendo, partim adducendo, partim flectendo, & partim in rectum agendo ut inquit Paulus. Et si manum, vel pedem præmiserit ne attrahatur per munerum, nam magis impigitur, aut luxatur, aut etiam abrumpitur, verum digitis humero fœtus, vel coxæ affixis rursus in conuenientem locum introducatur, id quod iam præmissum est: Si vero vna cum fœtus figura mala os vteri compressum, seu coarctatum fuerit, prius ab osculo vteri in sublime eleuetur fœtus, & postea rursus ad osculum recta dirigatur, fiantque omnia placide, leuiter, ac citra compressionem oleo assidue locis affuso: hoc etenim ex salute tum fœtus tum parientis fuerit, & vterus ita quoque illæsus manet Vbi vero infans præmagnus fuerit, aut totus, aut ob capitis, seu thoracis, aut ventris magnitudinem, Ea adhibenda sunt tum intus, tum extra quæ laxare, ac dilatare os vteri possunt, Verum ubi nec sic procedat, aut etiam infans mortuus fuerit, modo spes sit salutis vtero gerentis, omnino necessarium est fœtum secare, ex communi sententia tum Aetii, tum Pauli, modum autem sectionis reperies apud Paulum lib. 6. cap. 74. & ab Aetio conscriptum capit.

23. lib. 16. At si gemini foetus fuerint, aut terni, ac collum vteri obfederint, aut etiam plures, reliqui ad fundum vteri repellantur, & is, qui magis paratus videbitur prius educatur: sensim autem, & citra contusionem omnia fiant oleo locis perunctis, vt idem Paulus refert: Si vero ex parte membranarum contingat pariendi difficultas, vbi secunda folior, ac crassior fuerit, quam vt rumpi possit, discindatur, inquit Aetius, Verum si propter tunicarum tenuitatem, in quibus humor continetur, difficilis fiat partus, propterea quod humor in membranis contentus ante debitum tempus effluxerit, ita vt vteri sint resicati, eis albumia ouorum cum malua, aut foenugræci decocto excolato, aut cū ptisanæ cremore tepido infundantur, decreto eiusdem Aetij.

Ex parte membranarum si fiat difficultas partus curatio.

περί χωρίων Εκκλυσσεως.

id est de secunda derelicta.

Cap. 115.

DUm foetus vtero adhuc geritur ipsum natura conformans, machinata quoque est loco, per quæ alimentum, ac spiritum posset à matre suscipere, & reliqua quoque eiusdem foetus extremitatis idonea comparauit: etenim toti ipsi membrana tenuis undique est circumiecta quæ *ἡμνω*, i. amiculum appellant, foetus velut sudorem excipiens: huic extrinsecus tenuior alia incumbit, quam *ἡλαντοειδής*, id est intestinale nuncupant, in ipsius vesica perforata, quæ & hæc in se ipsa colligit vsque ad partum ipsum velut foetus lotium: His autem extrinsecus in orbem altera membrana circumiecta est totum vterum intrinsecus subiungens, qua media foetus vtero connectitur, Nam in singulis orificiis vasorum, quæ intrinsecus in vterum pertinent, per quæ etiam sanguis menstruus ipsum ferebatur (quo tempore vtero geritur) aliud vasas gignitur, arteria quidem in arteriæ, vena vero in venæ orificia, vt sint ea, quæ generantur numero æqualia iis orificiis, quæ intro in vterum deflunt; colligat autem ea membrana hæc, tenuius quidem, sed fortis ita vt simul & munimentum, & ligamentum eorum sit tum inter se tum cum vtero. & quoniam exiguum est vasorum quoque cum primum ab vtero exoritur, cuiusmodi sunt arboris radices extremæ in terram defixæ, ad tamen paululum progressæ per coniugationem coalescunt, ita vt ex duobus vnum procreetur, rursusque illorum singula cum singulis eiusdem generis coalescunt, fitque id perpetua quod parua omnia in duo magna coeant, quæ velut stipites quidam foetui per locum vmbilici inferuntur: quatuor itaque omnino hæc vasa sunt, duæ scilicet, arteriæ, & totidem venæ nullis diuersi generis inter se commixtis, sed venis quidem semper cum venis, arteriis cum arteriis in idem coeuntibus: per quæ vasa, velut per truncos quosdam foetus ex vtero sanguinem, ac spiritum trahit. Verum inter hæc omnia, & vasa exigua quæ dicta sunt, media est iam dicta membrana, quæ velut truncorum radicatio existit, quæ radicatio à græcis *χωρίων* nuncupatur, quod nihil aliud est, quam vasorum multitudo membrana tenui connexorum, quæ haud facile numerare queas, Galen. auctore 15. de vsu part. Interim *δευτερον*, seu *δολτεριον* appellant, vt liquet com. aph. 49. 5. libr. à Galen. & cap. 75. libr. 6. a Paulo, latini secundam, & secundas nominare solent: sic quidem appellata, quod velut secundum domicilium, ac receptaculum sit ab vtero, & velut foetus indumentum, vt inquit Aetius cap. 24. lib. 16. Hæc secunda quoniam ex vmbilico pueri hæret, & vmbilicus postremus ex uteris exit, Nanque si prior exiret non accideret per ipsum puero nutrimentum, quoniam ex ipso depender, Hipp. auctore lib. primo de morbis mulieribus propterea foetu excusso foras prodire debet in naturali, partu sed quoniam contingit interdum, vt foetu in lucem edito ipsa præter naturam detineatur, quo modo huic retentioni succurrere

χωρίων seu secunda quid sit.

27. de vsu part. c. 5.

Vnde nomen sumpserit.

In medio.

Pars affecta. oportet hoc cap. instituere intendimus: Porro quod in eius detentione vterus quodammodo afficiatur, & quod eadem detenta morbus sit in numero, atque in excessu, nemini in dubium venit, detinetur autem aut propterea quod fundo vteri adhuc conuexa est, aut licet seiuncta fuerit, tamen circa aliquam vteri partem instar pilæ conuoluta est, vel propterea quod os vteri clausum sit, ita ut foras prodire non valeat: quomocunque tandem ipsa detineantur, non statim, ac violenter extrahenda est, neque eius eductio par- uifacienda, seu negligenda erit, Nam cum diu detinetur cerebro, cordi, ac stomacho nocumenta haud exigua comunicat prauis vaporibus ex ea ele- uatis, & ad iam dictas partes traductis: confestim itaque sternutatio excite- tur, & spiritus detineatur, ac os & nares obturentur, Hipp. præcepto aph. 49. 5. lib. presertim si imbecillæ mulieres non fuerint: quod si nec sic exciderit, sed adhuc remanserit vbi vteri os clausum non sit, si eadem secunda instar pilæ circa aliquam vteri partem constiterit, sinistram manum calidam, oleoq; inunctam, seu pinguidine quadam pinguefactam in vteri profundum immi- ttere oportet, & arreptam secundam leniter extrahere, quemadmodum Ae- tio & Paulo præcitat is locis visum est. Verum si vteri fundo connexa fuerit, similiter quidem manus obstetricis immittenda est, at apprehensam secun- dam non statim rectâ trahere conuenit propter vteri prolapsus timorem, neque violenter admodum, sed sensim primum nulla violentia adhibita in obliquum placide ducenda erit, huc illuc eam circumagens, deinde paulò valentius, etenim sic obediet & à conexu dissoluetur: quod si vteri os con- tinere fuerit deprehensum, remediis ad hoc commemoratis præcedenti cap. vtendum est; Et vbi vires non fuerit inualidæ, etiam quæ sternutamen- ta prouocant, adhibenda sunt. Quare perfusionibus pinguibus vtemur, & per sinistræ manus digitos os vteri clausum leniter aperire, ac paulatim dila- tare conabimur. Quod si neque sic successerit, rursus vteri perfundendi sunt, ac pingua fomenta eisdem adhibere conuenit: nec non superiorem ventrem ex cruda hordeacea farina, aqua calida, ac olei subacta integre, ex sententia Aetii. Similiter & portionibus mensis cientibus, de quibus supra egimus vta- re: Suffitus insuper adhibeantur per aromata, qualia sunt casia, nardus flos iunci odorati, arthemisia, sabina, dictamum, pulegium, & huiusmodi, Cui mulier infideat vndique vestimentis contexta: postea vero si vteri osculum apertum inuentum sit: iterum manus immittenda erit, & sicut dictum est, edu- cere conabitur, Si vero neque sic educta fuerit, eadem dilaceranda non erit, ne- que perturbari oportet, intra paucos enim dies putrefacta, & in saniem disso- luta ex cidet: quia vero hoc tempore grauitate odoris, & caput opplet, & sto- machum peruertit, suffitus conuenientes excitabuntur: inter quos prævalent cardamomum, & ficus aridæ, ex Pauli testimonio: Ad hunc etiam vsum pro- bata sunt bdellium, sabina, thus, styrax, lapis gagates, vnguis odoratus, ladanū, & reliqua, que cum hoc quod odorata sunt, ac prædictis malis aduersantur, se- cundam subducunt: quibus etiam castorei, ac pulegii, singulorum 3. i. ex aqua malsa bibenda detur ex eiusdem Aetii decreto: insuper & omnia conueniunt mensis ducentia, veluti arthemisiæ decoctum, & reliqua: pessi etiam subdi- ri ad hoc faciunt, presertim ex myrrha, & cyclamino, a dipe anseris, saccharo, oleoque irino confecti.

απει' q' λ' γ' μ' ν' s' v' t' e' p' a' s' . De vteri inflammatione. Cap. 116.

signa inflamma-
ti vteri.

Velut & reliquæ corporis partes, ita quoque vterus interdum inflam- matione laborat, de qua (quoniam sexcenties verba fecimus) non opus erit hic fimbrias dilatando eadem sæpius repetere, sed ad partis affectæ dignotionē accedentes dicimus vterū inflammatione affectum deprehen-

deprehendi ex ardenti dolore muliebrium locorum, pubis, imi uentris, ac lumborum, ut liquet ex Aetio cap. 83. libr. 16. Et si digitus (ut ipse inquit) in os uteri, submittatur, occurrit ad contactum durum, clausum, feruens, ac retractum, praesertim si in ipso, aut in collo fuerit inflammatio, Nam licet oris compressio commune sit signum conceptionis, & tumoris praeter naturam, id tamen ex duritie distinguitur, ut patet ab Hippocr. & Gale. apho. 51. & 54. 5. lib. molle siquidem est grauidis, & secundum naturam durum vero in quibus tumor praeternaturam adest: At si non vniuersus uterus, sed pars eiusdem aliqua inflammatione fuerit obfessa, in ea magis dolor intenditur, & sentitur, Nam si posteriora eius inflammatione laborant, dolor lumbos affligit, ac spinam magis, & stercus recto intestino (compressio eo) retinebitur: Anteriora autem parte inflammata, dolor pubem occupabit, & stillicidium, aut urinae difficultas (pressio vesicae) excitabitur; Lateribus vero uteri inflammationem expertis, linguina tenduntur, & crura grauantur, ac egre mouentur, & quibusdam eius ipsum, quod e ratione est, per incessum claudicat: quem etiam in coxam dolor transit, eiusdem quoque partis dolor cum grauitate non nihil significare potest, Gal. teste 6. de loc. affect. Et ubi cauitas, seu fundum uteri fuerit inflammatum, in umbilico potissimum dolor cum tumore infestabit. ut ne contactum quidem foris admittat: cum autem os uteri inflammatio affligit, in abdomine dolor est, digitoque immisso, os occurrit durum, ac rigidum, ut diximus, plerumque etiam uterus in eam partem declinat, ac retrahitur, qua inflammatus est, & ob eam causam os, & collum eius auertitur, Comitantur autem uteri inflammationem, praeter iam dicta rumor, ac dolor eiusdem haud validus, si languida fuerit inflammatio, vehemens vero, ubi valida fuerit, eritque is dolor, quem percipiunt egrotantes pulsatis, Paulo teste, secundum vniuersum uterum ubi totus fuerit inflammatus, aut secundum partem, si pars ipsius fuerit affecta: febris item acuta consequitur, dolor capitis tendinum, basis oculorum, brachialis, digitorum, & colli conuulsio, inclinatio in aduersum, stomachi etiam ex consortio dolor, pulsus exigui, & crebri, ex eiusdem Pauli testimonio, eadem praesertim inualescente, ac augegente. & ubi magis augeatur, consequuntur animi deliquium, exolutio, singultus, pedum torpor, genuum perfrigeratio, & extremarum partium exudatio, urinaeque ac stercoreumcrementa supprimuntur, delirant, & dentibus frendent egrotantes, febres magis augentur, & capitis dolores, praesertim syncipitis, ut ab Hippo. & Gal. 6. de morb. vulg. scriptum est, Nam cum inter omnes corporis partes plurimas, grandissimasque venas uteri habeant, phlegmone utrumque ipsis orta, calidas vehemensque febres accendi opus est, adeo ut inter synchorum species connumerandae sint, cum ex putrido sanguine excitentur, ex quibus calentium vaporum copia ad caput subuolat, quo dictorum vaporum pleno grauitates, & maxime in syncipite hominem vexant, tum quoniam recta in synciput per infundibulum arteriae deducuntur, per quas calidi illi vapores ascendunt, tum quod etiam sanitatis tempore tenuia, & halitiosa excrementa cerebri maxime per synciput diffusi solent, cum in ipso future laxissime sint, caluaria subtilissima, plurimisque meatibus peruiia: ad haec & multa sensibilia corpora praefuturas euadunt, tum membranam, quae crassum inuolucrum pericranio connectum, tum etiam multitudo tenuium conceptaculorum praefuturas exiliunt, & propterea cum sensibilior sit locus hic, ab inferentibus dolorem causis magis cruciatur, His itaque de causis in syncipite magis dolores fiunt, ex Gale. sententia eodem 6. de morb. vulg. Inflammatione vero in abscessum transeunte, dictae quidem notae intensiores erunt, dolores etiam circa puris generationem ipsis augentur, ac febres, quae cum humore plerumque ad vesperam ingruunt, ac inordinate accessiones ipsae

Posterioris uteri patris inflammatione signa.
Anterioris signa.
Signa, si latera fuerint inflammata.

Cap 5
Si uteri cauitas fuerit inflammata signa.
Signa oris uteri inflammationis.

Reliqua inflammationis uteri signa.
Lib. 3. c. 64

Auge scientie inflammationis signa.

Comentario 1.
eommento 1.
Cur in his dolor capitis in syncipiti sentiantur.

Loco citato.
signa eiusdem inflammationis in abscessum transeuntis.

si in scirrhum
permutetur di-
gna.

Causæ externæ

Internæ.

Prognostica.

Com. 20
Curatio.

Ratio iustus.

6 de morb. vul.
cōmentatio 4.
com. 17. ante
med.

Venæ sectio.

Dubium de ve-
næ sectione.
Cap. 18.

sis obueniunt, primis quidem temporibus intensè cum doloribus; ad ultimū, ubi suppurauerit, aliquantulum remittunt, ut inquit Paulus cap. 6. lib. 3. Tumor attollitur, dolor punctorius adest, aliquando vrina, aliquando stercoreiscrementa supprimuntur, aut vtraque simul, Aetio teste, alias tumor in pube eminet, & veluti exundationis sensus cum abscessus maior fuerit, ut liquet ex eodem Paulo. Cum vero neque ipsa inflammatio soluta est, neque in abscessum transmutata, adhuc perseverans in scirrhī naturam permutabitur, idque percipies. Nam febris, ac dolor, & reliqua leuiora symptoma remittuntur tumore tamen, & renitentia permanentibus cum grauitate, & egro motu non solum crurum, sed totius corporis, ac segnitie ad omnes vitæ functiones, ut liquet ex eisdem Aetio, & Paulo. Cæterum huius inflammationis causæ nonnullæ esse poterunt externæ, simulatque internæ: externæ quidem velut ictus, siue percussio, multitudo coitus, abortus, atque sinistre editus foris, durioris sellæ infessus, longa, intentaque ambulatio: flatus etiam, atque frigiditas vterum astringentes adeo ut transpirationem prohibeant, inflammationis auctores esse poterunt: Internæ vero, ut mensium suppressio, & totius corporis plenitudo, ac eiusdem vteri exulceratio, quas omnes haud magno negotio partim ex te ipso, partim etiam ex ægre, aut astantium loquela percipere poteris: Deterior autem inflammatio ea est quæ plures vteri partes occupat, quàm quæ pauciores, similiter quæ os, aut ceruicem fatigat, minus periculosa existit, quàm ea, quæ fundum, seu cavitatem, quoniam promptius curationem admittit: si vero vtero gerenti erysipelas vtero fiat, letale est, inquit Hip. aph. 43. lib. 5. quanquam de vera inflammatione proprie dicta dubitet Galen. num foetus possit aliquando viuere, id quod negari haudquaquam debet eadem exigua existente, ex qua nedum maligna, verum etiā nec acuta febris gignitur necessario, etiam si in iocinore, ventriculo, aut septo transuerso orta sit, ut liquet ex Gal. 2. prorrhetic. Ex erysipelate autem semper acuta febris generatur, & sæpenumero maligna. In principio itaque curationem agresi egram in domicilio obscuro, & moderate tepido collocabimus: somnus moderatus præcipiatur, nam & vigilæ etiam conferunt in principio magis quàm somnus, prohibent enim phlegmonem augeri cum in visceribus generatur, ut patet 6 de morb. vulg. & com. aphori. primi. 2. lib. quætem quoque imperabimus, omnem crurum motum interdicentes: alui excrementa si non natura, molli infuso clystere euacuabimus: immodicos animi affectus vitent: A cibo per triduum abstineant, ut inquit Paulus: deinde aut pane loto, aut præsana seu eius cremore egra alatur, aut etiam alternis diebus ouis forbilibus vtatur: In potum vero aquam hordei, aut seminum coriandrorum preparatorum decoctum, seu ipsammet aquam modice calidam dabimus. A uino autem abstinendum est, deinde artus, seu extremas corporis partes, manuum præsertim, auersionis gratia perfricabimus, At si vehementior inflammatio fuerit, & neque vires, aut ætas, aut habitus, seu anni tempus obstiterint neque inflammatio post abortum, aut nimiam sanguinis euacuationem superuenerit, confestim circa initia cubiti uena secetur, ex Aetii, & Pauli decreto, & sanguis pro virium ratione detrahatur. Licebit autem, ut inquit Aetius, in secunda die uenam incidere, in tertia vero detractionem repetere. Atqui mox obicit quispiam asserens Galenum aliter sentire de sectione venæ pro curatione inflammationis uteri, nam libr. de curandi rat. per venæ sectionem postquam nonnullas partes enarrauerat quæ ex sectione venæ cubiti iuuabantur, hæc protulit verba, (sic quæ his inferiores sunt illis, quæ per poplites, & malleolos decurrunt, sunt autem dictis inferiores coxendix, vterus, vesica) & paulo post (porro uteri inflammationes magis quàm renes a venis in crure sectis iuuantur) idem confirmauit 13 meth.

meth.med. Cum dixit, Renibus vero, & vesica, pudendo; & vtero sic habentibus eas, quæ in cruribus sunt sitæ, ac potissimum quæ circa poplitem sunt; sin minus eas, quæ iuxta malleolum, ac perpetuo quidem in omnibus eam, quæ è directo est. Verum si quis prædicta loca optime perlegerit, luce clarius percipiet Gal. præcitatæ locis venæ sectionem precipere pro euacuatione, indicatione sumpta a parte affecta; aut pro euacuatione cum deriuatione, eius, quod in parte inflammata continetur, & non pro auersione eius, quod influit, quod quidem in inflammatione, quæ adhuc in generatione exilit, prius exequendum est per contrarias, atque longinquissimas partes, vt eodem 13. metho.med. ab eo decretum est, Qua propter si reuulsionis duntaxat gratia uenam secemus, nemini in dubium venit secandam esse cubiti venam eaq; internam; & è directo, vt Aetius, & Paulus præcipiunt: At si euacuationem simul cum deriuatione requirimus, crurum venę secandæ erunt. Id quod decretum reliquit idem Gal. 1. de arte curatiua ad Glauconem his verbis. Veluti in locis muliebribus in contrarium trahes, si eas, quę in cubito sunt secaueris venas, aut mamillis cucurbitas apposueris, vel manus concalefeceris, & fricueris; atque alligaueris: deriuabis autem, si eas, quę, poplitibus, aut talis venas diuideris, & cucurbitas coxis applicaueris, crura calefeceris, atque perfricueris, & alligaueris: & siquidem in parte dextra locorum passio fuerit, à dextra manu, aut cruce sanguinem detrahes, si vero in sinistra à membris, quæ illi è directo sunt: Circa initia itaque cum vteri inflammatio adhuc sit magna eadem existente, viribusq; non admodum valentibus, ita vt exquiram venę sectionem ferre non possint, reuulsionis duntaxat gratia, interna cubiti vena secanda erit, & demum si opus fuerit, quæ in talo existit incidatur pro deriuatione simul cum euacuatione: exigua vero existente inflammatione, valentibus viribus, potissimū vbi corpus totum plenum non fuerit & inflammatio iam facta, sit tali vena incidatur, & si opus est, eadem iteretur rectitudinem perpetuo seruantes. Quod si Gale. fateatur magis vteri inflammationes à venis in crure sectis iuuari illud haudquaquam negandum, cum per eam venę sectionem nedum deriuatio, sed euacuatio sanguinis in parte inflāmata existentis perficiatur: secta vero in cubito vena, reuulsio duntaxat eius, quod influit ad inflammatam partem fit, efficiturque confluentis sanguinis inhibitiō, quod in phlegmones generatione primo exequendum esse censeat Galen. eodem 13. method. meden. quamuis eius curationi minis conferat, cum nihil ex parte inflammata detrahatur, & menstrues purgationes comprimat A venę sectione si eadem inflammatio erysipelate præsertim participet, vbi quodammodo mitior fuerit reddita (non autem circa initia) leni quadam purgatione vti conuenit, etiam pro deriuatione perficienda, vt casia fistula melle aereo, saccharo violaceo, & reliquis huiusmodi, quibus etiam parum diacath. adicere poteris, dein imo ventri, ac pubi, & lumbis forus irrigationes, seu epithemata ex vino, & oleo, aut vino, & oleo rosaceo, seu aceto, & rosaceo cum linteis lineis adhibeantur tepida, Similiter palmulæ, aut mala cytonia, in vino, aut in posca cocta, oleo cytoniorum, aut rosaceo admixto imponantur, & vbi hæc non suffecerint cataplasmata applicentur ex farina hordei, seminum lini, & fœnugræci, vitellis ouorum affatis cum rosaceo, & decocto capitum papaueris, & meliloti, ac exiguo vino seu aceto compositis, aut etiam ex palmulis vino diluto decoctis cum farina hordei, & oleo rosaceo, seu cydoniorum cataplasma fiat: At si erysipelatis naturam participauerit, quod ex igneo calore percipies, intubum, & umbilicum veneris, sedum, polygonum, portulacam plantaginem ac uitis pampinos cataplasmati apponito. Quod si cataplasmatum onus loci non tolerent aqua rosacea admixta ex modicis interuallis affundatur: Hoc

Cap. 11. circa
finem.

Resolutio.

Cap. 12.

Cap. 20.

Cap. 6
Altorum medi
camentorum ra
tio.

Purgatio.

Topica.

etiam tempore in pudendum subdatur aliquis prædictarum herbarum succus: Pessi item figurêtur ex prædictarum herbarum foliis contusis, aut succis, rosaceo, melino, aut lenriscino, ouorum vitellis crudis, siue aslaris, anseris pinguedine, & exiguo croco: admodum tamen viles ad sedandos inflammationis dolores vteri pessi tales sunt, fœnugræcum madefacito, & prima, ac secunda aqua diffusa cum tertia pura, ac dulci coquito, & excolato, Ad decoctum autem adipem anserinum, vel gallinaceum recentem addito, & ad prunas liquari finito: Et vbi frigefacta fuerint, concretum adipem tollito, ac seruato, & vsus tempore pello excipito, ac subdito, vt inquit Aetius, At vbi dolor multus ex cruciat lachrymæ papaueris exiguum cum lacte muliebri, & succo fœnugræci apponendum exhibeto, & per totum etiam morbi decursum ex Pauli sententia: etiam infessus viles sunt ex decocto fœnugræci, seminum lini maluarum, arthemisiæ, & olei præcipue post principium: In iis autem, quæ calorem non sustinent, & maxime circa initia ex aqua modica calida rosata superfuso infessus fiant: Postquam autem inflammatio declinare inceperit, ad ea deueniendum est, quæ laxare, ac discutere possunt, proinde in fœnugræci, althæe, seminum lini interdum etiam pulegii, marrubii, saluiæ & arthemisiæ decocto ægra infideat, & ad imum ventrem, ac pubem, vt inquit Aetius farinam hordeaceam cum fœnugræco, & lini semine in aquam mulsa coctam imponat, aut caricarum decoctum adhibeat, ac pessi etiam subdantur si calorem ferre possint ex œsypo, butyro, medulla ceruicæ, adipe, anserino, oleo anethino, chamæmelino, seu irino, & cera compositi: Cæterum butyrum, medullam, & adipem omnia recentia ad pessos deligas, etenim antiqua dum liquantur, nidorosa fiunt, ac calidiora euadunt, & in inflammationes exacuunt, vt liquet ex eodem Aetio. Illud item animaduertendum ex præcepto eiusdem, quod nec in distensionibus, neque in inflammationibus vteri menses prouocandi sunt etenim loci magis distenduntur, & cum ob inflammationem cōclusi sint, sanguinis transitum impediunt: Vbi vero curatio processerit, tenuis victus, & ciborum parsimonia tollatur, & manifesta iam facta declinatione, balneum ac vinum concedi possunt, & cibi resicientes exhiberi, quemadmodum ab eodem Aetio scriptum est: Si vero inflammatio discuti non potest, sed ad suppurationem vergat, suppurationi auxilium ferendum est, itaque imo ventri, ac lumbis cataplasmata imponantur ex lini semine, fœnugræco, farina hordei, caricis decoctis, althææ radice, ac terebinthina. quo etiam tempore pudendi sinus per spongiam assidue foueatur, & vapores per arundinem operculo ollæ perforato insertem intra pudendum recipiantur: Demum infusiones frequentes fiant decoctis in aqua his quæ vim attractoriam habent, velut est pulegium; marrubium, laurus; saluiæ, arthemisiæ, dictamnium, centaurium, Item pessuli indantur ex terebinthina, myrrha, œsypo, anseris pinguedine, & butyro compositi, aliquando etiam columbinum stercus cum oleo, & melle pro cataplasmate adhibebimus: Disrupto autem abscessu, quibus medicamentis vtendum sit sequenti cap. docebimus, At si non in abscessum, ac suppurationem inflammatio transeat, sed ad puritatem vergat emollientibus pugnandum est medicamentis, tum intus, tum extra adhibitis, quorum syluam reperies cap. de scirrho cum lienis, tum iocinoris.

ἡ ἀπὸ τῆς ἐνδομήτρου ὕψης.

id est de exulceratione uteri. Cap. 117.

Exulcerati uteri lingua,

NON raro etiam contingit vterum exulcerari, dignosces autem ipsum esse exulceratum quoniam ægre in affecta parte dolorem punctorium percipiunt, & interuallis fœtidi, ac saniosi humores ab vlcere sordido prodeunt, & consequuntur etiam alia vtero affecto peculiaria symptoma

ta,

ra, velut est capitis, ac præsertim syncipitis dolor, vt præcedenti cap. adnotauimus, Item dolor ligamentorum, & radicis oculorum, qui ad manus vsque ad digitos se extendit, & reliqua supra de inflammatione relata, ex Aetii testimonio cap. 88. libr. 16. Quod si prompta inconspicuum exulceratio venerit, specillo oriculario deprehenditur, in profundo vtero reconditum humores, qui excernuntur, indicant, nanque diuersus pro vlceris diuersitate excernitur humor, quoniam eo inflammato paucus, cruentus, ac feculentus cum magno dolore euacuabitur: At si, ordidum extiterit copiosior humor, & sanies cum minori cruciatu profluit: Depascens vero si fuerit fatidus, niger, cum doloribus vehementibus, ac aliis inflammationis signis aderit, Præterea quæ laxant medicamenta hoc irritant, contraria leniunt; Cui autem parum fuerit vlchus, humor paucis, æqualis, crassus candidus, minime foetidus excernetur, vt testatur Paulus cap. 66. lib. 3. Cæterum non vnā duntaxat habet sue originis causam, Nam quandoque vteri exulceratio ab acerbis medicamentis, interim ob partus difficultatem foetu exausso, aut corrupto ortum habet; non raro autem ex disrupto abscessu, aut fluxione erodentium succorum generationem habet, velut idem Paulus, & Aetius testantur: singulas autem iam dictas causas, ex loquela, vel earundem ægrotantium, uel assistentium percipies, partim etiam ex te ipso ea, quæ præcesserunt, & quæ comitantur considerans, Nullum vero vteri vlcus contemnendum est, sed quam primum fieri potest curandum. Nam cum totius corporis recrementa excipiat, atque nervosæ substantiæ sit vterus, haud facile curationem admittunt eius vlcera, præsertim cum diuturna fiunt, quanquam ex eis, quæ in conspectum veniunt promptius, quàm quæ in profundo sunt recondita, & quæ pura, aut etiam sordida existunt facilius, quam depascentia medicamentis cedant. Si itaque ex redundantibus vitiosis, ac erodentibus succis exulceratio vteri fuerit orta, purgantibus medicamentis prius vtendum erit, præsertim cum alteri, concocti, ac præparati fuerint qui redundant humores: Et deinceps ad vlceris curationem confugiendum. Ea autem victus ratio instituitur, ac eadem exhibeantur medicamenta, quæ in reliquis exulcerationibus renum potissimum, & vesicæ à nobis fuere conscripta. Quantum vero ad topica medicamenta spectat, si purum fuerit vlcus, leuiter astringentibus, atque exiccantibus medicamentis vtendum erit: quod vbi conspicuum fuerit eisdem illinatur vlcus, Si vero profundum existat, infundere ea oportet per instrumentum ad hoc appositum, quare rosaceum, aut tetrapharmacum cum butyro recenti, ac rosaceo infundatur: Eluantur item loci: rosarum, aut lentium decocto, aut ptisanæ, seu plantaginis succo: præstabit etiam portulacæ, aut polygoni decoctum cum rosaceo: Si vero cum inflammatione vlcus compositum sit, iis primo, vtendum est, quæ ad illam præcedenti cap. conscripsimus, & deinceps ad adhibeantur, quæ modo annotauimus, Verum vbi sordidum fuerit vteri vlcus, detergentibus medicamentis vtendum erit, veluti est ptisanæ cremor cum melle, vel mulsæ, in qua foenugræcum sit decoctum aut malua, aut fursures, aut lenticula, cui cortex sit detractus, ex Pauli testimonio: & si validioribus detergentibus indigebis, etiam marrubium, aut eruum, vel melli adiuncta erui farina, vel iris, aut alumen rotundum, vel aliquid simile iniiciatur, quæ etiam extrinsecus ex mulsæ macerata illinuntur, ut liquet ex eodem Paulo: Vtendum est etiam ad sordida vteri vlcera eo medicamento, quod ex melle, terebinthina, rosaceo, & butyro constat, quibus aliqui etiam parum croci addunt: Ad eadem quoque repurganda efficax est & iris illyrica cum melle imposita, & aristolochiæ decoctum per se, vel cum melle infusum, vt inquit Aetius. Vlcere vero depascente robustiora, astringentiaq; medicamenta adhibenda sunt, veluti ex baccarum myrti, palmularum,

Causæ,

Prognostica,

Curatione,

Purgatio,

Topica,

Vbi sordidum fuerit vlcus, curatione.

Depascentis ulceris curatio,

rum, lentium, & malicorij decoctum si infundatur: Fomenta quoque & infusiones ex aqua mulsa fiant, in qua absynthium, marrubium, eruum, centaureum, aut lentes sint decoctæ: Loci item ptisanæ succo eluantur addito melle, & rosaceo ex eodem Aetio liquet: Paulus vero præter hæc decoctum rosarum, cupressi, summitatis oleæ, malorum cotoneorum, rubi, lentisci fruticis, rhus coriarii ex vino astringente commendat, & post hæc aluminis quoque, acaciæ, licij, & hypocistidis, ex quibus etiam decoctis infusus parari poterunt, eodem auctore. Verum ubi nedum depascentia, sed asserata quodammodo vlcera fuerint, equino, aut asinino lacte recens multo eleuantur, & in vtriusque penuria quodcunque haberi potest recens coctum accipiat: duabus autem lactis heminis, mellis hemina dimidia addenda est, & iiii. iridis 3. inspergendæ, & tale infusum calidum sæpe singulis diebus infundendum erit: Idem facit aqua mulsa, in qua absynthium, aut calamus aromaticus, aut leucanthemum, vel chamæmelum, seu buphtalmum decoctum sit: & ubi quod infusum est, fuerit excretum, loci protinus malux decocto eluantur, deinde pessus subdatur ex farinæ erui, & iridis singulorum 3. ii. cum melle subactis, aut etiam farinam lentium cum melle subdes, seu oleæ folia cum vino trita, & melle admixto: nec minus & vuarum passarum carnes tritas cum melle subdito, ex sententia eiusdem Aetii: Vbi vero depascentia, ac asseritas fuerint cohibita, ea adhibeantur, quæ paulo ante ad vlcera repurgata relata sunt: Cibus quoque dandus boni succi, modicus: balneorum, ciborumque varietate ægrotaans sollicitari, vinoque refici debet, quo caro statim procreetur, ex Pauli sententia: deinceps his, quæ ad cicatricem perducunt, primo mitioribus, deinde efficacioribus vtendum est, etiam de foris adhibitis, ab domini videlicet, ac coxis, Nam quemadmodum cataplasmatum, ita etiam emplastrorum facultas per latentes meatus traducitur, vt idem inquit Paulus, Inter quæ magnopere ab Aetio commendatur ceratum hoc, quod recipit ceræ albæ quadrantem, rosacei optimi dodrantem, ad prunas liquefacito, & quadrantem refrigerato, deinde in mortarium conuicito, ac lacte mulieris, aut asinino, aut caprino recens multo affuso cum pistilo subigito, donec totum in albescat, deinde diffuso priore lacte nouum infundito, ac rursus subigito, ac & croci circiter 3. i. admisceto, quod si magis mitigatorium facere volueris, rosacei septuncem, adipis anseris, & medullæ eiusdem singulorum vnc. i. accipito: Potes etiam & pro rosaceo melinum admiscere. Hoc etiam vnguento ad hunc etiam vsum vtare, Recipe tutiæ ablutæ partes ij. lithargyrii, cerusæ, & sarcollæ, singulorum partem. i. cum oleo rosaceo, & cera fiat vnguentum, cui etiam adipis anseris, & croci parum admiscere poteris, Interim etiam, & plumbum vsum, & pro rosaceo melinum, aut myrteum admisceto.

περὶ ἰσχυρίδος. de ischiade, seu coxendicum dolore.

Cap. 118.

Articulus quid sit.

In præfatione.

Consequens est postquam de internarum partium affectibus sermonem absoluiamus, de quibusdam, qui extremas, seu externas partes occupant, verba faciamus, quanquam in eis pars, quæ afficitur (cum sensui subiiciatur) haud ægre percipi possit, præsertim si articulos obderint. Nam de his pertractare intēdimus, quoniam extremæ partes corporis articulis inter se conferuntur, vt inquit Celsus cap. 22. libr. 4. per articulum intelligentes nos quod a græcis ἀρθρον dicitur: est autem articulus Galen. auctore lib. de ossibus, naturalis ossium compositio (veluti & naturalis eorundem vino σύνφυσσις appellantur) tam si de articulationem, quàm si coarticulationem articulus significet, Hæc nanque pro motus quantitate desinent, Cū

dear-

de articulatione sit ossium structura, quorum motus evidens est: Coarticulatio vero ossium composita est, quæ neque validum, neque manifestum, sed obscurum, difficilemque habet motum. Omnem igitur naturalem ossium structuram, compositionem, siue coherentiam articulum nuncupamus, De quorum affectibus sermonem facturi ab eo exordiemur, qui ἰσχιον nuncupatum articulum cruciare solet à græcis ἰσχίαι, velur & qui eo affectu laboranti ἰσχιᾶδινος nuncupantur, barbaram sectantes medicinam sciaticam & sciaticos vocant: latine vero etiam Ischias, & qui eo affliguntur ischiadici nuncupari possunt, poterit etiam & coxendicum dolor, seu morbus dici. Nam plinius articulum hunc coxendicem nominavit, in quo ossis femoris caput cum coxendice esse appellato, aligatur, atque dearticulatur. Inditum siquidem nomen huic affectioni est à parte oblæsa, ex Galen. testimonio 2. meth. med. quemadmodum etiam si pedum articulis vitium adsit ποδάγρα, & si cunctis, aut plurimis corporis articulis ἀρθρίτις nuncupatur: sunt etenim tum ischias, tum podagra ex arthritidis genere, ut 10. de compositione medicamentorum secundum locos à Gal. scriptum est, affectis locis duntaxat differentes. Habent autem communem hi tres affectus humoris redundantiam, quæ affectam occupat coarticulationem, qua expleta in omnem partem circumsitam nervosæ particulæ tenduntur, & ex his dolor oritur, neque enim nervos, per quos motus dispensatur voluntarius primario affectu fluxio infestat, quoniam artuum prius internodia obli dere ea necesse est: afficiuntur tamen iidem nervi lege confortii, quod cum articulis ineunt: seu per consensum, ut liquet ex Paulo cap. 78. lib. 3. quare si ad inferiores partes facta fluxio pedum articulos repleat, podagra vitium nuncupabitur, si cæteros corporis artus, arthritidis, seu articularis affectio nuncupabitur, ut diximus. Id vero bifariam contingit. Nam vel multi corporis articuli afficiuntur, vel singuli, quando proprie arthritidis seu articularis affectio nominatur, Cæterum incipit plerunque podagræ generatio ex vno articulo & paulatim ad genera procedit, progrediturque in omnes malum temporis diuturnitate accedente, quanquam aliquando repente irruat equaliter per omnes articulos dispersum, At quod in omnibus articulis arthritidis est, hoc in vno iuxta coxendicum Ischiada, & coxendicum vitium appellant, quod dolor est haudquaquam exiguus circa eum articulum, quem græci ἰσχιον vocant ab aliqua fluxione ortum, symptoma existens, ut ea. de dolore cap. determinauimus, & non morbus neque inflammatio. Nam licet fluxione ischii articulatio impleatur, propter quod, & quæ ipsis circumiacent ligamenta extendi est necessarium, non tamen verisimile est nervos, & chordas inflammati, sed solum dolore, quoniam simul cum articulatione extenduntur, argumento est, quoniam nunquam visus est podagricus (ut Galen. inquit com. aph. 49. 6. libr.) pati conuulsionem, quæ frequenter solet in nervorum, ac chorda eum inflammationibus aduenire. Pari quoque ratione neque in coxendicum dolore easdem partes inflammati fatendum erit, neque etiam articulum, qui primam suscipit fluxionem, nam ipse (& non spatia vacua, quæ inter prima sunt corpora) fluxionem suscipit, quanquam intentio sanationis huius affectus communis sit cum omnibus inflammatione laborantibus, ut liquet ab eodem Gal. ibidem, Verum si quis velit fluxionem hanc in articulum decumbentem inflammatione nominare, & sic fateri morbum esse, non reclamabimus: Sequitur autem dolor hic tum ad inæqualem intemperiem ipsius articulationis & partium circumiacentium, tum etiam & præcipue ad earundem extensionem, seu continui solutiones, qui dolor à naribus inguinibusque ad genera usque, In plurimis autem ad summum usque pedem pertinet, ut refert Paulus cap. 77. libr. 3. Actius vero Archigenis auctoritate cap. 1. lib. 12. inquit, quod antecedit, & quasi auspicatur hoc multum, aliquando

Ischias seu coxendicum dolor.

Plinius lib. 20. cap. 3. & 9. & alibi.

cap. 2. Quibus communice, & differat a podagra, & arthritide, Cap. 2.

Quid sit ischias seu coxendicum dolor. Vide supra ca. 10. Quis affectus præter naturam sit.

10. de com. med. sec. loc. c. 2.

Signa, do

do quidem vicinorum musculorum dolore, & maxime lumborum, aliquando vero ab ipsa iunctura initium fit affectionis, iam vero quandoque contingit, ut articuli dolore fere sublato circa poplitem afflictio hæreat, aliis autem iuxta talum, quibusdam vero totum crus æqualiter dolore affligitur: multis item circa inguina dolor fingitur, quo fit ut urinae difficultatem inducat, & tunc maxime totum crus a coxendicibus usque ad calcaneum dolorem perfert; non parum autem adiuuant huius affectionis generationem assidua cruditates, immodicus rei venereæ usus, aliquando etiam deambulationes concitiores, hæmorrhoides suppressæ, & vomendi consuetudo intermissa, exercitiorum contemptus, & purgationes menstruæ, aut etiam aliæ familiares excretiones impediæ, ex eiusdem Aetii auctoritate, quæ omnia humorum redundantiam efficiunt diuersam in diuersis corporibus, & propterea quâdoque irruens ad coxendicem humor sanguineus est, ut plurimum vero pituitosus, aut ex pituitoso, & bilioso mixtus, Interim etiam sanguine cum ipsis permixto, quanquam id sit commune podagræ etiam, & arthritidi, ut eodem loco de compositio. medica. secundum locos a Gale. scriptum est, ut plurimum autem diximus pituitosum humorem prædominari in hisce affectionibus, eum proprie, qui crudus appellatur, crassus existens ad similitudinem puris crassioris, & ubi in ipsis articulis diutius moram traxerit, non solum crassior, sed & viscosior redditur, & qui tophi, seu calli appellantur, eorum generatio ex huiusmodi humoribus fit, cognitio vero ipsorum humorum redundantiam ex coloribus tum symptomatis coincidentibus, itemque per experientiam pharmacorum, quæ adhibentur, haberi facile poterit, ut liquet a Galen. ibidem; ad cuius etiam humoris noxii cognitionem non parum confert tibi prægræssa victus ratio, siue per essercitia, siue per otium transmissa, & per balneum post & ante cibum acceptum. Conferet etiam & gymnasiorum, & eduliorum tum quantitas, tum qualitas, item anni tempus, & regionis, ac aeris constitutio, Insuperque & ætas, & habitus corporis, & reliqua huiusmodi, insuper & doloris species siue feruens, & pungens, siue stupidus fuerit, Nam ubi biliosus sanguis in causa fuerit, caliditatis sensum egroto exhibet, calor corporis flauus, rufus, seu pallidus, & calfacientibus impositis exacerbatur dolor, quemadmodum rursus a frigidis relaxatur, & quæ præcessit victus ratio, ac cuncta, quæ dinumerauimus ad generandam bilem apta fuere: Pari etiam ratione si sanguineus humor, aut pituitosus redundarit, prompte percipi poterit, si cuncta, quæ supra meminimus rite considerabis, Illud tamen animaduertendum ex Gal. decreto eodem 10. de compositione medicamentorum secundum locos, quod ubi tophi, seu calli ex humoribus crassis, ac viscidis, qui in articulis diutius moram traxerint, fuerint producti, haudquaquam sperandum est ad pristinam constitutionem exacte redire articulum posse, Cæterum quod quibuscunque a longo coxendicum dolore molestatis cavitae sua excidit coxa, & rursus recidit, iis mucroes superueniant, & quod eisdem crus tabescat, & claudicent si non vrantur, ab Hippo. apho. 59. & 60. 6. libr. scriptum est, quod vero raro fiat coxendicum dolor ex sanguinis multitudine, & si fiat citissime curetur, a Gal. decretum est eodem 10. de compositione medicamentorum secundum locos. quod autem coxarum ingens dolor esse consuevit, isque hominem sepe debilitat, & quosdam non dimittit, eodem loco a Celso scriptum est. Pro ischiadis itaque curatione aer eligatur ad siccum vergens, in calido, & frigido temperatus, vel parum etiam ad calidum declinas, pro diuersitate redundantis succi, somno moderato utantur, aut consueto parciori: Circa initia corpore non euacuato quies eligatur, temporis autem processu deambulationibus, assiduis flexibus, & moderato cursu uti conuenit: aluum autem quotidie probe solutam habere præstat, si

Causæ,

Loco citato,

Cap. 2

Prognostica,
Cap. citato,

Loco citato,

Curatio,

si non natura, arte saltem, premuntur etenim, & aggrauantur articuli coxendicum maxime vbi ipsa sit adstricta, Vitanda venus est, & ab animi affectibus immodicis cauendi sunt: Cibus sit mediocriter tenuis, modicus, ac concoctu facilis haudquaquam humidior potissimum in primis morbi diebus, deinceps vero solidior sit, & reparandis viribus magis accomodatus, habeatque interim acrium eduliorum comestiones quasdam adiunctas, quorum sylvam sepe conscripsimus, Perpetuo tamen bonæ coctioni consulendum, ita vt cibi nihil viscosum, aut crassi succi, aut agre concoctile, seu quod difficulter digeratur in seipsis complectantur, etsi caro exhibeatur, sit paucarum superfluitatum, vt montanarum auium, & syluestrium quadrupedum, Potus sit aqua malsa, aut aqua in qua cinnamomi parum fuerit decoctum, à vino penitus abstineant, affectus ratione: Quo ad medicamentorum autem rationem attinet initium curationis fiat ab affligentis humoris euacuatione, siquidem si humoribus ex æquo redundarit corpus, Venæ sectio primum omnium assumatur, deinde purgatio, quibus accedat pharmacorum dicendorum conueniens (& tempore, & ordine) vsus, vt præcitatæ locis liquet à Galen. & Aetio, Verum quanquam à sanguinis multitudine coxendicum dolorem obortum venæ sectio curet, ex qua tamen vena sanguis minuendus sit, in dubium venit, nam lib. de cur. rat. per venæ sectionem Gal. coxendicum iuuari sectans vena proplitis aut malleolorum confessus est, & eodem lib. dicebat, Memini me ischiadas, siue coxendicum dolorem vno die facta ex crure euacuatione curasse, nimirum vbi non ex frigore, sed impletis sanguine, quæ in coxa sunt venis, prouenissent. quare secta in poplite vena commodios ita affectis est, quam in malleolo: idem confirmat 10. de compositione medicamentorum secundum locos quanquam eodem lib. post pauca sic scripserit, Tanquam igitur maximam vim ad affectionis curationem habeat totius corporis euacuatio, ab ipsa exordium est, non solum à cautibus, sed etiam à cubito primum sanguinis detractione facta. Hanc sententiam sectatus Aetius, hunc in modum scriptum reliquit, A multitudine itaque sanguinis coxendicum dolorem obortum venæ sectio curat, si primum cubiti venam secemus, deinde etiam eam, quæ iuxta talus est, aut poplitem. & causam reddens, statim subdit, In principio enim omnium inflammationum diuulsoriam venæ sectionem facere oportet, In affectionibus vero iam inueteratis maximam quidem ex ipsis locis affectis extrahemus, aut si id fieri non possit ex vicinibus: quanquam hæc eadem verba à Gal. transcripserit libr. de cur. rat. per venæ sectionem & propterea Paulus id etiam perpendens eodem capitu. 77. 3. libr. (per initia igitur dicebat ægro nobis oblato, fœcibus clystere euacuatis, vena in cubito secanda. si autem vetustas vitium occupauerit ex malleolo partis affectæ imminutionem sanguinis moliemur: facta itaque ex crure venæ sectione, inueteratas siquidem ischiadas, seu coxendicum dolorem robustisq; corporibus, quibus non multa admodum sanguinis copia redundabat in toto corpore, sed impletis sanguine, quæ in coxa sunt, venis duntaxat, vno die curauit Gal. quare & nos eundem sectantes easdem venas incidere debemus, Vbi dolor fuerit inueteratus quodammodo, & vires ferant sanguinis missionem copiosam, & corpus totum haudquaquam fuerit multo sanguine refertum, sed quæ in coxa sunt venæ sanguine impletæ fuerint (Nam per hanc venæ sectionem fit euacuatio sanguinis in venis coxendicum contenti cum deriuatione) quo fit vt necessario citissime per eam coxendicum dolor curetur, Verum in recenti dolore, viribus haudquaquam robustis, adeo vt exquisitam venæ sectionem ferre non possint, refertumque sit totum corpus multo sanguine, in cubito primum vena secanda erit, reuulsionis duntaxat gratia, & deinceps à crurum venis sanguis mittendus, iuxta Gal. sententiam

Ratio uictus,

Medicamentorum ratio.
Venæ sectio.
sanguine redundante,Quæ uena secanda sit.
cap. 18

cap. 2.

cap. 19.

Lib. de cur. rat.
per uenæ sect.
Cap. 18.

Cap. 2

eodem

Purgatio.

Clysteres.

Quæ animad-
uertenda sunt
circa localia
medicamenta.

Cap. citato.

Quibus medica-
mentis utendū.

eodem 10. de comp. medic. secund. locos, quam sententiam omnino seſtatus eſt Aetius, & Paulus quodammodo, vt diximus, Suppoſuit etenim Gale. hoc loco vniuerſum corpus humoribus ex æquo redundare, quæadmodum etiã & Aetius: miſſo ſanguine, vbi adhuc dolor perſeuerauerit purgatione vtare, ex eiufdem Gal. auctoritate, Verum (vt ipſe inquit) auxiliantur ipſis iſchiadicis vomitus magiſquam euacuationes infernæ per ventrem, vt qui reuellant deorſum repentem humorem: faciendi itaque ſunt vomitus in principio ab accepto cibo, poſtea vero etiã per vomitoria medicamenta initio a mediocribus facti: At ſi neque per vomitum coxendicum dolor auferatur, aut corpora ad eum inepta fuerint, amplius non confluentibus humoribus, aut parum, purgatione per inferiorem ventrem vtinon inconuenit, præſertim ſi tum ſanguine bilioſus etiã ſuccus redundarit, neque id negauit Gal. quãquam vomitum tanquam magis commodum commedauit, propterea quod reuellat, fiat autem ea per familiaria medicamenta purgantia, veluti eſt hiera, agaricum, diacath. ſyr. ex pluribus infuſionibus roſarum, myrobalani, & reliqua huiusmodi, Conſert quoque hoc tempore clyſteribus vti paulo efficacioribus, fiat decoctum ex foliis maluarum, betæ, mercurialis ana manip. i. furfuris, & florum chamæmeli ana pugil. s. caricarum numero vi. ſalis communis 3. ii. cui adiciantur olei communis, anethini, vel chamæmelini vnc. iiii. mellis roſacei, ſeu mellis deſpumati vnc. ii. s. diacath. & ieræ picræ ſimplicis ana vnc. s. fiat clyſter, interim 3. i. vel ſcrup. iiii. agarici etiã permiſcebis: deinceps ad topica medicamenta conſugien dum eſt. id primo animaduertēs q̃ licet manibus, & pedibus pharmacis fluxionem repellentibus vt poſſumus, ut ſequenti cap. docebimus, circa coxendicum tamen iuncturam id facere omnino vitandum eſt, Nam cum in profundo ea ſita ſit, ſanguis ex vicinis, & ambientibus vafiſ, ac muſculis ad illam compellitur, vt liquet ex eodem Gal. citato lib. 10. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. Item ex præcepto eiufdem eodem loco, cauendum eſt ne quiſpiam ante totius corporis euacuationem (præſertim ſi coxendicum dolor ex humorum copia fuerit exortus) acris pharmacis circa partem affectam vtatur, Nam egre curabilem reddet affectionem copia nimirum indiſſolubiliter ibidem condensata, præter alia enim & craſſa, & uiſcoſa ſit ob calorem, & ſiccitatem acrium pharmacorum, non diſſimile quidpiam aſſationi perpetiens, quare mitigatoriis in principio medicamenti opus eſt in dolore circa coxendicem herente, quæ neque refrigerent multum, neque fortiter calfaciant, qualibus ſane poſtea opus habet, Exacerbantur enim per ipſam fluxiones, caliditate nimirum plus attrahentes ipſas, quàm impediende (eodem Gale. teſte ibidē) Irrigandi itaq; loci ſunt ex oleo chamæmelino, anethino, liliaceo, irino, ſeu etiã nardino, & rutaceo, vel rutam, chamæpitryn, ſaluiam, chamæmeli flores, ac althææ folia, ac radices decoque in oleo communi, demum exiguo adiecto vino, vel aceto albo cum ſpongiis, ſeu lineis, vel laneis linteis ſæpius loci foueantur, & deinde aliquo prædictorum oleorum irrigentur, aut ex contuſis foliis, & radicibus althææ, ſambuci, ac rutæ, farina fœnugræci, ſeminis lini, adipe anſerino, ac butyro, & oleo chamæmelino, ſeu anethino cum poſca cataplaſma fiat & adhibeatur: Poterunt quoque ſorus fieri ex decocto foliorum, & fruſtuum iuniperi, radicum althææ, meliloti, & chamæmeli in vino albo, quibus ſæpius iteratis loci abſtergantur, & aliquo dictorum oleorum, ſeu aliquibus ſimul mixtis iidem irritentur, perpetuo tamen primum mitioribus, & demum efficacioribus vtare: ſacculi item ex friſtio milio, ſale, & furfure, præter id, quod dolorem mitigant, leuiter doloris cauſam diſcutiunt calfacti, in calido latere, pauco vino irrorato, & ſæpius adhibiti: & vbi vehemens fuerit dolor papaue-

ris calices in aqua mulsa decoquito, ipsisque proiectis farinam hordeaceam aqua mulsa imponito, ac coquito: Si autem coxendicus dolor ex irruente pituitoso humore generetur, (velut plurimum contingit) aut ex eodem cum bilioso permixto, circa initia quoque reuulsionis gratia in cubite secta vena confert, seruata rectitudine, potissimum si tum eo etiam sanguinis fuerit permixtus. Procedente vero tempore, vel vbi idem pituitosus humor crassior, ac viscosior fuerit citra sanguinis missionē, an per vomitum purgatione prius vtare, nedum ab accepto cibo, verum etiam per vomitoria sumpta medicamenta à mediocribus semper initio facto, veluti est acetum, syr. acetosus, postea oxymel simplex, aut scyllinum cum aqua tepida. At quibus insuetus ac valde molestus vomitus fuerit, aut etiam vbi vomitus non suffecerit, purgantia per inferiorem ventrem medicamenta exhibenda sunt, primo tamen per clysteres, & deinceps per ea, quæ per os exhibentur: fiant autem clysteres hoc modo, Recipe foliorum maluarum, mercurialis. & betæ ana manipulum. i. centaurii minoris, florum chamæmeli, singul. manipulum .s. caricarum numero. vi. furfuris pugillum .i. s. fiat decoctum cum pauco sale communi, cui adde olei communis, vel chamæmelini, anethini, rutacei, liliaceo, aut irini vnc. iiii. mellis rosacei, aut mellis despumati vnc. ii. s. confectionis de dactylis, hieræ picræ simplicis, aut diacath. 3. iiii. fiat clyster, & si efficaciori indigebis chamæpytim, rutam, centaurium maius, saluiam; ac stæcadem in decocto adice, & demum agaricum, hieram picram compositam, compositionē indi, ac quam benedictam appellant, permisceto sunt qui etiam efficacioribus clysteribus vtuntur, potissimum vbi vehementer humores densati fuerint, decocto vtentes iupinorum amarorum, colocynthidis, radicis, cucumeris syluestris salforum piscium, & oliuarum colymbadum muria, & reliquis huiusmodi, à quibus abstinendum esse quoad fieri potest censere, nobilioribus præsertim corporibus, Conflueuerunt enim maximo cum dolore periculosam dysenteriam efficere, sed potius, ac tutius purgantia per os assumenda medicamenta præbeantur, prius tamen humoribus ipsis concoctis ac præparatis eis melle rosaceo, seu oxymelite simplici, vel scyllino, syr. è stæcade, & reliqua huiusmodi. Commendantur etenim purgantia medicamenta ad hunc vsu Paulo, & Aetio, Paretur autem medicamentum purgans hunc in modum, Recipe corticum myrobalanorum chebularum 3. iiii. cicrinarum 3. ii. polypodii, & agarici, singul. 3. i. fiat arte decoctum, cui per collum transfuso adde electuarii rosati, aut confectionis de dactylis 3. ii. s. vel. iiii. syr. ex pluribus infusionibus rosarum vnc. ii. fiat potio: & vbi crassior, ac tenacior fuerit redundans humor pituitosus, catapotii vtere foetidis, aut de sagapeno, eorundem accipiens 3. i. cum altera trochiscati agarici, & cum melle rosaceo, aut oxymelite catapotia formentur, seu pulueris hieræ simplicis 3. i. & scrup. iiii. agarici trochiscati excipe oximelite, & similiter catapotia formato; à quorum assumptione, per aliquod tempus decoctum 3. iiii. seu iiii. myrobalanorum chebularum, in quo 3. ii. vel vnc. iiii. syr. ex pluribus infusionibus rosarum rubearum fuerint dissolutæ, assumant & vbi opus fuerit tam vomitus, quam ea, quæ hic conscripsimus, medicamenta purgantia, ac clysteres bis, ac ter, & sæpius iterari poterunt. Deinceps vero irrigandi sunt affecti loci oleo rutaceo, costino, nardino, vulpino de castoreo, ac etiam de piperibus, & pyrethro, vbi adeo efficacioribus indigebis, & vt penitus eorum facultas traducatur, aceti, seu vini albi parum permisceto, Vel hoc vnguento vtare, quod recipit cremoris seminum maluarum, & althææ, cuiuslibet 3. iiii. farinæ fœnugræci, seminis lini vtriusque vnc. s. adipis anseris, & suilli, singu. 3. iiii. olei rutacei, & chamæmelini ana unc. i. s. ceræ, & aceti parum fiat vnguentum, Vel fœnugræcum

Si ex pituitoso humore fiat coxendicum dolor, curatio. Venę sectio, Vomitus.

Purgatio.

Clysteres.

Purgantium medicamentorum descriptio.

Topica.

Vnguenta.

cum in vas fictile coniecito, & ad ipsum poscam sufficientem affundito, & prunis impositum donec dissoluatur, coquito, ad dissolutum vero mellis, quod satis est iniice, ac rursus coque, deinde exempta diligenter tere, & in linteolum infarcta locis affectis impone, hoc aurem fiat ad biduum, & tri-
 duum: symphyti quoque libr. i. s. rasam, & minutim concisam, ac in mortariū coniectam diligenter tertio, ac attritam mannæ thuris quadrantem, & ouorū recentium crudorum candida vna cum luteis tria adiecito, & rursus, tertio, & ubi unita fuerint adipis suilli veteris libr. i. adiecito, & conquassata diligen-
 ter, atque in linteolum infarcta imposito, ex Gal. sententia, Asclepiadis au-
 thoritate, eodem ro. de compositione medicamentorum secundum locos, qui etiam ex Andromachi monumentis hoc medicamentum commendauit, quod recipit picis partes. ii. sulphuris uiui partem .i. vtraque trita mixta do-
 lenti loco imposito, & sinere eum oportet donec sua sponte dilabatur, pote-
 rit quoque picis pars vna recipi, modo sciamus efficacius esse medicamentum si pari mensura misceantur, debilius vero, in quo duplum picis ad simplum sulphuris coniecitur, Valebis etiam cataplasma componere ex foliis althææ, saluæ, rutæ, ac sambuci leuiter decoctis, ac contusis, singul. P. s. capiens, qui-
 bus olei irini. de castoreo, ac anethini ana vnc. i. adiciatur, cremoris seminis lini, & fœnugræci ana. vnc. ii. farinæ loliaceæ, & lupinorum, cuiuslibet vnc. i. & cum posca quantum satis sit, fiat cataplasma, quibus vt efficacius red datur
 adiaci poterunt ebuli radix, lauri folia, pulegium, fauina, oleum de piperibus de castoreo, costinum aut nardinum, galbani quoque, aut ammoniaci parum Vel in formam emplastri, redigito in hunc modum, Recipe succi foliorum rutæ, sambuci, & calaminthæ ana vnc. i. bdelli, opopanacis, ammoniaci disso-
 luti in aceto, cuiuslibet, vnc. s. myrrhæ, & resinæ terebinthinæ ana 3. iiii. cre-
 moris seminis althææ, seminis lini, fœnugræci ana vnc. i. s. farinæ hordei, fa-
 barum, & lupinorum ana 3. vii. picis, & ceræ quantum satis sit, fiat emplastrū, Poterunt insuper ex eisdem fomenta parari, vt Recipe radicū, & foliorum ebuli, & althææ ana manipulum. i. foliorum rutæ, fauinæ, sambuci, & pulegii. singul. manip. florum chamæmeli, fœnugræci, & meliloti, cuiuslibet pugil-
 lis. decoquantur arte in tribus partibus olei, & vna vini albi, & cum sponsia in eodem decocto madefacta dolentibus locis iterum, atquæ iterum applicetur, post quæ iidem loci aliquo ex iam dictis vnguento irrigentur. Paulus vero lupinorum amarorum farinam cum oxymelite, aut calaminthæ folia ex oxymelite, vel aqua mulsæ admouenda commendat. At si ne hæc quidē pro-
 fecerint, adeo vt morbus infestare nō desierit, congruum erit ad sinapismos, atque vrentium medicamentorum vsum deuenire, & ex pauli sententia sina-
 pi cum caricis, vel etiam per se illitum confert, Vel hunc in modum sinapismum conficito, Recipe seminis sinapis in aceto fortissimo macerati vnc. ii. caricarum vnc. iiii. stercoris columbini in vino albo decocti vnc. iiii. mellis anacardini vnc. i. misceantur, & fiat sinapismus: vel accipe cantaridū alis abie-
 ctis 3. ii. staphis agriæ 3. iiii. cum fermento, & aceto fiat medicamentum, & vta-
 re: Postremo autem tam Paulus, quam Aetius iberidis herbæ vsum extol-
 lunt, tanquam in totum ischiadior sanitati restitutionem, cuius radicē assump-
 tam diligenter tundito, & suilla axungia ueteri modica excipito, adeo vt emplastri speciem repræsentet, & exinde linteolo densiori illitum locis ma-
 xime dolentibus imponatur, ac incumbere finito, mulieribus quidem non infra duas horas, viris autem per quatuor horarum spatium si possibile sit id perferre, excitat enim tumores cum ardore, & rubore, veluti sinapismus fa-
 cere solet, post vero ægrum in balneum inducito, atque reliqua exequari prout iidem præcipiunt, Nanque consuevit hoc præsidium nullo alio au-
 xilio

Cap. 2.

Cataplasmata,

Emplastræ,

Fomenta,

Sinapismi, ac
alia vrentia me-
dicamenta,Paul. li. 3. c. 77.
Aet. lib. 12. c. 2
Iberidis usus,

xilio opus habere. Quod si tamen aliquando vestigium affectionis relinquitur, viginti diebus interpositis, rursus eodem præsidio utare. Ex Damocratis tamen auctoritate Gal. huius iberidis, vsus ac modum vsus eodem 10. de compositione medic. secundum locos ante Aetium, & Paulum scriptum reliquit, nec cecidit ea, quæ Archigenes 2. lib. pharmacorum secundum genera de ea conscripsit: Porro si igne sub genu externa in parte inustio fiat, diuturnis coxendiculi doloribus valde conferet.

Cap. 2

Cauterium cum igne.

πρὸς τὴν ποδάγραν καὶ τὴν ἀρθρίτιδα.

id est de podagra & arthritide seu morbo articulari.

Cap. 119.

QUONIAM podagra non toto genere, (ut dictum est) sed affectis dumtaxat locis differt ab arthritide; Namque in ambobus affectibus imbecillitas adest articularum diuturna cum fluxione, ut Aetio visum est cap. 6. lib. 12. eundemque requirunt curationis modum, propterea vno capite de ambabus affectionibus pertractare proposuimus. Cæterum uterque affectus ab oblecta parte denominatus est, ut liquet ex Gal. 2. metho. med. Nam si ad inferiores partes facta fuerit fluxio, & pedum articulos repleuerit, podagra vitium nuncupabitur: Si vero in multis corporis articulis innititur, aut per omnes æqualiter articulos fluxio dispergatur ἀρθρίτις græci, nos articulare morbum appellare consueuimus, ex eiusdem Aetii testimonio, neque enim quemlibet articularum difficilem motum, seu dolorem Arthritida, seu articulare morbum modo nominamus, sed eum dumtaxat, qui ex eorundem articularum imbecillitate, ac humorum influxu ortum habet. cum autem excitatus fuerit articularum dolor ex aliqua immodica intemperantia, potissimum sicca, ut liquet ab Hippo. aphor. 16. libr. 3. affectum hunc haudquaquam arthritida nuncupabimus, nisi improprie, eodem Gal. teste com. citati aphor. Accedit ad hæc quoniam, omnes, qui articulari morbo laborant magna ex parte prius podagrici fiunt, communemque habent hi duo affectus in simul cum ischiade humoris redundantiam, quæ affectam occupat articulationem, quem admodum ex eodem Gal. liquet com. aph. 28. 6. lib. & 10. de compositione medicamentorum secundum locos. Quare si podagra fieri nequit ex imbecillitate articularum sola, sed humorum influxum etiam requirit, neque etiam & articularis morbus: Non sola itaque particularum corporis imbecillitas articulares, podagricos cruciatus excitat, sic etenim accessiones sine ullo temporis intervallo vrgerent, Cum nativa imbecillitas continuo existat: atqui datur podagricis tempus accessionum intermedium; item ne humor quidem solus hos dolores creat, quandoquidem non solum vitium hoc articulis insidet, verum ambo, & humor à natura alienus, & particularum imbecillitas morbum afferunt articulare, ac podagram, Paulo teste cap. 78. lib. 3. Id quod decreuit cum erat à Gal. citato com. aph. 28. 6. lib. Liquet igitur ex his podagram nihil aliud esse, quàm articularum pedum dolorem à fluxione quapiam ortum: articularis morbus nonnullorum articularum, aut omnium æqualiter dolor existit ab eadem etiam fluxione ortus. Denique excipiantur dolores his, qui in quibusvis articulis fuerint orti citra fluxionem, Nam neque podagra, si pedum articuli fuerint affecti, neque articularis morbus, si cæteri totius corporis articuli fuerint oblecti proprie appellari poterunt, ut supra demonstraui, neque etiam generari poterunt, si humor quispiam non influxerit, ex sententia eiusdem Gal. citato com. aphor. 28. 6. libr. Quapropter neque de eis verba faciemus.

Cap. præcedenti.

Podagræ, & arthritidis convenientia, & differentia.

Cap. 2

Loco citato.

Que necessario requirantur, pro Arthritidis, ac podagræ generatione. 10. de com. me. sec. loc. c. 2

Podagra quid sit, Quid arthritidis.

Affectus præter naturam qui sunt.

N n mus.

Causæ.

Externæ causæ

Multo post me-
dium.

Lib. 3, c. 78.

Lib. 12, c. 7

Causæ internæ.

Si ex sanguine
sunt signa

mus. Hos affectus si tanquā dolores considerabis symptomata esse haudquaquam formidabis, veluti & reliquos dolores omnes: At si fluxionem inspicias ob quam articulationes implentur, ac ea, quæ ipsis circumiacent, extenduntur hos affectus morbos appellare non inconuenit, inflammationes inquam quemadmodum Hippo. nominauit aphorif. 49. 6. lib. licet improprie, & non vere articulorum dolores, quicunque fuerint etiam ex fluxione orti, inflammationes appellari possint, vt cuiuslibet (quem nō præterit inflammationis generationis modus, & qui Galen. verba commen. citati aphorif. 49. 6. lib. optime perlegerit) patere potest. At quicquid sit de horum affectuum qualitate, postea quam gigni non possunt nisi articulorum imbecillitas ad sit, & humores superabundauerint, ac adeos defluerint, decens est annuere, ac fateri cuncta quæ imbecillos reddere articulos valent, ac superfluitates in corpore generare esse tum podagræ, tum articularis morbi. causas. Sunt autem hæc aut extrinsecus occurrentes, aut internæ euidentes quidem, externe, seu manifestæ, vt nimium ocium, seu desidiosa, vita multorum alimentorum esus, seu crapulæ, potus multorum, ac fortium vinorum præcipue cum aliquis ea ieiunus potauerit, & in summa cruditates, atque ebrietates, ac veneris vsus immoderatus: Incidunt autem & plerique in eosdem affectus, propterea quod patres, & auos habuere podagricos, aut arthriticos, in quibus semen erat vitiatum atq; ideo posteris vehementiorem fecerunt partium imbecillitatem, vt eodem com. aphorif. 28. 6. lib. à Galen. scriptum est excernitur nanque Hippocra. auctore lib. de aere, regione, & aquis, semen genitale ab omnibus corporis membris, à sanis quidem sanum, & à morbidis morbosum; magnam tamen vim habet ad podagræ generationem vsus venereorum, vt ex eodem Galen. liquet comm. aphorif. 30. eiusdem 6. lib. Cæterum hæc vitia (vt inquit Paulus) frequenter antecedit improbus labor, vehemens ambulatio, creber equitatus, intempestiuus vsus veneris, insueta frigida potio, frigidorum, vel multorum, ac noxiorum ciborum esus. mœrores, curæ, vigiliæ, & reliquæ animi affectiones. iam aliqui (vt ipse fatetur) prolapsu, deturbatione, vel propulso, luxatione, vel id genus aliis originem huius affectionis traxerunt: Actius deambulationes concitiores quàm pro more, & familiares excretiones suppressas, ac consuetorum exercitiorum intermissiones inter vniuersales causas harum affectionum connumerauerit, licet suppressæ consuetæ excretiones inter internas causas dinumerentur, redduntque corpus superfluitatibus plenum: Interna autem causa esse potest quæuis humoris redundantia, quoniā & hoc sæpius diximus commune existit cuius articulorum dolor: At externas, euidentesque causas ex ægrotantium, aut assidentium sermone facile percipies: Internæ vero ex earūdem propriis indiciis facile deprehenduntur, Nam affligentium humorum differentia tum ex coloribus, cum symptomatis coincidentibus, itemque per experientiam pharmacorum, quæ adhibentur, deprehendi poterunt: ad quarum etiam exactam cognitionem non parum confert si prægressa victus ratio intelligatur, & reliqua, que præcedenti cap. ad notauimus. Ad vberiore vero doctrinam hic quoq; particulariter conscribemus signa cuiuslibet redundantis humoris podagræ: seu articulare morbum efficientis, Nam si sanguineus humor redundet, plenitudinem efficit, & tumorem ingentem non venarum modo, sed totius membri affecti circa cutem, cumque calidum quidem moderare, sed vehementer rubentem, pulsusque adest in alto inflammationis mediocris, qui hoc modo affecti sunt neque refrigerantia, neque calfactoria valida præsidia adhiberi sustinent, & assidue, ac continue exacerbantur, quamquam & per circuitum quidam irritatione vexentur vrinæ vero eorum fuluæ sunt, & mediocri crassitudine præditæ: aliquando etiam sub sidentiam albam,

aut

aut nubem, aut tale quiddam in medio pendens quasi suspensum habentes: ætas ad multi sanguinis generationem apta magis est, ab adolescentia vsque ad ætatem vigoris: edulia item boni succi, & quæ maximæ alunt, ac exercitia moderata præcesserunt, tempus vero anni ver, & regio temperata: Biliosam vero fluxionem color cutis inflammari loci subpallidus, & subrubens testatur, item caloris sensus, dolorisque lancinantis modo acris: gaudet vero caliditas hæc, quæ vehementissima, & feruentissima est, amplius refrigerantibus pharmacis. qui enim ita habent vehementer a refrigerantibus iuuantur medicamentis siue actu, siue potentia talia existant, leduntur autem a calidis, humor in cutem subito sine euidenti tumore erumpet: exacerbationes his mouetur per tertium quenque diem: subinde febris in ipso accessionum statu accedit, ac valida sitis: eorum lotia subflaua erunt, & subflua quandoque etiam acriæ: Curæ item ingentes, iræ, vigiliæ, fatigationes, & vt summam dicam, vniuersa victus ratio bilem gignens, & attenuatoria ex acribus, & falsis edulis huius humoris influxum præcessit: ætas vero, & corporis temperies calida, & sicca, anni tempus æstiuum, itemque consimilis regio. At si pituitosa fuerit fluxio, color exalbidus, & aquæ subtercutem similis apparebit, ac ad digitorum oppressione cauus fiet tumor sublatus existens, & moderatus: dolores autem aliquando quidem fortes, aliquando mediocres, & exacerbationes quotidie paulatim irruunt, & augentur, & per plures horas durant, & breuem intercapedinem habent immo neque vnquam integre remittunt, tardius etiam in tumorem materia sese attollit, aderitque ætas seu illis, temperamentum frigidum, & humidum, similis ambientis nos aeris status, & tempus hybernium, aliquando etiam & frigoris sensum in alto locorum affectuum ægri perceptant, vita præcessit ociosa, ac secors, hæc nanque plurimum conferunt ad pituitosi humoris generationem: edulia etiam refrigerantis, humectantis, ac inspissantis facultatis: & balnea a cibo, vrinæ crassissimæ ab eis prodeunt, & sæpe conturbatæ reperiuntur: At si falsa fuerit pituita, color, & tumor affecti membri eodem modo se habent, pruritus autem maximus, & mordacitas locos infestabit: vrinæ vero tum his, tum prædictis aliquando quidem tenues, & aquosæ, aliquando vero crassum in eis est quod sublidet, suntque conturbatæ vt diximus. Quod si ex atra bile sit fluxus (quanquam raro id contingat) colores tumorum nigriores erunt, frigoris sensus quandoque affectis aderit, & corpora in profundo velut atterantur, aut scalpantur, afficiuntur, Circuitus exacerbationum per quantum quenque diē redeunt, suntque ex tum magnitudine, tum impetu mediocres: ætas vero, quæ magis humorem generat, est vigore inclinato, & vergente, temperies frigida, & sicca, quæ quidem superfluitates natura etiam pituitosas generat: præcedit hūc fluxum ratio victus ex edulis bilem atram gignentibus, & lassitudines immodicæ, regio frigida, & sicca, tempus autumnii, & consimilis aeris status, vrinæ vt plurimum in principio ei tenues fiunt, & aquosæ, postea vero, quam secundum naturam acriores, & modicæ crassæ, & quod sublidet in eis aliquando fuscum, aliquando vero mixtum, subruentum videlicet, & fuscum reperitur, vt liquet ex Aetio, & Paulo, Interdum autem ex prædictorum humorum complexu fluores fiunt, Nam fluxus commiscetur, vt calidus frigidus, aut frigidus calido, & secundum eorundem qualitatem tum dolores, tum colores, & calores, & exacerbationes erunt permixti. Verum vbi sic vitium hoc contrahatur ægre dignosci, & difficulter medicamentis eligi potest, vel etiam pene nullo remedio sanescit, vt inquit Paulus: & hac de re podagricus morbus molestam, tristemque de se opinionem acquisiuit (nempe quod nequaquam arte medica vnquā curari possit) propter generationis in quā varietatem,

Biliosa fluxio
ne.Signa pituitose
fluxionis.Si ex atra bile
sit fluxio, signaAet. c. 14. 15. 16
& 17
Paul. li. 3. c. 78
Prognostica.

Loco citato.

Cap. 1.

Curandi metho-
dus.
6. aph. com. 28.Si ex sanguinis
copia excitetur
curatio.
Victus ratio.Lib. 11. vbi agit
de podagra san-
guinea.
De vino nota.Commētario 4.
11. x. 23.
Venæ sectio.
Paul. lib. 3. cap.
28. de podagra
sanguinea.
Aetius libr. 12.
Cap. 13.
Ale. lib. 11. vbi
agit de podagra

tatem, propter quam neque internosci probe, neque absolutam curationem consequi potuit: Verum si hæc differētiæ, seu species ipsius quot, & quales existant internoscantur faciles curatu medicis erunt, Tralliano auctore cap. primo lib. 11. quanquam vbi tophi, seu calli appellati fuerint producti, ne speraueris ad pristinam constitutionem exacte articulum redire posse, ex Galeni sententia 10. de compositione medic. secund. locos: Hipp. eunuchus podagra non laborare, neque mulieres nisi menses defecerint, neque pueros ante Veneris congressum, 6. aphor. scriptum reliquit aphor. 28. 29. & 30. & eodem lib. aphor. 49. Quibusunque morbi podagrici fiunt (dicebat) si sedata in quadraginta diebus inflammatione, finiunt, modo (vt inquit Gal. in com.) medicus in suo opere non aberrauerit, & æger illi in omnibus obedierit. & aph. 55. sic scriptum ab eo est, Dolores podagrici uere, & autumnio magna ex parte mouentur, quoniam uero præcipuæ causæ tam podagræ, quàm articularis morbi sunt (vt prius dictum est ex Gal. sententia) & articulorum imbecillitas, & redundantium humorum copia, Propterea duplex etiam sanationis scopus nobis præfigitur, euacuatio inquam redundantis humoris, & corroboratio debilitatarum partium. Verum quoniam tam euacuatio redundantis succi, quàm partiū imbecillum roboratio varia existit pro ratione diuersi humoris redundantis, ea de re nos particulatim eadem conscribemus, ab eius podagræ, seu articularis morbi curatione exordientes, quæ ob sanguinis copiam ortum ducit. Eligatur igitur aer ad siccum vergens, ac etiam parum ad frigidum, seu in caliditate repperatum, somno, & vigilia vtantur moderatis, vitentque somnos longiores, aluum eos, oportet facile solubilem habere, & si sua sponte talis non sit, lenibus clysteribus vtantur; fluxione incipiente, ac uigente quiescant. Cum vero incinauerit, & reliquis temporibus exercitiis utendum est plusquàm mediocribus, mœrores, & curas, ac reliquas immoderatas animi perturbationes vitent, cibos modicos, ac parum nutrientes, & leuiter quoque infrigidantes adhibere oportet: abstineant autem ab his, qui multum nutriunt, ac copiosum sanguinem gignunt, eumque magis adaugēt, Quapropter a carne prorsus abstinere oportet, aut si id fieri non possit, propter virium imbecillitatem, volucrum, potissimum motanarum caro exhibeatur: vinum etiam penitus circuncidendum est, nisi corporum intemperantia, aut consuetudo illud requirat, quo etiam casu moderatiore vtatur, Nam multos noui (vt inquit Alex.) ex iis, qui cum vino tantum abstinere, non amplius morbos fuisse expertos: copiosum namque vinum multo sanguine præditis inimicum est. In vicem vini aqua vtendum, in qua præparatorum coriandrorum semina fuerint decocta, aut etiam cinnamomi parum: A venere abstinendum præsertim immoderata, Nā venus omnes podagricos extreme lædit, & præsertim si assidue, & intēpestiue ea utantur, Aetio re ste cap. 20. lib. 12. quinimo nedum si quis venereis utatur immoderatis incider in podagram, sed crapulæ etiam, cruditates, ac ebritates, desidiaque uita cuiuslibet podagræ auctores sunt, & morbi etiam articularis, ut liquet ex Gal. com. citati aphor. 28. 6. lib. Qua de re ab eisdem cauendum erit, & bonæ coctioni, ac sobrietati uazandū, & mediocri exercitio uti oportet, eum qui a podagra, ac morbo articulari cupit esse immunis; Nāque salubris victus caput est (vt inquit Hip. 6. de morb. vul.) non satari cibus, & impigrum esse ad labores. Ceterum in quibus sanguineus humor redundat necessario protinus sanguis mitti debet ubi quidē nihil prohibeat, Pauli, Aetii, ac Alex. sententia, Verum statim cum quis morbum experiri cœperit sanguinis missio erit tentanda, id enim inter initia statim factum sæpe annuam, nonnunquā perpetuā valetudinem præstat, Celso auctore c. ultimo lib. 4. Qui vero iam læpius huiusmodi fluxionibus sunt conflictati, plus noxæ, quàm auxilii ex sanguinis detractio-

detractione sentiunt, vt inquit Paulus, præsertim si corpore sint imbecillo, & frigido hac enim ratione (vt Alex. testatur) multos nouit aut in totum morbo liberatos aut raro fluxionibus correptos, eo quod non neglexerint, sed ueris statim initio sanguinē sibi detrahi curarint non solum vacuandi, sed etiam præseruationis gratia id facientes, neque semel, duntaxat, sed iterum, atque iterum pluries vena secanda erit detractione sanguinis paulatim repetita, secanda est autem vena, ex Aetii decreto, ex directo cruris fluxione infestati in brachio interna: Si vero hæc non appareat, media, quod si manus dextra dolore infestetur, venam in dextro crure secabis, adeo etenim magnam habet vim venæ sectio in his, qui multo sanguine redundant, vt nedum cum inceperit podagra, seu articularis morbus ægros à morbo vindicet, sed eisdem nondum ea laborantibus, sed obnoxiiis, ac partis incidere, etiam si tribus, quatuorve annis per interualla laborassent, ineunte vere secta vena ab eadem fuerunt liberati, Gal. auctore lib. de cur. rat. per venæ sectionem, & com. aph. 47. 6 libr. modo deinceps in omni victu, vitæq; ratione agerent moderati, Porro à venæ sectione adhuc sanguineo influente humore, quemadmodum etiam & reliquis influentibus scopum afferendorum auxiliorum communi rationi influentium humorum subicere oportet, ita vt repellamus, ac restringamus, Nam manibus, & pedibus pharmacis fluxionem repellentibus uti debemus, vt liquet ex eodem Galen, 10. de compos. medic. secund. loc. quanquam eadem adhibenda non sint nisi à venæ sectione, corpore prius præuacuato, aliàs magni mali auctor eris, Nam quod articulis influit, ne ad principales partes recurrens suffocationis causa fiat ægro, periculumque mortis afferat, metuendum est, & sic pro morbo mortem inducit, Alex. & Actio testibus, quinimo post sanguinem detractum, (nisi solus ille superauerit) momento temporis interposito purgationem etiam molemur, ex Pauli testimonio, Diuersa autem purgatione utendum erit pro differentia redundantis cum sanguine humoris, harum purgationum infra mentio fiet. Post sanguinis missionem, ac etiam purgationem ubi opus fuerit, particulari fluxione tentatis, ea adhibeantur medicamenta, quæ vim habeant id quod influit repellere, eisdem partibus robor adicere, ac quod in eis continetur exiccare, Vbi vero amplius non influat, discutientia appropinquare oportet. Quapropter circa initia aceto veteri tenuium partium cum rosaceo eas rigas oportet, & præsertim si in alto hære dolorum causa videatur etenim acetum propria sua tenuitate vsque in altum progressum expedita rosaceo vim exhibet, quod natura sua dolores lenire potest: Ac si in superficie dolor consistat per vini, & iam dicti olei usum magnopere iuueris, æstate quidem tepidorum, hyema vero calidorum (vt Aetio visum est:) ex mali punici corticibus, hu, & temperuino vino probe decoctis, accurateque leuigatis, ac cum farina mixtis medicamentum commendat Alex. sit autem farina hordei, vel fabarum, poteritque adici rosaceum, ac prædicta in posca decoqui, præsertim si dolor magis in alto hæret, & calor adlit immodicus: conducit etiam (vt eidem visum est) malum punicum ipsum mediocriter decoctum, vt supra leuigatumque affectis particulis imponere æstate frigidum hyeme autem tepidum: aliis quoque cataplasmatibus utendum, quæ inflammationes lenire possunt citra hoc quod fluxiones prouocent. talia sunt (vt inquit Aetius) farinæ hordei, fabarum fœnugræci, ac cicerum tritæ vino coctæ modica etiam aqua affusa: quibus quoque oleum rosaceum adici poterit: necnon & eadem farinæ in posca, & oleo rosaceo decoctæ dolorem mitigare consueuerunt, etiam quælibet de per se. Permutentur autem assidue cataplasmata, ac etiam foris contegantur ne infrigidentur: Item ex caprillo lacte, seu bubulo farina hordei, vel fabarum, seu panis medulla vitælis ouorum rosaceo pauco croco adiecto, & aceto: medicamentum fiat etenim non parum conferet, debet autem assidue permutari, Ad

sanguinea.
Loco citato.
Loco citato.

Lib. 11. cap. 13

Lib. de cur. rat.
per venæ sect.
Cap. 7.

Ratio medica
minorum a ue
næ sectione.

Cap. 2.

Locis citatis.
Purgatio.
citato loco.

Topica medica
menta qualia
esse debeant.

Lib. 11. cap. 6.

Loco citato.

Lib. 12. cap. 25

Aet. li. 12. c. 23.
loco citato.

S ex biliosa flu
xione fiat poda
gra, aut Arthri
tis curatio.
Victus ratio.
Paul. li. 3. cap. 78
De podagra bi
liosa. & Alex.
li. 11. cap. 1
De podagra bi
liosa.

loco citato.

Medicamento.
ruin ratio.
Vomitus.
lib. 12. cap. 13
Loco citato

Ibidem.
Purgatio.

Clystera.

Vena sectio.

hæc ex malis cotoneis vino maceratis pane permixtis, ac rosaceo cataplasmata imponatur: ipsis vero affectis partibus neque aqua, neq; aliud oleum adhibea-
tur, sed si eas ablueri oporteat, posca mediocriter tepescita, aut alterius plan-
te austera decocto abluantur, ex Aetii præcepto: At si dolor adhuc remanet,
præsertim si in alto fuerit, hoc cataplasmate vtare (ex Alex. sententia) foliis
brassicæ coctis, leuigatisque diligenter, facem aceti, odororum crudorum lutea
duo, & rosacei paulum adiiçito, ac mixta omnia simul, leuigataque inducito cō-
tinue immutans medicamentum, & vehementes dolores multum lenies, vt ip-
se inquit: Si vero articularis, seu podagricus dolor, ob biliosi humoris influxuū
proritetur, Victus ratio refrigerans, humidaq; præcipiatur, vitanda sunt om-
nia calfacientia, & que pallidam, seu flauam bilem generare ualent, ex Pauli,
& Alex. monumentis, Talis itaque qualitas aer eligatur, pzulo tamen ad hu-
midum vergant ne fluxiones proritet: quies, & somnus eligatur: labor & vene-
ris vsus intercidantur, pariter & vigilæ immodicæ, alius quotidie suo munere
fungatur, aliàs leui clystere eluatur: ab ira, & furore, ac inedia arceantur: cibis
autem vtantur ptisana, & eius cremore: Ex oleribus lactuca, intubo, malua, in-
terim quoque blito, & soncho. Ex auibus gallinis, perdicibus, merulis, turdis,
aliisque montanis passerculis, Ex piscibus saxatiles, & erinacei conueniunt, Ex
fructibus parum astringentes gustare conuenit, vt mala, sorba, pyra, mala puni-
ca, & reliquos huiusmodi: Ex bellaris castaneas commendat Alex. Crapule
(vt dictum est) & nimix ciborum repletiones vitetur, Potus, sit aqua hordei,
aut in qua semina coriandrorum præparatorum fuerint decocta: Vitandumq;
omnino vinum est, præsertim, vetus fuluum, aut nigrum. Cæterum circa initia
confestim tentandum est noxium humorem vacuare tum per vomitum, tum
etiam per inferiorem ventrem, ut Aetio visum est: Vomitus per aquam tepidā
assumptam fiat exiguo aceto aut syr. aceroso permixto, Purgatio autem non
prius exhibeatur (ex Alex. decreto) quā acrimoniam humoris, ac rosionem
humestaris ac contemperaueris. In quem vsus syr. è succo cychorii, ex succo,
seu infusione rosarum, & reliqui sexcenties in præcedentibus conscripti præ-
beantur, à quibus eos confidenter purgabis nedum se mel, sed sæpius si res po-
stulabit, ita nanque (ut refert Alex.) a recrementis, & fluxionibus tutos serua-
re poteris, si materiam superantem non uniuersam, sed per uices subtrahere
semper coneris: Sit autem medicamentum simplicius, ac familiarius quod fie-
ri possit, quod non multum calidum existat bilem ducens cum facilitate, velu-
ti est casia fistula, mel aereum, saccharum violaceum, syr. ex pluribus infusioni-
bus rosarum, & reliqua huiusmodi; Poteris autē hunc in modum purgaus me-
dicamentum componere, Recipe mellis aerei vnc. ii. seu pulpæ casia fistulæ
vnc. i. s. siue sacchari violacei vnc. ii. s. aut syr. ex pluribus infusionibus rosarum
vnc. iii. diacath. vnc. s. cum aqua cychorii fiat potio, & vbi hoc non suffecerit,
sed iterata purgatione indigebis, paretur decoctum seu infusio ex 3. iii. myro-
balanorum citrinarum in aqua cychorii, aut endiuia, seu aqua lactis, cui 3. i.
rhabatbari, vnc. ii. mellis aerei, aut iii. syr. ex pluribus infusionibus rosarū adii-
ciantur, & vnc. s. diacath. aut 3. ii. eclegmatis rosacei, & fiat potio: Quod si ad
huc vltiori purgatione ægri indigeant, tandem, aut similem potionem re-
petas post aliquos dies, aut ex 3. i. rhabarbari, & 3. s. agarici, & scrup. ii. corti-
cum myrobalanorum citrinarum, seu trochiscorum earundem catapotia for-
mato, post quæ vnc. ii. mellis aerei, aut iii. syr. ex pluribus infusionibus rosarū
rubeorum absorbe aut ægrotantes, clysteribus item lenientibus hoc tempore
sæpius vtare, & vbi bilis defluens sanguini permixta fuerit, non erit ablouum
reuulsionis gratia in principio ante purgationem venam secare seruata recti-
tudine, vt diximus, aliis consentientibus pauca sanguinis copia emissa, à qua
eadem bile præparata, contemperata, & concocta tucius purgans medicamen-

tum exhibebis, deinceps ad topica medicamenta te conuertas, expedit enim affectas partes à principio vsque ad vigorem refrigerare, & corroborare, ac mitigare ne propter immodicum ardorem magis fluxionibus tententur, ut liquet ex Aetio, & Alexâ. Ad hoc autem præstantissimum est rosaceum, si ouorum lutea præsertim ei admisceas, vini etiam, aut aceti momento addito, ex eiusdem Alex. & Pauli testimonio. Herbarum etiam admoueantur, quæ infrigidandi, & abstringendi vim habent per se leuigatæ præsertim virides, veluti sunt semperuium, lactuca, solanum, portulaca, lenticula palustris, feris, polygonum, rosarum foliarum, ex acutus, a triplex, plantago, blitum, umbilicus veneris, violarum flores, & reliqua huiusmodi. Hæc etenim dolores, qui in accessionibus fiunt abunde lenire possunt, adhuc etiam magis si paucæ farinæ hordeaceæ, vel vnū ex prædictis, vel duo admisceas, & ne siccescat medicamentum vtile est etiā rosaceum cataplasmati adicere: frigida autem cataplasmata admoueantur, murenturq; crebrius, & nunc hæc, nunc micæ panis posca imbutæ adhibeantur, vel hordeacea farina cum rosaceo accommodetur, ut Paulo visum est. At si semen psylli in aqua feruenti maceretur, & diligenter subigatur, viscosumque fiat, & hordeacea farinæ permisceatur, mirabiliter dolores mitigabit, feruorem, & ardorem doloris extinguet, & affecta loca ad temperiem bonam reducet, ut liquet ex Alex. Aetio, & Paulo optimum autem pharmacum dicebat esse idem Aetius ex rosaceo, & betæ succo compositum, vidit etiam (ut ipse testatur) quendam hac affectione occupatum, qui immixtis in frigidam aquam pedibus, & aliquandiu in ea detentis præclaram opem tulit. Vbi vero adeo magnus dolor vrgeat, vel laborans eum ferre nequeat, eis, quæ torporē inducunt, medicamentis vtendum est ex dictorum auctorum monumentis, quanquam eorum liberalior vsus cauendus sit, neque diutius eisdem insiltendum, quam ut doloris vehementiam dūtaxat lenierint, & deinceps prorsus aufere vbi feruor doloris finierit aliàs, magis offendat, quam iuuabunt, constringere etenim insertum humorē sic ut in rophaceam duritiem occalescat, & languidum sensum diuturna sq; motus difficultates parient, Verū vbi sedatus fuerit dolor cōfestim partes resouendæ erunt per ea, quæ calefaciunt medicamenta: In hunc iraque vsus cicutæ, papaueris, hyosciami, seu mandragoræ folia adhibeantur, vel eadem folia contusa, ac leuigata cum ouorum luteis, ac rosaceo permixta accommodentur: Similis quoque efficaciæ erit hoc medicamentum Pauli, Recipe micam panis aqua maceratam, vel posca imbutam cum succo semperuiui, vel portulacæ, vel solani, vel palmularum carne, & papaueris semine pari portione, adicias ouorum tostorum lutea, ac rosaceum, & affectas partes delinias Gal. 10. de comp. medic. secund. loc. hoc medicamentum ex Asclepiade commendauit, Recipe succi paueris. 3. iiii. poteris. 3. ii. assumere, croci 3. i. cum lacte bubulo, aut caprillo tertio, ac adiecto pane interno diligenter leuigato ut molle cataplasma, fiat & rosaceo admoto mollito, ac vritor. Forinsecus betæ, ac lactuce foliis custodiendi eius gratia impositis, item opium, & crocum cum lacte trita cerato rosaceo excipiebat linteolo infarcta imponebat, post anodynorum vsus thymi, origani calaminthæ, satureiæ, saluiæ, & similibus decocto in aqua, aut vino, ut videbitur, loci calefaciendi sunt: Aduuare etiā oportet sudorem exclusionem corpus calefaciendo, & fricando, ita tamen ne affectos locos cōtinguamus, ut Aetius refert, & præbenda sunt ea, quæ urinā diētalia etenim bilem per lotium euacuare consueuerunt, ut ipse asserit: Doloribus quoque valde infestantibus, ea, quæ somnum conciliant, exhibeantur, veluti est lactucæ, & papaueris semen tum incibo, tum in potu, similiter, & syru. de papauere post cibum, hæc autem post corporis euacuationem exhibeantur, ex licentia eiusdem Aetii. At si is, qui influit humor pituitosus fuerit, eligatur aer calidus, & siccus: Somnus moderatus, Nam, & moderatæ etiam vigilæ

Topica.

Locis citatis.

Anodyna.

cap. 3.

Lib. 12, cap. 30.

Loca citata.
Si pituitosus in

Huat humor cu
ratio.

Vicius ratio.

Lib. 12. cap. 33.

locis citatis.

Lib. 12. c. 53
citato loco.

Venæ sectio.

lib. 11. cap. 1
vbi depodagra
pituitola agit.

Medicamento.
tum ratio

Vomitus.
lib. 12. cap. 33

purgatio.

loco citato.

citato loco.

conferunt: circa fluxionis initia quies, postea exercitium valde conducit, alui excrementa quotidie natura, vel arte excernantur, adhibitis nedum lenibus, sed efficacioribus quoque clysteribus: Inedia quoque, & fame vtendum est ad plures dies. Nam pituitosa natura eam bene tolerare potest, vt inquit Aetius, Corporibus etenim carnes humidæ habentibus famem adhibere conuenit: fames nanque corpora exiccat, Hipp. auctore aph. 59. 7. libr. Deinceps aut vt inediam ferre non valeant cibi tribuantur qui parum nutriant, extenuent, ac siccet, ex eiusdem Aetii, & Pauli testimonio, veluti est orizæ succus, passer culi montani assati, nuces iuglantes pistachia, vix passæ, & cappares ex aceto mulso: quandoque etiam vti poterunt paruis pisciculis in petrosis aquis coalitis, assis, aut elixatis adiectis quibusdam herbis extenuantibus, vt fœniculo, hyssopo, satureia, sampsocho, puleio, serpyllo, & reliquis huiusmodi: Ab aliis carnibus, & leguminibus, fugacibus fructibus, reliquisque refrigerantibus ac, copiosiore vino, præsertim nigro abstinentum, verum quàm minimum vinum interualli tempore tenue, fuluum, & vetus præbeatur, ut refert Aetius: quam si fieri possit etiam ex toto vinum circuncidendum sit, Plurimos siquidem noui (inquit Paulus) qui prorsus abstemii omnes sanitatem consequi sunt, alii siquidem per morbi initia omnino liberati sunt: alii in posterum rarius, & minori dolore accessiones perceperunt, Quapropter nisi quid obster, aut futuri inde aliquid metuant mali perpetuam uitam agent abstemiam, In uicem vero vini decocto anisi, aut alicuius consimilis vtatur, si Paulo credendum est. Poterunt ite cinnamomi, aut garyophyllorum decocto, seu aqua mulsa uti, Cæterum si q. defluit humor nō modo pituitosus fuerit, sed simul cum sanguine redundas appareat, vena secāda erit prius, deinde viribus recreatis, ad medicamentum purgans veniendum est, ex Alex. testimonio, saltē resolutionis gratia aliis consentientibus, neque Paulus hoc negauit, quoniam magis pituitosis ipsam prohibere noluit, neq; magis etiam melancholicis, verum ea statim tentanda erit cum quis morbum experiri cœperit, nec multa sanguinis copia extrahenda, ne plus noxæ, quam auxilii ex sanguinis detractioe cōsequatur. A venæ sectione, aut vbi pituitosus succus citra sanguinis permixtionem redundarit, ac fluxerit, a pituitæ vacuatione principii curationis sumere oportet, vt inquit Aetius, Euacuatur autem humor pituitosus per vomitus quidem nihilominus, & inferne per ventrem. Vtilis est autem in hac affectio ne per inferna purgatio siue iuxta manus, siue iuxta pedes hæreat morbus, & multo adhuc magis si iuxta omnes corporis articulos fluxos fuerit dispersus: familiarior etenim pituitæ via, & minus periculosa per intestina exiit: Si enim in superiorem uentrem uiolenter attracta nō euacuatur, periculum inducit, vt testatur idem Aetius. Tutius itaq; est vt ad infernā excretionem pituita ducatur, paulatim tamen, & per uices, Nam neq; crassiora excrementa vniuersa, & uice vna extrahi possunt, vt inquit Alex. Verum ante purgationem medicamentorum exhibitionem ea tribuenda sunt, quæ uim habeant extenuandi, ac incidendi, Nanque si præparati pituitosi succi ad purgationem magis idonei reddantur præparentur autem melle rosaceo, syr. ex itœcade, oxymelite simplici, aut etiā scyllino pauco adiecto, syr. ex succo borraginis, aut de infusione rosarum: quibus iam præparatis purgans medicamentum præbeat ur tale, Recipe myrobalanorum chebularum 3. iiii. agarici 3. i. s. fiat decoctum, in quo per colum transfuso dissolue sy. ex pluribus infusionibus rosarum rubearum, vel persicarum unc. iiii. confectiois de dactylis 3. ii. diacath. vnc. s. fiat potus, uel 3. i. pilularum e sagapeno, seu fatidarum recipe, & alteram agarici trochiscati, & cum sy. de itœcade, aut oxymelite cataportia formato, post quorum assumptionem decoctum 3. ii. corticum myrobalanorum: chebularum absorbeant, in quo vnc. ii. vel iiii. syru. ex pluribus infusionibus rosarum rubearum sint

sint dissolute, hæc non semel duntaxat, sed bis, & sæpius, vt diximus (vbi vsus vrgear) repetenda sunt. Nostri temporibus vniuersus fere medicorum coetus ex quadam praua consuetudine, seu abusu ductus nedum in articulorum doloribus, seu podagra pituita ortis, sed in omnibus ex quacunque causa fuerint-
 geniti, hermodactylis aluum purgatione sollicitant: quandoque etiam catax potius de hermodactylis à Mæ sue, seu Raze compositis vtuntur, verum ipse pij nitus abstinendum esse cōsulto ab hermodactylorum vsu, Nam quo seplasiar hodie per hermodactylo vtuntur, non est hermodactylus, Sed bulbus quidem agrestis à græcis *κολοχικόν*, appellatum, huic enim omnibus numeris aridet, vt liquet ex Dioscoride cap. proprio, quod quidem in cibo sumptum (vt ipse inquit) fungorum modo enecat, si contingat ipsum exhibitum non enecare, eius exiguae quantitati, quæ offertur ascribendum erit: nec propterea negandum est quod suapte natura enecet, & si non suffocat propter eius exiguam quantitatem saltem magnum inferit corporibus detrimētum, quem admodum sæpius experientia etiam obseruari est. At testis quod sit hermodactylus (quod negatur) adhuc ab eo abstinendum erit, nisi valde robustis corporibus tribueretur, Nam etiam verus hermodactylus stomacho facessit negotium cibi fastidium ex repletionem, & ventriculi redundantia mouens, cum eidem sit inimicus, & nimis aduersetur, Paulo auctore cap. de podagra, & cap. de hermodactylo: quapropter reliquis vtendum est purgantibus medicamentis tanquam tutioribus existentibus, hermodactylos, seu eorum cataportia omnino vitantes. Atqui si euacuatio per purgationes ob aliquam causam fieri non possit, tum inedia, & fame vtendum est ad plures dies tum etiam frictionibus discussoriis, efficacioribus clysteribus, & pharmacis vrinam cientibus, Aetio recte: Post purgationes antidota etiam nonnulla exhibere conuenit, præsertim his, qui natura pituitosa sunt, veluti theriacam, mithridatum, ac diacorallium dictum, quod omnium securissimum, longoq; vsu probatissimum est, ex Alexan. & Pauli testimonio, cuius descriptionem apud eosdem perlegas: Partibus vero affectis medicamina imponenda sunt quæ vim habeant leniendi, discutiendi, atque astringendi, præsertim circa initia. Nā deinceps omissis astringentibus discutientibus magis, ac exiccantibus vtendum, Imponatur itaque terebinthi folia virida, & tenera cum adipe suillo recenti, & rosaceo modica cera adiecta: apta etiā sunt cupressi folia, & pilule vino cocta: nec non & cyperi radices, aut rhamni folia, vt inquit Aetius. Verum cum folijs, aut pilulis cupressi, cyperiq; radicibus, aut rhamni folijs, poteris tu adipem suillum recentem, ac rosaceum, & modicam ceram admiscere. & vbi mediocris dolor affuerit, brassicæ folia conferunt, si cōcisa obducantur, similiter apii, aut conizæ, ex Alex. & Pauli auctoritate. Sin autem dolor, vehemens ortus, fuerit, cataplasmatibus mitigantibus: vt oportet, qualia sunt quæ ex farina fœnugræci, seminis lini, cicerum, & loliacea constāt ex aqua mulsa, aut vino tenui decoctis modico oleo nardino adiecto item cinis cremate radice brassicæ, eiusque coliculorum cum axungia illitus multis fuit præsidio, vt inquit Paulus, sed finiendis doloribus recens adhibenda est axungia, discutiendo autem humori verus salsa auxiliatur: bubulum quoq; ster-
 cus cum ordeacea farina in aqua mulsa coctum prodest vel per se recens, & liquidum, vel ex folijs brassicæ, similiter caprillus finus per se, aut cū hordeacea farina coctus in posca, eodem Paulo teste, Mansuetissimum autem remedium est (vt Aetius refert) post principium, etenim leuiter discutit, & exicat, si althææ folia cocta trita tum per se, tum cum polline, seu hordeacea farina imponantur: Eundem etiam præstant vsus radices eius cōcise in aqua mulsa tritæ, vt idem Aetius fatetur: amaraci item coma, arthemisia, abrotani folia, pullegium, sampsuchus, brassica, serpyllum, feniculū, sisymbrium, mentha, ac reliqua huiusmodi per se singula cum pane, seu farina fœnugræci, erui, aut loliæ
 recenti

De hermoda-
 ctylo quid sen-
 tiendum.
 Lib. 4. c. 717

Lib. 3. c. 78. &
 Lib. 7. c. 5.

Quæ a purgatio-
 ne tribuenda
 sunt.

Topica,

recenti adipe suillo, oleoque irrino, seu nardino pro cataplasmate imponuntur. At si nihil hisce cataplasmatibus leniantur, foribus, seu liquoribus torrentis ritu ab alto proiectis certandum erit: sunt autem hi chamæmeli, melilori, fœnugræci, aut centauris decocto: Nonnullis etiam capparis decoctum abunde fuit auxilii: Verum quod infra scribitur omnibus præstat efficacia, ut liquet ex Alex. & Paulo, thymum, origanum, satureiam, & calamintham in aceto acerrimo decoquito, & ubi herbarum probe fuerint decoctæ, tunc eodem aceto adhuc calido affectas partes, non modo semel, aut iterum, sed sæpius, & frequenter superinfundito, seu foueto. Hoc præhædio (ut ipsi fatentur) permulti pristina valetudine recuperarunt, quibus non pituita solum, sed etiam flaua bilis, fuit infecta: Vbi vero per ista dicta cataplasmata, aut superinfusiones, seu fots, dolor moderatior euaserit, eis utendum est medicamentis, quæ non solum summam cutem instantia, sed etiam in alto fixa calfacere, & discutere queant, Alex. auctore: Conponatur autem hunc in usum hoc medicamentum, Recipe adipis suilli veteris, & butyri, cuiuslibet vnc. i. olei vteris, vel nardini vnc. ii. cremoris seminis lini, & fœnugræci, singulorum 3. iiii. ammoniaci, & galbani in aceto macerati an. 3. iiii. croci 3. s. ceræ quantum satis sit, fiat ceratum: Item & hoc admirandum est pharmacum, Recipe castorei, thuris an. 3. i. s. medullæ ceruinæ, & adipis anseris an. 3. iiii. olei anethini, & nardini ana. vnc. ii. s. bdelli, & galbani in aceto dissoluti an. 3. iiii. farinæ seminis lini, & fœnugræci ana. 3. iiii. s. cum cera quantum satis sit, fiat medicamentum: Hoc etiam vtare tanquam magnopere conferente, Recipe succi radicis ebulorum 3. iiii. resinæ pinus, & terebenthinæ ana. 3. iiii. olei vulpini, & chamæmelini an. vnc. ii. cremoris seminis althææ, seminis lini, & fœnugræci, cuiuslibet 3. ii. s. opoponacis, sagapeni, & ammoniaci dissoluti in aceto an. vnc. s. croci 3. i. cum cera quantum satis sit, & adipis suilli vnc. i. fiat ceratum. Admirandum quoque iis pharmacum est, quod ex croco constat ab Aetio descriptum cap. 26. lib. 12. Hoc etiam tempore naturalia balnea discutienti, ac exiccandi vi prædita conferunt, quemadmodum Puteolis est balneum, quod vulgus appellat (Souiene homini) quidam aqua marina, lixiuio vel vino astringenti affectos articulos lauant post inflammationum remissionem, non nullasque in eisdem, aut etiam aqua decoquunt discutientes, ac exiccantes herbas, & laconicum balneum parant, quo non inutiliter vtuntur. Si vero ex atra bilis influxu laborabunt (quanquam hoc raro accidat, & ipsi quoque omnino uniuersali vacuatione indigent) protinus quidem venæ sectione, quoniam & in his humor, quemadmodum & in magis pituitosis, quam maxime in venis continetur quantitate, magis quam qualitate peccans, ex Pauli sententia, Verum statim in morbi principio vena secanda erit, Nam si sæpius fuerint a fluxione comprehensi, offenduntur magis a sanguinis vacuatione, quam iuuantur, præsertim quibus natura frigidus aut imbecillius est corpus, ut ipse inquit. Aetius vero quandoque venæ sectione, interim purgatione, & interdum vtriusque eos indigere fatetur, cap. 34. eiusdem lib. 12. Nam quando ad sanguinem declinant atra bile infectum venæ sectione opus habent: quando vero ad atram vergunt bilem, euacuatione, per ea, quæ ipsum repurgant: Si vero hæc ambo simul per totum hominem redundarint, prius venam secare, deinde purgare eos cogimur, ut ipse asserit. At quoniam sæpius in uenis continetur totius corporis cum sanguine permixta atra bilis, quibus ex eius fluxione podagra excitatur, seu articularis morbus, propterea saltem reuulsionis gratia in morbi initio vena secetur; ac deinceps concocto, ac præparato humore purgetur aliquo medicamento purgante eorum, quæ cap. de melancholia conscripsimus, & medicamentis vtare in eodem principio super affectas partes repulforiis, & sensim simul calfacientibus, veluti sunt iam dicta terebinthi, accipressi folia, cyperiq; radices, & reliquæ huiusmodi. At post principium his, quæ sensim calfacere, & attenuare,

Si ex atra bile
fluxio fiat, cura
tio,

Venæ sectio.

Purgatio.

Topica.

Lib. 12. c. 34.

tenuare, ac discutere possunt vtemur; ex sententia eiusdem Aetii, cuius farinæ sunt lauri folia mollia, pastinacæ, caucalidis, conizæ, brassicæ, iridis, ocymi, nasturtii, & reliquorum innumerorum admiscenda autem sunt hæc pani, aut cuiuspiam ex prædictis iam sæpe farinis adipi anserino, aut gallinaceo, butyroque, & æsypo, quo leniora reddantur, potissimum in mollibus, ac humectis corporibus vt patet ex eodem auctore: Reliquis quoque medicamentis supra relatis post huiusmodi pharmacorū impositionem (vbi ea non suffecerint) vti conuenit. At in quibus obscura fuerit podagræ origo hæc semel experiri abunde fuerit, & modo ad consimilia transgrediendum est, modo contrariis pugnandum, neque tamen eisdem diutius immorari consilium est, si nullum ex eis iuuamētum perceperint. Hæc quotidie in artis operibus fieri videmus, vt idem medicamentum vni articulo profuerit, alteri in eodem ægrotante inflammationem excitari: quin etiā nō modo non opituletur, sed confestim (quod maxime mirum est) offenderit: quippe vnus, idemq; articulus sæpe ex eodem re medio nunc iuuabitur, paulopost eiusdem appositu inflammationē concipiet, vt liquet ex Paulo: Quoniam uero & tophi etiam in articulis quandoq; gigni consueuerunt modo ob humoris, qui ad eos decubuit, crassitiem, terrestremque duritiem, modo propter immoderatum discutientium, resicantiumq; medicamentorū vsum, sine eorum mixtura, quæ emolliendi virtute pollent; propterea pro eorum curatione (si curari poterunt) ea conuenientiora sunt, quæ emollientem naturā sortiuntur, veluti sunt adeps suillus caprillus, vitulinus, anserinus & medulla, præsertim ceruina, althæa bis cocta, & reliqua huiusmodi. Interim autem digerentibus, ac discutientibus vtare, quemadmodum cap. de lineis scirrho docuimus: proprie autem facit vetustissimus accerimusque caseus cum suillæ carnis præpinguis, ac veteris decocto contritus, & super impositus ex omnium fere medicorum græcorum consensu: Liquet itaque ex his simplicium fluxionem articulare morbum, seu podagram generantiū curatio, Quæ de re nulla amplius difficultas aderit etiam mixtarum curam inuenire. Satis enim manifestum est quod ad humorū complexū, consequitur etiam curationes oportet mixtas esse: Cognitiones etiam mixtarum fluxionum ex prædictis simplicibus affectionibus sunt sumendæ, & propterea iure eas prætermisimus.

Si obscura fuerit podagræ origo.

Tophorum curationis.

F I N I S .

R E G I S T R V M .

* A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z .

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn.

Omnes sunt quaterniones, præter * duernionem, & Nn ternionem.

